

# 全国农技中心文件

农技植保〔2025〕15号

## 全国农技中心关于印发 2025 年油料经济作物 重大病虫害防控技术方案的通知

各省、自治区、直辖市植保（植检、农技）站（总站、中心），  
天津市农业发展服务中心，广东省农业有害生物预警防控中心，  
新疆生产建设兵团农业技术推广总站：

为贯彻落实全国农业农村厅局长会议精神，做好油料经济作物重大病虫害防控技术指导服务，推动油料经济作物病虫害绿色防控提质增效，我中心组织制定了 2025 年大豆、棉花、花生、向日葵等作物及大豆玉米带状复合种植主要病虫害防控技术方案。现将方案印发你们，请结合当地实际，认真抓好落实。



# 2025 年大豆病虫害防控技术方案

据全国农技中心预测，2025 年全国大豆病虫害总体中等发生，发生面积 1.35 亿亩次，重于上年。其中，大豆根腐病、大豆食心虫在东北春大豆区，甜菜夜蛾在黄淮海大豆玉米复合种植区，烟粉虱在黄淮南部偏重发生。为做好 2025 年大豆病虫害防控工作，制定本方案。

## 一、防控目标

病虫害危害损失率控制在 5% 以内，坚持防病虫害提单产和品质并举，在大豆主产区及带状复合种植区加强绿色防控与统防统治融合推进，保障大豆生产和质量安全。

## 二、防控策略

坚持预防为主、综合防治的方针，合理选用抗（耐）性品种，加强种子处理、健康栽培，综合应用农业防治、生态调控、理化诱控、生物防治、科学用药等技术措施，推进大面积单产提升。

## 三、防控对象

### （一）北方春大豆区

重点防控根腐病、胞囊线虫病、大豆食心虫、大豆蚜虫，兼顾细菌性斑点病、菌核病、霜霉病、灰斑病、豆荚螟、红蜘蛛、棉铃虫、苜蓿夜蛾、大豆蕾瘿蚊及叶甲、地下害虫等。

### （二）黄淮夏大豆区

重点防控根腐病、病毒病、炭疽病、甜菜夜蛾、点蜂缘蝽、烟粉虱，兼顾拟茎点种腐（茎枯）病、地下害虫、棉铃虫、大豆

食心虫、豆荚螟、大豆蚜虫、蜗牛等。

### **（三）南方多作大豆区**

重点防控根腐病、锈病、病毒病、炭疽病、斜纹夜蛾、豆荚螟、豆秆黑潜蝇，兼顾甜菜夜蛾、豆卷叶螟、高隆象、点蜂缘蝽、稻绿蝽、地下害虫等。

## **四、防控措施**

**（一）播种期。**合理轮作，避免低地温早播。选用抗（耐）病虫害品种，筛查精选优质种子，并进行药剂处理。防治地下害虫和叶甲、大豆蚜等苗期害虫可选用含有噻虫嗪等成分的种子处理剂，蛴螬等地下害虫重发区可选用吡虫啉或金龟子绿僵菌等颗粒剂撒施或种肥同播。防治大豆根腐病、胞囊线虫病等根部病害可选用含有精甲·咯菌腈、吡唑醚菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等成分的种子处理剂。

**（二）苗期至分枝期。**食叶类害虫可选用氯虫苯甲酰胺等喷雾防治。刺吸类害虫可选用高氯·吡虫啉、噻虫·高氯氟、联苯·氟啶虫酰胺等化学药剂，或苦参碱、阿维菌素等生物农药喷雾。防治病毒病需及时防治刺吸类害虫，阻断其传播病毒，可结合喷施氨基寡糖素等植物诱抗剂进行预防。大面积连片田块可结合使用色板、灯光诱杀等物理防控技术，监测并防控烟粉虱、金龟子和鳞翅目等害虫成虫。

**（三）开花至鼓粒期。**发病初期可喷施唑醚·氟环唑、苯甲·嘧菌酯、丙环·嘧菌酯、氟硅唑等防治锈病、茎枯病、炭疽病和菌核病，喷施唑醚·烯酰吗啉、氟菌·霜霉威等防治霜霉病，喷施

春雷·王铜、噻唑锌、噻霉酮等防治细菌性斑点病，同时喷施叶面肥、生长调节剂、诱抗剂等，强健植株，预防早衰。开花结荚初期重点防控点蜂缘蝽等刺吸式害虫，选用聚集信息素诱捕，并喷施噻虫嗪、噻嗪酮等药剂，同时兼治其它食叶害虫。结荚鼓粒期重点防控大豆食心虫、豆荚螟等蛀荚害虫，可选用性诱剂诱杀成虫；释放赤眼蜂灭卵；选用苏云金杆菌、氯虫苯甲酰胺、高效氯氟氰菊酯等杀虫剂防治初孵幼虫，同时兼治其他害虫；老熟幼虫开始脱荚入土前，选用球孢白僵菌粉剂均匀喷施于地表防治越冬幼虫。蜗牛等软体动物发生为害时，喷施四聚乙醛或四聚·杀螺胺等药剂进行防治。

**（四）收获期。**秸秆粉碎还田，深翻耕耙，降低病虫基数。

## **五、注意事项**

（一）大豆登记用药品种有限，本方案中提到的药剂仅供参考，根据当地农业农村部门有关规定和指导意见，科学选用药剂，注意合理轮换用药和交替使用。

（二）在病虫害发生前期或初期优先选用生物、物理等非化学防治措施，注意保护利用自然天敌和生物多样性；防治食叶害虫大豆营养生长期可适当放宽防治指标，减少化学用药，注重开花结荚鼓粒期的精准防控。

（三）加强拌种（包衣）机、喷雾器、无人机等植保器械及操作技术的配套，确保技术到位率 and 安全性。

# 2025 年大豆玉米带状复合种植病虫害 防控技术方案

大豆玉米带状复合种植区植株紧密、病虫害种类多样，甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、点蜂缘蝽、茎腐病、根腐病、叶斑病等病虫害在局部地区有加重发生的风险，为做好 2025 年复合种植病虫害防治工作，特制定本方案。

## 一、防治策略

坚持预防为主、综合防治方针，以大豆玉米带状复合种植模式下主要病虫害协同防治为重点，综合应用健康栽培、理化诱控、生物防治和科学用药等技术措施，抓住病虫害发生窗口期实施综合防治，合理利用高效植保器械，切实提高防治效果，保障生产和质量安全。

## 二、防治对象

### （一）西南间（套）作种植模式区

**玉米：**穗腐病、白斑病、纹枯病、大斑病、灰斑病、南方锈病，草地贪夜蛾、玉米螟、桃蛀螟、粘虫、棉铃虫、蚜虫等。**大豆：**根腐病、锈病、病毒病、炭疽病，斜纹夜蛾、豆荚螟、豆秆黑潜蝇、甜菜夜蛾、高隆象、稻绿蝽、地下害虫等。

### （二）西北间作模式区

**玉米：**锈病、茎腐病、大斑病，玉米螟、蚜虫、叶螨、棉铃虫、地下害虫、双斑长跗萤叶甲等。**大豆：**根腐病、霜霉病、灰斑病，大豆食心虫、大豆蚜虫、豆荚螟、红蜘蛛、棉铃虫、叶甲、

地下害虫等。

### **（三）黄淮海和长江中下游间作模式区**

**玉米：**南方锈病、穗腐病、褐斑病、弯孢叶斑病、小斑病、茎腐病，玉米螟、棉铃虫、粘虫、桃蛀螟、蚜虫、蓟马等。**大豆：**根腐病、病毒病、炭疽病、拟茎点种腐（茎枯）病，甜菜夜蛾、棉铃虫、斜纹夜蛾、点蜂缘蝽、烟粉虱、豆荚螟、大豆食心虫、地下害虫等。

## **三、防控措施**

**（一）播种期。**选用抗（耐）病虫品种，合理密植。玉米选择耐密紧凑型，种子处理以防治蚜虫、蓟马、玉米茎腐病、丝黑穗为主；大豆选择耐阴性品种，种子处理以防治大豆根腐病、拟茎点种腐病、地下害虫、叶甲为主。选择含有精甲·咯菌腈、噻呋酰胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、吡虫啉等成分的种衣剂。不同区域根据当地主要病虫种类选择相应的药剂。

**（二）苗期—玉米喇叭口期（大豆分枝期）。**一是理化诱控措施，使用杀虫灯、性诱剂、食诱剂、色板诱杀成虫。二是生物防治措施，选用苏云金杆菌、球孢白僵菌、核型多角体病毒、金龟子绿僵菌、短稳杆菌等防治低龄幼虫。三是化学防治措施，选用四氯虫酰胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乙基多杀菌素、噻虫嗪等防治草地贪夜蛾、玉米螟、棉铃虫、蚜虫、烟粉虱等害虫；选用阿维菌素、唑螨酯等防治叶螨；选用吡唑醚菌酯、戊唑醇、宁南霉素等防治玉米、大豆地上部病害，可结合使用植物诱抗剂增强植株抗逆性。

**（三）花期（玉米抽雄期）—成熟期。**在前期防治的基础上，

根据玉米大斑病、小斑病、南方锈病、褐斑病、穗腐病、钻蛀性害虫，大豆锈病、叶斑病、豆荚螟、大豆食心虫、甜菜夜蛾等发生情况，针对性选用枯草芽孢杆菌、井冈霉素、吡唑·氟环唑、苯甲·嘧菌酯、丙环·嘧菌酯等杀菌剂和氯虫苯甲酰胺、高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、噻虫嗪等杀虫剂，合理混配喷施防治。防治蜗牛、蛴螬类害虫可撒施聚醛·甲萘威颗粒剂。防治点蜂缘蝽可用聚集信息素诱捕或喷施噻虫嗪等药剂。

#### 四、注意事项

（一）大豆带荫蔽较重地块，应采用植物生长调节剂控旺，可选用烯效唑、多效唑等在大豆分枝期喷施一次，严重地块花期可加喷一次。

（二）采用植保无人飞机施药时要注意添加沉降剂等助剂，亩施药液量 1.5 升以上。在防治害虫时，要抓住低龄幼虫防控最佳时期，以保苗、保芯、保产为目标开展统防统治。收获后及时进行秸秆粉碎或者打包处理，以减少田间病残体和虫源数量。

# 2025 年棉花重大病虫害防控技术方案

据全国农技中心预测，2025 年棉蚜、棉叶螨、蓟马、棉盲蝽、棉铃虫、黄萎病、苗病（立枯病、猝倒病、炭疽病等）、铃病（疫病、炭疽病、红腐病等）将在各棉区普遍发生，烟粉虱、斜纹夜蛾、地下害虫（地老虎、蝼蛄、蛴螬等）、枯萎病、甜菜夜蛾等病虫害局部发生。为做好 2025 年棉花病虫害防控工作，保障棉花生产安全，特制定本方案。

## 一、防控策略

突出做好播前和苗期预防、蕾铃期控害。优先采用抗（耐）性品种、种子处理、生态调控、农艺措施、生物防治等技术，充分发挥棉花自身补偿能力和自然天敌持续控害能力；优先选用生物源和环境友好型农药，推行达标用药、精准施药，实现控害保铃保产。融合推进绿色防控和专业化统防统治，提高防治效益，降低化学农药使用强度。

## 二、防控重点

**（一）西北内陆棉区。**包括新疆、甘肃棉区。重点防治棉蚜、棉叶螨、蓟马、棉盲蝽、棉铃虫、黄萎病、苗病、铃病，密切关注烟粉虱、甜菜夜蛾、枯萎病。

**（二）黄河流域棉区。**包括河北、山东、河南、天津、山西和陕西棉区。重点防治棉蚜、棉盲蝽、棉铃虫、烟粉虱、棉叶螨、黄萎病、苗病、铃病，密切关注蓟马、甜菜夜蛾、枯萎病。

**（三）长江流域棉区。**包括江苏、安徽、湖北、江西和湖南棉区。重点防治棉盲蝽、棉叶螨、棉铃虫、棉蚜、斜纹夜蛾、苗

病、铃病，密切关注黄萎病、枯萎病、蓟马、烟粉虱、红铃虫、甜菜夜蛾。

### 三、防控措施

#### （一）预防控制技术

**1. 选用抗（耐）病虫品种。**因地制宜选用抗枯萎病、耐黄萎病品种，优先选用抗虫棉兼抗（耐）病性较好的优质高产品种，并适时播种预防苗病。

**2. 种子处理。**针对苗期主要病虫种类，选用适宜的杀虫剂、杀菌剂进行种子包衣。杀虫剂可选用噻虫嗪或吡虫啉种子处理剂，杀菌剂可选用苯醚甲环唑、咯菌腈、吡唑醚菌酯等。

**3. 生态调控。**西北内陆棉区在田边和林带下种植苜蓿等植物，保留田埂边苦豆子、甘草、骆驼刺、罗布麻、红柳等功能植物带，提倡棉花与冬小麦同域种植，其他棉区田边或条带种植蛇床草、波斯菊、百日菊等显花植物，引诱、涵养天敌，增强天敌对棉蚜、棉铃虫、棉叶螨和棉盲蝽等害虫的控制能力。棉铃虫常发区棉花套种玉米，地边种植苘麻条带，诱集棉铃虫成虫产卵，集中杀灭。在棉田周边、田埂种植早熟芥菜型油菜、红花、向日葵诱集带可阻隔或集中诱集防治牧草盲蝽等害虫。

**4. 天敌保护和利用。**一是保护利用自然天敌。棉花生长前期注重保护利用棉田自然天敌，小麦、油菜收获后，秸秆在田间放置2—3天，促进瓢虫、草蛉等天敌向棉田转移。二是人工释放天敌。棉铃虫成虫始盛期人工释放卵寄生蜂螟黄赤眼蜂或松毛虫赤眼蜂，每代放蜂2—3次，间隔3—5天，每次放蜂10000头/亩，降低棉铃虫幼虫量。在棉花叶螨点片发生期，每个中心株

挂一袋胡瓜钝绥螨、巴氏新小绥螨、双尾新小绥螨等捕食螨，每次释放 100000 头/亩，控制棉叶螨发生。

**5. 理化诱控。**棉铃虫越冬代成虫始见期至末代成虫末期，棉田和周边寄主作物田连片使用棉铃虫性诱剂，一是交配干扰，采用高剂量性信息素智能喷施装置，每 3 亩设置 1 套，或田间放置棉铃虫袋状迷向散发器，平均每亩放置 6 个。二是群集诱杀，每亩设置 1 个挥散芯和干式飞蛾诱捕器，长江流域棉区斜纹夜蛾常发区，连片使用斜纹夜蛾性诱剂，每亩 1 个挥散芯和夜蛾型诱捕器，群集诱杀成虫，降低田间落卵量。三是连片施用生物食诱剂，于夜蛾科害虫（棉铃虫、地老虎、甜菜夜蛾等）主害代羽化前 1—2 天，以条带方式滴洒，每隔 50—80 米于 1 行棉株顶部叶面均匀施药，可诱杀成虫。

**6. 农艺措施。**清洁田园，棉花收获后及时清除棉秆和病虫残体。秋季深翻，有条件的棉区秋冬灌水保墒，压低病虫越冬基数。利用对功能植物安全的选择性除草剂清除田边无保育天敌功能的杂草，或中耕除草，减少害虫的转移危害。西北棉区合理布局棉田，尽量避免棉花与大面积的春玉米、加工番茄、十字花科作物邻作，并远离集中连片的温室大棚，减少棉铃虫、棉盲蝽、烟粉虱转移为害。

## （二）合理用药技术

**1. 棉蚜。**当益害比低于防治指标时，黄河流域棉区和西北内陆棉区苗蚜 3 片真叶前卷叶株率达 5 %—10 %时，或 4 片真叶后卷叶株率 10 %—20 %时，进行药剂点片挑治，有条件的地区，推荐利用遥感监测指导实施精准施药。伏蚜单株上中下 3 叶蚜量

平均 200—300 头时，全田防治。合理选用双丙环虫酯、氟啶虫胺脒、氟啶虫酰胺·烯啶虫胺、溴氰虫酰胺、吡蚜酮等药剂交替使用。

**2. 棉叶螨。**点片发生时或有螨株率低于 15%时挑治中心株，有螨株率超过 15%时全田防治，药剂选用乙螨唑、乙唑螨腈、哒螨灵、阿维菌素等杀螨剂。有条件地区，在点片状发生期，推荐利用遥感监测指导实施精准施药。

**3. 蓟马。**苗期和蕾期以烟蓟马为主，主要通过噻虫嗪、吡虫啉等种子包衣防治。花铃期以花蓟马为主，可选用金龟子绿僵菌、噻虫嗪等喷雾防治。

**4. 棉盲蝽。**以保蕾保顶尖为重点，达标用药。防治指标：西北内陆棉区以牧草盲蝽为主，百株虫量蕾期 12 头、花期 20 头、铃期 40 头；黄河流域棉区以三点盲蝽、绿盲蝽为主，百株虫量蕾期 5 头、花铃期 10 头；长江流域棉区以绿盲蝽、中黑盲蝽为主，新被害率 3%或百株虫量 5 头。由田边向内施药，药剂选用金龟子绿僵菌、啉虫脒、噻虫嗪、氟啶虫胺脒等。

**5. 棉铃虫。**优先选用棉铃虫核型多角体病毒、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、短稳杆菌、苏云金杆菌、印楝素、多杀霉素等生物农药，化学农药选用氯虫苯甲酰胺、虱螨脲、茚虫威、氟铃脲等。

**6. 苗病。**以种子包衣预防为主，选用咯菌腈、精甲霜灵、啞菌酯等拌种。发病初期尤其是遇低温阴雨天气时及时药剂防治，选用枯草芽孢杆菌、多抗霉素、噁霉灵等喷施。

**7. 黄萎病和枯萎病。**选用枯草芽孢杆菌种子包衣。苗期至

蕾期发病前或发病初期，选用枯草芽孢杆菌、氨基寡糖素、乙蒜素等喷施或随水滴施。

**8. 铃病。**发病前或初见病时，以花蕾和幼铃为重点喷药预防，或花铃期雨前预防、雨后及时喷药控制，药剂可选用三乙膦酸铝、多抗霉素等。

#### **四、注意事项**

（一）优先选用生物农药以及对天敌安全的高选择性化学农药，注意棉田自然天敌的区域性保护与棉田可持续利用。

（二）根据棉蚜等害虫的抗药性监测结果，暂停使用高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、吡虫啉等药剂，严格限制丁硫克百威使用次数，轮换使用双丙环虫酯、氟啶虫酰胺、氟啶虫胺胍等不同作用机理药剂，避免一季多次使用同一药剂。

（三）严格遵守农药使用操作规程，执行农药安全间隔期。

# 2025 年花生病虫害防控技术方案

据全国农技中心预测，2025 年全国花生重大病虫害总体中等发生，发生面积 1.1 亿亩次，花生叶斑病、棉铃虫、地下害虫在局部地区偏重发生。为做好 2025 年花生病虫害防治工作，特制定本方案。

## 一、防控策略

坚持预防为主、综合防治，推广抗（耐）性品种，综合应用健康栽培、理化诱控、生物防治等技术措施，科学安全使用高效低风险农药，推进花生病虫害全程绿色防控，保障花生生产和质量安全。

## 二、防控对象

重点防控地下害虫、甜菜夜蛾、褐斑病、白绢病、茎腐病，兼顾根腐病、黑斑病、网斑病、果腐病、锈病、青枯病、棉铃虫、斜纹夜蛾、蚜虫、蓟马、叶螨等。

## 三、防控措施

**1. 播种期。**重点防治土传病害、地下害虫等。因地制宜与玉米等禾本科作物轮作，适时深耕。选用抗（耐）性优质高产品种，适时播种，合理密植。根据土传病害、地下害虫、刺吸性害虫的发生情况，选用咯菌腈、精甲·咯·嘧菌等杀菌剂和吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺等杀虫剂合理混配进行种子处理。拌种时可加入芸苔素内酯、吲哚丁酸或糠氨基嘌呤等植物生长调节剂或氨基寡糖素等免疫诱抗剂，促进植株生长发育，增强抗逆抗病虫能力。

播种时可沟施球孢白僵菌、金龟子绿僵菌防治地下害虫。

**2. 苗期。**重点防治茎腐病、根腐病、刺吸性害虫等。在茎腐病、根腐病等发病初期选用四霉素、噻呋·戊唑醇、噻呋·吡唑酯等杀菌剂喷施植株茎基部；蚜虫、蓟马、叶螨等刺吸性害虫选用溴氰菊酯等杀虫剂喷雾防治，同时预防虫传病毒病；蛴螬、金针虫、地老虎可选用氟氯氰菊酯喷淋灌根，也可用颗粒剂拌沙土撒施。

**3. 开花下针至饱果成熟期。**重点防治叶部、根茎部病害及鳞翅目害虫等。在褐斑病、黑斑病、网斑病、锈病等叶部病害发生初期，选用枯草芽孢杆菌、多抗霉素等生物农药或选用唑醚·氟环唑、吡唑醚菌酯、苯甲·嘧菌酯等化学药剂喷雾防治；花生封垄前，选用枯草芽孢杆菌、噻呋酰胺、氟胺·嘧菌酯、噻呋·戊唑醇或氟酰胺等杀菌剂喷淋花生茎基部，预防控制白绢病、根腐病、茎腐病、果腐病。注意合理排灌，保持适宜田间湿度。

在甜菜夜蛾、棉铃虫、斜纹夜蛾、地老虎等发生期，使用杀虫灯、性诱剂、食诱剂等诱杀成虫，选用溴氰菊酯、氰戊·马拉松等防治幼虫；花生荚果期选用辛硫磷颗粒剂或噻虫胺颗粒剂防治蛴螬等地下害虫。

对植株密、长势旺的花生田，开花下针期合理使用烯效唑、调环酸钙或多唑·甲哌鎗等植物生长调节剂控旺。

#### 四、注意事项

（一）在病虫害发生初期优先选用生物、物理等非化学防治措施，注意保护利用自然天敌。

（二）使用性诱剂诱杀宜大面积连片使用，不同害虫的诱芯

不能放置于同一诱捕器内。

(三)使用灯光诱杀应在害虫成虫羽化高峰期和夜间活跃时段使用，尽量减少对天敌和非靶标生物影响。

# 2025 年向日葵主要病虫害防控技术方案

据全国农技中心预测，2025 年全国向日葵重大病虫害总体中等发生。向日葵常见病虫害有菌核病、黄萎病、霜霉病、锈病、白锈病、黑斑病、褐斑病、向日葵列当、向日葵螟、棉铃虫、花蓟马、草地螟、双斑长跗萤叶甲、盲蝽蟊、白星花金龟、蚜虫、地下害虫等。为做好 2025 年向日葵主要病虫害防控工作，特制定此方案。

## 一、防控策略

坚持“因地制宜、分区施策、分类指导”的原则，综合采取农艺措施、理化诱控、生物防治、科学用药等绿色防控技术，统筹病虫害防控与蜜蜂授粉安全，适时组织应急防治，保障向日葵生产和质量安全。

## 二、防治对象

**1. 幼苗期。**新疆、甘肃产区以防治菌核病、地下害虫为主。内蒙古、宁夏、陕西、山西产区以防治黄萎病、菌核病、地下害虫为主。黑龙江、吉林、河北产区以防治锈病、地下害虫为主。

**2. 现蕾期。**新疆、甘肃产区以防治菌核病、白锈病、地下害虫为主。内蒙古、宁夏、陕西、山西产区以防治向日葵螟、黄萎病、花蓟马、菌核病、霜霉病、向日葵列当、草地螟为主。黑龙江、吉林、河北产区以防治盘腐型菌核病、黄萎病、黑斑病、褐斑病、锈病、地下害虫为主。

**3. 开花期。**新疆、甘肃产区以防治菌核病、黄萎病、白锈

病、向日葵列当、花蓟马、棉铃虫、盲蝽蟊、向日葵螟为主。内蒙古、宁夏、陕西、山西产区以防治向日葵螟、花蓟马、黄萎病、菌核病、向日葵列当、草地螟为主。黑龙江、吉林、河北产区以防治盘腐型菌核病、黄萎病、锈病、向日葵列当为主。

**4. 成熟期。**新疆、甘肃产区以防治向日葵列当、棉铃虫、向日葵螟、花蓟马、盲蝽蟊为主。内蒙古、宁夏、陕西、山西产区以防治向日葵螟、菌核病、向日葵列当、草地螟为主。黑龙江、吉林、河北产区以防治向日葵列当为主。

### 三、防控措施

#### （一）预防技术

**1. 选用抗（耐）病品种。**因地制宜选用抗（耐）菌核病、黄萎病、锈病、向日葵列当等品种，避免种植高（易）感品种。

**2. 农艺措施。**深秋翻，消灭病残体，及时清除田间病残株，减少初侵染源；与禾本科、豆科等作物轮作倒茬和合理间作，清除田间地头藜科等杂草和花蓟马田间寄主植物，有效减少盲蝽蟊越冬虫源，降低草地螟和花蓟马幼虫密度；适时晚播，合理密植；播种时沟施生物菌肥，增施基肥，适当追肥，提高植株抗病能力。

**3. 播种期预防。**播种前使用药剂进行种子包衣、拌种或浸种，根据不同防治对象选用不同药剂，如咯菌腈、噻虫嗪等。

#### （二）非化学绿色防控技术

**1. 理化诱控。**在向日葵螟、棉铃虫成虫盛发期，在田间按棋盘式等距离放置性信息素诱捕器 25—30 枚/hm<sup>2</sup> 诱杀成虫。现蕾期悬挂蓝板诱杀花蓟马，悬挂高度要高于向日葵植株 10 厘米。

利用杀虫灯诱杀向日葵螟、棉铃虫、地下害虫等。棉铃虫可采用食诱装置进行诱杀。

**2. 生物防治。**在向日葵现蕾期、花期，可人工释放螟黄赤眼蜂防治向日葵螟和棉铃虫，东亚小花螬防治蓟马，在向日葵开花初期，针对葵盘进行定向喷施苏云金杆菌防治幼虫。

### **（三）药剂控害技术**

**1. 菌核病。**对重发生的地块，在初花期选用腐霉利、咯菌腈等药剂防治。

**2. 锈病。**各地试验表明，发病初期喷施吡唑醚菌酯或丙环唑具有较好效果，可在试验示范的基础上扩大应用范围。

**3. 黑斑病。**各地试验表明，发病初期及时喷施代森锰锌或百菌清、异菌脲，间隔 7—10 天，连喷 2—3 次，具有较好效果，可在试验示范的基础上扩大应用范围。

**4. 褐斑病。**发病初期，用多菌灵、甲基硫菌灵等药剂交替使用，间隔 7—10 天，连喷 2—3 次。

**5. 向日葵螟、棉铃虫和草地螟。**各地试验表明，在初孵幼虫尚未蛀入花盘前使用苏云金杆菌、棉铃虫核型多角体病毒、四氯虫酰胺、甲维·茚虫威、氯虫苯甲酰胺、溴氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、灭幼脲等进行喷雾具有较好效果，可在试验示范的基础上扩大应用范围。

**6. 花蓟马。**在苗期到花蕾期可结合其他病虫害进行兼治。

**7. 盲蝽蟊。**各地试验表明，发生严重时可利用高效氯氟菊酯、氟啶虫胺腈等化学药剂进行喷雾防治具有较好效果。由于盲

蟥成虫迁飞能力强，防治时尤其注意统筹时间，组织开展统防统治。

#### 四、注意事项

（一）使用灯光诱杀技术时应安装特定波段专用型杀虫灯，通过不同时段光波调节诱杀，禁用广谱杀虫灯。

（二）使用性信息素诱杀技术时应大面积连片统防统治，且不能将不同害虫的诱芯置于同一诱捕器内。

（三）在向日葵花期时，禁止使用诱虫板以免误杀蜜蜂，禁止使用对蜜蜂具有毒性的药剂，施药尽量选择蜜蜂非访时间。

（四）选用向日葵上登记药剂，或根据当地省级农业部门提出的临时用药选择品种，严格执行安全间隔期，注重农药的轮换使用，延缓抗药性产生。

---

抄送：农业农村部种植业管理司。

---

全国农技中心办公室

2025 年 2 月 27 日印发

---