
GeoGebra: innsláttur og skurðpunktar

Opnaðu GeoGebra Classic á íslensku. Algebrugluggginn getur verið vinstra megin eða neðan við grafið.


SKREF 1 **Smelltu í inntaksreitinn.** Sláðu inn eina línu í einu og ýttu á **Enter** eftir hverja:





```
f(x)=3*x-2
A=(0,-2)
B=(2,4)
```

Notaðu `*` til að margfalda og `/` til að deila. Notaðu punkt í tugabroti, t.d. `1.5`. Komma aðskilur hnit.
Til að finna fallgildi slærðu inn `f(2)`; útkoman er 4.

SKREF 2 **Finndu x þegar $f(x) = 7$.** Sláðu fyrst inn `y=7`. Opnaðu punktavalmyndina og veldu **Skurðpunktar**.



Smelltu á báðar línurnar eða beint þar sem þær skerast. Á myndinni heitir skurðpunkturinn C.



Lestu hnitin í algebrugluggnum: $C = (3, 7)$. Svarið er $x = 3$.

GeoGebra: afmörkun, kvarði og skjáskot

SKREF 3 **Afmarkaðu leigukostnaðinn úr 5. tíma.** Sláðu inn:

```
k(x)=600*x+800, 1<=x<=6
```

$k(x) = 600\,x + 800, \quad (1 \le x \le 6)$

Hér má leigutíminn vera frá einni upp í sex klukkustundir. Endapunktarnir eru $(1, 1400)$ og $(6, 4400)$. Ef grafið sést illa skaltu stilla mörk ásanna:

1. Hægrismelltu á auðan teiknifleti. Á Chromebook má smella með tveimur fingrum á snertiflötinn.



2. Veldu Opna stillingar. Í flipanum **Teikniborð** opnarðu **Víddir**.



3. Skráðu mörkin í fjóra reiti neðar í sama glugga, eins og á myndinni.

Ýttu á Enter eftir hvert gildi. Lokaðu stillingunum með × efst til hægri.

Reitirnir neðar í sama glugga:



Mundu: Gluggamörkin ráða því hvaða hluti teikniborðsins sést. Skilyrðið í innslættinum ræður leyfilegum gildum fallsins. Hringurinn við jöfnuna sýnir eða felur grafið.

SKREF 4 **Tveir hlutar eða stakir punktar.** Fyrir rafhlöðuna úr 3. tíma slærðu inn tvær línur: `a(x)=30+10*x, 0<=x<=4` og `b(x)=90-5*x, 4<=x<=10`. Pær mætast í $(4, 70)$.

Fyrir merkimiðadæmið úr 5. tíma sýnirðu kostnað við 0–5 miða með stökum punktum:

```
L={(0,1800),(1,1875),(2,1950),(3,2025),(4,2100),(5,2175)}
```

SKREF 5 **Taktu læsilegt skjáskot.** Sýndu jöfnur, kvarða og punkta. Á Chromebook: **Ctrl + Shift + Sýna glugga**. Skrifaðu t.d.: „Punkturinn $(3, 7)$ gefur $x = 3$ þegar $y = 7$.“