

1 Folgen

1.1 Konvergenz

Die Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ **konvergiert** gegen a für $n \rightarrow \infty$, falls gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\epsilon) \in \mathbf{N} \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \epsilon$$

Wir schreiben dann:

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ oder } a_n \rightarrow a \text{ (} n \rightarrow \infty \text{)}$$

und nennen a den **Grenzwert/ Limes** der Folge $(a_n)_{n \geq 1}$. Existiert der Limes nicht, so heisst die Folge **divergent**. Zu bemerken ist:

$$(a_n)_{n \geq 1} \text{ konvergent} \Rightarrow (a_n)_{n \geq 1} \text{ beschränkt}$$

1.2 Monotone Konvergenz

Sei die Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ monoton wachsend und nach oben beschränkt. Dann konvergiert $(a_n)_{n \geq 1}$ mit Grenzwert:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n : n \geq 1\}$$

Ist die Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ monoton fallend und nach unten beschränkt, so konvergiert $(a_n)_{n \geq 1}$ mit Grenzwert:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n : n \geq 1\}$$

1.3 Cauchy Kriterium

Die Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ ist genau dann konvergent, falls:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \geq 1 \text{ so dass } |a_n - a_m| < \epsilon \quad \forall n, m \geq N$$

1.4 Rechnen mit Limes

Seien die Folgen $(a_n)_{n \geq 1}$, $(b_n)_{n \geq 1}$ konvergent mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. Dann gilt:

- (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
- (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n * b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n * \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
- (iii) Falls zusätzlich $b_n \neq 0 \forall n \geq 1$ und $b \neq 0$ gegeben ist, so gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = a/b$.
- (iv) Falls es ein $K \geq 1$ gibt mit $a_n \leq b_n \forall n \geq K$, dann folgt $a \leq b$.

1.5 Limes Superior/ Inferior

Sei eine Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ beschränkt. Wir können dann zwei monotone Folgen $(b_n)_{n \geq 1}$ und $(c_n)_{n \geq 1}$ definieren, welche dann einen Grenzwert besitzen. Sei für jedes $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} b_n &= \inf\{a_k : k \geq n\} \text{ und } c_n = \sup\{a_k : k \geq n\} \\ b_n &\leq b_{n+1} \\ c_{n+1} &\leq c_n \end{aligned}$$

Da also beide Folgen beschränkt sind und konvergieren, können wir aufgrund von Monotoner Konvergenz folgern:

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n &:= \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \\ \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n &:= \lim_{n \rightarrow \infty} c_n \\ \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \end{aligned}$$

Es gilt auch, dass $(a_n)_{n \geq 1}$ genau dann konvergiert, falls $(a_n)_{n \geq 1}$ beschränkt ist und $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$

1.6 Bolzano-Weierstrass

Jede beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

1.7 Sandwichsatz für Folgen

Seien $(a_n)_{n \geq 1}$ und $(b_n)_{n \geq 1}$ konvergente Folgen mit demselben Limes $\alpha \in \mathbf{R}$. Ist $K \in \mathbf{N}$ und $(c_n)_{n \geq 1}$ eine Folge mit der Eigenschaft:

$$a_n \leq c_n \leq b_n \quad \forall n \geq K$$

so konvergiert auch $(c_n)_{n \geq 1}$ gegen α .

1.8 Limes Binom Trick

Gegeben die Summe zweier Wurzeln könnte man wie folgt vorgehen (Bsp.):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{(x+5) - (x-3)}{\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}} \right)$$

1.9 Limes Substitution Trick

Hier ein Beispiel:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

Substituiere nun $u = \frac{1}{x}$:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(u)}{u^2} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{2u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\cos(u)}{2} = \frac{1}{2}$$

1.10 Limes Taylor Trick

Mithilfe der Reihenentwicklung von e^x und $\sin(x)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{1/n} - 1 - \frac{1}{n}}{1 - n * \sin(\frac{1}{n})} = \frac{\frac{1}{2}n^{-2} + \mathcal{O}(n^{-3})}{1 - n(n^{-1} - \frac{1}{6}n^{-3} + \mathcal{O}(n^{-5}))} = 3$$

1.11 Rekurrenz Beispiel

Die folgenden Schritte sollten bei der Auflösung einer Rekursiven Folge in betracht gezogen werden:

1. Zeige Monotonie (Durch Induktion)
2. Zeige Obere oder Untere Schranke (Evt. Induktion)
3. Verwende $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}$ (Da für jede Teilfolge der gleiche Grenzwert gilt)

1.12 Punktweise Konvergenz

Die Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 0}$ konvergiert punktweise gegen eine Funktion $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ falls für alle $x \in \mathbf{D}$, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ gilt. Konkret:

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbf{D} \quad \forall \epsilon > 0 \quad \exists N_{x,\epsilon} \geq 1 \text{ so dass} \\ \forall n \geq N \quad |f_n(x) - f(x)| < \epsilon \end{aligned}$$

1.13 Gleichmässige Konvergenz

Die Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 0}$ konvergiert gleichmässig in \mathbf{D} gegen eine Funktion $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ falls für alle $x \in \mathbf{D}$, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ gilt. Konkret:

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0 \quad \exists N_\epsilon \geq 1 \text{ so dass} \\ \forall n \geq N \quad \forall x \in \mathbf{D} \quad |f_n(x) - f(x)| < \epsilon \end{aligned}$$

Weiter ist folgendes Kriterium äquivalent:

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0 \quad \exists N \geq 1 \text{ so dass} \\ \forall n, m \geq N \quad \forall x \in \mathbf{D} \quad |f_n(x) - f_m(x)| < \epsilon \end{aligned}$$

Konvergiert eine Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}, f_n : \mathbf{D} \subset \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ bestehend aus in \mathbf{D} stetigen Funktionen gleichmässig gegen die Funktion $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$, so ist f in \mathbf{D} stetig.

1.14 Grenzwerte von Funktionen

Sei $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$, $x_0 \in \mathbf{R}$ ein Häufungspunkt von \mathbf{D} . Dann ist $A \in \mathbf{R}$ der Grenzwert von $f(x)$ für $x \rightarrow x_0$, bezeichnet mit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

falls $\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$ so dass

$$\forall x \in \mathbf{D} \cap (]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\setminus \{x_0\}) : |f(x) - A| < \epsilon$$

1.15 Rechnen mit Limes Für Funktionen

Seien die Funktionen $f, g : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ konvergent mit $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$. Sei weiter $x_0 \in \mathbf{R}$ ein Häufungspunkt von \mathbf{D} . Dann gilt:

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$(ii) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f * g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) * \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

(iii) Sei $f, g : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ mit $f \leq g$. Dann folgt:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

falls beide Grenzwerte existieren.

(iv) Seien $\mathbf{D}, \mathbf{E} \subset \mathbf{R}$ und $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ eine Funktion. Wir nehmen an, dass

$$y_0 := \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

existiert und $y_0 \in \mathbf{E}$. Falls $g : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{R}$ stetig in y_0 folgt:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(y_0)$$

1.16 Sandwichsatz für Funktionen

Falls $g_1 \leq f \leq g_2$ und

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_2(x)$$

dann existiert $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ und

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x)$$

1.17 Links- und Rechtsseitige Grenzwerte

Sei $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$, $x_0 \in \mathbf{R}$. Wir nehmen an, dass x_0 ein Häufungspunkt von $\mathbf{D} \cap]x_0, +\infty[$ ist. Falls der Grenzwert der Eingeschränkten Funktionen f im Bereich $\mathbf{D} \cap [x_0, +\infty[$ für $x \rightarrow x_0$ existiert, wird er mit $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ bezeichnet und nennt sich **rechtsseitiger Grenzwert** von f bei x_0 .

Der **linksseitige Grenzwert** ist analog definiert für den Bereich $\mathbf{D} \cap]-\infty, x_0]$ für $x \rightarrow x_0$, falls er existiert. Es wird mit $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ bezeichnet.

Besitzt die Funktion $f(x)$ an der Stelle x_0 den Grenzwert L , so gilt:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

2 Reihen

2.1 Konvergenz

Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ist konvergent, falls die Folge der Partialsummen $(S_n)_{n \geq 1} = \sum_{k=1}^n a_k$ konvergiert. In diesem Fall definieren wir:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

2.2 Monotone Konvergenz

Sei $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ eine Reihe mit $a_k \geq 0 \quad \forall k \in \mathbf{N}$. Die Reihe konvergiert genau dann, wenn die Folge der Partialsummen $(S_n)_{n \geq 1}$ nach oben beschränkt ist.

2.3 Cauchy Kriterium

Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ist genau dann konvergent, falls:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \geq 1 \text{ mit } \left| \sum_{k=n}^m a_k \right| < \epsilon \quad \forall m \geq n \geq N$$

2.4 Rechnen mit Konvergenten Reihen

Seien $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konvergent, sowie $\alpha \in \mathbf{C}$. Dann gilt:

$$(i) \quad \sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) \text{ ist konvergent und } \sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

$$(ii) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \alpha * a_k \text{ ist konvergent und } \sum_{k=1}^{\infty} \alpha * a_k = \alpha * \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Konvergieren die Reihen $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ und $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$ absolut, so gilt zusätzlich für das Cauchy Produkt:

$$(iii) \quad \sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{j=0}^n a_{n-j} * b_j) = (\sum_{i=0}^{\infty} a_i) * (\sum_{j=0}^{\infty} b_j)$$

2.5 Absolute Konvergenz

Eine Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ heisst **absolut konvergent**, falls $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ konvergiert. Weiter sind **absolut konvergente Reihen auch konvergent** und es gilt:

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} a_k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$$

2.6 Reihen Umordnung

Konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut, dann konvergiert auch jede Umordnung der Reihe $a'_n = a_{\phi(n)}$ (wobei ϕ bijektiv) und hat denselben Grenzwert.

2.7 Potenzreihe

Die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ konvergiert absolut für alle $z \in \mathbf{C}$ mit $|z| < \rho$ (divergiert bei $|z| > \rho$), wobei

$$\rho := \begin{cases} +\infty & \text{Falls } \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = 0 \\ \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}} & \text{Falls } \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} > 0 \end{cases}$$

Ränder Prüfen!

2.8 Nullfolgenkriterium

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ divergiert}$$

2.9 Wurzelkriterium

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ konvergiert absolut.}$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ und } \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ divergieren.}$$

2.10 Quotientenkriterium

Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ eine Folge mit $a_n \neq 0$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ konvergiert absolut.}$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ divergiert.}$$

2.11 Vergleichssatz

Seien $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ Reihen mit:

$$0 \leq a_k \leq b_k \quad \forall k \geq 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{ konvergent} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ konvergent}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ divergent} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{ divergent}$$

2.12 Integraltest

Sei $f(x)$ eine stetige, positive und monoton fallende Funktion auf $[k, \infty)$ und $f(n) = a_n$:

$$\int_k^{\infty} f(x) dx \text{ konvergiert} \Rightarrow \sum_{n=k}^{\infty} a_n \text{ konvergiert}$$

$$\int_k^{\infty} f(x) dx \text{ divergiert} \Rightarrow \sum_{n=k}^{\infty} a_n \text{ divergiert}$$

2.13 Leibniz Kriterium

Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ monoton fallend mit $a_n \geq 0 \quad \forall n \geq 1$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Dann konvergiert

$$S := \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$$

und es gilt: $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$

2.14 Gleichmässige Konvergenz

Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ konvergiert gleichmässig in \mathbf{D} falls die durch

$$S_n(x) := \sum_{k=0}^n f_k(x)$$

definierte Funktionenfolge gleichmässig konvergiert.

Gilt weiter, dass $f_n : \mathbf{D} \subset \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ eine Folge stetiger Funktionen ist und eine Folge C_n existiert, so dass

$$|f_n(x)| \leq C_n \quad \forall x \in \mathbf{D}$$

und dass $\sum_{n=0}^{\infty} C_n$ konvergiert, dann konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(k)$ gleichmässig in \mathbf{D} und deren Grenzwert

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n(k)$$

ist eine in \mathbf{D} stetige Funktion.

3 Stetigkeit

3.1 Stetigkeit einer Funktion in einem Punkt

Sei $\mathbf{D} \subseteq \mathbf{R}$, $x_0 \in \mathbf{D}$. Die Funktion $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ ist in x_0 **stetig**, falls es für jedes $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, so dass für

alle $x \in \mathbf{D}$ gilt:

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

Hier noch eine äquivalente Definition: Falls für jede Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0$ folgendes gilt:

$$f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n) = f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$$

ist die Funktion f in x_0 stetig.

3.2 Stetigkeit einer Funktion

Die Funktion $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ ist **stetig**, falls sie in jedem Punkt $x \in \mathbf{D}$ stetig ist.

3.3 Gleichmässige Stetigkeit einer Funktion

Eine Funktion $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ ist in \mathbf{D} gleichmässig stetig falls

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta_{\epsilon} > 0 \forall x, y \in \mathbf{D} \quad |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

wobei Funktionen $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ welche in einem kompakten Intervall stetig sind im selben Intervall glm. stetig sind.

3.4 Rechnen mit Stetigkeit

Sei $x_0 \in \mathbf{D} \subset \mathbf{R}$, $\lambda \in \mathbf{R}$ und $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$, $g : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ beide in x_0 stetig:

(i) Dann sind $f + g$, $\lambda * f$, $f * g$ stetig in x_0

(ii) Falls $g(x_0) \neq 0$ dann ist

$$\frac{f}{g} : \mathbf{D} \cap \{x \in \mathbf{D} : g(x) \neq 0\} \rightarrow \mathbf{R}$$
$$x \rightarrow \frac{f(x)}{g(x)}$$

stetig in x_0 .

(iii) Polynomiale Funktionen sind auf ganz \mathbf{R} stetig

(iv) Die Trigonometrischen Funktionen $\sin : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ und $\cos : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ sind stetig

(v) Die Exponentialfunktion e^x ist auf ganz \mathbf{R} stetig.

- (vi) Seien P, Q polynomiale Funktionen auf \mathbf{R} mit $Q \neq 0$. Seien x_1, \dots, x_m die Nullstellen von Q . Dann ist

$$\frac{P}{Q} : \mathbf{R} \setminus \{x_1, \dots, x_m\} \rightarrow \mathbf{R}$$

$$x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$$

stetig.

- (vii) Seien $\mathbf{D}_1, \mathbf{D}_2 \subset \mathbf{R}$ zwei Teilmengen, $f : \mathbf{D}_1 \rightarrow \mathbf{D}_2$ und $g : \mathbf{D}_2 \rightarrow \mathbf{R}$ Funktionen, sowie $x_0 \in \mathbf{D}_1$. Falls f in x_0 und g in $f(x_0)$ stetig sind, so ist $g(f(x)) : \mathbf{D}_1 \rightarrow \mathbf{R}$ in x_0 stetig.
- (viii) Sei $\mathbf{D} \subset \mathbf{R}$, $x_0 \in \mathbf{D}$ und $f, g : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ stetig in x_0 . Dann sind $|f|$, $\max(f, g)$ und $\min(f, g)$ stetig in x_0 .

3.5 Zwischenwertsatz

Sei $\mathbf{I} \subset \mathbf{R}$ ein Intervall, $f : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{R}$ eine stetige Funktion und $a, b \in \mathbf{I}$. Für jedes y zwischen $f(a)$ und $f(b)$ gibt es (mindestens) ein c zwischen a und b mit $f(c) = y$. Es gibt folgende typischen Anwendungsszenarien:

- (i) Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ stetig. Falls $f(a) \cdot f(b) < 0$, dann $\exists c \in]a, b[$ mit $f(c) = 0$ (also eine Nullstelle).
- (ii) Sei $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ ein Polynom mit $a_n \neq 0$ und n ungerade. Dann besitzt P mindestens eine Nullstelle in \mathbf{R} .
- (iii) Jede $n \times n$ Matrix mit n **ungerade** mit Koeffizienten in \mathbf{R} hat mindestens einen Eigenwert $\lambda \in \mathbf{R}$.

3.6 Min-Max Satz

Sei $f : \mathbf{I} = [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ stetig auf einem kompakten Intervall. Dann gibt es $u \in [a, b]$ und $v \in [a, b]$ mit:

$$f(u) \leq f(x) \leq f(v) \quad \forall x \in [a, b]$$

Insbesondere ist f beschränkt.

3.7 Satz der Umkehrabbildung

Sei \mathbf{I} ein Intervall. Sei $f : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{R}$ stetig, **streng** monoton wachsend. Dann ist das Bild von $f(\mathbf{I}) =: J$ ein Intervall und die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \rightarrow \mathbf{I}$ ist stetig, streng monoton wachsend.

- (i) Sei $n \geq 1$. Dann ist $f : [0, \infty[\rightarrow [0, \infty[$ als $x \mapsto x^n$ streng monoton wachsend, stetig und surjektiv. Nach dem Umkehrsatz existiert eine streng monoton wachsende stetige Umkehrabbildung $f^{-1} : [0, \infty[\rightarrow [0, \infty[$ als $x \mapsto \sqrt[n]{x}$.

3.8 Stetigkeit gesplitteter Funktionen

Sind alle Abschnitte einer gesplitteten Funktion stetig, müssen wir nur die Übergangstellen prüfen. Gilt an diesen Stellen x_0

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$$

so ist die Funktion stetig.

4 Ableiten

4.1 Differenzierbarkeit

Sei $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ und $x_0 \in \mathbf{D}$ ein Häufungspunkt. Die Funktion f heißt in x_0 differenzierbar, falls der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert. In diesem Fall wird der Grenzwert mit $f'(x_0)$ oder $\frac{df}{dx}(x_0)$ bezeichnet und heißt die **Ableitung** (oder das Differential) von f an der Stelle x_0 .

4.2 Differenzierbarkeit & Stetigkeit

$$f \text{ differenzierbar in } x_0 \Rightarrow f \text{ stetig in } x_0$$

4.3 Rechenregeln der Ableitung

- (i) $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$
- (ii) $(f * g)'(x_0) = f'(x_0) * g(x_0) + f(x_0) * g'(x_0)$

$$(iii) \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) * g(x_0) - f(x_0) * g'(x_0)}{(g(x_0))^2} \text{ für } g(x_0) \neq 0$$

$$(iv) (g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) * f'(x_0)$$

4.4 Aussagen der Ableitung

Sei $f :]a, b[\rightarrow \mathbf{R}$ und $x_0 \in]a, b[$. Wir nehmen an, dass f in x_0 differenzierbar ist.

- (i) Falls $f'(x) > 0 \exists \delta > 0$ mit $f(x) > f(x_0) \forall x \in]x_0, x_0 + \delta[$ und $f(x) < f(x_0) \forall x \in]x_0 - \delta, x_0[$
- (ii) Falls $f'(x) < 0 \exists \delta > 0$ mit $f(x) < f(x_0) \forall x \in]x_0, x_0 + \delta[$ und $f(x) > f(x_0) \forall x \in]x_0 - \delta, x_0[$
- (iii) Ist $f'(x) \geq (>) 0 \quad \forall x \in]a, b[$ ist f (strikt) monoton wachsend
- (iv) Ist $f'(x) \leq (<) 0 \quad \forall x \in]a, b[$ ist f (strikt) monoton fallend

4.5 Umkehrsatz

Sei $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ eine bijektive Funktion, $x_0 \in \mathbf{D}$ ein Häufungspunkt. Wir nehmen an, dass f in x_0 differenzierbar ist und $f'(x_0) \neq 0$. Dann ist $y_0 := f(x_0)$ ein Häufungspunkt von \mathbf{E} und f^{-1} in y_0 differenzierbar. Es gilt:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

4.6 Satz von Rolle

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ stetig und in $]a, b[$ differenzierbar. Falls $f(a) = f(b)$, dann gibt es mindestens einen Punkt $\xi \in]a, b[$ mit $f'(\xi) = 0$.

4.7 Mittelwertsatz

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ stetig und in $]a, b[$ differenzierbar. Dann gibt es $\xi \in]a, b[$ mit $f(b) - f(a) = f'(\xi) * (b - a)$

4.8 l'Hôpital

Seien $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbf{R}$ differenzierbar mit $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in]a, b[$. Falls

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = 0 \text{ und } \lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = 0$$

sowie

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} =: \lambda$$

existiert, dann folgt, dass

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

wobei der Satz auch gilt wenn

- (i) falls $b = +\infty$
- (ii) falls $x \rightarrow a^+$
- (iii) falls $\lambda = +\infty$
- (iv) falls $\lim f = \lim g = \infty$

4.9 Konvexität

Sei $\mathbf{I} \subset \mathbf{R}$ ein Intervall und $f : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{R}$ eine Funktion.

- (i) f ist **(streng) konvex** auf \mathbf{I} falls für alle $x \leq y$, $x, y \in \mathbf{I}$ und $\lambda \in [0, 1]$ ($\lambda \in]0, 1[$)


$$f(\lambda * x + (1 - \lambda) * y) \leq (<) \lambda * f(x) + (1 - \lambda) * f(y)$$

gilt.

- (ii) f ist **(streng) konkav** auf \mathbf{I} falls für alle $x \leq y$, $x, y \in \mathbf{I}$ und $\lambda \in [0, 1]$ ($\lambda \in]0, 1[$)

$$f(\lambda * x + (1 - \lambda) * y) \geq (>) \lambda * f(x) + (1 - \lambda) * f(y)$$

gilt.



Wobei wir folgende Bemerkungen machen können:

- (i) Die Summe zweier konvexer Funktionen ist konvex
- (ii) f ist genau dann konvex, falls für alle $x_0 < x < x_1$ in \mathbf{I}

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x_0}$$

gilt.

- (iii) Sei $f :]a, b[\rightarrow \mathbf{R}$ in $]a, b[$ differenzierbar. Die Funktion f ist genau dann (streng) konvex, falls f' (streng) monoton wachsend ist. (z.B.: $f''(x) \geq 0$ ($f''(x) > 0$))

4.10 Höhere Ableitungen

Sei $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ differenzierbar.

- (i) Für $n \geq 2$ ist f n -mal differenzierbar in \mathbf{D} falls $f^{(n-1)}$ in \mathbf{D} differenzierbar ist. Dann ist $f^{(n)} := (f^{(n-1)})'$ und nennt sich die n -te Ableitung von f . Wobei zu beachten ist, dass: n -mal differenzierbar $\Rightarrow (n-1)$ -mal stetig differenzierbar.

- (ii) Die Funktion f ist n -mal **stetig Differenzierbar**, falls sie n -mal differenzierbar ist und $f^{(n)}$ stetig ist. Wir definieren weiter die Menge

$$C^n(\mathbf{D}) = \{f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R} \mid f \text{ } n\text{-mal stetig diff'bar}\}$$

- (iii) Die Funktion f ist in \mathbf{D} **glatt** falls sie $\forall n \geq 1$ n -mal differenzierbar ist.

$$C^\infty(\mathbf{D}) = \{f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R} \mid f \text{ glatt}\}$$

4.11 Rechenregeln höherer Ableitungen

Seien $f, g : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ n -mal differenzierbar:

$$(i) \quad (f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$$

$$(ii) \quad (f * g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} * g^{(n-k)}$$

- (iii) $\frac{f}{g}$ ist n -mal differenzierbar falls $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbf{D}$

- (iv) $(g \circ f)$ ist n -mal differenzierbar

- (v) e^x , $\sin(x)$ und $\cos(x)$ sind glatte Funktionen

- (vi) Alle Polynome sind glatte Funktion

4.12 Taylor Approximation

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ stetig und in $]a, b[$ $(n+1)$ -mal differenzierbar. Für jedes $a < x \leq b$ gibt es $\xi \in]a, x[$ mit:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} * (x - a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} * (x - a)^{n+1}$$

Man bemerke: der letzte Term $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} * (x - a)^{n+1}$ wird meist zur Fehlerabschätzung innerhalb eines Bereichs von a verwendet. Als Beispiel betrachte man $p(x) = x^3 + x + 1$ an der Stelle $a = 1$. Hier ist die Taylor Approximation

$$T_3 = 3 + 4(x - 1) + \frac{6}{2!}(x - 1)^2 + \frac{6}{3!}(x - 1)^3 = p(x)$$

und der Fehler für $\xi \in]0, 2[$

$$|\text{Fehler}| \leq \frac{f^{(4)}(\xi)}{(4)!} * (x - 1)^4 \leq \frac{0}{(4)!} * (1)^4 = 0$$

Ein weiteres Beispiel: Approximiere $\sqrt{9.2}$ mit einen Taylor Polynom zweiten Grades.

$$f(x) = \sqrt{x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} * x^{-0.5}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4} * x^{-1.5}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8} * x^{-2.5}$$

$$T_2 f(x) = f(x_0) + f'(x_0) * (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} * (x - x_0)^2$$

$$R = \frac{f'''(\xi)}{3!} * (x - x_0)^3 \text{ für } \xi \in (9, 9.2)$$

$$\Rightarrow x_0 = 9, \xi = 9$$

4.13 Sattelpunkt/ Horiz. Wendepunkt

Ein Graphenpunkt wo $f'(x_0) = 0$, x_0 aber kein Extrema ist.

4.14 Wendepunkt

Ein Wendepunkt ist ein Graphenpunkt wo der Drehsinn der Tangente sich ändert (In einem Wendepunkt gilt: $f'''(x_0) = 0$)

4.15 Spezielle Punkte bestimmen

Sei $n \geq 0$, $a < x_0 < b$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ in $]a, b[$ $(n+1)$ -mal stetig differenzierbar. Annahme: $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0$

- (i) Falls n gerade ist und x_0 eine lokale Extremalstelle, folgt $f^{(n+1)}(x_0) = 0$
- (ii) Falls n ungerade ist und $f^{(n+1)}(x_0) > 0$ so ist x_0 eine strikte lokale Minimalstelle
- (iii) Falls n ungerade ist und $f^{(n+1)}(x_0) < 0$ so ist x_0 eine strikte lokale Maximalstelle

Ist x_0 jedoch keine Extremalstelle ((i) von oben nicht erfüllt) bleiben zwei Optionen:

- (i) $f'(x_0) = 0 \wedge x_0$ keine Extremalstelle $\Rightarrow x_0$ ist ein Sattelpunkt
- (ii) $f''(x_0) = 0 \wedge x_0$ keine Extremalstelle $\Rightarrow x_0$ ist ein Wendepunkt

4.16 Integrale Ableiten

Hier ein Beispiel für die Ableitung eines Integrals:

$$\begin{aligned} f(x) &= - \int_2^{x^2} e^{-t^2} dt \\ h(x) &= e^{-t^2} \\ \Rightarrow f(x) &= -H(x^2) + H(2) \\ \Rightarrow f'(x) &= -h(x^2)2x = -e^{-x^4}2x \end{aligned}$$

5 Integrieren

5.1 Partition

Eine Zerlegung eines Intervalls $I = [a, b]$. Ist eine endliche Teilmenge $P = \{a = x_0, x_1, \dots, x_n = b\} \subset I$ wobei $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ und $\{a, b\} \subset P$

Man bemerke: eine Partition P' ist eine Verfeinerung von P falls $P \subset P'$

5.2 Feinheit einer Partition

Die **Feinheit** der Partition ist definiert durch $\delta(P) := \max_{1 \leq i \leq n} \delta_i = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$

5.3 Riemannsche Summe

Sei $\xi_i \in I_i$ zwischen Punkten. Jede Summe der Form

$$S(f, P, \xi) := \sum_{i=1}^n f(\xi_i) * (x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) * \delta_i$$

nennt man eine **Riemannsche Summe** der Partition P und den Zwischenpunkten $\xi = \{\xi_1, \dots, \xi_n\}$

5.4 Unter-/ Obersumme

Wir definieren die Untersumme

$$s(f, P) := \sum_{i=1}^n \left(\inf_{x \in I_i} f(x) \right) * \delta_i$$

und die Obersumme

$$S(f, P) := \sum_{i=1}^n \left(\sup_{x \in I_i} f(x) \right) * \delta_i$$

5.5 Eigenschaften der Unter-/ Obersumme

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ eine beschränkte Funktion, sowie $P, Q \in \mathcal{P}(I)$.

- (i) $P \subset Q \Rightarrow s(f, P) \leq s(f, Q) \leq S(f, Q) \leq S(f, P)$
- (ii) $\sup_{P \in \mathcal{P}(I)} s(f, P) \leq \inf_{Q \in \mathcal{P}(I)} S(f, Q)$

5.6 (Riemann) Integrierbar

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ beschränkt. Wir definieren zuerst $s(f) := \sup_{P \in \mathcal{P}(I)} s(f, P)$ sowie analog $S(f) := \inf_{P \in \mathcal{P}(I)} S(f, P)$.

Gilt

$$s(f) = S(f)$$

so ist die f Riemann-Integrierbar und wird mit $\int_a^b f(x) dx$ bezeichnet.

Weiter sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i) $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ ist integrierbar mit $A := \int_a^b f(x) dx$
- (ii) $\forall \epsilon > 0 \exists P \in \mathcal{P}(I)$ mit $S(f, P) - s(f, P) < \epsilon$
- (iii) $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass für jede Partition $P \in \mathcal{P}(I)$ mit $\delta(P) < \delta$ und ξ_1, \dots, ξ_n Zwischenpunkten $x_{k-1} \leq \xi_k \leq x_k : |A - S(f, P, \xi)| < \epsilon$
- (iv) Der Grenzwert $\lim_{\delta(P) \rightarrow 0} S(f, P, \xi) = \int_a^b f(x) dx$ existiert

5.7 Integrierbarkeit schnell zeigen

Es gilt weiter für $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ beschränkt, integrierbar und $\lambda \in \mathbf{R}$:

- (i) f stetig $\Rightarrow f$ Integrierbar
- (ii) f ist monoton $\Rightarrow f$ ist integrierbar
- (iii) $f + g, \lambda * f, f * g, |f|, \max(f, g), \min(f, g)$ sind integrierbar sowie auch $\frac{f}{g}$ falls $|g(x)| \geq \beta > 0 \quad \forall x \in [a, b]$
- (iv) Jedes Polynom auf $[a, b]$ ist integrierbar, auch $\frac{P(x)}{Q(x)}$ falls $Q(x)$ keine Nullstelle besitzt.

5.8 Majoranten Kriterium

- (i) Falls $|f(x)| \leq g(x) \quad \forall x \geq a$ und $g(x)$ auf $[a, \infty[$ integrierbar ist, so ist f auf $[a, \infty[$ integrierbar.
- (ii) Falls $0 \leq g(x) \leq f(x)$ und $\int_a^\infty g(x) dx$ divergiert, so divergiert auch $\int_a^\infty f(x) dx$
- (iii) Sei $f : [1, \infty[\rightarrow [0, \infty[$ monoton fallend. Dann konvergiert $\sum_{k=1}^\infty f(k)$ genau dann, wenn $\int_1^\infty f(x) dx$ konvergent und in diesem Fall gilt: $0 \leq \sum_{k=1}^\infty f(k) - \int_1^\infty f(x) dx \leq f(1)$

5.9 Rechenregeln für Integrale

Es gelten folgende Rechenregeln:

- (i) $\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$ für $a < b < c$ mit $f : [a, c] \rightarrow \mathbf{R}$ und auf $[a, b]$ sowie $[b, c]$ integrierbar
- (ii) $\int_a^b (\alpha * f_1(x) + \beta * f_2(x))dx = \alpha * \int_a^b f_1(x)dx + \beta * \int_a^b f_2(x)dx$ für $f_1, f_2 : I \subseteq \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ beschränkt integrierbar mit Endpunkten a, b sowie $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$

5.10 Abschätzungen von Integralen

Es gibt folgende Absätzungen:

- (i) Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ beschränkt und integrierbar und $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b]$. Dann folgt $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$
- (ii) Falls $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ beschränkt und integrierbar folgt $|\int_a^b f(x)dx| \leq \int_a^b |f(x)|dx$
- (iii) $|\int_a^b f(x)g(x)dx| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x)} * \sqrt{\int_a^b g^2(x)}$

5.11 Mittelwertsatz der Integralrechnung

Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ wobei f stetig und g beschränkt integrierbar mit $g(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$ ist. Dann gibt es $c \in [a, b]$ mit

$$\int_a^b f(x) * g(x)dx = f(c) * \int_a^b g(x)dx$$

und falls $g \equiv 1$ erhalten wir

$$\int_a^b f(x)dx = f(c) * (b - a)$$

5.12 Stammfunktion

Sei $a < b, f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ stetig. Eine Funktion $F : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ heisst **Stammfunktion** von f falls F stetig differenzierbar in $[a, b]$ ist und $F' = f$ in $[a, b]$ gilt.

5.13 Fundamentalsatz der Analysis

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ stetig. Dann gibt es eine Stammfunktion F von f , die bis auf eine additive Konstante eindeutig bestimmt ist und es gilt:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - f(a)$$

5.14 Partielle Integration

Seien $a < b$ reelle Zahlen und $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ stetig differenzierbar. Dann gilt:

$$\int_a^b f(x) * g'(x)dx = f(x) * g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) * g(x)dx$$

beziehungsweise für unbestimmte Integrale

$$\int f(x) * g'(x)dx = f(x) * g(x) - \int f'(x) * g(x)dx$$

- Polynome ableiten, wiederholende Funktionen ($\sin(x), \cos(x), e^x$) integrieren
- manchmal mit 1 multiplizieren

5.15 Methode der Substitution

Die Methode der Substitution ist die Umkehrung der Kettenregel. Sei $a < b, \phi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ stetig differenzierbar und $I \subset \mathbf{R}$ ein Intervall mit $\phi([a, b]) \subset I$ und $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ eine stetige Funktion. Dann ist

$$\int_a^b f(\phi(t)) * \phi'(t)dt = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x)dx$$

wobei für unbestimmte Integrale gilt:

$$\int f(\phi(t)) * \phi'(t)dt + C = \int f(x)dx \Big|_{x=\phi(t)}$$

Hier ein Beispiel:

$$\begin{aligned} \int 2x * \cos(x^2)dx &\Rightarrow u = x^2, \frac{du}{dx} = 2x, dx = \frac{du}{2x} \\ &= \int 2x * \cos(u) * \frac{du}{2x} = \int \cos(u)du = \sin(u) + C = \sin(x^2) + C \end{aligned}$$

5.16 Integration konvergenter Reihen

Sei $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ eine Folge von beschränkten integrierbaren Funktionen die gleichmässig gegen eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ konvergiert. Dann ist f beschränkt, integrierbar und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

Es gilt weiter: Sei $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ eine Folge beschränkter und integrierbarer Funktionen so dass $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ auf $[a, b]$ gleichmässig konvergiert. Dann gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)dx$$

Es gilt weiter: Sei $f(x) := \sum c_k x^k$ eine Potenzreihe mit positiven Konvergenzradius $\rho > 0$. Dann ist für jedes $0 \leq r < \rho$ f auf $[-r, r]$ integrierbar und es gilt $\forall x \in]-r, \rho[$

$$\int_0^x f(t)dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} x^{k+1}$$

5.17 Uneigentliche Integrale

Sei $f : [a, \infty[\rightarrow \mathbf{R}$ beschränkt und integrierbar auf $[a, b]$ für alle $b > a$. Wir definieren

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx = \int_a^{\infty} f(x)dx$$

falls existent und sagen dass f auf $[a, \infty[$ integrierbar ist.

Analog: Sei f eine Funktion auf jedem Intervall $[a + \epsilon, b]$ $\forall \epsilon > 0$ beschränkt und integrierbar. $f :]a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ ist integrierbar falls der folgende Grenzwert existiert, welchen wir als

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_{a+\epsilon}^b f(x)dx := \int_a^b f(x)dx$$

definieren. (Gilt auch symmetrisch für $[a, b - \epsilon]$ $\forall \epsilon > 0$) Wobei wir anmerken, dass

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx := \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{\infty} f(x)dx$$

5.18 Partialbruchzerlegung

Seien P, Q Polynome mit $\text{grad}(P) < \text{grad}(Q)$ und Q mit der Produktzerlegung $Q(x) = \prod_{j=1}^l ((x - \alpha_j)^2 + \beta_j^2)^{m_j} \prod_{i=1}^k (x - \gamma_i)^{n_i}$. Dann gibt es A_{ij}, B_{ij}, C_{ij} reelle Zahlen mit

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^{m_i} \frac{(A_{ij} + B_{ij}x)}{((x - \alpha_i)^2 + \beta_i^2)^j} + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \frac{C_{ij}}{(x - \gamma_i)^j}$$

Bei einer Partialbruchzerlegung geht man folgendermassen vor:

- (i) Sei $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$. Falls $\text{grad}(P) \geq \text{grad}(Q)$ wenden wir Polynomdivision an.
- (ii) Q lässt sich nun als $Q(x) = \prod_{j=1}^l ((x - \alpha_j)^2 + \beta_j^2)^{m_j} \prod_{i=1}^k (x - \gamma_i)^{n_i}$ zerlegen. Das sind die komplexen und reellen Nullstellen mit ihrer Vielfachheit.
- (iii) Wir bilden nun die "hässliche" Summe von oben
- (iv) Wir bestimmen mithilfe von Koeffizientenvergleich (Nennerpolynom Multiplizieren) die unbekannten A_{ij}, B_{ij}, C_{ij} .

Hier ein einfaches Beispiel:

$$\begin{aligned} \frac{5x+1}{x^2+x-2} &= \frac{5x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} \\ \Rightarrow \text{Löse } 5x+1 &= A(x+2) + B(x-1) \\ \Rightarrow \text{Setze } x &= -2, 1 \end{aligned}$$

Mit mehreren Linearen Faktoren:

$$\begin{aligned} \frac{-2x^2+x+8}{x(x-2)^2} &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2} \\ \Rightarrow \text{Löse } -2x^2+x+8 &= A(x-2)^2 + Bx(x-2) + Cx \end{aligned}$$

Ohne reelle Nullstellen:

$$\begin{aligned} \frac{2x^2-3x+3}{(x-1)(x^2+1)} &= \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \\ \Rightarrow \text{Löse } 2x^2-3x+3 &= A(x^2+1) + (Bx+C)(x-1) \\ \Rightarrow \text{Setze } x &= 0, 1, 2 \end{aligned}$$

5.19 Unbestimmte Integral

Das Unbestimmte Integral ist die Menge aller Stammfunktionen und sozusagen fast alles von oben gilt. $+C$ ist **sehr** wichtig.

6 Sonstiges

6.1 Rewrite Function

$$h(x) = \max f(x), g(x) = \frac{1}{2}(f(x) + g(x)) + \frac{1}{2}|f(x) - g(x)|$$

6.2 Proof of "Null-Reihe"

Eine Reihe konvergiert, wenn die Folge ihrer Partialsumme $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit: $s_n = \sum_{i=1}^n a_i$ konvergiert, das heisst, es existiert ein Grenzwert s , sodass $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$. Durch Umstellung der Reihe und mit den Rechenregeln für Grenzwerte gilt dann $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} = s - s = 0$

6.3 Injektiv/ Surjektiv

Injektiv: $\forall a, b \in X, f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$
f ist injektiv Beweis: wenn Ableitung > 0: dann streng monoton wachsend auf ganz \mathbb{R} und somit injektiv
Surjektiv: $\forall y \in Y, \exists x \in X, f(x) = y$ *f ist surjektiv*
Beweis: anhand von Zwischenwertsatz beweisen

6.4 Supremum

Sei $A \subseteq \mathbf{R}, A \neq \emptyset$ und A nach oben beschränkt. Dann gibt es eine kleinste obere Schranke von A . Es gibt also ein $c \in \mathbf{R}$ so dass:

1. $\forall a \in A \quad a \leq c$
2. Falls $\forall a \in A \quad a \leq x$ ist $c \leq x$

Man bezeichnet $c := \sup A$

6.5 Infimum

Analog zum Supremum die grösste untere Schranke.

6.6 Dreiecksungleichung

$$\forall x, y \in \mathbf{R} : ||x| - |y|| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y|$$

6.7 Bernoulli Ungleichung

$$\forall x \in \mathbf{R} \geq -1 \text{ und } n \in \mathbf{N} : (1+x)^n \geq 1+nx$$

6.8 Exponentialfunktion

Für ein $z \in \mathbf{C}$ berechnet man die Exponentialfunktion wie folgt:

$$\exp(z) := 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

und es gilt:

$$\exp(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$$

Die reelle Exponentialfunktion $\exp : \mathbf{R} \rightarrow]0, \infty[$ ist streng monoton wachsend, stetig und surjektiv.

Es gelten weiter folgende Rechenregeln:

- (i) $\exp(x+y) = \exp(x) * \exp(y)$
- (ii) $x^a := \exp(a * \ln(x))$
- (iii) $x^0 = 1 \quad \forall x \in \mathbf{R}$
- (iv) $\exp(iz) = \cos(z) + i * \sin(z) \quad \forall z \in \mathbf{C}$
- (v) $\exp(i * \frac{\pi}{2}) = i$
- (vi) $\exp(i\pi) = -1$ und $\exp(2\pi i) = 1$
- (vii) Für $a > 0$ ist $]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$ als $x \rightarrow x^a$ eine streng monoton wachsende stetige Bijektion

Merke: e^x entspricht $\exp(x)$.

6.9 Natürliche Logarithmus

Der natürliche Logarithmus wir als $\ln :]0, \infty[\rightarrow \mathbf{R}$ bezeichnet und ist eine streng monoton wachsende stetige funktion. Es gilt auch, dass

- (i) $\ln(1) = 0$
- (ii) $\ln(e) = 1$

$$(iii) \ln(a * b) = \ln(a) + \ln(b)$$

$$(iv) \ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$$

$$(v) \ln(x^a) = a * \ln(x)$$

$$(vi) x^a * x^b = x^{a+b}$$

$$(vii) (x^a)^b = x^{a*b}$$

$$(viii) \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (-1 < x \leq 1)$$

6.10 Faktoriserungs Lemma

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + ba^{n-2} + \dots + b^{n-2}a + b^{n-1})$$

6.11 Sinus Abschätzung

Es gilt $|\sin(x)| \leq |x|$ mit folgendem Beweis:

$$f(x) = x - \sin(x), x \geq 0$$

$$f'(x) = 1 - \cos(x) \geq 0$$

Weil $f(0) = 0$, $f(x) \geq 0$ für $x > 0$. Dann $|\sin(x)| \leq |x|$ einfach.

6.12 Polynomiale Funktion

Eine **Polynomiale Funktion** $P : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ist eine Funktion der Form $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ wobei $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbf{R}$. Falls $a_n \neq 0$, ist n der Grad von P .

6.13 Kompaktes Intervall

Ein Intervall $I \subset \mathbf{R}$ ist kompakt, wenn es von der Form $I = [a, b]$, $a \leq b$ ist.

6.14 Funktionenfolge

Eine Funktionenfolge ist eine Abbildung:

$$f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{R}^{\mathbf{D}} = \{f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}\}$$

$$n \rightarrow f_n$$

wobei $f_n : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ eine Funktion ist. Für jedes $x \in \mathbf{D}$ erhält man eine Folge $(f_n(x))_{n \geq 1}$ reeller Zahlen.

6.15 Trigonometrische Funktionen


$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \mathcal{O}(x^5) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \mathcal{O}(x^7) \\ \sinh(x) &= x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \mathcal{O}(x^7) \\ \cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \mathcal{O}(x^8) \\ \cosh(x) &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \mathcal{O}(x^8) \\ \tan(x) &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \mathcal{O}(x^7) \\ \tanh(x) &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \mathcal{O}(x^7) \\ \log(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \mathcal{O}(x^5) \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \mathcal{O}(x^4) \\ \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \mathcal{O}(x^4) \end{aligned}$$

Sind alle stetig

$$(i) \cos(z) = \cos(-z)$$

$$(ii) \sin(-z) = -\sin(z)$$

$$(iii) \cos^2(z) + \sin^2(z) = 1 \quad \forall z \in \mathbf{C}$$



6.16 Häufungspunkt

$x_0 \in \mathbf{R}$ ist ein **Häufungspunkt** der Menge \mathbf{D} , falls $\forall \delta > 0 \quad (]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\setminus \{x_0\}) \cap \mathbf{D} \neq \emptyset$

6.17 Lokales Extremum

Eine Funktion f besitzt ein lokales Extremum in x_0 falls es entweder ein lokales Minimum oder lokales Maximum von f ist.

6.18 Lokales Minimum

Die Funktion f besitzt ein lokales Minimum in x_0 falls es $\delta > 0$ gibt mit:

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\cap \mathbf{D}$$

6.19 Lokales Maximum

Die Funktion f besitzt ein lokales Maximum in x_0 falls es $\delta > 0$ gibt mit:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\cap \mathbf{D}$$

6.20 Kritische Stelle

Eine **kritische Stelle** einer Funktion ist ein x_0 an der $f'(x_0)$ null oder undefiniert ist.

6.21 Hyperbol Funktionen

$$(i) \cosh(x) := \frac{e^x + e^{-x}}{2} : \mathbf{R} \rightarrow [1, \infty]$$

$$(ii) \sinh(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{2} : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

$$(iii) \tanh(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} : \mathbf{R} \rightarrow [-1, 1]$$

und es gilt $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$

6.22 Funktionen Verknüpfung

$$x \mapsto (g \circ f)(x) := g(f(x))$$

6.23 Sin/Cos Werte

| α | 0 | 30° | 45° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 270° |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|------------------|
| | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{5\pi}{6}$ | π | $\frac{3\pi}{2}$ |
| $\sin \alpha$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 0 | -1 |
| $\cos \alpha$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 0 | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | -1 | 0 |
| $\tan \alpha$ | 0 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1 | $\sqrt{3}$ | N/A | $-\sqrt{3}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 0 | N/A |

| | $-\alpha$ | $90^\circ - \alpha$ | $90^\circ + \alpha$ | $180^\circ - \alpha$ | $180^\circ + \alpha$ | $270^\circ - \alpha$ | $270^\circ + \alpha$ |
|--------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| \sin | $-\sin \alpha$ | \cos | \cos | \sin | $-\sin$ | $-\sin$ | \sin |
| \cos | \cos | \sin | $-\sin$ | $-\cos$ | $-\cos$ | \cos | \cos |
| \tan | $-\tan$ | \cot | $-\cot$ | $-\tan$ | \tan | $-\tan$ | \tan |

7 Trigonometrie

7.1 Regeln

7.1.1 Periodizität

- $\sin(\alpha + 2\pi) = \sin(\alpha) \quad \cos(\alpha + 2\pi) = \cos(\alpha)$
- $\tan(\alpha + \pi) = \tan(\alpha) \quad \cot(\alpha + \pi) = \cot(\alpha)$

7.1.2 Parität

- $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha) \quad \cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$
- $\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha) \quad \cot(-\alpha) = -\cot(\alpha)$

7.1.3 Ergänzung

- $\sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha) \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha)$
- $\tan(\pi - \alpha) = -\tan(\alpha) \quad \cot(\pi - \alpha) = -\cot(\alpha)$

7.1.4 Komplemente

- $\sin(\pi/2 - \alpha) = \cos(\alpha) \quad \cos(\pi/2 - \alpha) = \sin(\alpha)$
- $\tan(\pi/2 - \alpha) = -\tan(\alpha) \quad \cot(\pi/2 - \alpha) = -\cot(\alpha)$

7.1.5 Doppelwinkel

- $\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$
- $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) = 1 - 2 \sin^2(\alpha)$
- $\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$

7.1.6 Addition

- $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta)$
- $\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$
- $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)}$

7.1.7 Subtraktion

- $\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) - \cos(\alpha) \sin(\beta)$
- $\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta)$
- $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}{1 + \tan(\alpha) \tan(\beta)}$

7.1.8 Multiplikation

- $\sin(\alpha) \sin(\beta) = -\frac{\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)}{2}$
- $\cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{2}$
- $\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)}{2}$

7.1.9 Potenzen

- $\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\alpha))$
- $\cos^2(\alpha) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\alpha))$
- $\tan^2(\alpha) = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{1 + \cos(2\alpha)}$

7.1.10 Diverse

- $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$
- $\cosh^2(\alpha) - \sinh^2(\alpha) = 1$
- $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ und $\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

8 Tabellen

8.1 Grenzwerte

Wichtige Tabellen stehen hier

| | |
|--|---|
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ | $\lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{x} = 1$ |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$ | $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$ | $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \infty$ |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^m} = \infty$ | $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$ | $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$ |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = 1$ | $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^b = 1$ | $\lim_{x \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$ |
| $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$ | $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x})^x = \frac{1}{e}$ |
| $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} (1 + \frac{k}{x})^{mx} = e^{km}$ | $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{x}{x+k})^x = e^{-k}$ |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a), \forall a > 0$ | $\lim_{x \rightarrow \infty} x^a q^x = 0, \forall 0 \leq q < 1$ |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} = k$ |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1$ | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$ |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log \frac{1-x}{x}}{x} = -1$ | $\lim_{x \rightarrow 0} x \log x = 0$ |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arctan x} = 1$ | $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$ | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$ |
| $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$ | $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x)}{x^a} = 0$ |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{x} = 1$ | $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{2^x} = 0$ |

8.2 Ableitungen

Kurze Notiz am Rande, ein stationärer Punkt ist:
 $x \in \mathbb{R}$ mit $f'(x) = 0$

| $\mathbf{F(x)}$ | $\mathbf{f(x)}$ | $\mathbf{f'(x)}$ |
|---|---------------------|--------------------------|
| $\frac{x^{-a+1}}{-a+1}$ | $\frac{1}{x^a}$ | $\frac{a}{x^{a+1}}$ |
| $\frac{x^{a+1}}{a+1}$ | $x^a \ (a \neq -1)$ | $a \cdot x^{a-1}$ |
| $\frac{1}{k \ln(a)} a^{kx}$ | a^{kx} | $ka^{kx} \ln(a)$ |
| $\ln x $ | $\frac{1}{x}$ | $-\frac{1}{x^2}$ |
| $\frac{2}{3} x^{3/2}$ | \sqrt{x} | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ |
| $-\cos(x)$ | $\sin(x)$ | $\cos(x)$ |
| $\sin(x)$ | $\cos(x)$ | $-\sin(x)$ |
| $\frac{1}{2}(x - \frac{1}{2} \sin(2x))$ | $\sin^2(x)$ | $2 \sin(x) \cos(x)$ |
| $\frac{1}{2}(x + \frac{1}{2} \sin(2x))$ | $\cos^2(x)$ | $-2 \sin(x) \cos(x)$ |
| $-\ln \cos(x) $ | $\tan(x)$ | $\frac{1}{\cos^2(x)}$ |
| | | $1 + \tan^2(x)$ |
| $\cosh(x)$ | $\sinh(x)$ | $\cosh(x)$ |
| $\log(\cosh(x))$ | $\tanh(x)$ | $\frac{1}{\cosh^2(x)}$ |
| $\ln \sin(x) $ | $\cot(x)$ | $-\frac{1}{\sin^2(x)}$ |
| $\frac{1}{c} \cdot e^{cx}$ | e^{cx} | $c \cdot e^{cx}$ |
| $x(\ln x - 1)$ | $\ln x $ | $\frac{1}{x}$ |
| $\frac{1}{2}(\ln(x))^2$ | $\frac{\ln(x)}{x}$ | $\frac{1 - \ln(x)}{x^2}$ |
| $\frac{x}{\ln(a)}(\ln x - 1)$ | $\log_a x $ | $\frac{1}{\ln(a)x}$ |

8.3 Weitere Ableitungen

| $\mathbf{F(x)}$ | $\mathbf{f(x)}$ |
|-------------------------|--|
| $\arcsin(x)/\arccos(x)$ | $\frac{1/-1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $\arctan(x)$ | $\frac{1}{1+x^2}$ |
| $x^x \ (x > 0)$ | $x^x \cdot (1 + \ln x)$ |
| $f(x)^{g(x)}$ | $e^{g(x)\ln(f(x))}$ |
| $f(x) = \cos(\alpha)$ | $f(x)^n = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$ |
| $f(x) = \frac{1}{ax+b}$ | $f(x)^n = (-1)^n * a^n * n! * (ax+b)^{-n+1}$ |

8.4 Integrale

| $\mathbf{f(x)}$ | $\mathbf{F(x)}$ |
|--|--|
| $\int f'(x)f(x) \, dx$ | $\frac{1}{2}(f(x))^2$ |
| $\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx$ | $\ln f(x) $ |
| $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx$ | $\sqrt{\pi}$ |
| $\int (ax+b)^n \, dx$ | $\frac{1}{a(n+1)}(ax+b)^{n+1}$ |
| $\int x(ax+b)^n \, dx$ | $\frac{(ax+b)^{n+2}}{(n+2)a^2} - \frac{b(ax+b)^{n+1}}{(n+1)a^2}$ |
| $\int (ax^p+b)^n x^{p-1} \, dx$ | $\frac{(ax^p+b)^{n+1}}{ap(n+1)}$ |
| $\int (ax^p+b)^{-1} x^{p-1} \, dx$ | $\frac{1}{ap} \ln ax^p+b $ |
| $\int \frac{ax+b}{cx+d} \, dx$ | $\frac{ax}{c} - \frac{ad-bc}{c^2} \ln cx+d $ |
| $\int \frac{1}{x^2+a^2} \, dx$ | $\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$ |
| $\int \frac{1}{x^2-a^2} \, dx$ | $\frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right $ |
| $\int \sqrt{a^2+x^2} \, dx$ | $\frac{x}{2}f(x) + \frac{a^2}{2} \ln(x+f(x))$ |