

<div data-bbox="0 0 699 32" data-label="Section-Header"> <h1>1 Wahrscheinlichkeiten</h1> </div> <div data-bbox="0 32 699 138" data-label="Text"> <p>Ereignisraum Die Menge $\Omega \neq \emptyset$ aller möglichen Ergebnisse des betrachteten Zufallsexperiments. Die Elemente $\omega \in \Omega$ heissen Elementarereignisse.</p> </div> <div data-bbox="0 138 699 267" data-label="Text"> <p>Potenzmenge Die Potenzmenge von Ω, bezeichnet mit $\mathcal{P}(\Omega)$ oder 2^Ω ist die Menge aller Teilmengen von Ω. Ein Prinzipielles Ereignis ist eine Teilmenge $A \subseteq \Omega$, also eine Kollektion von Elementarereignissen. Die Klasse aller beobachtbaren Ereignisse ist \mathcal{F}.</p> </div> <div data-bbox="0 267 699 324" data-label="Text"> <p>σ-Algebra Ein Mengensystem ist eine σ-Algebra falls</p> </div> <div data-bbox="0 324 699 495" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> $\Omega \in \mathcal{F}$ Für jedes $A \in \mathcal{F}$ ist auch $A^c \in \mathcal{F}$ Für jede Folge $A_n, n \in \mathbb{N}$ mit $A_n \in \mathcal{F}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ auch die Vereinigung $\bigcup_{n=1}^\infty A_n \in \mathcal{F}$ </div> <div data-bbox="0 495 699 560" data-label="Text"> <p>Wahrscheinlichkeitsmass Eine Abbildung $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ mit folgenden Eigenschaften:</p> </div> <div data-bbox="0 560 699 738" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> $P[A] \geq 0$ für alle Ereignisse $A \in \mathcal{F}$ $P[\Omega] = 1$ Für $A_i \in \mathcal{F}$ paarweise disjunkt gilt $P[\bigcup_{i=1}^\infty A_i] = \sum_{i=1}^\infty P[A_i]$ </div> <div data-bbox="0 738 699 787" data-label="Text"> <p>Es gelten weiter folgende Rechenregeln:</p> </div> <div data-bbox="0 787 699 966" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> $P[A^c] = 1 - P[A]$ $P[\emptyset] = 0$ Für $A \subseteq B$ gilt $P[A] \leq P[B]$ $P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$ </div> <div data-bbox="0 966 699 1031" data-label="Text"> <p>Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume Impliziert:</p> </div> <div data-bbox="0 1031 699 1120" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> Ω ist endlich oder abzählbar unendlich $\mathcal{F} = 2^\Omega$ </div> <div data-bbox="0 1120 699 1266" data-label="Text"> <p>Laplace Raum Ist $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$ endlich mit $\Omega = N$ und $\mathcal{F} = 2^\Omega$ sowie alle ω_i gleich wahrscheinlich mit $p_i = \frac{1}{n}$, so heisst Ω ein Laplace Raum und P die diskrete Gleichverteilung auf Ω. Dann ist für $A \subseteq \Omega$:</p> </div> <div data-bbox="273 1266 420 1347" data-label="Equation-Block"> $P[A] = \frac{ A }{ \Omega }$ </div> <div data-bbox="0 1347 699 1469" data-label="Text"> <p>Bedingte Wahrscheinlichkeit Seien A, B Ereignisse mit $P[A] > 0$. Die bedingte Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung, dass A eintritt wird definiert durch:</p> </div> <div data-bbox="189 1469 504 1615" data-label="Equation-Block"> $\begin{aligned} P[B \mid A] &:= \frac{P[B \cap A]}{P[A]} \\ &= \frac{P[A \mid B] \cdot P[B]}{P[A]} \end{aligned}$ </div> <td data-bbox="699 0 1398 1624"> <div data-bbox="699 0 1398 32" data-label="Section-Header"> <h1>Multiplikationsregel</h1> </div> <div data-bbox="699 32 1398 105" data-label="Text"> <p>Es gilt:</p> $P[A \cap B] = P[A \mid B] \cdot P[B] = P[B \mid A] \cdot P[A]$ </div> <div data-bbox="699 105 1398 235" data-label="Text"> <p>Satz der totalen Wahrscheinlichkeit Sei A_1, \dots, A_n eine Zerlegung von Ω in paarweise disjunkte Ereignisse, d.h. $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ und $A_i \cap A_k = \emptyset \quad \forall i \neq k$. Dann gilt:</p> </div> <div data-bbox="882 235 1207 332" data-label="Equation-Block"> $P[B] = \sum_{i=1}^n P[B \mid A_i] \cdot P[A_i]$ </div> <div data-bbox="699 332 1398 462" data-label="Text"> <p><i>Beweis.</i> Da $B \subseteq \Omega \implies B = B \cap \Omega = B \cap (\bigcup_{i=1}^n A_i) = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)$. Weiter sind alle Mengen der Art $(B \cap A_i)$ paarweise disjunkt, was bedeutet, dass $(B \cap A_i)$ eine disjunkte Zerlegung von B bilden. Damit folgt:</p> </div> <div data-bbox="819 462 1260 633" data-label="Equation-Block"> $\begin{aligned} P[B] &= P\left[\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right] \\ &= \sum_{i=1}^n P[B \cap A_i] = \sum_{i=1}^n P[B \mid A_i] \cdot P[A_i] \end{aligned}$ </div> <div data-bbox="699 633 1398 755" data-label="Text"> <p>Satz von Bayes Sei A_1, \dots, A_n eine Zerlegung von Ω mit $P[A_i] > 0$ für $i \in \{1, \dots, n\}$. Sei B ein Ereignis mit $P[B] > 0$. Dann gilt für jedes k:</p> </div> <div data-bbox="840 755 1249 836" data-label="Equation-Block"> $P[A_k \mid B] = \frac{P[B \mid A_k] \cdot P[A_k]}{\sum_{i=1}^n P[B \mid A_i] \cdot P[A_i]}$ </div> <div data-bbox="699 836 1398 917" data-label="Text"> <p><i>Beweis.</i> Verwende Definition Bedingte Wahrscheinlichkeit, im Zähler Multiplikationsregel und im Nenner Satz der totalen Wahrscheinlichkeit.</p> </div> <div data-bbox="699 917 1398 982" data-label="Text"> <p>Unabhängige Ereignisse (2) Zwei ereignisse heissen (stochastisch) Unabhängig, falls</p> </div> <div data-bbox="903 982 1186 1031" data-label="Equation-Block"> $P[A \cap B] = P[A] \cdot P[B]$ </div> <div data-bbox="699 1031 1398 1104" data-label="Text"> <p>Ist $P[A] = 0$ oder $P[B] = 0$, so sind A, B immer unabhängig. Für $P[A] \neq 0$ gilt:</p> </div> <div data-bbox="819 1104 1260 1153" data-label="Equation-Block"> $A, B \text{ unabhängig} \iff P[A \mid B] = P[A]$ </div> <div data-bbox="699 1153 1398 1282" data-label="Text"> <p>Unabhängige Ereignisse (∞) Die Ereignisse A_1, \dots, A_n heissen (stochastisch) unabhängig, wenn für jede endliche Teilfamilie der Produktformel gilt, d.h. für $m \in \mathbb{N}$ und $\{k_1, \dots, k_m\} \subseteq \{1, \dots, n\}$:</p> </div> <div data-bbox="882 1282 1197 1372" data-label="Equation-Block"> $P\left[\bigcap_{i=1}^m A_{k_i}\right] = \prod_{i=1}^m P[A_{k_i}]$ </div> <div data-bbox="699 1372 1398 1502" data-label="Text"> <p>Diskrete Zufallsvariable Eine reelwertige diskrete Zufallsvariable auf Ω ist eine Funktion $X : \Omega \mapsto \mathbb{R}$. Mit Ω ist natürlich auch $\mathcal{W}(X) = \{x_1, x_2, \dots\}$ endlich oder abzählbar.</p> </div> <div data-bbox="699 1502 1398 1567" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> Die Verteilungsfunktion von X ist die Abbildung $F_X : \mathbb{R} \mapsto [0, 1]$, definiert durch: </div> <div data-bbox="819 1567 1323 1615" data-label="Equation-Block"> $t \mapsto F_X(t) := P[X \leq t] = P[\{\omega : X(\omega) \leq t\}]$ </div> <td data-bbox="1398 0 2100 1624"> <div data-bbox="1398 0 2100 64" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> Die Gewichtsfunktion oder diskrete Dichte von X ist die Funktion $p_X : \mathcal{W}(X) \mapsto [0, 1]$, definiert durch: </div> <div data-bbox="1512 64 2016 105" data-label="Equation-Block"> $p_X(x_k) := P[X = x_k] = P[\{\omega : X(\omega) = x_k\}]$ </div> <div data-bbox="1398 105 2100 154" data-label="Text"> <p>Wobei gilt:</p> </div> <div data-bbox="1398 154 2100 373" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> $F_X(t) = P[X \leq t] = \sum_{x_k \text{ mit } x_k \leq t} p_X(x_k)$ Für jedes $x_k \in \mathcal{W}(X)$ gilt $0 \leq p_X(x_k) \leq 1$ und $\sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} p_X(x_k) = 1$ $\mu_X(B) := P[X \in B] = \sum_{x_k \in B} p_X(x_k)$ $\sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} p_X(x_k) = P[X \in \mathcal{W}(X)] = 1$ </div> <div data-bbox="1398 373 2100 462" data-label="Text"> <p>Indikatorfunktion Für jede Teilmenge $A \subseteq \Omega$ ist die Indikatorfunktion I_A von A definiert durch:</p> </div> <div data-bbox="1564 462 1879 535" data-label="Equation-Block"> $I_A(\omega) := \begin{cases} 1 & \text{falls } \omega \in A \\ 0 & \text{falls } \omega \in A^c \end{cases}$ </div> <div data-bbox="1398 535 2100 633" data-label="Text"> <p>Erwartungswert Sei X eine diskrete Zufallsvariable mit Gewichtsfunktion $p_X(x)$, dann ist der Erwartungswert definiert durch:</p> </div> <div data-bbox="1564 633 1900 706" data-label="Equation-Block"> $E[X] := \sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} x_k \cdot p_X(x_k)$ </div> <div data-bbox="1398 706 2100 755" data-label="Text"> <p>und hat folgende Eigenschaften:</p> </div> <div data-bbox="1398 755 2100 876" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> Linearität: $E[a \cdot X + b] = a \cdot E[X] + b$ Monotonie: $X \leq Y \implies E[X] \leq E[Y]$ Nimmt X nur Werte in \mathbb{N} an: </div> <div data-bbox="1638 876 1890 958" data-label="Equation-Block"> $E[X] = \sum_{i=1}^\infty P[X \geq i]$ </div> <div data-bbox="1398 958 2100 1063" data-label="Text"> <p>Erwartungswert von Funktionen Sei X eine Diskrete Zufallsvariable mit Gewichtsfunktion $p_X(x)$ und $Y = g(X)$ für eine Funktion $Y : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$. Dann gilt:</p> </div> <div data-bbox="1491 1063 1974 1144" data-label="Equation-Block"> $E[Y] = E[g(X)] = \sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} g(x_k) \cdot p_X(x_k)$ </div> <div data-bbox="1398 1144 2100 1226" data-label="Text"> <p>Varianz Sei X eine diskrete Zufallsvariable. Ist $E[X^2] < \infty$, so heisst:</p> </div> <div data-bbox="1512 1226 1963 1339" data-label="Equation-Block"> $\begin{aligned} Var[X] &:= E[X - E[X]^2] \\ &= \sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} x_k - E[X]^2 \cdot p_X(x_k) \end{aligned}$ </div> <div data-bbox="1398 1339 2100 1388" data-label="Text"> <p>die Varianz von X. Es gilt weiter:</p> </div> <div data-bbox="1398 1388 2100 1615" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> $E[Z]^2 \leq E[Z^2]$ $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$ $Var[a \cdot X + b] = a^2 \cdot Var[X]$ $Var[X - Y] = Var[X] + (-1)^2 \cdot Var[Y]$ $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$ </div> </td></td>	<div data-bbox="699 0 1398 32" data-label="Section-Header"> <h1>Multiplikationsregel</h1> </div> <div data-bbox="699 32 1398 105" data-label="Text"> <p>Es gilt:</p> $P[A \cap B] = P[A \mid B] \cdot P[B] = P[B \mid A] \cdot P[A]$ </div> <div data-bbox="699 105 1398 235" data-label="Text"> <p>Satz der totalen Wahrscheinlichkeit Sei A_1, \dots, A_n eine Zerlegung von Ω in paarweise disjunkte Ereignisse, d.h. $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ und $A_i \cap A_k = \emptyset \quad \forall i \neq k$. Dann gilt:</p> </div> <div data-bbox="882 235 1207 332" data-label="Equation-Block"> $P[B] = \sum_{i=1}^n P[B \mid A_i] \cdot P[A_i]$ </div> <div data-bbox="699 332 1398 462" data-label="Text"> <p><i>Beweis.</i> Da $B \subseteq \Omega \implies B = B \cap \Omega = B \cap (\bigcup_{i=1}^n A_i) = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)$. Weiter sind alle Mengen der Art $(B \cap A_i)$ paarweise disjunkt, was bedeutet, dass $(B \cap A_i)$ eine disjunkte Zerlegung von B bilden. Damit folgt:</p> </div> <div data-bbox="819 462 1260 633" data-label="Equation-Block"> $\begin{aligned} P[B] &= P\left[\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right] \\ &= \sum_{i=1}^n P[B \cap A_i] = \sum_{i=1}^n P[B \mid A_i] \cdot P[A_i] \end{aligned}$ </div> <div data-bbox="699 633 1398 755" data-label="Text"> <p>Satz von Bayes Sei A_1, \dots, A_n eine Zerlegung von Ω mit $P[A_i] > 0$ für $i \in \{1, \dots, n\}$. Sei B ein Ereignis mit $P[B] > 0$. Dann gilt für jedes k:</p> </div> <div data-bbox="840 755 1249 836" data-label="Equation-Block"> $P[A_k \mid B] = \frac{P[B \mid A_k] \cdot P[A_k]}{\sum_{i=1}^n P[B \mid A_i] \cdot P[A_i]}$ </div> <div data-bbox="699 836 1398 917" data-label="Text"> <p><i>Beweis.</i> Verwende Definition Bedingte Wahrscheinlichkeit, im Zähler Multiplikationsregel und im Nenner Satz der totalen Wahrscheinlichkeit.</p> </div> <div data-bbox="699 917 1398 982" data-label="Text"> <p>Unabhängige Ereignisse (2) Zwei ereignisse heissen (stochastisch) Unabhängig, falls</p> </div> <div data-bbox="903 982 1186 1031" data-label="Equation-Block"> $P[A \cap B] = P[A] \cdot P[B]$ </div> <div data-bbox="699 1031 1398 1104" data-label="Text"> <p>Ist $P[A] = 0$ oder $P[B] = 0$, so sind A, B immer unabhängig. Für $P[A] \neq 0$ gilt:</p> </div> <div data-bbox="819 1104 1260 1153" data-label="Equation-Block"> $A, B \text{ unabhängig} \iff P[A \mid B] = P[A]$ </div> <div data-bbox="699 1153 1398 1282" data-label="Text"> <p>Unabhängige Ereignisse (∞) Die Ereignisse A_1, \dots, A_n heissen (stochastisch) unabhängig, wenn für jede endliche Teilfamilie der Produktformel gilt, d.h. für $m \in \mathbb{N}$ und $\{k_1, \dots, k_m\} \subseteq \{1, \dots, n\}$:</p> </div> <div data-bbox="882 1282 1197 1372" data-label="Equation-Block"> $P\left[\bigcap_{i=1}^m A_{k_i}\right] = \prod_{i=1}^m P[A_{k_i}]$ </div> <div data-bbox="699 1372 1398 1502" data-label="Text"> <p>Diskrete Zufallsvariable Eine reelwertige diskrete Zufallsvariable auf Ω ist eine Funktion $X : \Omega \mapsto \mathbb{R}$. Mit Ω ist natürlich auch $\mathcal{W}(X) = \{x_1, x_2, \dots\}$ endlich oder abzählbar.</p> </div> <div data-bbox="699 1502 1398 1567" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> Die Verteilungsfunktion von X ist die Abbildung $F_X : \mathbb{R} \mapsto [0, 1]$, definiert durch: </div> <div data-bbox="819 1567 1323 1615" data-label="Equation-Block"> $t \mapsto F_X(t) := P[X \leq t] = P[\{\omega : X(\omega) \leq t\}]$ </div> <td data-bbox="1398 0 2100 1624"> <div data-bbox="1398 0 2100 64" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> Die Gewichtsfunktion oder diskrete Dichte von X ist die Funktion $p_X : \mathcal{W}(X) \mapsto [0, 1]$, definiert durch: </div> <div data-bbox="1512 64 2016 105" data-label="Equation-Block"> $p_X(x_k) := P[X = x_k] = P[\{\omega : X(\omega) = x_k\}]$ </div> <div data-bbox="1398 105 2100 154" data-label="Text"> <p>Wobei gilt:</p> </div> <div data-bbox="1398 154 2100 373" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> $F_X(t) = P[X \leq t] = \sum_{x_k \text{ mit } x_k \leq t} p_X(x_k)$ Für jedes $x_k \in \mathcal{W}(X)$ gilt $0 \leq p_X(x_k) \leq 1$ und $\sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} p_X(x_k) = 1$ $\mu_X(B) := P[X \in B] = \sum_{x_k \in B} p_X(x_k)$ $\sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} p_X(x_k) = P[X \in \mathcal{W}(X)] = 1$ </div> <div data-bbox="1398 373 2100 462" data-label="Text"> <p>Indikatorfunktion Für jede Teilmenge $A \subseteq \Omega$ ist die Indikatorfunktion I_A von A definiert durch:</p> </div> <div data-bbox="1564 462 1879 535" data-label="Equation-Block"> $I_A(\omega) := \begin{cases} 1 & \text{falls } \omega \in A \\ 0 & \text{falls } \omega \in A^c \end{cases}$ </div> <div data-bbox="1398 535 2100 633" data-label="Text"> <p>Erwartungswert Sei X eine diskrete Zufallsvariable mit Gewichtsfunktion $p_X(x)$, dann ist der Erwartungswert definiert durch:</p> </div> <div data-bbox="1564 633 1900 706" data-label="Equation-Block"> $E[X] := \sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} x_k \cdot p_X(x_k)$ </div> <div data-bbox="1398 706 2100 755" data-label="Text"> <p>und hat folgende Eigenschaften:</p> </div> <div data-bbox="1398 755 2100 876" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> Linearität: $E[a \cdot X + b] = a \cdot E[X] + b$ Monotonie: $X \leq Y \implies E[X] \leq E[Y]$ Nimmt X nur Werte in \mathbb{N} an: </div> <div data-bbox="1638 876 1890 958" data-label="Equation-Block"> $E[X] = \sum_{i=1}^\infty P[X \geq i]$ </div> <div data-bbox="1398 958 2100 1063" data-label="Text"> <p>Erwartungswert von Funktionen Sei X eine Diskrete Zufallsvariable mit Gewichtsfunktion $p_X(x)$ und $Y = g(X)$ für eine Funktion $Y : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$. Dann gilt:</p> </div> <div data-bbox="1491 1063 1974 1144" data-label="Equation-Block"> $E[Y] = E[g(X)] = \sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} g(x_k) \cdot p_X(x_k)$ </div> <div data-bbox="1398 1144 2100 1226" data-label="Text"> <p>Varianz Sei X eine diskrete Zufallsvariable. Ist $E[X^2] < \infty$, so heisst:</p> </div> <div data-bbox="1512 1226 1963 1339" data-label="Equation-Block"> $\begin{aligned} Var[X] &:= E[X - E[X]^2] \\ &= \sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} x_k - E[X]^2 \cdot p_X(x_k) \end{aligned}$ </div> <div data-bbox="1398 1339 2100 1388" data-label="Text"> <p>die Varianz von X. Es gilt weiter:</p> </div> <div data-bbox="1398 1388 2100 1615" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> $E[Z]^2 \leq E[Z^2]$ $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$ $Var[a \cdot X + b] = a^2 \cdot Var[X]$ $Var[X - Y] = Var[X] + (-1)^2 \cdot Var[Y]$ $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$ </div> </td>	<div data-bbox="1398 0 2100 64" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> Die Gewichtsfunktion oder diskrete Dichte von X ist die Funktion $p_X : \mathcal{W}(X) \mapsto [0, 1]$, definiert durch: </div> <div data-bbox="1512 64 2016 105" data-label="Equation-Block"> $p_X(x_k) := P[X = x_k] = P[\{\omega : X(\omega) = x_k\}]$ </div> <div data-bbox="1398 105 2100 154" data-label="Text"> <p>Wobei gilt:</p> </div> <div data-bbox="1398 154 2100 373" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> $F_X(t) = P[X \leq t] = \sum_{x_k \text{ mit } x_k \leq t} p_X(x_k)$ Für jedes $x_k \in \mathcal{W}(X)$ gilt $0 \leq p_X(x_k) \leq 1$ und $\sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} p_X(x_k) = 1$ $\mu_X(B) := P[X \in B] = \sum_{x_k \in B} p_X(x_k)$ $\sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} p_X(x_k) = P[X \in \mathcal{W}(X)] = 1$ </div> <div data-bbox="1398 373 2100 462" data-label="Text"> <p>Indikatorfunktion Für jede Teilmenge $A \subseteq \Omega$ ist die Indikatorfunktion I_A von A definiert durch:</p> </div> <div data-bbox="1564 462 1879 535" data-label="Equation-Block"> $I_A(\omega) := \begin{cases} 1 & \text{falls } \omega \in A \\ 0 & \text{falls } \omega \in A^c \end{cases}$ </div> <div data-bbox="1398 535 2100 633" data-label="Text"> <p>Erwartungswert Sei X eine diskrete Zufallsvariable mit Gewichtsfunktion $p_X(x)$, dann ist der Erwartungswert definiert durch:</p> </div> <div data-bbox="1564 633 1900 706" data-label="Equation-Block"> $E[X] := \sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} x_k \cdot p_X(x_k)$ </div> <div data-bbox="1398 706 2100 755" data-label="Text"> <p>und hat folgende Eigenschaften:</p> </div> <div data-bbox="1398 755 2100 876" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> Linearität: $E[a \cdot X + b] = a \cdot E[X] + b$ Monotonie: $X \leq Y \implies E[X] \leq E[Y]$ Nimmt X nur Werte in \mathbb{N} an: </div> <div data-bbox="1638 876 1890 958" data-label="Equation-Block"> $E[X] = \sum_{i=1}^\infty P[X \geq i]$ </div> <div data-bbox="1398 958 2100 1063" data-label="Text"> <p>Erwartungswert von Funktionen Sei X eine Diskrete Zufallsvariable mit Gewichtsfunktion $p_X(x)$ und $Y = g(X)$ für eine Funktion $Y : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$. Dann gilt:</p> </div> <div data-bbox="1491 1063 1974 1144" data-label="Equation-Block"> $E[Y] = E[g(X)] = \sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} g(x_k) \cdot p_X(x_k)$ </div> <div data-bbox="1398 1144 2100 1226" data-label="Text"> <p>Varianz Sei X eine diskrete Zufallsvariable. Ist $E[X^2] < \infty$, so heisst:</p> </div> <div data-bbox="1512 1226 1963 1339" data-label="Equation-Block"> $\begin{aligned} Var[X] &:= E[X - E[X]^2] \\ &= \sum_{x_k \in \mathcal{W}(X)} x_k - E[X]^2 \cdot p_X(x_k) \end{aligned}$ </div> <div data-bbox="1398 1339 2100 1388" data-label="Text"> <p>die Varianz von X. Es gilt weiter:</p> </div> <div data-bbox="1398 1388 2100 1615" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> $E[Z]^2 \leq E[Z^2]$ $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$ $Var[a \cdot X + b] = a^2 \cdot Var[X]$ $Var[X - Y] = Var[X] + (-1)^2 \cdot Var[Y]$ $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$ </div>
--	---	---

Standardabweichung

σ(X) = √Var[X]

Gemeinsame Verteilung

Seien X1,...,Xn beliebige Zufallsvariablen. Die Gemeinsame Verteilungsfunktion von X1,...,Xn ist die Abbildung F:ℝ^n → [0,1], definiert durch:

(x1,...,xn) ↦ F(x1,...,xn) := P[X1 ≤ x1,...,Xn ≤ xn] = ∑_{y1 ≤ x1,...,yn ≤ xn} p(y1,...,yn)

Die Gemeinsame Gewichtsfunktion ist:

p(x1,...,xn) := P[X1 = x1,...,Xn = xn]

Unabhängige Zufallsvariablen

Zufallsvariablen X1,...,Xn heissen Unabhängig, falls gilt (äquivalent):

F(x1,...,xn) = F_{X1}(x1) · ... · F_{Xn}(xn) p(x1,...,xn) = p_{X1}(x1) · ... · p_{Xn}(xn)

Unabhängige Ereignisse

Ereignisse A1,...,An heissen Unabhängig, falls für beliebige Teilmengen Bi ⊆ W(Xi) i = 1,...,n gilt (äquivalent):

P[X1 ∈ B1,...,Xn ∈ Bn] = ∏_{i=1}^n P[Xi ∈ Bi]

Funktionen von Zufallsvariablen

Seien X1,...,Xn diskrete Unabhängige Zufallsvariablen und fi:ℝ → ℝ irgendwelche Funktionen. Sei weiter Yi := fi(Xi). Dann sind die Zufallsvariablen Y1,...,Yn ebenfalls unabhängig.

Linearität des Erwartungswertes

Seien X1,...,Xn diskrete Zufallsvariablen mit endlichen Erwartungswerten. E[X1],...,E[Xn]. Sei Y = a + ∑_{i=1}^n bi · Xi mit Konstanten a, b1,...,bn. Dann gilt:

E[Y] = a + ∑_{i=1}^n bi · E[Xi]

Kovarianz

Seien X,Y Zufallsvariablen auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,ℱ,P) mit endlichen Erwartungswerten. Dann ist die Kovarianz definiert als:

Cov(X,Y) := E[XY] - E[X]E[Y] = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]

Wobei Cov(X,X) = Var[X].

Korrelation

Die Korrelation von X,Y ist definiert durch

ρ(X,Y) := { Cov(X,Y) / (σ(X) · σ(Y)) falls σ(X) · σ(Y) > 0 0 sonst.

und es gilt |Cov(X,Y)| ≤ σ(X) · σ(Y) beziehungsweise -1 ≤ ρ(X,Y) ≤ 1.

Summenformel für Varianzen

Var [∑_{i=1}^n Xi] = ∑_{i=1}^n Var[Xi] + 2 · ∑_{i<j} Cov(Xi,Xj)

ist aber Cov(X,Y) = 0 (X,Y paarweise unkorreliert), so wird die Summe linear.

Produkte von Zufallsvariablen

Seien X1,...,Xn diskrete Zufallsvariablen mit endlichen Erwartungswerten. Falls X1,...,Xn unabhängig sind, so ist:

E [∏_{i=1}^n Xi] = ∏_{i=1}^n E[Xi]

Dann sind auch X1,...,Xn paarweise unkorreliert und:

Var [∑_{i=1}^n Xi] = ∑_{i=1}^n Var[Xi]

da Unabhängig ⇒ paarweise Unabhängig ⇒ unkorreliert.

Bedingte Verteilung

Seien X,Y diskrete Zufallsvariablen mit gemeinsamer Gewichtsfunktion p(x,y). Die bedingte Gewichtsfunktion von X, gegeben dass Y = y, ist definiert durch:

p_{X|Y}(x|y) := P[X = x | Y = y] P[X = x, Y = y] / P[Y = y] = p(x,y) / p_Y(y)

für p_Y(y) > 0 und 0 sonst.

Kriterium für Unabhängigkeit

X,Y sind genau dann unabhängig, wenn für alle y mit p_Y(y) > 0 gilt:

p_{X|Y}(x|y) = p_X(x) ∀x ∈ W(X)

n tief k

(n k) = n! / (k! · (n - k)!)

2 Wichtige diskrete Verteilungen

Diskrete Gleichverteilung

Die diskrete Gleichverteilung auf einer endlichen Menge W = {x1,...,xn} gehört zu einer Zufallsvariablen X mit Wertebereich W und Gewichtsfunktion:

p_X(x_k) = P[X = x_k] = 1/N k ∈ {1,...,N}

Unabhängige 0-1-Experimente

Es sei Ai := {Erfolg beim i-ten Experiment} und:

- Die Ai sind unabhängig
- P[Ai] = p für alle i
-

Y_i(ω) = { 1 ω ∈ A_i 0 ω ∉ A_i 2

Bernoulli-Verteilung

Ein einziges 0-1-Experiment mit W(X) = {0,1}. Die Gewichtsfunktion ist gegeben durch p_X(1) = p, sowie p_X(0) = 1 - p. Man schreibt kurz X ~ Be(p). Es gilt:

E[X] = 1 · P[X = 1] + 0 · P[X = 0] = p Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = p · (1 - p)

Binomialverteilung

Beschreibt die Anzahl der Erfolge bei n unabhängigen 0-1-Experimenten mit Erfolgsparameter p. Also ist die Zufallsvariable respektive Gewichtsfunktion:

X = ∑_{i=1}^n I_{Ai} = ∑_{i=1}^n Yi p_X(k) = P[X = k] = (n k) · p^k · (1 - p)^{n-k}

und man schreibt kurz X ~ Bin(n,p). Es gilt weiter:

E[X] = ∑_{i=1}^n E[Yi] = n · p Var[X] = ∑_{i=1}^n Var[Yi] = n · p · (1 - p)

Geometrische Verteilung

Bei einer unendlichen Folge von unabhängigen 0-1-Experimenten mit Erfolgsparameter p sein X die Wartezeit zum ersten Erfolg:

X = inf{ i ∈ ℕ : Ai tritt ein } p_X(k) = P[X = k] = p · (1 - p)^{k-1}

wir schreiben X ~ Geom(p) und es gilt:

E[X] = ∑_{i=0}^∞ (1 - p)^i = 1 / (1 - (1 - p)) = 1/p E[X · (X - 1)] = 2(1 - p) / p^2 Var[X] = 1 - p / p^2

Negativbinomiale Verteilung

Bei einer unendlichen Folge von unabhängigen 0-1-Experimenten mit Erfolgsparameter p sein X die Wartezeit zum r-ten Erfolg (r ∈ ℕ):

X = inf{ k ∈ ℕ : ∑_{i=1}^k I_{Ai} = r } p_X(k) = P[X = k] = (k-1 r-1) · p^r · (1 - p)^{k-r}

wir schreiben X ~ NB(r,p) und es gilt:

E[X] = ∑_{i=1}^r E[Xi] = r/p Var[X] = ∑_{i=1}^r Var[Xi] = r · (1 - p) / p^2

Hypergeometrische Verteilung
 In einer Urne seien n Gegenstände, davon r vom Typ 1 und $n-r$ vom Typ 2. Man zieht ohne zurücklegen m der Gegenstände. Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Gegenstände vom Typ 1 in der Stichprobe. Der Wertebereich von X ist $\mathcal{W}(X) = \{0, 1, \dots, \min(m, r)\}$ und:

$$p_X(k) = \frac{\binom{r}{k} \cdot \binom{n-r}{m-k}}{\binom{n}{m}} \qquad \text{für } k \in \mathcal{W}(X)$$

$$E[X] = \sum_{i=1}^n i \cdot p_X(i) = m \cdot \frac{r}{n} \qquad \text{(Nicht im Skript)}$$

$$Var[X] = m \cdot \frac{r}{n} \left(1 - \frac{r}{n}\right) \cdot \frac{n-m}{n-1} \qquad \text{(Nicht im Skript)}$$

Poisson Verteilung
 Die Poisson Verteilung mit Parameter $\lambda \in (0, \infty)$ ist eine Verteilung auf der Menge $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ mit Gewichtsfunktion:

$$p_X(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \qquad \text{für } k = 0, 1, 2, \dots$$


$$E[X] = \sum_{i=1}^n i \cdot \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} e^\lambda = \lambda$$

$$E[X^2] = \lambda^2 + \lambda$$

$$Var[X] = \lambda$$

Ist eine Zufallsvariable X Poisson verteilt mit Parameter λ schreiben wir $X \sim P(\lambda)$.
Zufallsvariable

$P[X = x] = 0$ für stetige Zufallsvariablen ist die Wahrscheinlichkeit



Sein (Ω, \mathcal{F}, P) ein Wahrscheinlichkeitsraum. Also Ω ein Grundraum, $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$ die beobachtbaren Ereignisse und P ein Wahrscheinlichkeitsmass auf \mathcal{F} . Eine (reelwertige) Zufallsvariable auf Ω ist eine messbare Funktion $X : \Omega \mapsto \mathbb{R}$. Das bedeutet, dass die Menge $\{X \leq t\} = \{\omega : X(\omega) \leq t\}$ für jedes t ein beobachtbares Ereigniss sein muss.

Verteilungsfunktion

Die Verteilungsfunktion von X ist die Abbildung $F_X : \mathbb{R} \mapsto [0, 1]$:

$$t \mapsto F_X(t) := P[X \leq t] := P[\{\omega : X(\omega) \leq t\}]$$

und hat die Eigenschaften:

- F_X ist wachsend und rechtsstetig. Das bedeutet, dass $F_X(s) \leq F_X(t)$ für $s \leq t$ gilt und $F_X(u) \rightarrow F_X(t)$ für $u \rightarrow t$ mit $u > t$
- $\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0$ und $\lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = 1$

Beispiel: Verteilungsfunktion

Um zu verhindern, dass ein Gerät infolge eines defekten Halbleiters längere Zeit ausfällt, werden zwei identische, parallel geschaltete Halbleiter zu einem Bauteil zusammengefasst. Eine Kontrolllampe leuchtet auf, wenn einer der beiden Halbleiter ausgefallen ist. Wir nehmen an, dass die Lebensdauern der Halbleiter unabhängige, exponentialverteilte Zufallsvariablen mit Erwartungswert 60 Tage sind. Wie ist die Zeit, nach der die Kontrolllampe aufleuchtet, verteilt?

Seien H_1 und H_2 die Lebensdauern der entsprechenden Halbleiter. Nach Voraussetzung sind H_1 und H_2 i.i.d. und $\text{Exp}(\lambda)$ -verteilt mit $\lambda = \frac{1}{60}$. Sei T die Zeit, nach der die Kontrolllampe aufleuchtet; also ist $T = \min\{H_1, H_2\}$. Die Verteilungsfunktion von T ist gegeben durch

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P[T \leq t] = P[\min\{H_1, H_2\} \leq t] \\ &= 1 - P[\min\{H_1, H_2\} > t] = 1 - P[H_1 > t, H_2 > t] \\ &= 1 - P[H_1 > t]P[H_2 > t] \\ &= (1 - \exp(-2\lambda t))\mathbf{1}_{[0, \infty)}(t) \end{aligned}$$

d.h. T ist wieder exponentialverteilt mit Parameter $2\lambda = \frac{1}{30}$.

Dichtefunktion

Das Analogon der Gewichtsfunktion im Diskreten Fall. Eine Zufallsvariable X mit Verteilungsfunktion $F_X(t) = P[X \leq t]$ heisst (absolut) stetig mit Dichte (funktion) $f_X : \mathbb{R} \mapsto [0, \infty)$, falls gilt:

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(s) \, dx \qquad \text{für alle } t \in \mathbb{R}$$

und hat die Eigenschaften:

- $f_X \geq 0$ und $f_X = 0$ ausserhalb von $\mathcal{W}(X)$.
- $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(s) \, ds = 1$; das folgt aus $\lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = 1$

Gleichverteilung

Die Gleichverteilung auf dem Intervall $[a, b]$ ist ein Modell für die Zufällige Wahl eines Punktes in $[a, b]$. Die zugehörige Zufallsvariable X hat den Wertebereich $\mathcal{W}(X) = [a, b]$, sowie

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{für } a \leq t \leq b \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < a \\ \frac{t-a}{b-a} & \text{für } a \leq t \leq b \\ 1 & \text{für } t > b. \end{cases}$$

wir schreiben kurz $X \sim U(a, b)$.

$$E[X] = \frac{a+b}{2} \qquad Var[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Exponentialverteilung

Die Exponentialverteilung mit Parameter $\lambda > 0$ ist das stetige Analogon der Geometrischen Verteilung. Die zugehörige Zufallsvariable X hat $\mathcal{W}(X) = [0, \infty)$, Dichte und Verteilungsfunktion:

$$f_X(t) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda t} & \text{für } t \geq 0 \\ 0 & \text{für } t < 0 \end{cases}$$

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(s) \, ds = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t} & \text{für } t \geq 0 \\ 0 & \text{für } t < 0 \end{cases}$$

wir schreiben kurz $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Weiter ist die Funktion Gedächtnislos, dh. $P[X > t + s \mid X > s] = P[X > t]$.

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} \qquad Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Normalverteilung

Die Normalverteilung hat zwei Parameter: $\mu \in \mathbb{R}$ und $\sigma^2 > 0$. Die zugehörige Zufallsvariable X hat den Wertebereich $\mathcal{W}(X) = \mathbb{R}$ und die Dichtefunktion:

$$f_X(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} \qquad \text{für } t \in \mathbb{R}$$

welche symmetrisch um μ ist. Wir schreiben kurz: $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Standard Normalverteilung

Wichtige Normalverteilung mit $\mathcal{N}(0, 1)$. Weder für die zugehörige Dichte $\varphi(t)$ noch Verteilungsfunktion $\Phi(t)$ gibt es geschlossene Ausdrücke, aber das Integral

$$\Phi(t) = \int_{-\infty}^t \varphi(s) \, ds = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{1}{2}s^2} \, ds$$

ist tabelliert. Ist $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, so ist $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$, also:

$$F_X(t) = P[X \leq t] = P\left[\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{t-\mu}{\sigma}\right] = \Phi\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)$$

deshalb genügt es Φ zu tabellieren.

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

Normalapproximation

Wenn $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$ dann

$$S_n \sim_{\text{approx}} N(np, np(1-p))$$

Erwartungswert

Ist X stetig mit Dichte $f_X(x)$, so ist der Erwartungswert:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) \, dx$$

sofern das Integral absolut konvergiert. Ist das Integral nicht absolut konvergent, so existiert der Erwartungswert nicht.

Erwartungswert einer Funktion

Sei X eine Zufallsvariable und $Y = g(X)$ eine weitere Zufallsvariable. Ist X stetig mit Dichte f_X , so ist

$$E[Y] = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f_X(x) \, dx$$

Momente & Absolute Momente

Sei X eine Zufallsvariable und $p \in \mathbb{R}^+$. Wir definieren:

- p -te absolute Moment von X : $M_p := E[|X|^p]$
- falls $M_n < \infty$ für ein n , dann ist das n -te (rohe) Moment von X durch $m_n := E[X^n]$ definiert.
- Das n -te zentralisierte Moment von X ist durch $\mu_n := E[(X - E[X])^n]$ definiert.

Es gilt weiter, dass $M_n < \infty$ für $n \in \mathbb{N} \implies |m_m| \leq M_n$.

$$M_p = \int_{-\infty}^{\infty} |x|^p f_X(x) dx$$

$$m_n = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f_X(x) dx$$

$$p \leq q \wedge M_q < \infty \implies M_p < \infty$$

Gemeinsame Verteilung/Dichte

Die Gemeinsame Verteilungsfunktion von Zufallsvariablen X_1, \dots, X_n ist die Abbildung $F: \mathbb{R}^n \mapsto [0, 1]$ mit:

$$\begin{aligned} F(x_1, \dots, x_n) &:= P[X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n] \\ &= \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f(t_1, \dots, t_n) dt_n \dots t_1 \end{aligned}$$

dann heisst $f(x_1, \dots, x_n)$ die gemeinsame Dichte, welche folgende Eigenschaften hat:

- $f(x_1, \dots, x_n) \geq 0$ und $= 0$ ausserhalb von $\mathcal{W}(X_1, \dots, X_n)$.
- $\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(t_1, \dots, t_n) dt_n \dots t_1 = 1$
- $P[(X_1, \dots, X_n) \in A] = \int_{(x_1, \dots, x_n) \in A} f(t_1, \dots, t_n) dt_n \dots t_1$ für $A \subseteq \mathbb{R}^n$

Randverteilung

Haben X, Y die Gemeinsame Verteilungsfunktion F , so ist die Funktion $F_X: \mathbb{R} \mapsto [0, 1]$,

$$F_X(x) = P[X \leq x] = P[X \leq x, Y < \infty] = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y)$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

Sind X, Y diskrete Zufallsvariablen mit $\mathcal{W}(Y) = \{y_1, y_2, \dots\}$ und gemeinsamer Gewichtsfunktion $p(x, y)$, so ist die Gewichtsfunktion der Randverteilung von X gegeben durch:

$$x \mapsto p_X(x) := \sum_{y_i \in \mathcal{W}(Y)} P[X = x, Y = y_i]$$

Beispiel: Dichtefunktion berechnen

Seien X und Y zwei unabhängige Zufallsvariablen, beide exponentialverteilt mit Parameter $\lambda > 0$. Definiere

$$U := \frac{X}{X+Y} \text{ und } V := X+Y$$


Seien f_U und f_V die zu U und V gehörigen Dichtefunktionen. Berechne die Dichtefunktion f_U und Verteilungsfunktion F_U

$$\begin{aligned} P[U \leq u] &= f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u, v) dy \\ &= \lambda^2 \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} \left(\int_0^{\infty} 1_{\frac{x}{x+y} \leq u} e^{-\lambda y} dy \right) dx \\ &= \lambda^2 \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} \left(\int_0^{\infty} 1_{x(u-1) \leq y} e^{-\lambda y} dy \right) dx \\ &= \lambda \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} \left(\int_{x(u-1)}^{\infty} \lambda e^{-\lambda y} dy \right) dx \\ &= \lambda \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} e^{-\lambda x(u-1)} dx \\ &= \lambda \int_0^{\infty} e^{-\lambda u x} dx \\ &= u \end{aligned}$$

Beispiel: Randverteilung, gemeinsame Dichte

Man wählt zufällig einen Punkt $P = (U, V)$ in dem Gebiet D . Die gemeinsame Dichte von (U, V)

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} c & \text{falls } (u, v) \in D \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



1. bestimme Konstante c
2. bestimme Randverteilungsfunktion von U und Randdichtefunktion $f_U(u)$.
3. Sind U und V unabhängig?

$$\begin{aligned} D &= \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq a \leq 1 \text{ and } -2 \leq b \leq 2\} \\ &\cup \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq a \leq 2 \text{ and } -1 \leq b \leq 1\} \end{aligned}$$

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} 1/10 & \text{if } (u, v) \in D \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

2. For $u < -1$, $F_U(u) = P(U \leq u) = 0$. For $-1 \leq u \leq 1$, $F_U(u) = P(U \leq u) =$

$$\int_u^{-1} \int_{-2}^2 \frac{1}{10} \mathbf{1}_D(u, v) dv ds = \frac{4(u+1)}{10}$$

$$\text{For } 1 \leq u \leq 2, F_U(u) = P(U \leq u) =$$

$$\begin{aligned} &\int_1^{-1} \int_{-2}^2 \frac{1}{10} \mathbf{1}_D(u, v) dv ds + \int_u^1 \int_{-1}^1 \frac{1}{10} \mathbf{1}_D(u, v) dv ds \\ &= \frac{8}{10} + \frac{2(u-1)}{10} \end{aligned}$$

$$\text{and } F_U(u) = 1 \text{ for } u > 2.$$

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{4}{10} & \text{if } -1 \leq u \leq 1 \\ \frac{2}{10} & \text{if } 1 \leq u \leq 2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{U,V}(u, v) du =$$

$$\frac{1}{2} (2[v \in [-2, 2]] + [v \in [-1, 1]])$$

3. If U and V are independent, then for all u and v :

$$f_U(u) \cdot f_V(v) = f_{U,V}(u, v)$$

However, we have $f_{U,V}(2, 2) = 0$ and $f_U(2) \cdot f_V(2) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \neq 0$.
Therefore, U and V are not independent.

Unabhängigkeit

Die Zufallsvariablen X_1, \dots, X_n heissen unabhängig, falls gilt (äquivalent):

$$F(x_1, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1) \cdot \dots \cdot F_{X_n}(x_n)$$
$$f(x_1, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) \cdot \dots \cdot f_{X_n}(x_n)$$

für alle x_1, \dots, x_n .

Bedingte Verteilungen

Es gilt:

$$f_{X_1 \mid X_2}(x_1 \mid x_2) = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_2}(x_2)}$$
$$P[Y > t \mid Y < a] = \frac{P[t < Y < a]}{P[Y < a]}$$
$$E[X_1 \mid X_2] = \int x_1 \cdot f_{x_1 \mid x_2}(x_1 \mid x_2) \, dx_1$$

Summen von Zufallsvariablen

Sei $Z = X + Y$ eine Zufallsvariable mit:

$$F_Z(z) = P[Z \leq z] = P[X + Y \leq z]$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) \, dy \, dx$$
$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z - y, y) \, dy$$

Transformationen

Sei X eine Zufallsvariable mit Verteilung und Dichte. Sei $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ eine messbare Funktion. Betrachte nun $Y = g(X)$, wir suchen Verteilung und Dichte von Y :

$$F_Y(t) = P[Y \leq t] = P[g(Y) \leq t] = \int_{A_g} f_X(s) \, ds$$
$$A_g := \{s \in \mathbb{R} \mid g(s) \leq t\}$$

Wobei man die Dichte durch ableiten der Verteilung erhält.

Anwendung von Transformationen

Sei F eine stetige und streng monoton wachsende Verteilungsfunktion mit Umkehrfunktion F^{-1} . Ist $X \sim \mathcal{U}(0,1)$ und $Y = F^{-1}(X)$, so hat Y gerade die Verteilungsfunktion F :

$$F_Y(t) = P[Y \leq t] = P[F^{-1}(X) \leq t]$$
$$= P[X \leq F(t)] = F(t)$$

Mit der Substitution

$$\phi(X) = Y$$
$$X = \phi^{-1}(y)$$
$$f_Y(y) = f_X(\phi^{-1}(y)) |\det J_{\phi^{-1}}(y)|$$

Beispiel: Transformation

Sei X eine Zufallsvariable mit Dichte $f_X(x), x \in \mathbb{R}$ und sei $Y = e^X$. Was ist die Dichte $f_Y(y), y > 0$ der Zufallsvariable Y ?

$$Y = e^X$$
$$X = \ln Y$$
$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y}$$
$$f_Y(y) = f_X(\ln y) \cdot \frac{1}{y}$$

Markov Ungleichung

Sei X eine Zufallsvariable und ferner $g : \mathcal{W}(X) \mapsto [0, \infty)$ eine wachsende Funktion. Für jedes $c \in \mathbb{R}$ mit $g(c) > 0$ gilt dann:

$$P[X \geq c] \leq \frac{E[g(X)]}{g(c)}$$

Chebyshev-Ungleichung

Sei Y eine Zufallsvariable mit endlicher Varianz. Für jedes $b > 0$ gilt dann:

$$P[|Y - E[Y]| \geq b] \leq \frac{Var[Y]}{b^2}$$

Momenterzeugende Funktion

Die Momenterzeugende Funktion einer Zufallsvariable X ist:

$$M_X(t) := E[e^{t \cdot X}] \qquad \text{für } t \in \mathbb{R}$$

Grosse Summenabweichung

Seien X_1, \dots, X_n i.i.d. Zufallsvariablen, für welche die Momenterzeugende Funktion $M_X(t)$ für alle $t \in \mathbb{R}$ endlich ist. Für jedes $b \in \mathbb{R}$ gilt dann:

$$P[S_n \geq b] \leq \exp \left(\inf_{t \in \mathbb{R}} (n \cdot \log M_X(t) - t \cdot b) \right)$$

Chernoff Schranken

Seien X_1, \dots, X_n unabhängig mit $X_i \sim Be(p)$ und $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Sei $\mu_n := E[S_n] = \sum_{i=1}^n p_i$ und $\delta > 0$. Dann gilt:

$$P[S_n \geq (1 + \delta) \cdot \mu_n] \leq \left(\frac{e^\delta}{(1 + \delta)^{1 + \delta}} \right)^{\mu_n}$$

Schwaches Gesetz der grossen Zahlen

Sei X_1, X_2, \dots eine Folge von unabhängigen Zufallsvariablen, die alle den gleichen Erwartungswert $E[X_i] = \mu$ und die gleiche Varianz $Var[X_i] = \sigma^2$ haben. Sei

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Dann konvergiert \overline{X}_n für $n \rightarrow \infty$ in Wahrscheinlichkeit/stochastisch gegen $\mu = E[X_i]$, d.h.:

$$P[|\overline{X}_n - \mu| > \varepsilon] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \qquad \text{für jedes } \varepsilon > 0$$

(Statt unabhängig genügt auch $Cov(X_i, X_k) = 0$ für $i \neq k$)

Starkes Gesetz der grossen Zahlen

Sei X_1, X_2, \dots eine Folge von unabhängigen Zufallsvariablen, die alle dieselbe Verteilung haben, und ihr Erwartungswert $\mu = E[X_i]$ sei endlich. Für:

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

gilt dann

$$\overline{X}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu \qquad \text{P-fast sicher}$$

d.h.:

$$P \left[\left\{ \omega \in \Omega : \overline{X}_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu \right\} \right] = 1$$

i.i.d. / u.i.v.

Independent identically distributed

Zentraler Grenzwertsatz

Sei X_1, X_2, \dots eine Folge von i.i.d. Zufallsvariablen mit $E[X_i] = \mu$ und $Var[X_i] = \sigma^2$. Für die Summe $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ gilt dann:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left[\frac{S_n - n \cdot \mu}{\sigma \sqrt{n}} \leq x \right] = \Phi(x) \qquad \text{für alle } x \in \mathbb{R}$$

wobei Φ die Verteilungsfunktion von $\mathcal{N}(0,1)$ ist.

3 Statistik

χ^2 -Verteilung

Die χ^2 -Verteilung mit n Freiheitsgraden (bez. \mathcal{X}_n^2) gehört zu einer stetigen Zufallsvariable Y mit Dichtefunktion:

$$f_Y(y) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{1}{2}y}$$

wobei dies ein Spezialfall der $Ga(\alpha, \lambda)$ Verteilung ist mit $\alpha = \frac{n}{2}$ und $\lambda = \frac{1}{2}$. Sind die Zufallsvariablen X_1, \dots, X_n i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0,1)$, so ist die Summe $Y := \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \mathcal{X}_n^2$.

t-Verteilung

Die t -Verteilung mit n Freiheitsgraden gehört zu einer stetigen Zufallsvariable Z mit Dichtefunktion

$$f_Z(z) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{z^2}{n} \right)^{-\frac{n+1}{2}} \qquad \text{für } z \in \mathbb{R}$$

für $n = 1$ ist das eine Cauchy Verteilung und für $n \rightarrow \infty$ erhält man $\mathcal{N}(0,1)$. Sind X, Y unabhängig und $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ und $Y \sim \mathcal{X}_n^2$, so ist der Quotient:

$$Z := \frac{X}{\sqrt{\frac{1}{n}Y}} \sim t_n, \text{ also } t\text{-Verteilt mit } n \text{ Freiheitsgraden}$$

Hypothesen

Es gibt:

- Hypothese $H_0 : \vartheta \in \Theta_0$
- Alternative $H_A : \vartheta \in \Theta_A$

Man verwirft die Hypothese genau dann, wenn der realisierte Wert im Verwerfungsbereich K liegt.

Fehler

Es gibt folgende Fehler:

- 1. Art: Hypothese wird zu unrecht abgelehnt. $P_\vartheta[T \in K]$ für $\vartheta \in \Theta_0$
- 2. Art: Hypothese wird zu unrecht nicht verworfen. $P_\vartheta[T \notin K]$ für $\vartheta \in \Theta_A$

Meist kann man nicht beides minimieren, also geht man wie folgt vor:

- Man wählt ein **Signifikanzniveau** $\alpha \in (0, 1)$ und kontrolliert die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art durch

$$\sup_{\vartheta \in \Theta_0} P_\vartheta[T \in K] \leq \alpha$$

- Man versucht die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler zweiter Art $P_\vartheta[T \notin K]$ für $\vartheta \in \Theta_A$ zu minimieren. Dazu maximiert man die **Macht des Tests**:

$$\beta : \Theta_A \mapsto [0, 1] \quad \vartheta \mapsto \beta(\vartheta) := P_\vartheta[T \in K]$$

Somit ist es schwieriger eine Hypothese zu verwerfen als zu behalten. In einem Test **verwendet man deshalb immer als Hypothese die Negation der eigentlich gewünschten Aussage**.

Beispiel: Hypothesen-Test

Christoph hat in 100 Versuchen 60 Mal richtig gelegen mit seiner Vorhersage. Soll man nun Christoph hellseherische Fähigkeiten zuschreiben, oder war das purer Zufall? Führen Sie dazu einen statistischen Test durch. Mittels eines Binomial-Tests möchten wir testen ob Christoph hellseherische Fähigkeiten besitzt oder nicht. Wir gehen dabei wie folgt vor:

- H_0 : Christoph besitzt keine hellseherische Fähigkeiten, d.h. $X \sim \text{Bin}(n, p)$ mit $p = \frac{1}{2}$
- H_A : Christoph besitzt hellseherische Fähigkeiten, d.h. $X \sim \text{Bin}(n, p)$ mit $p > \frac{1}{2}$
- Der Test ist einseitig durchzuführen. Wir möchten herausfinden ob Christophs Vorhersagen häufiger korrekt sind (d.h. $p > \frac{1}{2}$) sind als diejenigen einer Person die einfach zufällig etwas tippt (d.h. $p = \frac{1}{2}$)
- sei wieder X die Anzahl korrekter Vorhersagen aus n Versuchen. Unter H_0 ist also $X \sim \text{Bin}(p = \frac{1}{2}, n = 100)$ und somit verwerfen wir H_0 für alle $k \in \mathbb{N}$, für welche $P_{H_0}(X \geq k) \leq 0.05$. Durch Ablesen von der Binomialtabelle erhalten wir $P_{H_0}(X \geq 58) = 1 - P_{H_0}(X \leq 57) = 0.0666$ und $P_{H_0}(X \geq 59) = 0.0443$. Der Verwerfungsbereich V ist also gegeben durch $V = \{k \in \mathbb{N} : k \geq 59\}$.
- Testentscheidung: Christoph hat von den 100 Mal 60 Mal korrekt vorhergesagt und somit verwerfen wir H_0 , denn $60 \in V$.

Likelihood Quotient

Sei $L(x_1, \dots, x_n; \vartheta)$ die Likelihood Funktion und $\vartheta_0 \in \Theta_0$ sowie $\vartheta_A \in \Theta_A$. Dann definieren wir:

$$R(x_1, \dots, x_n; \vartheta_0, \vartheta_A) = \frac{L(x_1, \dots, x_n; \vartheta_A)}{L(x_1, \dots, x_n; \vartheta_0)}$$

je grösser der Quotient, desto wahrscheinlicher die Alternative. Es gibt auch:

$$R(x_1, \dots, x_n) = \frac{\sup_{\vartheta \in \Theta_A} L(x_1, \dots, x_n; \vartheta)}{\sup_{\vartheta \in \Theta_0} L(x_1, \dots, x_n; \vartheta)}$$
$$\tilde{R}(x_1, \dots, x_n) = \frac{\sup_{\vartheta \in \Theta_A \cup \Theta_0} L(x_1, \dots, x_n; \vartheta)}{\sup_{\vartheta \in \Theta_0} L(x_1, \dots, x_n; \vartheta)}$$

Wähle Konstante c_0 für $K_0 = (c_0, \infty)$ mithilfe von Signifikanzniveau.

Neyman-Pearson Lemma

Sei $\Theta_0 = \{\vartheta_0\}$ und $\Theta_A = \{\vartheta_A\}$. Wie oben sei $T = R(X_1, \dots, X_n; \vartheta_0, \vartheta_A)$ und $K := (c, \infty)$, sowie $\alpha^* := P_{\vartheta_0}[T \in K] = P_{\vartheta_0}[T > c]$. Der Likelihood Quotienten Test mit Teststatistik T und kritischem Bereich K ist dann in folgendem Sinn optimal: Jeder andere Test mit Signifikanzniveau $\alpha \leq \alpha^*$ hat eine kleinere Macht (bez. Grössere WS Fehler 2. Art).

p-Wert

(Nach Wikipedia) Der p -Wert ist die Wahrscheinlichkeit ein mindestens so extremes Testergebnis zu erhalten, wenn die Nullhypothese gelten würde:

$$p(x) = P[X \leq x \mid H_0] \text{ oder } P[X \geq x \mid H_0]$$
$$p(x) = 2 \cdot \min\{P[X \leq x \mid H_0], P[X \geq x \mid H_0]\}$$

z-Test

Normalverteilung, Test für Erwartungswert bei bekannter Varianz. Hier sind X_1, \dots, X_n i.i.d. $\mathcal{N}(\vartheta, \sigma^2)$. Wir möchten die Hypothese $H_0 : \vartheta = \vartheta_0$ testen. Mögliche Alternativen H_A sind $\vartheta > \vartheta_0$, $\vartheta < \vartheta_0$ (einseitig) oder $\vartheta \neq \vartheta_0$ (zweiseitig). Die Teststatistik ist:

$$T = \frac{\bar{X} - \vartheta_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{unter } P_{\vartheta_0}$$

Und die Verwerfungsbereiche:

$$\begin{aligned} \vartheta < \vartheta_0 & \quad (-\infty, z_\alpha) \\ \vartheta > \vartheta_0 & \quad (z_{1-\alpha}, \infty) \\ \vartheta \neq \vartheta_0 & \quad (-\infty, z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty) \end{aligned}$$

Wobei die z Werte in der Tabelle nachgeschaut werden können und es gilt $z_\alpha = -z_{1-\alpha}$.

Beispiel Fehler 1. Art berechnen

Sei $\Theta = [0, 1]$ und seien X_1, \dots, X_6 unabhängig, identisch verteilt unter P_θ mit $X_i \sim \text{Ber}(\theta)$. Wir betrachten die Nullhypothese $H_0 : \theta = \frac{1}{2}$ und die Alternativhypothese $H_A : \theta = \frac{1}{3}$. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art für den Test (T, K) mit $T = \sum_{i=1}^6 X_i$ und $K = (-\infty, 0]$? Die Teststatistik T ist die Summe der beobachteten Werte der X_i :

$$\begin{aligned} P(T \in K) &= P[T \leq 0] = P[T = 0] \\ &= P(X_1 = 0) \cdot P(X_2 = 0) \cdot \dots \cdot P(X_6 = 0) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64} \end{aligned}$$

Beispiel Fehler 2. Art berechnen

Nehme an: einseitiger z -Test, $T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, $\mu_0 = 70$.

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_A : \mu < \mu_0$$

Kritischer Bereich mit 5% niveau: $K = (-\infty, -1.645)$.

Wir nehmen an, dass $T = \frac{\bar{X}_n - \mu_A}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$\begin{aligned} P_{\mu_A}[T \notin K] &= P_{\mu_A}[T > -1.645] \\ &= P_{\mu_A}\left[\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > -1.645\right] \\ &= P_{\mu_A}\left[\frac{\bar{X}_n - \mu_A}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{\mu_0 - \mu_A}{\sigma/\sqrt{n}} - 1.645\right] \\ &= 1 - P_{\mu_A}\left[\frac{\bar{X}_n - \mu_A}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{\mu_0 - \mu_A}{\sigma/\sqrt{n}} - 1.645\right] \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{\mu_0 - \mu_A}{\sigma - \sqrt{n}} - 1.645\right) \end{aligned}$$

Weil $\sim \mathcal{N}(0, 1)$

t-Test

Normalverteilung, Test für Erwartungswert bei unbekannter Varianz. Hier sind X_1, \dots, X_n i.i.d. $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ unter $P_{\vec{\vartheta}}$, wobei $\vec{\vartheta} = (\mu, \sigma^2)$. Wir wollen die Hypothese $\mu = \mu_0$ testen. Die Teststatistik ist:

$$T := \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad \text{unter } P_{\vartheta_0}$$
$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

Und die Verwerfungsbereiche:

$$\begin{aligned} c_< &= t_{n-1, \alpha} & (-\infty, c_<) & & \mu < \mu_0 \\ c_> &= t_{n-1, 1-\alpha} & (c_>, \infty) & & \mu > \mu_0 \\ c_\neq &= t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} & (-\infty, c_<) \cup (c_>, \infty) & & \mu \neq \mu_0 \end{aligned}$$

Wobei gilt $t_{m, \alpha} = -t_{m, 1-\alpha}$.

Gepaarter Zweiprobe-Test

Hier sind X_1, \dots, X_n i.i.d. $\sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma^2)$ und Y_1, \dots, Y_n i.i.d. $\sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma^2)$ unter P_ϑ . Insbesondere ist $m = n$ und die Varianz beider Stichproben dieselbe. Differenzen $Z_i := X_i - Y_i$ sind unter P_ϑ i.i.d. $\mathcal{N}(\mu_X - \mu_Y, 2\sigma^2)$. Dann analog z und t -Test. (Setzt natürliche Paarung von Daten voraus!)

Ungepaarter Zweiprobe-Test
 Hier sind unter P_ϑ die Zufallsvariablen X_1, \dots, X_n i.i.d. $\sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma^2)$ und Y_1, \dots, Y_m i.i.d. $\sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma^2)$, wobei die Varianz in beiden Fällen dieselbe ist.

- Bei bekannter Varianz:

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \mu_0 \quad (z.B. \mu_0 = 0)$$

$$T = \frac{\overline{X}_n - \overline{Y}_m - (\mu_X - \mu_Y)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Die kritischen Werte für den Verwerfungsbereich sind wie oben geeignete Quantile der $\mathcal{N}(0, 1)$ -Verteilung, je nach Alternative. Das ist der ungepaarte Zweistichproben- z -Test.

- Bei unbekannter Varianz:

$$S_X^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X}_n)^2$$

$$S_Y^2 := \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (Y_j - \overline{Y}_m)^2$$

$$S^2 := \frac{1}{m+n-2} ((n-1) \cdot S_X^2 + (m-1) \cdot S_Y^2)$$

$$T = \frac{\overline{X}_n - \overline{Y}_m - (\mu_X - \mu_Y)}{S \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim t_{n+m-2}$$

unter jedem P_ϑ . Dieser Test heisst ungepaarter Zweistichproben- t -Test.

Konfidenzbereich
 Ein Konfidenzbereich für ϑ zu Daten x_1, \dots, x_n ist eine Menge $C(x_1, \dots, x_n) \subseteq \Theta$. Damit ist $C(X_1, \dots, X_n)$ eine zufällige Teilmenge von Θ . Dieses C heisst Konfidenzbereich zum Niveau $1 - \alpha$, falls für alle $\vartheta \in \Theta$ gilt:

$$P_\vartheta[\vartheta \in C(X_1, \dots, X_n)] \geq 1 - \alpha$$

Beispiel: Konfidenzbereich

Machen wir den Ansatz:

$$C(X_1, \dots, X_n) = [\overline{X}_n - \dots, \overline{X}_n + \dots]$$

so wollen wir erreichen, dass gilt:

$$1 - \alpha \leq P_\vartheta[\vartheta \in C(X_1, \dots, X_n)]$$

$$= P_\vartheta[\mu \in [\overline{X}_n - \dots, \overline{X}_n + \dots]] = P_\vartheta[|\overline{X}_n - \mu| \leq \dots]$$

Nach Satz 7.1 ist für jedes $\vartheta \in \Theta$:

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad \text{unter } P_\vartheta$$

$$1 - \alpha \leq P_\vartheta \left[\left| \frac{\overline{X}_n - \mu}{S/\sqrt{n}} \right| \leq \frac{\dots}{S/\sqrt{n}} \right]$$

also erhalten wir das Konfidenzintervall für μ zum Niveau $1 - \alpha$:

$$C(X_1, \dots, X_n) = \left[\overline{X}_n - t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}, \overline{X}_n + t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$$

4 Schätzer

Schätzer

Wir suchen ein Modell für eine Stichprobe X_1, \dots, X_n und haben einen Parameteraum $\vartheta \subseteq \Theta$ und für jedes ϑ einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{F}, P_\vartheta)$. Wir möchten nun die Parameter $\vartheta_1, \dots, \vartheta_m$ bestimmen. Ein Schätzer T_j für einen Parameter ϑ_j ist eine Zufallsvariable der Form $T_j := t_j(X_1, \dots, X_n)$ für eine Schätzfunktion t_j .

Schätzwert

Ein Schätzwert ist das Ergebnis einer konkreten Berechnung, eine Zahl. Sie entsteht durch das Einsetzen konkreter Daten in einen Schätzer: $T_j(\omega) = t_j(x_1, \dots, x_n)$ und liefert damit einen Wert für genau einen Parameter.

Eigenschaften von Schätzern

Sei T ein Schätzer.

- T ist erwartungstreu, falls $E_\vartheta[T] = \vartheta$ gilt. T schätzt im Mittel also richtig.
- Bias := $E_\vartheta[T] - \vartheta$. Ein erwartungstreuer Schätzer hat also keinen Bias.
- Mittlere Quadratische Schätzfehler $MSE_\vartheta[T] := E_\vartheta[(T - \vartheta)^2]$.
- Eine Folge $T^{(n)}$ von Schätzern heisst konsistent für ϑ , falls $T^{(n)}$ für $n \rightarrow \infty$ in P_ϑ -Wahrscheinlichkeit gegen ϑ konvergiert, d.h. für jedes $\vartheta \in \Theta$ gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_\vartheta \left[\left| T^{(n)} - \vartheta \right| > \varepsilon \right] = 0$$

Beispiel: Erwartungstreuer Schätzer

Seien X_1, \dots, X_n unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen mit $X_i \sim \mathcal{U}([\theta - 1, \theta])$ unter \mathbb{P}_θ wobei $\theta \in \mathbb{R}$. Wir betrachten den Schätzer

$$T_1^{(n)} := \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{2}$$

Sind Schätzer erwartungstreu?

Sei $\theta \in \mathbb{R}$ fixiert. Aus der Gleichverteilung folgt, dass

$$\mathbb{E}_\theta[T(n)_1] = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}_\theta[X_i] \right) + \frac{1}{2}$$

$$= \mathbb{E}_\theta[X_1] + \frac{1}{2} = \theta - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

$$= \theta$$

Somit folgt, dass der Schätzer $T(n)_1$ erwartungstreu ist.

Maximum-Likelihood Methode

(Analog im diskreten Fall.) In einem Modell P_ϑ sind die Zufallsvariablen X_1, \dots, X_n stetig mit einer gemeinsamen Dichtefunktion $f(x_1, \dots, x_n, \vartheta)$. Oft sind die X_i i.i.d. und man erhält:

$$f(x_1, \dots, x_n, \vartheta) = P[X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n]$$

$$= \prod_{i=1}^n f_X(x_i, \vartheta)$$

7

Wir nehmen nun an, dass die Daten die wir erhalten haben sehr Wahrscheinlich sind und versuchen nun folgende Likelihoodfunktion zu Maximieren durch Anpassungen an ϑ :

$$L(x_1, \dots, x_n; \vartheta) := f(x_1, \dots, x_n; \vartheta)$$

$$\log L(x_1, \dots, x_n; \vartheta) := \log f(x_1, \dots, x_n; \vartheta)$$

letzteres kann bei Produkt zu Summe umwandlung hilfreich sein.

Beispiel: Maximum Likelyhood-Funktion

Sei $\Theta = [0, 1]$. Wir betrachten die Modellfamilie $P_{\theta \in \Theta}$, wobei X_1, \dots, X_n unter \mathbb{P}_θ unabhängig und identisch verteilt sind mit $X_1 \sim \text{Geom}(\theta)$. Was ist die Likelihood-Funktion $L(x_1, \dots, x_n; \theta)$ für $x_1, \dots, x_n \in \{1, 2, \dots\}$?

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta) = (P_\theta)[X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n]$$

$$= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}_\theta[X_i = x_i]$$

$$= \theta^n \cdot (1 - \theta)^{x_1 + \dots + x_n - n}$$

Was ist der Maximum-Likelihood-Schätzer T_{ML} für θ ?

$$n \cdot \log(\theta) + (x_1 + \dots + x_n - n) \cdot \log(1 - \theta)$$

Wir setzen nun die Ableitung der log-Likelihood-Funktion nach θ gleich 0 und erhalten:

$$\frac{n}{\theta} - \frac{x_1 + \dots + x_n - n}{1 - \theta} = 0$$

$$\iff n - n\theta = (x_1 + \dots + x_n) \cdot \theta - n\theta$$

$$\iff \theta = \frac{n}{x_1 + \dots + x_n}$$

$$= \frac{n}{X_1 + \dots + X_n}$$

Empirisches Moment

Für $k \in \{1, \dots, m\}$ sei das k -te Moment empirische Moment oder Stichprobenmoment \hat{m}_k der Realisierung (x_1, \dots, x_n) :

$$\hat{m}_k(x_1, \dots, x_n) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$$

Momentenmethode

Der Momentenmethode liegt zugrunde, dass die Momente einer Zufallsvariable bzw. einer Wahrscheinlichkeitsverteilung durch Stichprobenmomente geschätzt werden können.

Sei X_1, \dots, X_n eine Stichprobe und Θ der Parameteraum. Für jeden Parameter $\vartheta = (\vartheta_1, \dots, \vartheta_m) \in \Theta$ sei X_1, \dots, X_n i.i.d. unter dem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{F}, P_\vartheta)$. Methode:

- Für gegebene Realisierungen x_1, \dots, x_n bestimme für jedes $k \in \{1, \dots, m\}$ das k -te empirische Moment
- Stelle ein Gleichungssystem für die Unbekannten Parameter $\vartheta_1, \dots, \vartheta_m$ auf, in dem das k -te empirische Moment dem k -ten Moment gleichgesetzt wird, also:

$$\hat{m}_k(x_1, \dots, x_n) = g_k(\vartheta_1, \dots, \vartheta_m) \quad k \in \{1, \dots, m\}$$

- Existiert eine Eindeutige Lösung so wird das unsere Schätzung für ϑ .

Momentenschätzer

Der Vektor $\hat{\vartheta}(X_1, \dots, X_n)$ heisst Momentenschätzer des Parameters ϑ .

Beispiel: Normalverteilte Stichprobe

Sei X_1, \dots, X_n i.i.d. $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ -verteilt mit unbekannten Parametern $\vartheta = (\mu, \sigma^2)$. Damit berechnen wir mit der log max likelihood funktion Ableitungen setzen diese zu 0 und bekommen:

$$T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}_n$$

$$T_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \bar{X}_n^2$$

möchten wir aber noch, dass der Schätzer erwartungstreu wird, so wählen wir für $T_2 = S^2$:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

Normalverteilte Stichproben

Seien X_1, \dots, X_n i.i.d. $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Dann gilt:

- $\bar{X}_n \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ und $\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
- $\frac{n-1}{\sigma^2} S^2 = \left(\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \right) \sim \chi_{n-1}^2$
- \bar{X}_n und S^2 sind unabhängig
- $\frac{\bar{X}_n - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\frac{S/\sigma}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \frac{n-1}{\sigma^2} S^2}}} \sim t_{n-1}$

5 Diskrete Verteilungen

Verteilung	Parameter	$E[X]$	$\text{Var}(X)$	$p_X(t)$	$F_X(t)$
Gleichverteilung	n : Anzahl Ereignisse x_i : Ereignisse	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n^2} (\sum_{i=1}^n x_i)^2$	$\frac{1}{n}$	$\frac{\lfloor t \cdot n \rfloor + 1}{n}$
Bernoulli	p : ErfolgsWK	p	$p \cdot (1-p)$	$p^t (1-p)^{1-t}$	$1-p$ für $0 \leq t < 1$
Binomial	p : ErfolgsWK n : Anzahl Versuche	np	$np(1-p)$	$\binom{n}{t} p^t (1-p)^{n-t}$	$\sum_{k=0}^t \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
Geometrisch	p : ErfolgsWK t : Anzahl Versuche	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$p(1-p)^{t-1}$	$1 - (1-p)^t$
Negativ Binomial	$r > 0$: Erfolge bis Abbruch p : ErfolgsWK t : Misserfolge	$\frac{r}{1-p}$	$\frac{r}{(1-p)^2}$	$\binom{t+r-1}{r-1} \cdot (1-p)^r p^t$	$F_{\text{Binomial}}(t; n = t+r, p)$
Hypergeometrisch	N : Anzahl aller Elemente $M \leq N$: Anzahl möglicher Erfolge $n \leq N$: Anzahl Elemente in der Stichprobe	$n \frac{M}{N}$	$n \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) \frac{N-n}{N-1}$	$\frac{\binom{M}{t} \binom{N-M}{n-t}}{\binom{N}{n}}$	$\sum_{k=0}^t \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$
Poisson	λ : Erwartungswert und Varianz	λ	λ	$\frac{\lambda^t}{t!} e^{-\lambda}$	p

6 Stetige Verteilungen

Verteilung	Parameter	$E[X]$	$\text{Var}(X)$	$f_X(t)$	$F_X(t)$
Gleichverteilung	$[a, b]$: Intervall	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{1}{12}(b-a)^2$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{t-a}{b-a}$
Exponentialverteilung	λ : $\frac{1}{\text{MTBF}}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$	$\begin{cases} 1 - e^{-\lambda t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$
Normalverteilung	σ^2 : Varianz μ : $E[X]$	μ	σ^2	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} - \infty < t < \infty$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy$
χ^2 -Verteilung	n : Freiheitsgrad	n	$2n$	$\frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} t^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{t}{2}} \quad t > 0$	$\text{Gamma}(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$
Gamma-Verteilung	α, λ	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda^\alpha \Gamma(\alpha)^{-1} e^{-\lambda t} t^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} \quad t > 0 \quad \alpha, \lambda > 0$	$\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \gamma(\alpha, \lambda t)$
t-Verteilung	n : Freiheitsgrad	0 für $n > 1$ sonst undef.	$\begin{cases} \frac{n-2}{2} & n > 2 \\ \text{undef.} & 1 < n \leq 2 \\ \text{undef.} & \text{sonst} \end{cases}$	$\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} (1 + \frac{t^2}{n})^{-\frac{n+1}{2}}$	cdf

7 Tabellen

Ableitung, Integration

Es gilt:

- Summenregel** $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$
- Produktregel** $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
- Quotientenregel** $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$ wenn $g(x) \neq 0$
- Kettenregel** $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
- Partielle Integration** $\int_a^b f'(x) \cdot g(x) dx = [f(x) \cdot g(x)]_a^b - \int_a^b f(x) \cdot g'(x) dx$
- Substitution** $\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt$
- $a + c, b + c \in I$: $\int_a^b f(t + c) dt = \int_{a+c}^{b+c} f(x) dx$
- Logarithmus** $\int \frac{f'(t)}{f(t)} dt = \log(|f(x)|)$

Beispiel: Substitution

$$\int \cos(x^2) 2x dx \quad u = x^2$$
$$\int \cos(u) du \quad \frac{du}{dx} = \frac{dx^2}{dx} = 2x$$

7.1 Ableitungen

$F(x)$	$f(x)$
$(x-1)e^x$	xe^x
$\frac{x-a+1}{x-a+1}$	$\frac{1}{x^a}$
$\frac{a+1}{x^{a+1}}$	$x^a (a \neq -1)$
$\frac{a+1}{k \ln(a)} a^{kx}$	a^{kx}
$\ln x $	$\frac{1}{x}$
$\frac{2}{3} x^{3/2}$	\sqrt{x}
$-\cos(x)$	$\sin(x)$
$\sin(x)$	$\frac{\sin(x)^2}{2}$
$\frac{1}{2}(x - \frac{1}{2} \sin(2x))$	$\cos(x)$
$\tan(x) - x$	$\sin^2(x)$
$-\cot(x) - x$	$\tan^2(x)$
$\frac{1}{2}(x + \frac{1}{2} \sin(2x))$	$\cot^2(x)$
$-\ln \cos(x) $	$\cos^2(x)$
$\cosh(x)$	$\tan(x)$
$\log(\cosh(x))$	$\sinh(x)$
$\ln \sin(x) $	$\tanh(x)$
$\frac{1}{c} \cdot e^{cx}$	$\cot(x)$
$x(\ln x - 1)$	e^{cx}
$\frac{1}{2}(\ln(x))^2$	$\ln x $
$\frac{x}{\ln(a)}(\ln x - 1)$	$\frac{\ln(x)}{x}$
	$\log_a x $
$F(x)$	$f(x)$
$\arcsin(x)/\arccos(x)$	$\frac{1/-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$x \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}$	$\arcsin(x)$
$x \arccos(x) - \sqrt{1-x^2}$	$\arccos(x)$
$x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$	$\arctan(x)$
$\ln(\cosh(x))$	$\tanh(x)$
$x^x (x > 0)$	$x^x \cdot (1 + \ln x)$
$f(x)^{g(x)}$	$e^{g(x) \ln(f(x))}$
$f(x) = \cos(\alpha)$	$f(x)^n = \sin(x + n \frac{\pi}{2})$
$f(x) = \frac{1}{ax+b}$	$f(x)^n =$
	$(-1)^n * a^n * n! * (ax+b)^{-n+1}$
$-\ln(\cos(x))$	$\tan(x)$
$\ln(\sin(x))$	$\cot(x)$
$\ln(\tan(\frac{x}{2}))$	$\frac{1}{\sin(x)}$
$\ln \tan(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})$	$\frac{1}{\cos(x)}$

$f(x)$	$F(x)$
$\int f'(x)f(x) dx$	$\frac{1}{2}(f(x))^2$
$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$	$\ln f(x) $
$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$	$\sqrt{\pi}$
$\int (ax+b)^n dx$	$\frac{1}{a(n+1)}(ax+b)^{n+1}$
$\int x(ax+b)^n dx$	$\frac{(ax+b)^{n+2}}{(n+2)a^2} - \frac{b(ax+b)^{n+1}}{(n+1)a^2}$
$\int (ax^p+b)^n x^{p-1} dx$	$\frac{(ax^p+b)^{n+1}}{ap(n+1)}$
$\int (ax^p+b)^{-1} x^{p-1} dx$	$\frac{1}{ap} \ln ax^p+b $
$\int \frac{ax+b}{cx+d} dx$	$\frac{ax}{c} - \frac{ad-bc}{c^2} \ln cx+d $
$\int \frac{1}{x^2+a^2} dx$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$
$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx$	$\frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right $
$\int \sqrt{a^2+x^2} dx$	$\frac{x}{2} f(x) + \frac{a^2}{2} \ln(x+f(x))$

