

Zufallsvektoren

Aufgabe 1

Sei $Z = X + Y$ mit $X, Y \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{E}(\lambda)$. Zeigen Sie, dass Z Gamma-verteilt ist mit $Z \sim \mathcal{G}(\alpha = 2, \beta = \lambda)$.

Aufgabe 2

Sei die gemeinsame Dichte von (X, Y) gegeben als

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{für } 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- (a) Was ist der Träger von (X, Y) ?
- (b) Zeigen Sie dass die Randverteilung von X eine Gleichverteilung auf $[0, 1]$ ist.
- (c) Bestimmen Sie die Randverteilung von Y .
- (d) Zeigen Sie dass die bedingte Verteilung von $Y|X = x$ eine Gleichverteilung auf $[0, x]$ ist.
- (e) Bestimmen Sie die bedingte Verteilung von $X|Y = y$.

Aufgabe 3

Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion von X und Y sei

$$f(x, y) = \begin{cases} \exp(-2\lambda) \frac{\lambda^{x+y}}{x!y!} & x, y \in \mathbb{N}_0^+ \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- (a) Bestimmen Sie die Randverteilungen von X und Y
- (b) Bestimmen Sie die bedingten Verteilungen von $X|Y = y$ und $Y|X = x$
- (c) Was folgt aus den Ergebnissen der vorigen Teilaufgaben für (X, Y) ?

Aufgabe 4

Der Zwedshgen-Alfons betreibt einen Obststand vor der Uni. Sei $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ die Poisson-verteilte Anzahl an Kund:innen an einem gegebenen Tag. Seien die Umsätze U_i für die i -te Person des Tages unabhängig und identisch Gamma-verteilt: $U_i \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{G}(\alpha, \beta)$

- (a) Helfen Sie dem Zwedshgen-Alfons den Erwartungswert seines täglichen Gesamtumsatzes zu bestimmen.
- (b) Helfen Sie dem Zwedshgen-Alfons die Varianz seines täglichen Gesamtumsatzes zu bestimmen.
- (c) Erfahrungsgemäß kommen im Mittel 120 Kund:innen pro Tag zum Obststand und geben jeweils im Mittel 10 Euro aus, mit einer Standardabweichung von $\sqrt{10}$ Euro. Bestimmen Sie (approximativ) die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Zwedshgen-Alfons an einem gegebenen Tag weniger als 1000 Euro Umsatz macht.
- (d) Verifizieren Sie ihr Ergebnis aus der vorherigen Teilaufgabe mit einem geeigneten Simulations-Experiment in R.

Hinweis: Die Summe von n unabhängigen $\mathcal{G}(\alpha, \beta)$ -Zufallsvariablen ist $\mathcal{G}(n\alpha, \beta)$ -verteilt.