

Daniel Vázquez Lago

Física de Partículas



Índice general

Introducción

1 Ejercicios	3
Ejercicios	3
Bibliografía	32

Capítulo 1

Ejercicios

Ejercicio 1.1 – Espinores

Sean ψ_{\downarrow} y ξ_{\uparrow} dos espinores de Weyl zurdos y diestros independientes, respectivamente. Demuestre que $\xi_{\uparrow}^{\dagger} \sigma^{\mu} \psi_{\uparrow}$ y $\xi_{\downarrow}^{\dagger} \bar{\sigma}^{\mu} \psi_{\downarrow}$ son cuatro-vectores contravariantes, donde $\sigma^{\mu} \equiv (1, \boldsymbol{\sigma})$ y $\bar{\sigma}^{\mu} \equiv (1, -\boldsymbol{\sigma})$.

Al ser $\sigma^{\mu} = (1, \boldsymbol{\sigma})$, la demostración se puede dividir en dos fases, en demostrar que $v^0 = \xi_{\downarrow}^{\dagger} \psi_{\downarrow}$ y que $v^i = \xi_{\downarrow}^{\dagger} \bar{\sigma}^i \psi_{\downarrow}$ (así mismo para los espinores R) son efectivamente invariantes Lorentz. Las transformaciones de Lorentz sobre un eje (por ej. el eje x):

$$V^0 \rightarrow V'^0 = \cosh(\eta) V^0 + \sinh(\eta) V^1 \quad (1.1)$$

$$V^1 \rightarrow V'^1 = \cosh(\eta) V^1 + \sinh(\eta) V^0 \quad (1.2)$$

siendo $V'^2 = V^2$ y $V'^3 = V^3$. Con hacerlo sobre un eje basta, ya que siempre podremos encontrar un sistema de referencia donde el boost sea sobre ese eje x . Si nuestros cuatro-vecotres siguen dichas transformaciones, podemos decir que son contravariantes. Veamos uno por uno los dos casos:

- Caso $\xi_{\uparrow}^{\dagger} \sigma^{\mu} \psi_{\uparrow}$. Una transformación Lorentz para los espinores de Weyl a derechas es:

$$\Lambda_{\uparrow} = \exp((-i\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\eta}) \cdot \boldsymbol{\sigma}) \quad (1.3)$$

y recordemos que

$$v^0 = \xi_{\uparrow}^{\dagger} \psi_{\uparrow} \quad v^i = \xi_{\uparrow}^{\dagger} \bar{\sigma}^i \psi_{\uparrow} \quad (1.4)$$

Si el boost lo hacemos en el eje x , el único valor no nulo de $\boldsymbol{\eta}$ es $\eta_1 = \eta$. Así pues:

$$\Lambda_{\uparrow} = \exp(\eta \sigma_1 / 2) \quad (1.5)$$

Ahora tenemos que aplicar esto a nuestro v_0 :

$$v^0 \rightarrow v'^0 = \xi_{\uparrow}^{\dagger} \psi'_{\uparrow} = (\Lambda_{\uparrow} \xi_{\uparrow}^{\dagger})(\Lambda_{\uparrow} \psi_{\uparrow}) = e^{(\eta \sigma_1)} \xi_{\uparrow}^{\dagger} \psi_{\uparrow} \quad (1.6)$$

Usando que $e^{(\eta \sigma_1)} = \cosh(\eta) + \sigma^1 \eta$, tenemos que:

$$v'^0 = \cosh(\eta) \xi_{\uparrow}^{\dagger} \psi_{\uparrow} + \sinh(\eta) \xi_{\uparrow}^{\dagger} \sigma^1 \psi_{\uparrow} = \cosh v^0 + \sinh \eta v^1 = \Lambda v^0 \quad (1.7)$$

q.e.d. Por otro lado, nos queda demostrar para v^i :

$$v^1 \rightarrow v'^1 = \xi_{\uparrow}^{\dagger} \sigma_1 \psi'_{\uparrow} = \cosh(\eta) \xi_{\uparrow}^{\dagger} \sigma^1 \psi_{\uparrow} + \sinh(\eta) \xi_{\uparrow}^{\dagger} \psi_{\uparrow} = \cosh(\eta) v^1 + \sinh(\eta) v^0 \quad (1.8)$$

donde nos hemos saltados algunos de los pasos. Dado que $\eta_2 = \eta_3 = 0$, es trivial que $v'^2 = v^2$ y $v'^3 = v^3$, de lo que se deduce que efectivamente $\xi_{\uparrow}^{\dagger} \sigma^{\mu} \psi'_{\uparrow}$ transforma como un 4-vector contravariante.

- El caso para la izquierda es análogo, aunque un poco diferente. En este caso

$$\Lambda_{\downarrow} = \exp(-\eta \sigma_1 / 2) \quad \exp(-\eta \sigma_1) = \cosh(\eta) - \sinh(\eta) \eta_1 \quad (1.9)$$

lo cual hace que aparezca un signo menos, pero que debido a $\bar{\sigma}^{\mu} = (1, -\sigma)$, desaparece. Como hemos dicho, es repetir pasos.

pág. 267-268 del Maggiore [1].

Ejercicio 1.2 – Transformaciones de Lorentz

Usando la representación quiral, demuestre que las transformaciones de Lorentz de los espinores de Dirac pueden escribirse en términos de las matrices γ como

$$\Psi \longrightarrow \Psi' = \exp\left(-\frac{i}{4} \omega_{\mu\nu} \sigma^{\mu\nu}\right) \Psi.$$

Esta ecuación nos dice que $S^{\mu\nu} = \sigma^{\mu\nu}/2$ proporciona una representación de dimensión compleja cuatro del álgebra de Lorentz. Compruébelo directamente usando la definición de $\sigma^{\mu\nu}$ en términos de las matrices γ y la relación $\{\gamma^{\mu}, \gamma^{\nu}\} = 2g^{\mu\nu}$, es decir, verifique la siguiente relación de conmutación

$$[S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] = i \left[g^{\nu\rho} S^{\mu\sigma} + g^{\mu\sigma} S^{\nu\rho} - g^{\nu\sigma} S^{\mu\rho} - g^{\mu\rho} S^{\nu\sigma} \right].$$

Ejercicio 1.3 – Identidad de Dirac

Demuestre la relación

$$\frac{i}{\not{q} - m} = \frac{i(\not{q} + m)}{q^2 - m^2}.$$

Este ejercicio es trivial.

Ejercicio 1.4 – Flujo invariante

Demuestre la siguiente identidad referente al flujo invariante de Lorentz,

$$F = 4E_a E_b (v_a + v_b) = 4\sqrt{(p_a \cdot p_b)^2 - m_a^2 m_b^2}.$$

Ejercicio 1.5 – Helicidad y Hamiltoniano de Dirac

Demuestre que el operador de helicidad conmuta con el hamiltoniano de Dirac, $[\hat{h}, H_D] = 0$, donde

$$\hat{h} = \frac{\boldsymbol{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}}{2p} = \frac{1}{2p} \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}} \end{pmatrix}, \quad \hat{H}_D = \boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m,$$

con

$$\alpha_k = \gamma^0 \gamma^k, \quad \beta = \gamma^0.$$

Ejercicio 1.6 – Sección eficaz diferencial $e^- \mu^-$

Usando amplitudes de helicidad, calcule la sección eficaz diferencial para el proceso

$$e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-,$$

en el límite relativista ($m_e \approx 0$, $m_\mu \approx 0$), en el sistema del centro de masas.

Nos piden la sección eficaz diferencial del scattering elástico $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$. Para ello tenemos que usar la ecuación:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{p_f}{p_i} |\mathcal{M}_{fi}|^2 \quad (1.10)$$

donde \mathcal{M} podemos hallarlo a través del siguiente diagrama de Feynmann a primer orden Nuestro




Figura 1.1: Diagrama de Feynman para $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$.

elemento de matriz

$$i\mathcal{M} = e^2 \underbrace{(\bar{u}^{s'}(p') Q_e \gamma^\mu u^s(p))}_{j_e^\mu} \frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2} \underbrace{(\bar{u}^{r'}(k') Q_\mu e \gamma^\nu u^r(k))}_{j_\mu^\nu} \quad (1.11)$$

tal que

$$i\mathcal{M} = \frac{e^2}{t} (j_e \cdot j_\mu) \quad (1.12)$$

con $Q = -1$ en ambos casos y $q^2 = t$ el invariante de Mandelstam ($t = |p'^\mu - p^\mu|^2$). Dado que no nos especifican los espines de entrada, podemos considerar que el elemento de matriz total es el no polarizado:

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 = \langle |\mathcal{M}_{fi}|^2 \rangle = \frac{1}{4} \sum_{ss',r,r'} |\mathcal{M}_{s,r}|^2 \quad (1.13)$$

O alternativamente con *las amplitudes de helicidad*:

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 = \frac{1}{4} (|\mathcal{M}_{RR}|^2 + |\mathcal{M}_{RL}|^2 + |\mathcal{M}_{LR}|^2 + |\mathcal{M}_{LL}|^2) \quad (1.14)$$

Solo tenemos que considerar los siguientes espinores (al no haber antipartículas no consideramos v y \bar{v}) con la siguiente forma (ultrarrelativista, masas despreciables)

$$u_{\uparrow} = \sqrt{E} \begin{pmatrix} c \\ se^{i\phi} \\ c \\ se^{i\phi} \end{pmatrix} \quad u_{\downarrow} = \sqrt{E} \begin{pmatrix} -s \\ ce^{i\phi} \\ s \\ -ce^{i\phi} \end{pmatrix} \quad (1.15)$$

con $c = \cos(\theta/2)$ y $s = \sin(\theta/2)$, siendo este θ el ángulo de salida de las partículas. Los momentos de nuestras partículas (caso de masa despreciable $m_e \approx m_{\mu} \approx 0$)

$$p^{\mu} = (E, 0, 0, E) \quad p'^{\mu} = (E, E \sin \theta, 0, E \cos \theta) \quad (1.16)$$

$$k^{\mu} = (E, 0, 0, -E) \quad k'^{\mu} = (E, -E \sin \theta, 0, -E \cos \theta) \quad (1.17)$$

Los autoestados de quiralidad aquí escritos:

$$u_{\uparrow}(p, \theta = 0) \sqrt{E} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad u_{\downarrow}(p, \theta = 0) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (1.18)$$

$$u_{\uparrow}(p', \theta) \sqrt{E} \begin{pmatrix} c \\ s \\ c \\ s \end{pmatrix} \quad u_{\downarrow}(p', \theta) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} -s \\ c \\ s \\ -c \end{pmatrix} \quad (1.19)$$

$$u_{\uparrow}(k, \theta = \pi) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad u_{\downarrow}(k, \theta = \pi) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1.20)$$

$$u_{\uparrow}(k', \pi + \theta) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} -s \\ c \\ -s \\ c \end{pmatrix} \quad u_{\downarrow}(k', \pi + \theta) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} -c \\ -s \\ c \\ s \end{pmatrix} \quad (1.21)$$

donde hemos aplicado que para los muones $\theta_2 = \pi + \theta_1$, recordando que $s = \sin \theta/2$ y $c = \cos \theta/2$, lo que nos lleva a $c \rightarrow -s$ y $s \rightarrow c$ en el caso de los muones (espinores con k y k'). Usando las relaciones [2, 3].

$$\bar{\psi} \gamma^0 \phi = \psi^{\dagger} \gamma^0 \gamma^0 \phi = \psi_1^* \phi_1 + \psi_2^* \phi_2 + \psi_3^* \phi_3 + \psi_4^* \phi_4, \quad (1.22)$$

$$\bar{\psi} \gamma^1 \phi = \psi^{\dagger} \gamma^0 \gamma^1 \phi = \psi_1^* \phi_4 + \psi_2^* \phi_3 + \psi_3^* \phi_2 + \psi_4^* \phi_1, \quad (1.23)$$

$$\bar{\psi} \gamma^2 \phi = \psi^{\dagger} \gamma^0 \gamma^2 \phi = -i(\psi_1^* \phi_4 - \psi_2^* \phi_3 + \psi_3^* \phi_2 - \psi_4^* \phi_1), \quad (1.24)$$

$$\bar{\psi} \gamma^3 \phi = \psi^{\dagger} \gamma^0 \gamma^3 \phi = \psi_1^* \phi_3 - \psi_2^* \phi_4 + \psi_3^* \phi_1 - \psi_4^* \phi_2. \quad (1.25)$$

Tenemos que:

$$\begin{aligned}\bar{u}_\uparrow(p')\gamma_0 u_\uparrow(p) &= 2Ec \\ \bar{u}_\uparrow(p')\gamma_1 u_\uparrow(p) &= 2Es \\ \bar{u}_\uparrow(p')\gamma_2 u_\uparrow(p) &= -i2Es \\ \bar{u}_\uparrow(p')\gamma_3 u_\uparrow(p) &= 2Ec\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{u}_\downarrow(p')\gamma_0 u_\uparrow(p) &= 0 \\ \bar{u}_\downarrow(p')\gamma_1 u_\uparrow(p) &= 0 \\ \bar{u}_\downarrow(p')\gamma_2 u_\uparrow(p) &= 0 \\ \bar{u}_\downarrow(p')\gamma_3 u_\uparrow(p) &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{u}_\uparrow(p')\gamma_0 u_\downarrow(p) &= 0 \\ \bar{u}_\uparrow(p')\gamma_1 u_\downarrow(p) &= 0 \\ \bar{u}_\uparrow(p')\gamma_2 u_\downarrow(p) &= 0 \\ \bar{u}_\uparrow(p')\gamma_3 u_\downarrow(p) &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{u}_\downarrow(p')\gamma_0 u_\downarrow(p) &= 2Ec \\ \bar{u}_\downarrow(p')\gamma_1 u_\downarrow(p) &= 2Es \\ \bar{u}_\downarrow(p')\gamma_2 u_\downarrow(p) &= -i2Es \\ \bar{u}_\downarrow(p')\gamma_3 u_\downarrow(p) &= 2Ec\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{u}_\uparrow(k')\gamma_0 u_\uparrow(k) &= 2Ec \\ \bar{u}_\uparrow(k')\gamma_1 u_\uparrow(k) &= -2Es \\ \bar{u}_\uparrow(k')\gamma_2 u_\uparrow(k) &= i2Es \\ \bar{u}_\uparrow(k')\gamma_3 u_\uparrow(k) &= -2Ec\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{u}_\downarrow(k')\gamma_0 u_\uparrow(k) &= 0 \\ \bar{u}_\downarrow(k')\gamma_1 u_\uparrow(k) &= 0 \\ \bar{u}_\downarrow(k')\gamma_2 u_\uparrow(k) &= 0 \\ \bar{u}_\downarrow(k')\gamma_3 u_\uparrow(k) &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{u}_\uparrow(k')\gamma_0 u_\downarrow(k) &= 0 \\ \bar{u}_\uparrow(k')\gamma_1 u_\downarrow(k) &= 0 \\ \bar{u}_\uparrow(k')\gamma_2 u_\downarrow(k) &= 0 \\ \bar{u}_\uparrow(k')\gamma_3 u_\downarrow(k) &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{u}_\downarrow(k')\gamma_0 u_\downarrow(k) &= 2Ec \\ \bar{u}_\downarrow(k')\gamma_1 u_\downarrow(k) &= -2Es \\ \bar{u}_\downarrow(k')\gamma_2 u_\downarrow(k) &= -i2Es \\ \bar{u}_\downarrow(k')\gamma_3 u_\downarrow(k) &= -2Ec\end{aligned}$$

Es decir, *cada vértice debe conservar la helicidad* (que básicamente implica conservar espín). Ahora tenemos que calcular cada término. Lo que está claro que es que, si en un vértice no se conserva helicidad la amplitud de probabilidad es nula. Así pues:

$$|\mathcal{M}_{LL}|^2 = |\mathcal{M}_{LL \rightarrow LL}|^2 = \frac{e^4}{t^2} |4E^2 c^2 + 4E^2 c^2 + 4E^2 s^2 + 4E^2 s^2| = \frac{e^4}{t^2} 64E^4 = \frac{e^4}{t^2} 4s^2 \quad (1.26)$$

$$|\mathcal{M}_{RR}|^2 = |\mathcal{M}_{RR \rightarrow RR}|^2 = \frac{e^4}{t^2} |4E^2 c^2 + 4E^2 c^2| = \frac{e^4}{t^2} 64c^4 E^4 = 16E^4 (1 + \cos \theta)^2 = \frac{e^4}{t^2} 4u^2 \quad (1.27)$$

$$|\mathcal{M}_{RL}|^2 = |\mathcal{M}_{RL \rightarrow RL}|^2 = \frac{e^4}{t^2} |4E^2 c^2 + 4E^2 c^2 + 4E^2 s^2 + 4E^2 s^2| = \frac{e^4}{t^2} 64E^4 = \frac{e^4}{t^2} 4s^2 \quad (1.28)$$

$$|\mathcal{M}_{LR}|^2 = |\mathcal{M}_{LR \rightarrow LR}|^2 = \frac{e^4}{t^2} |4E^2 c^2 + 4E^2 c^2| = \frac{e^4}{t^2} 64c^4 E^4 = 16E^4 (1 + \cos \theta)^2 = \frac{e^4}{t^2} 4u^2 \quad (1.29)$$

donde hemos usado que $s = (p + k)^2 = 4E^2$ y $u = (p - k')^2 = -2(p \cdot k') = -2E(1 + \cos \theta)$. Luego el elemento de matriz total cuando $m_e \approx m_\mu \approx 0$ es:

$$|\mathcal{M}_{ij}| = \frac{2e^4}{t^2} (s^2 + u^2) \quad (1.30)$$

que es lo que queríamos demostrar. De hecho, podemos hacer el cálculo con trazas para comprobar si da lo mismo. Así pues, tenemos que:

$$|\mathcal{M}_{s,r}|^2 = e^4 \left[(\bar{u}^{s'}(p') \gamma^\mu u^s(p)) (\bar{u}^{r'}(k') \gamma_\mu u^r(k)) \right] \left[(\bar{u}^{s'}(p') \gamma^\nu u^s(p)) (\bar{u}^{r'}(k') \gamma_\nu u^r(k)) \right]^* \quad (1.31)$$

Tal que usando el truco de Casimir (Williams [4])

$$\sum_{s_1, s_2} [\bar{u}_1^{s_1}(p_1) \Gamma u_2^{s_2}(p_2)] [\bar{u}_1^{s_1}(p_1) \Gamma' u_2^{s_2}(p_2)]^* = \text{tr} \left[\Gamma (\not{p}_2 + m_2) \bar{\Gamma}' (\not{p}_1 + m_1) \right].$$

tenemos que

$$|\mathcal{M}_{s,r}|^2 = \frac{2e^4}{t^2} \text{tr} (\gamma^\mu (\not{p} + m_e) \gamma^\nu (\not{p} + m_e)) \text{tr} (\gamma^\mu (\not{k} + m_\mu) \gamma^\nu (\not{k} + m_\mu)) \quad (1.32)$$

tal que:

- La primera traza:

$$\text{tr} (\gamma^\mu (\not{p} + m_e) \gamma^\nu (\not{p} + m_e)) = \text{tr} (\gamma^\mu \not{p} \gamma^\nu \not{p}) + 4g^{\mu\nu} m_e^2 \quad (1.33)$$

Ahora la traza más compleja

$$\text{tr} (\gamma^\mu \not{p} \gamma^\nu \not{p}') = 4g^{\mu\sigma} p_\sigma g^{\nu\rho} p'_\rho + 4g^{\mu\rho} p'_\rho g^{\nu\sigma} p_\sigma - 4p_{\mu\nu} (p \cdot p') \quad (1.34)$$

$$= 4p^\mu p'^\nu + 4p^\nu p'^\mu - 4g^{\mu\nu} (p \cdot p') \quad (1.35)$$

- La segunda traza:

$$\text{tr} (\gamma_\mu (\not{k} + m_\mu) \gamma_\nu (\not{k} + m_\mu)) = \text{tr} (\gamma_\mu \not{k} \gamma_\nu \not{k}) + 4g_{\mu\nu} m_\mu^2 \quad (1.36)$$

Ahora la traza más compleja

$$\text{tr} (\gamma_\mu \not{k} \gamma_\nu \not{k}') = 4g_{\mu\sigma} k^\sigma g_{\nu\rho} k'^\rho + 4g_{\mu\rho} k'^\rho g_{\nu\sigma} k^\sigma - 4g_{\mu\nu} (k \cdot k') \quad (1.37)$$

$$= 4k_\mu k'_\nu + 4k_\nu k'_\mu - 4g_{\mu\nu} (k \cdot k') \quad (1.38)$$

Directamente multiplicando:

$$|\mathcal{M}_{s,r}|^2 = 32(p \cdot k)(p' \cdot k') + 32(p \cdot k')(p' \cdot k) - 32(p \cdot p')m_\mu^2 - 32(k \cdot k')m_e^2 + 64m_e^2 m_\mu^2 \quad (1.39)$$

Ahora solo tenemos que agrupar y dividir entre $1/4t$.

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 = \frac{8}{t} ((p \cdot k)(p' \cdot k') + (p \cdot k')(p' \cdot k) - (p \cdot p')m_\mu^2 - (k \cdot k')m_e^2 + 2m_e^2 m_\mu^2) \quad (1.40)$$

Usando los invariantes de Middelstam:

$$s = (p + k)^2 = (p' + k')^2 \quad t = (p - p')^2 = (k - k')^2 \quad u = (p - k')^2 = (p' - k)^2 \quad (1.41)$$

tal que:

$$s = m_e^2 + m_\mu^2 + 2(p \cdot k) = m_e^2 + m_\mu^2 + 2(p' \cdot k') \quad (1.42)$$

$$t = 2m_e^2 + m_\mu^2 - 2(p \cdot p') = 2m_\mu^2 - 2(k \cdot k') \quad (1.43)$$

$$u = m_e^2 + m_\mu^2 - 2(p \cdot k') = m_e^2 + m_\mu^2 - 2(p' \cdot k) \quad (1.44)$$

Con la relación:

$$s + t + u = 2(m_e^2 + m_\mu^2) \quad (1.45)$$

Ahora:

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 = \frac{2e^4}{t^2} ((s - m_\mu^2 - m_e^2)^2 + (u - m_e^2 - m_\mu^2)^2 + 2t(m_e^2 + m_\mu^2)) \quad (1.46)$$

$$= \frac{2e^4}{t^2} (s^2 + u^2 - 2(s + \mu)(m_\mu^2 + m_e^2) + 2t(m_e^2 + m_\mu^2) + 2(m_\mu^2 + m_e^2)^2) \quad (1.47)$$

que aplicando $s + u = 2(m_e^2 + m_\mu^2) - t$ tenemos:

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 = \frac{2e^4}{t^2} (s^2 + u^2 + 4t(m_\mu^2 + m_e^2) - 2(m_\mu^2 + m_e^2)^2) \quad (1.48)$$

que efectivamente si $m_e \approx m_\mu \approx 0$ tenemos

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 = \frac{2e^4}{t^2} (s^2 + u^2) \quad (1.49)$$

que es lo mismo que obtuvimos antes [4]. Lo que implica que, la sección eficaz diferencial es, en este caso:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{e^4 (s^2 + u^2)}{t^2} \quad (1.50)$$

que si queremos expresar con E y $\cos \theta$ explícitamente, tenemos que $t = -2(p_1 \cdot p_3) = -2E(1 - \cos \theta)$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{16}{64\pi^2 s} \frac{e^4 E^2 (+\frac{1}{4}(1 + \cos \theta))}{4E^2(1 - \cos \theta)^2} \quad (1.51)$$

y la expresión final, usando la constante de estructura fina $2\alpha^2 = 2(e^4/16\pi^2)$ tenemos:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{2\alpha^2}{s} \frac{1 + \cos \theta}{(1 - \cos \theta)^2} \quad (1.52)$$

que coincide con la del Thomson [3].

Ejercicio 1.7 – Elemento de matriz en QED con trazas

Use el formalismo de trazas para calcular el elemento de matriz al cuadrado, promediado en espines, de la electrodinámica cuántica (QED) para

$$e^+ e^- \rightarrow f \bar{f},$$

sin despreciar ninguna de las masas de las partículas.

Nuestro elemento de matriz con $Q = -1$ en ambos casos y $q^2 = s$ el invariante de Mandelstam ($s = |k^\mu + p^\mu|^2$). Dado que no nos especifican los espines de entrada, podemos considerar que el elemento de matriz total es el no polarizado:

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 = \langle |\mathcal{M}_{fi}|^2 \rangle = \frac{1}{4} \sum_{s,s',r,r'} |\mathcal{M}_{s,r}|^2 \quad (1.53)$$




Figura 1.2: Diagrama de Feynman para $e^+e^- \rightarrow f^+f^-$.

Así pues, tenemos que:

$$|\mathcal{M}_{s,r}|^2 = e^4 \left[(\bar{v}^{s'}(k) \gamma^\mu u^s(p)) (\bar{u}^{r'}(p') \gamma_\mu v^r(k')) \right] \left[(\bar{v}^{s'}(k) \gamma^\nu u^s(p)) (\bar{u}^{r'}(p') \gamma_\nu v^r(k')) \right]^* \quad (1.54)$$

Tal que usando el truco de Casimir (Williams [4])

$$\sum_{s_1, s_2} [\bar{u}_1^{s_1}(p_1) \Gamma u_2^{s_2}(p_2)] [\bar{u}_1^{s_1}(p_1) \Gamma' u_2^{s_2}(p_2)]^* = \text{tr} \left[\Gamma (\not{p}_2 + m_2) \bar{\Gamma}' (\not{p}_1 + m_1) \right].$$

tenemos que

$$|\mathcal{M}_{s,r}|^2 = \frac{2e^4}{t^2} \text{tr} (\gamma^\mu (\not{p} + m_e) \gamma^\nu (\not{k} - m_e)) \text{tr} (\gamma^\mu (\not{p}' + m_\mu) \gamma^\nu (\not{k}' - m_\mu)) \quad (1.55)$$

tal que:

- La primera traza:

$$\text{tr} (\gamma^\mu (\not{p} + m_e) \gamma^\nu (\not{k} - m_e)) = \text{tr} (\gamma^\mu \not{p} \gamma^\nu \not{k}) - 4g^{\mu\nu} m_e^2 \quad (1.56)$$

Ahora la traza más compleja

$$\text{tr} (\gamma^\mu \not{p} \gamma^\nu \not{k}) = 4g^{\mu\sigma} p_\sigma g^{\nu\rho} k_\rho + 4g^{\mu\rho} k_\rho g^{\nu\sigma} p_\sigma - 4p_{\mu\nu} (p \cdot k) \quad (1.57)$$

$$= 4p^\mu p'^\nu + 4p^\nu k^\mu - 4g^{\mu\nu} (p \cdot k) \quad (1.58)$$

- La segunda traza:

$$\text{tr} (\gamma_\mu (\not{p}' + m_f) \gamma_\nu (\not{k}' - m_f)) = \text{tr} (\gamma_\mu \not{p}' \gamma_\nu \not{k}') - 4g_{\mu\nu} m_f^2 \quad (1.59)$$

Ahora la traza más compleja

$$\text{tr} (\gamma_\mu \not{p}' \gamma_\nu \not{k}') = 4g_{\mu\sigma} p'^\sigma g_{\nu\rho} k'^\rho + 4g_{\mu\rho} k'^\rho g_{\nu\sigma} p'^\sigma - 4g_{\mu\nu} (p' \cdot k') \quad (1.60)$$

$$= 4p'_\mu k'_\nu + 4p'_\nu k'_\mu - 4g_{\mu\nu} (p' \cdot k') \quad (1.61)$$

Directamente multiplicando:

$$\frac{s^2}{e^4} |\mathcal{M}_{s,r}|^2 = 32(p \cdot p')(k \cdot k') + 32(p \cdot k')(k \cdot p') + 32(p \cdot k) m_f^2 + 32(p' \cdot k') m_e^2 + 64 m_e^2 m_f^2 \quad (1.62)$$

Ahora solo tenemos que agrupar y dividir entre $1/4t$.

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 = \frac{8e^4}{s^2} ((p \cdot k)(p' \cdot k') + (p \cdot k')(p' \cdot k) - (p \cdot p') m_f^2 - (k \cdot k') m_e^2 + 2m_e^2 m_f^2) \quad (1.63)$$

Usando los invariantes de Middelstam:

$$s = (p + k)^2 = (p' + k')^2 \quad t = (p - p')^2 = (k - k')^2 \quad u = (p - k')^2 = (p' - k)^2 \quad (1.64)$$

tal que:

$$s = m_e^2 + m_f^2 + 2(p \cdot k) = m_e^2 + m_f^2 + 2(p' \cdot k') \quad (1.65)$$

$$t = 2m_e^2 + m_f^2 - 2(p \cdot p') = 2m_f^2 - 2(k \cdot k') \quad (1.66)$$

$$u = m_e^2 + m_f^2 - 2(p \cdot k') = m_e^2 + m_f^2 - 2(p' \cdot k) \quad (1.67)$$

Con la relación:

$$s + t + u = 2(m_e^2 + m_f^2) \quad (1.68)$$

Ahora:

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 = \frac{2e^4}{s^2} \left((t - m_f^2 - m_e^2)^2 + (u - m_e^2 - m_f^2)^2 + 2s(m_e^2 + m_f^2) \right) \quad (1.69)$$

$$= \frac{2e^4}{s^2} \left(t^2 + u^2 - 2(-s + 2(m_e^2 + m_f^2))(m_f^2 + m_e^2) + 2s(m_e^2 + m_f^2) + 2(m_f^2 + m_e^2)^2 \right) \quad (1.70)$$

que aplicando $t + u = 2(m_e^2 + m_f^2) - s$ tenemos:

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 = \frac{2e^4}{s^2} (t^2 + u^2 + 4s(m_f^2 + m_e^4) - 2(m_f^2 + m_e^2)^2) \quad (1.71)$$

que es el resultado final [4], y que como podemos ver es igual a la dispersión $e^- f^- \rightarrow e^- f^-$ pero haciendo el cambio $s \leftrightarrow t$.

Ejercicio 1.8 – Dispersión $e^- p$ y transferencia de momento

En un experimento de dispersión $e^- p$, la energía del electrón incidente es $E_1 = 529.5$ MeV y los electrones dispersados se detectan a un ángulo $\theta = 75^\circ$ con respecto al haz incidente. A este ángulo, casi todos los electrones dispersados se miden con una energía de $E_3 \approx 373$ MeV.

¿Qué se puede concluir a partir de esta observación? Encuentre el valor correspondiente de

$$Q^2 = -q^2.$$

En este ejercicio tenemos que usar los cuadrimomentos para ver la energía y momento del protón para el ángulo con el que salen los electrones.

Ejercicio 1.9 – Tasa de decaimiento del pión en interacción escalar

Calcule la tasa de decaimiento del pión para una interacción puramente escalar y muestre que la razón predicha de tasas de decaimiento es

$$\frac{\Gamma(\pi^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e)}{\Gamma(\pi^- \rightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu)} \approx 5.5.$$

Sugerencia: suponga que la interacción está mediada por una partícula escalar masiva X , de modo que la cantidad escalar asociada al vértice $\ell - \nu_\ell$ con constante de acoplo g_X sería

$$j_\ell = g_X \bar{u}v.$$

Puede trabajar también en el régimen $q^2 = m_\pi^2 \ll m_X^2$ y tomar el propagador como $1/m_X^2$ (interacción tipo Fermi puntual).

Tenemos que la tasa de decaimiento viene dada por la expresión:

$$\Gamma = \frac{p^*}{8\pi m_a^2} |\mathcal{M}_{fi}|^2 \quad (1.72)$$

siendo p^* el momento en el centro de masas de las partículas salientes ($p^* = |\mathbf{p}| = |\mathbf{k}|$), con los siguientes momentos:

$$p_\pi^\mu = (m_\pi, 0, 0, 0) \quad p^\mu = (E_1, 0, 0, p_1) \quad k^\mu = (E_2, 0, 0, -p_1) \quad (1.73)$$

Así pues, solo tenemos que calcular el elemento de matriz \mathcal{M}_{fi} , que se calcula a través del siguiente diagrama:




Figura 1.3: Diagrama de Feynman para $\pi^- \rightarrow \ell^- \bar{\nu}_\ell$.

Al hacer un acoplo puramente escalar tenemos que:

$$\mathcal{M}_{fi} = f_\pi p_\pi \frac{g_X}{M_X^2} \bar{u}(p)v(k) \quad (1.74)$$

Luego, la única dificultad para calcular $|\mathcal{M}_{ij}|^2$ es hacer:

$$\sum_{\text{espines}} (\bar{u}(p)v(k))(\bar{u}(p)v(k))^\dagger = \text{tr}((\not{p} + m_l)(\not{k} - m_\nu)) = 4p^\mu k_\mu - 4m_l m_\nu \quad (1.75)$$

que es, según los cálculos anteriores, y suponiendo que $m_\nu \rightarrow 0$:

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 = \left[f_\pi m_\pi \frac{g_X}{M_X^2} 2(p \cdot k) \right]^2 \quad (1.76)$$

tal que

$$p_\pi^\mu = p^\mu + k^\mu \rightarrow m_\pi^2 = m_l^2 + 2(p \cdot k) \rightarrow (p \cdot k) = \frac{1}{2}(m_\pi^2 - m_l^2) \quad (1.77)$$

y por tanto:

$$\Gamma = \frac{p^*}{8\pi m_\pi^2} \left[f_\pi m_\pi \frac{g_X}{M_X^2} (m_\pi^2 - m_l^2) \right]^2 \quad (1.78)$$

tal que:

$$\Gamma = \frac{f_\pi^2 g_X^2}{8\pi m_X^2} (m_\pi^2 - m_l^2)^2 \quad (1.79)$$

De lo que se deduce que

$$\frac{\Gamma(\pi^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e)}{\Gamma(\pi^- \rightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu)} = \frac{(m_\pi^2 - m_e^2)^2}{(m_\pi^2 - m_\mu^2)^2} = 5.5 \quad (1.80)$$

Ejercicio 1.10 – Vértices gauge en la parte cinética del lagrangiano electrodébil

Muestre explícitamente que la parte cinética del lagrangiano electrodébil contiene dos vértices triple-gauge

$$\gamma W^+ W^-, \quad Z W^+ W^-,$$

y cuatro vértices cuárticos gauge

$$W^+ W^- W^+ W^-, \quad W^+ W^- Z Z, \quad W^+ W^- \gamma \gamma, \quad W^+ W^- Z \gamma.$$

La manera mas rápida de resolver el ejercicio sería aplicar la siguiente ecuación [3],

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = +\frac{1}{2} g_W \epsilon_{ijk} (\partial^\mu W_i^\nu - \partial^\nu W_i^\mu) W_{j\mu} W_{k\nu} - \frac{1}{4} g_W^2 \epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} W_j^\mu W_k^\nu W_{m\mu} W_{n\nu}. \quad (1.81)$$

con las permutaciones necesarias, de una en una. Aquí decidimos hacerlo por partes, probablemente una decisión equivocada. En cualquier caso ya está resuelto. Veamos que la parte cinética del lagrangiano es:

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = -\frac{1}{4} B^{\mu\nu} B_{\mu\nu} - \frac{1}{4} W^{\mu\nu i} W_{\mu\nu}^i \quad (1.82)$$

Queremos llegar a obtener las relaciones entre W_μ , W_{μ^\dagger} , Z_μ y A_μ . Tenemos que usar la que relaciona los elementos 1 y 2 de W^i con los bosones W y W^\dagger :

$$W_\mu = \frac{1}{\sqrt{2}} (W_\mu^1 + i W_\mu^2) \quad W_\mu^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} (W_\mu^1 - i W_\mu^2) \quad (1.83)$$

$$W_\mu^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (W_\mu + W_\mu^\dagger) \quad W_\mu^2 = \frac{-i}{\sqrt{2}} (W_\mu - W_\mu^\dagger) \quad (1.84)$$

y la que relaciona B^μ y W^3 con Z y A :

$$\begin{pmatrix} W_\mu^3 \\ B_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_W & \sin \theta_W \\ -\sin \theta_W & \cos \theta_W \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_\mu \\ A_\mu \end{pmatrix}. \quad (1.85)$$

$$W_\mu^3 = \cos \theta_W W_\mu + \sin \theta_W W_\mu^\dagger \quad B_\mu = -\sin \theta_W W_\mu + \cos \theta_W W_\mu^\dagger \quad (1.86)$$

Lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar lo siguiente a nuestro \mathcal{L}_{kin} :

$$\widetilde{W}_{\mu\nu} \equiv \frac{\sigma^i}{2} W_{\mu\nu}^i, \quad W_{\mu\nu}^i = \partial_\mu W_\nu^i - \partial_\nu W_\mu^i - g_W \epsilon^{ijk} W_\mu^j W_\nu^k \quad (1.87)$$

$$B_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu \quad (1.88)$$

Una vez tenemos esto, solo es sustituir. Lo que está claro es que el término $B^{\mu\nu} B_{\mu\nu}$ no va a contribuir a nuestra triple o cuádruple interacción, ya que es evidente que solo contendrá términos de γ y Z . Por otro lado, solo nos interesan los términos que incluyan al menos un $g_W \epsilon^{ijk} W_\mu^j W_\nu^k$, ya que otros términos no contendrán términos triples y cuádruples. Cuando este esté relacionado con otro $g_W \epsilon^{ijk} W_\mu^j W_\nu^k$ tendremos los vértices cuádruples, y cuando esté relacionado con $\partial_\mu W_\nu^i - \partial_\nu W_\mu^i$ los vértices triples. Así:

$$W^{\mu\nu i} W_{\mu\nu}^i = W^{\mu\nu 1} W_{\mu\nu}^1 + W^{\mu\nu 2} W_{\mu\nu}^2 + W^{\mu\nu 3} W_{\mu\nu}^3 \quad (1.89)$$

Veamos término a término:

■ El **primer término**:

$$W^{\mu\nu 1} W_{\mu\nu}^1 = [(\partial^\mu W^{\nu 1} - \partial^\nu W^{\mu 1}) - g_W \epsilon^{1ij} W^{\mu i} W^{\nu j}] \times \\ [(\partial_\mu W_\nu^1 - \partial_\nu W_\mu^1) - g_W \epsilon^{1kl} W_\mu^k W_\nu^l] \quad (1.90)$$

Es evidente que el producto entre los dos primeros términos de cada corchete no generan un vértice triple o cuádruple, ya que W^1 solo va con los bosones W y W^\dagger . Los vértices triples $\mathcal{O}(3)$ se producirán cuando los primeros términos interaccionan con el término que va con la levi-civita. Cuando interaccionan los dos términos de la levi-civita se producen los términos que representan los vértices cuárticos $\mathcal{O}(4)$. Así pues, tenemos que, los términos que representen vértices triples son (digamos que $\mathcal{O}(n)$ significa “términos que contienen vértices con n partículas”):

$$\mathcal{O}(3) = -g_W [(\partial^\mu W^{\nu 1} - \partial^\nu W^{\mu 1})(\epsilon^{1kl} W_\mu^k W_\nu^l) + (\epsilon^{1ij} W^{\mu i} W^{\nu j})(\partial_\mu W_\nu^1 - \partial_\nu W_\mu^1)] \quad (1.91)$$

Fijémonos en particular en la primera parte:

$$(\partial^\mu W^{\nu 1} - \partial^\nu W^{\mu 1})(\epsilon^{1kl} W_\mu^k W_\nu^l) = (\partial^\mu W^{\nu 1} - \partial^\nu W^{\mu 1})(W_\mu^2 W_\nu^3) \\ - (\partial^\mu W^{\nu 1} - \partial^\nu W^{\mu 1})(W_\mu^3 W_\nu^2) \quad (1.92)$$

Trivialmente, si intercambiamos los nombres $\mu \leftrightarrow \nu$ en el segundo término nos podemos dar cuenta que es igual al primero (hay dos signos $-$, uno procedente de la Levi-Civita y otra del intercambio de las posiciones de las parciales que se cancelan), por lo que:

$$(\partial^\mu W^{\nu 1} - \partial^\nu W^{\mu 1})(\epsilon^{1kl} W_\mu^k W_\nu^l) = 2(\partial^\mu W^{\nu 1} - \partial^\nu W^{\mu 1})(W_\mu^2 W_\nu^3) \quad (1.93)$$

donde hemos obviado los términos que no generan vértices dobles (contenidos en $\mathcal{O}(2)$, y que contiene los términos que multiplica $W - W$ y $W^\dagger - W^\dagger$). Luego esto nos lleva a:

$$\begin{aligned} (\partial^\mu W^{\nu 1} - \partial^\nu W^{\mu 1})(W_\mu^2 W_\nu^3) &= \frac{i}{2}(\partial^\mu W^\nu - \partial^\nu W^\mu)(W_\mu^\dagger W_\nu^3) \\ &\quad - \frac{i}{2}(\partial^\mu W^{\nu\dagger} - \partial^\nu W^{\mu\dagger})(W_\mu W_\nu^3) \\ &\quad + \mathcal{O}(2) \end{aligned} \quad (1.94)$$

Donde aparece un signo menos y el número imaginario procedente de la definición de W^2 (1.84). El divisor 2 procede de la multiplicación de las raíces cuadradas. Finalmente nos quedaría expandir W_ν^3 , de lo que podemos obtener:

$$\begin{aligned} (\partial^\mu W^{\nu 1} - \partial^\nu W^{\mu 1})(W_\mu^2 W_\nu^3) &= \frac{i \cos \theta_W}{2} [(\partial^\mu W^\nu - \partial^\nu W^\mu)(W_\mu^\dagger) \\ &\quad - (\partial^\mu W^{\nu\dagger} - \partial^\nu W^{\mu\dagger})(W_\mu)] Z_\nu \\ &\quad + \frac{i \sin \theta_W}{2} [(\partial^\mu W^\nu - \partial^\nu W^\mu)(W_\mu^\dagger) \\ &\quad - (\partial^\mu W^{\nu\dagger} - \partial^\nu W^{\mu\dagger})(W_\mu)] A_\nu \\ &\quad + \mathcal{O}(2) \end{aligned} \quad (1.95)$$

Sin embargo aun tenemos que fijarnos en la segunda parte del $\mathcal{O}(3)$ (1.107). Aunque no parezca trivial, realmente el problema es simétrico respecto lo que acabamos de decir. Así pues, tenemos que el resultado final será dos veces el anterior (1.95), por lo que, para el primer término, los *vértices triples* serán:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(3) &= -i2g_W \cos \theta_W [(\partial^\mu W^\nu - \partial^\nu W^\mu)(W_\mu^\dagger) - (\partial^\mu W^{\nu\dagger} - \partial^\nu W^{\mu\dagger})(W_\mu)] Z_\nu \\ &\quad - i2g_W \sin \theta_W [(\partial^\mu W^\nu - \partial^\nu W^\mu)(W_\mu^\dagger) - (\partial^\mu W^{\nu\dagger} - \partial^\nu W^{\mu\dagger})(W_\mu)] A_\nu \end{aligned}$$

Ahora queda el término cuártico producido, que es, tal y como dijimos antes, el término producto de multiplicar los dos levi-civita. Así pues:

$$\mathcal{O}(4) = g_W^2 (\epsilon^{1ij} W^{\mu i} W^{\nu j}) (\epsilon^{1kl} W_\mu^k W_\nu^l) \quad (1.96)$$

que usando la propiedad

$$\epsilon_{1ij} \epsilon^{1kl} = \delta_i^k \delta_j^l - \delta_i^l \delta_j^k \quad (1.97)$$

nos lleva a:

$$\mathcal{O}(4) = g_W^2 [W^{\mu 2} W^{\nu 3} (W_\mu^2 W_\nu^3 - W_\mu^3 W_\nu^2) + W^{\mu 3} W^{\nu 2} (W_\mu^3 W_\nu^2 - W_\mu^2 W_\nu^3)] \quad (1.98)$$

si en el segundo término hacemos el cambio trivial de $\mu \leftrightarrow \nu$, podemos ver que tenemos el primer término, tal que:

$$\mathcal{O}(4) = 2g_W^2 [W^{\mu 2} W^{\nu 3} (W_\mu^2 W_\nu^3 - W_\mu^3 W_\nu^2)] \quad (1.99)$$

Denemos que desarrollar tres términos para obtener esto en función de W, W^\dagger, Z y A :

- El primer término:

$$W^{\mu 2} W_{\mu}^2 = \frac{-1}{2} (W^{\mu \dagger} - W^{\mu}) (W_{\mu}^{\dagger} - W_{\mu}) \Rightarrow \quad (1.100)$$

$$W^{\mu 2} W_{\mu}^2 = \frac{-1}{2} [W^{\mu \dagger} W_{\mu}^{\dagger} + W^{\mu} W_{\mu} - 2(W^{\mu \dagger} W_{\mu})] \quad (1.101)$$

- El segundo término:

$$W^{\mu 2} W_{\mu}^3 = \frac{1}{\sqrt{2}} (W^{\mu \dagger} - W^{\mu}) (\cos \theta_W Z_{\mu} + \sin \theta_W A_{\mu}) \Rightarrow \quad (1.102)$$

$$W^{\mu 2} W_{\mu}^3 = \frac{1}{\sqrt{2}} [(W^{\mu \dagger} - W^{\mu}) \cos \theta_W Z_{\mu} + (W^{\mu \dagger} - W^{\mu}) \sin \theta_W A_{\mu}] \quad (1.103)$$

- El tercer término:

$$W^{\mu 3} W_{\mu}^3 = (\cos \theta_W Z^{\mu} + \sin \theta_W A^{\mu}) (\cos \theta_W Z_{\mu} + \sin \theta_W A_{\mu}) \quad (1.104)$$

$$W^{\mu 3} W_{\mu}^3 = \cos^2 \theta_W Z^{\mu} Z_{\mu} + 2(\cos \theta_W \sin \theta_W) Z^{\mu} A_{\mu} + \sin^2 \theta_W A^{\mu} A_{\mu} \quad (1.105)$$

Una vez tenemos esto queda claro que:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(4)/2g_W^2 = & -\cos^2 \theta_W \{ [W^{\mu \dagger} W_{\mu}^{\dagger} + W^{\mu} W_{\mu} - 2(W^{\mu \dagger} W_{\mu})] Z^{\mu} Z_{\mu} \} \\ & -\sin^2 \theta_W \{ [W^{\mu \dagger} W_{\mu}^{\dagger} + W^{\mu} W_{\mu} - 2(W^{\mu \dagger} W_{\mu})] A^{\mu} A_{\mu} \} \\ & -2 \sin \theta_W \cos \theta_W \{ [W^{\mu \dagger} W_{\mu}^{\dagger} + W^{\mu} W_{\mu} - 2(W^{\mu \dagger} W_{\mu})] Z^{\mu} A_{\mu} \} \end{aligned} \quad (1.106)$$

- Aún queda evaluar el **segundo término**, que será:

$$\begin{aligned} W^{\mu \nu 2} W_{\mu \nu}^2 = & [(\partial^{\mu} W^{\nu 2} - \partial^{\nu} W^{\mu 2}) - g_W \epsilon^{2ij} W^{\mu i} W^{\nu j}] \times \\ & [(\partial_{\mu} W_{\nu}^2 - \partial_{\nu} W_{\mu}^2) - g_W \epsilon^{2kl} W_{\mu}^j W_{\nu}^k] \end{aligned} \quad (1.107)$$

Trivialmente, los términos de *vértices triples* generados serán exactamente igual a los anteriores, ya que estos contienen igual que antes un producto de W^{\dagger} y W , por lo que da igual que en los términos de tensor de campo esté W^2 y que con la levi-civita este W^1 , el resultado será el mismo:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(3) = & -i2g_W \cos \theta_W [(\partial^{\mu} W^{\nu} - \partial^{\nu} W^{\mu}) (W_{\mu}^{\dagger}) - (\partial^{\mu} W^{\nu \dagger} - \partial^{\nu} W^{\mu \dagger}) (W_{\mu})] Z_{\nu} \\ & -i2g_W \sin \theta_W [(\partial^{\mu} W^{\nu} - \partial^{\nu} W^{\mu}) (W_{\mu}^{\dagger}) - (\partial^{\mu} W^{\nu \dagger} - \partial^{\nu} W^{\mu \dagger}) (W_{\mu})] A_{\nu} \end{aligned}$$

No igual será el término que representa los vértices cuárticos, ya que es diferente $W^{\mu 2} W_{\mu}^2$ a $W^{\mu 1} W_{\mu}^1$. Así pues, veamos que:

- El término

$$W^{\mu 1} W_{\mu}^1 = \frac{1}{2} (W^{\mu \dagger} + W^{\mu}) (W_{\mu}^{\dagger} + W_{\mu}) \Rightarrow \quad (1.108)$$

$$W^{\mu 1} W_{\mu}^1 = \frac{1}{2} [W^{\mu \dagger} W_{\mu}^{\dagger} + W^{\mu} W_{\mu} + 2(W^{\mu \dagger} W_{\mu})] \quad (1.109)$$

- El otro término:

$$W^{\mu 1} W_{\mu}^3 = \frac{1}{\sqrt{2}} (W^{\mu \dagger} + W^{\mu}) (\cos \theta_W Z_{\mu} + \sin \theta_W A_{\mu}) \Rightarrow \quad (1.110)$$

$$W^{\mu 1} W_{\mu}^3 = \frac{1}{\sqrt{2}} [(W^{\mu \dagger} + W^{\mu}) \cos \theta_W Z_{\mu} + (W^{\mu \dagger} + W^{\mu}) \sin \theta_W A_{\mu}] \quad (1.111)$$

Lo que claramente nos lleva al siguiente resultado:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(4)/2g_W^2 = & \cos^2 \theta_W \{ [W^{\mu \dagger} W_{\mu}^{\dagger} + W^{\mu} W_{\mu} + 2(W^{\mu \dagger} W_{\mu})] Z^{\mu} Z_{\mu} \} \\ & + \sin^2 \theta_W \{ [W^{\mu \dagger} W_{\mu}^{\dagger} + W^{\mu} W_{\mu} + 2(W^{\mu \dagger} W_{\mu})] A^{\mu} A_{\mu} \} \\ & + 2 \sin \theta_W \cos \theta_W \{ [W^{\mu \dagger} W_{\mu}^{\dagger} + W^{\mu} W_{\mu} + 2(W^{\mu \dagger} W_{\mu})] Z^{\mu} A_{\mu} \} \end{aligned} \quad (1.112)$$

- Lo último que tenemos que calcular es el **tercer término**, con un vértice triple representado por tensor de campo con Z^{μ} y A^{μ} y términos cuárticos $WWWW$. Como antes:

$$\mathcal{O}(3) = -g_W [(\partial^{\mu} W^{\nu 3} - \partial^{\nu} W^{\mu 3})(\epsilon^{3kl} W_{\mu}^k W_{\nu}^l) + (\epsilon^{3ij} W^{\mu i} W^{\nu j})(\partial_{\mu} W_{\nu}^3 - \partial_{\nu} W_{\mu}^3)] \quad (1.113)$$

Dado que el proceso para obtener los resultados finales es igual al del primer término, nos tomamos algunas licencias y vamos directamente a ver que:

$$\mathcal{O}(3) = -i4g_W \{ \cos \theta_W [(\partial^{\mu} Z^{\nu} - \partial^{\nu} Z^{\mu}) W_{\mu} W_{\nu}^{\dagger}] + \sin \theta_W [(\partial^{\mu} A^{\nu} - \partial^{\nu} A^{\mu}) W_{\mu} W_{\nu}^{\dagger}] \} \quad (1.114)$$

donde ha hemos descartado todos los términos de orden 2. Aparece un término 2 debido a que ahora debemos tener en cuenta el producto $W^1 W^2$ y no $W^1 W^3$ o $W^2 W^3$. El término cuártico

$$\mathcal{O}(4) = g_W^2 [W^{\mu 1} W^{\nu 2} (W_{\mu}^1 W_{\nu}^2 - W_{\mu}^2 W_{\nu}^1) + W^{\mu 2} W^{\nu 1} (W_{\mu}^2 W_{\nu}^1 - W_{\mu}^1 W_{\nu}^2)] \Rightarrow \quad (1.115)$$

$$\mathcal{O}(4)/2g_W^2 = ((W^{\mu 1} W_{\mu}^1)(W^{\nu 2} W_{\nu}^2) - (W^{\mu 1} W_{\mu}^2)(W^{\nu 1} W_{\nu}^2)) \quad (1.116)$$

ahora contiene el producto de los términos $W^{\mu 1} W_{\mu 1}$, $W^{\mu 2} W_{\mu}^2$ y $W^{\mu 1} W_{\mu}^2$. Evaluamos este último:

- El término

$$W^{\mu 1} W_{\mu}^2 = \frac{i}{2} (W^{\mu \dagger} + W^{\mu}) (W_{\mu}^{\dagger} - W_{\mu}) \Rightarrow \quad (1.117)$$

$$W^{\mu 1} W_{\mu}^2 = \frac{i}{2} [W^{\mu \dagger} W_{\mu}^{\dagger} + W^{\mu} W_{\mu} - 2(W^{\mu \dagger} W_{\mu})] \quad (1.118)$$

Por lo que

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(4)/2g_W^2 = & \frac{-1}{4} [W^{\mu \dagger} W_{\mu}^{\dagger} + W^{\mu} W_{\mu} - 2(W^{\mu \dagger} W_{\mu})] [W^{\mu \dagger} W_{\mu}^{\dagger} + W^{\mu} W_{\mu} + 2(W^{\mu \dagger} W_{\mu})] \\ & + \frac{1}{4} [W^{\mu \dagger} W_{\mu}^{\dagger} + W^{\mu} W_{\mu} - 2(W^{\mu \dagger} W_{\mu})]^2 \end{aligned} \quad (1.119)$$

Finalmente

$$\mathcal{O}(4)/2g_W^2 = ((W^{\mu} W_{\mu})(W^{\nu \dagger} W_{\nu}^{\dagger}) - (W^{\mu} W_{\mu}^{\dagger})(W^{\nu} W_{\nu}^{\dagger})) \quad (1.120)$$

Una vez tenemos estos resultados, podemos llegar a los resultados de los apuntes. Cabe destacar dos cosas. La primera es que hay términos de $\mathcal{O}(3)$ que se anulan entre los generados por el primer término y el segundo, los cuales ya restamos. Lo segundo que hay que destacar es que hemos sustituido ya estas relaciones:

$$g_W = \frac{e}{\sin \theta_W} \quad \cot \theta_W = \frac{\cos \theta_W}{\sin \theta_W} \quad (1.121)$$

Además recordemos que los valores de \mathcal{L} tienen un término $1/4$ delante del término $W^{\mu\nu i} W_{\mu\nu}^i$. Ahora sí:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_3 = & ie \cot \theta_W \left\{ (\partial^\mu W^\nu - \partial^\nu W^\mu) W_\mu^\dagger Z_\nu - (\partial^\mu W^{\nu\dagger} - \partial^\nu W^{\mu\dagger}) W_\mu Z_\nu + W_\mu W_\nu^\dagger (\partial^\mu Z^\nu - \partial^\nu Z^\mu) \right\} \\ & + ie \left\{ (\partial^\mu W^\nu - \partial^\nu W^\mu) W_\mu^\dagger A_\nu - (\partial^\mu W^{\nu\dagger} - \partial^\nu W^{\mu\dagger}) W_\mu A_\nu + W_\mu W_\nu^\dagger (\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) \right\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_4 = & -\frac{e^2}{2 \sin^2 \theta_W} \left\{ (W_\mu^\dagger W^\mu)^2 - W_\mu^\dagger W^{\mu\dagger} W_\nu W^\nu \right\} \\ & - e^2 \cot^2 \theta_W \left\{ W_\mu^\dagger W^\mu Z_\nu Z^\nu - W_\mu^\dagger Z_\mu W_\nu Z^\nu \right\} \\ & - e^2 \cot \theta_W \left\{ 2 W_\mu^\dagger W^\mu Z_\nu A^\nu - W_\mu^\dagger Z_\mu W_\nu A^\nu - W_\mu^\dagger A_\mu W_\nu Z^\nu \right\} \\ & - e^2 \left\{ W_\mu^\dagger W^\mu A_\nu A^\nu - W_\mu^\dagger A_\mu W_\nu A^\nu \right\}. \end{aligned}$$

Ejercicio 1.11 – Expansión del potencial alrededor del vacío

Dados

$$\mathcal{U} = \mu^2 \phi^2 + \lambda \phi^4, \quad \mu^2 = -\lambda v^2, \quad \phi = \frac{1}{\sqrt{2}} (v + \eta + i\xi),$$

verifique la ecuación (2.108), a saber:

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(\eta, \xi) = & -\frac{1}{2} \lambda v^2 \left[(v + \eta)^2 + \xi^2 \right] + \frac{1}{4} \lambda \left[(v + \eta)^2 + \xi^2 \right]^2 \\ = & -\frac{1}{4} \lambda v^4 + \lambda v^2 \eta^2 + \lambda v \eta^3 + \frac{1}{4} \lambda \eta^4 + \frac{1}{4} \lambda \xi^4 + \lambda v \eta \xi^2 + \frac{1}{2} \lambda \eta^2 \xi^2 = \lambda v^2 \eta^2 + \mathcal{U}_{\text{int}} - \frac{1}{4} \lambda v^4. \end{aligned}$$

Este es aplicar directamente la ecuación. El *primer término* es

$$-\mu^2 \phi^2 = \lambda v^2 \phi^2 \quad (1.122)$$

Veamos que sustituyendo tenemos:

$$-\mu^2 \phi^2 = \frac{\lambda v^2}{2} \left[(v + \eta)^2 + \xi^2 \right] = \frac{\lambda v^2}{2} \left[v^2 + 2v\eta + \eta^2 + \xi^2 \right] \quad (1.123)$$

mientras que el *segundo término* es

$$-\lambda \phi^4 \quad (1.124)$$

Veamos que sustituyendo tenemos:

$$-\lambda\phi^4 = -\frac{\lambda}{4}[(v+\eta)^2 + \xi^2]^2 = -\frac{\lambda}{4}[v^4 + 8v^2\eta^2 + \eta^4 + \xi^4 + 2v^2\xi^2 + 4v\eta\xi^2 + 2\eta^2\xi^2] \quad (1.125)$$

Sumando el segundo y tercer término llegamos a:

$$-\mathcal{U} = -\mu^2\phi^2 - \lambda\phi^4 = \lambda\left[\frac{v^4}{4} + v^3\eta - v^2\eta^2 - \frac{1}{4}\eta^4 - \frac{1}{4}\xi^4 - v\eta\xi^2 + \frac{1}{2}\eta^2\xi^2\right] \quad (1.126)$$

o lo que es lo mismo:

$$\mathcal{U} = -\frac{1}{4}\lambda v^4 + \lambda v^2\eta^2 + \lambda v\eta^3 + \frac{1}{4}\lambda\eta^4 + \frac{1}{4}\lambda\xi^4 + \lambda v\eta\xi^2 + \frac{1}{2}\lambda\eta^2\xi^2 \quad (1.127)$$

tal y como queríamos demostrar, tal que

$$\mathcal{U}_{\text{int}} = +\lambda v\eta^3 + \frac{1}{4}\lambda\eta^4 + \frac{1}{4}\lambda\xi^4 + \lambda v\eta\xi^2 + \frac{1}{2}\lambda\eta^2\xi^2 \quad (1.128)$$

Ejercicio 1.12 – Invariancia gauge de un escalar complejo

Verifique que el lagrangiano

$$\mathcal{L} = (D_\mu\phi)^*(D^\mu\phi) - \mathcal{U}(\phi^2),$$

donde ϕ es un campo escalar complejo, es invariante bajo transformaciones de norma (gauge) del tipo

$$\phi \rightarrow \phi' = e^{ig\alpha(x)}\phi,$$

siempre que el campo gauge se transforme como

$$B_\mu \rightarrow B'_\mu = B_\mu - \partial_\mu\alpha(x),$$

con el derivado covariante $D_\mu = \partial_\mu + igB_\mu$.

Si aplicamos la transformación gauge a nuestro complejo es:

$$\mathcal{L}' = (D'_\mu\phi')^*(D'^\mu\phi') - \mathcal{U}(\phi^2) \quad (1.129)$$

Tenemos que:

$$D'_\mu\phi' = (\partial_\mu + igB'_\mu)e^{ig\alpha(x)}\phi = (\partial_\mu - ig\partial_\mu(\alpha(x)) + igB_\mu)e^{ig\alpha(x)}\phi \quad (1.130)$$

Por otro lado, tenemos que:

$$\partial_\mu e^{ig\alpha(x)}\phi = e^{ig\alpha(x)}(\partial_\mu\phi + ig\partial_\mu(\alpha(x))) \quad (1.131)$$

Sustituyendo esto en (1.130) tenemos que:

$$D'_\mu\phi' = e^{ig\alpha(x)}(\partial_\mu + ig\partial_\mu(\alpha(x)) - ig\partial_\mu(\alpha(x)) + igB_\mu)\phi = e^{ig\alpha(x)}D_\mu\phi \quad (1.132)$$

y dado que

$$(D'_\mu\phi')^* = (e^{ig\alpha(x)}D_\mu\phi)^* = e^{-ig\alpha(x)}(D_\mu\phi)^* \quad (1.133)$$

si lo sustituimos en (1.129):

$$\mathcal{L}' = e^{-ig\alpha(x)} e^{ig\alpha(x)} (D_\mu \phi)^* (D_\mu \phi) + \mathcal{U}(\phi^2) = \mathcal{L} \quad (1.134)$$

y por tanto es \mathcal{L} es invariante bajo transformaciones gauge.

Ejercicio 1.13 – Lagrangiano con campo escalar complejo

Considere el siguiente lagrangiano para un campo escalar complejo:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + (\partial_\mu \phi)^* (\partial^\mu \phi) - \mu^2 \phi^2 - \lambda \phi^4 - ig B_\mu \phi^* (\partial^\mu \phi) + ig (\partial_\mu \phi^*) B^\mu \phi + g^2 B_\mu B^\mu \phi^* \phi,$$

donde B_μ es un campo gauge y

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu B^\nu - \partial^\nu B^\mu.$$

Haga la sustitución

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} (v + \eta(x) + i\xi(x)),$$

y verifique que se obtiene:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (\partial_\mu \eta) (\partial^\mu \eta) - \lambda v^2 \eta^2 + \frac{1}{2} (\partial_\mu \xi) (\partial^\mu \xi) - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} g^2 v^2 B_\mu B^\mu - \mathcal{U}_{\text{int}} + gv B_\mu (\partial^\mu \xi),$$

junto con la expresión explícita para \mathcal{U}_{int} .

Basta con sustituir en el lagrangiano

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + (\partial_\mu \phi)^* (\partial^\mu \phi) - \mu^2 \phi^2 - \lambda \phi^4 - ig B_\mu \phi^* (\partial^\mu \phi) + ig (\partial_\mu \phi^*) B^\mu \phi + g^2 B_\mu B^\mu \phi^* \phi,$$

el término

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} (v + \eta(x) + i\xi(x)),$$

Iremos término por término.

- El *primer término* es

$$(\partial_\mu \phi)^* (\partial^\mu \phi) \quad (1.135)$$

Veamos que sustituyendo tenemos:

$$\frac{1}{2} (\partial_\mu (v + \eta(x) + i\xi(x)))^* (\partial^\mu (v + \eta(x) + i\xi(x))) = \frac{1}{2} [(\partial_\mu \eta) (\partial^\mu \eta) + (\partial_\mu \xi) (\partial^\mu \xi)] \quad (1.136)$$

- El *segundo término* es

$$-\mu^2 \phi^2 = \lambda v^2 \phi^2 \quad (1.137)$$

Veamos que sustituyendo tenemos:

$$-\mu^2\phi^2 = \frac{\lambda v^2}{2}[(v + \eta)^2 + \xi^2] = \frac{\lambda v^2}{2}[v^2 + 2v\eta + \eta^2 + \xi^2] \quad (1.138)$$

mientras que el *tercer término* es

$$-\lambda\phi^4 \quad (1.139)$$

Veamos que sustituyendo tenemos:

$$-\lambda\phi^4 = -\frac{\lambda}{4}[(v + \eta)^2 + \xi^2]^2 = -\frac{\lambda}{4}[v^4 + 8v^2\eta^2 + \eta^4 + \xi^4 + 2v^2\xi^2 + 4v\eta\xi^2 + 2\eta^2\xi^2] \quad (1.140)$$

Sumando el segundo y tercer término llegamos a:

$$-\mu^2\phi^2 - \lambda\phi^4 = \lambda \left[\frac{v^4}{2} + v^3\eta - v^2\eta^2 - \eta^4 - \xi^4 - v\eta\xi^2 + 2\eta^2\xi^2 \right] \quad (1.141)$$

Usando que

$$\mathcal{U}_{\text{int}}^1 = \lambda v\eta^3 + \frac{1}{4}\lambda\eta^4 + \frac{1}{4}\lambda\xi^4 + \lambda v\eta\xi^2 + \frac{1}{2}\lambda\eta^2\xi^2 + \frac{1}{4}\lambda v^4 \quad (1.142)$$

que es diferente al del ejercicio 11. Usando esto, tenemos que el segundo y tercer término juntos:

$$-\mu^2\phi^2 - \lambda\phi^4 = -\lambda v^2\eta^2 - \mathcal{U}_{\text{int}} \quad (1.143)$$

aún faltan términos por añadir a esta \mathcal{U}_{int} , por eso lo denotamos por con un índice superior.

- El *cuarto término* viene dado por:

$$-igB_\mu\phi^*\partial^\mu\phi = -\frac{ig}{2}B_\mu(v + \eta(x) - i\xi(x))\partial^\mu(\eta(x) + i\xi(x)) \quad (1.144)$$

y el *quinto término* por

$$igB^\mu\phi\partial_\mu\phi^* = \frac{ig}{2}B^\mu(v + \eta(x) + i\xi(x))\partial_\mu(\eta(x) - i\xi(x)) \quad (1.145)$$

que al sumarse:

$$-igB_\mu\phi^*\partial^\mu\phi + igB^\mu\phi\partial_\mu\phi^* = -igB^\mu\eta\partial_\mu\xi + igB^\mu\xi\partial_\mu\eta + igB^\mu v\partial_\mu\eta \quad (1.146)$$

tal que el término de interacción \mathcal{U}_{int} generado por estos dos términos:

$$\mathcal{U}_{\text{int}}^2 = -igB^\mu\eta\partial_\mu\xi + igB^\mu\xi\partial_\mu\eta \quad (1.147)$$

denotando el superíndice 2 que es un \mathcal{U}_{int} no es este término, si no la suma de otros.

- El *sexto término*

$$g^2B_\mu B^\mu\phi^*\phi = \frac{1}{2}g^2v^2B_\mu B^\mu + \frac{1}{2}g^2\eta^2B_\mu B^\mu + \frac{1}{2}g^2v\eta B_\mu B^\mu + \frac{1}{2}g^2\xi^2B_\mu B^\mu \quad (1.148)$$

nos lleva a un término de interacción

$$\mathcal{U}_{\text{int}}^3 = \frac{1}{2}g^2\eta^2B_\mu B^\mu + \frac{1}{2}g^2v\eta B_\mu B^\mu + \frac{1}{2}g^2\xi^2B_\mu B^\mu \quad (1.149)$$

Finalmente, la suma nos lleva a:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \eta)(\partial^\mu \eta) - \lambda v^2 \eta^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \xi)(\partial^\mu \xi) - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}g^2 v^2 B_\mu B^\mu - \mathcal{U}_{\text{int}} + gvB_\mu(\partial^\mu \xi), \quad (1.150)$$

donde

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{\text{int}} &= \mathcal{U}^1 + \mathcal{U}^2 + \mathcal{U}^3 = \\ &= \lambda v \eta^3 + \frac{1}{4}\lambda \eta^4 + \frac{1}{4}\lambda \xi^4 + \lambda v \eta \xi^2 + \frac{1}{2}\lambda \eta^2 \xi^2 + \frac{1}{4}\lambda v^4 + -igB^\mu \eta \partial_\mu \xi + igB^\mu \xi \partial_\mu \eta \\ &+ \frac{1}{2}g^2 \eta^2 B_\mu B^\mu + \frac{1}{2}g^2 v \eta B_\mu B^\mu + \frac{1}{2}g^2 \xi^2 B_\mu B^\mu \end{aligned} \quad (1.151)$$

conteniendo todos los vértices triples y cuárticos.

Ejercicio 1.14 – Término del lagrangiano del Modelo Estándar con derivadas covariantes

Verifique que el término del lagrangiano del Modelo Estándar que contiene las derivadas covariantes del campo de Higgs puede escribirse como:

$$\begin{aligned} (D_\mu \phi)^\dagger (D^\mu \phi) &= \frac{1}{2}(\partial_\mu h)(\partial^\mu h) + \frac{1}{8}g_W^2(W_\mu^{(1)} + iW_\mu^{(2)})(W^{(1)\mu} - iW^{(2)\mu})(v+h)^2 \\ &+ \frac{1}{8}(g_W W_\mu^{(3)} - g' B_\mu)(g_W W^{(3)\mu} - g' B^\mu)(v+h)^2. \end{aligned}$$

Dado que

$$\phi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + h(x) \end{pmatrix} \quad (1.152)$$

y

$$D_\mu = \frac{1}{2}[2\partial_\mu + i(g_W \boldsymbol{\sigma} \mathbf{W}_\mu + g' B_\mu)] \quad (1.153)$$

Tal que, las matrices de Pauli:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

nos llevan a:

$$D_\mu \phi = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -ig_W(W_\mu^1 - iW_\mu^2)(v+h) \\ 2\partial_\mu h(x) - i(-g_W W_\mu^3 + g' B_\mu)(v+h) \end{pmatrix} \quad (1.154)$$

tal queda

$$(D_\mu \phi)^\dagger = \frac{1}{2\sqrt{2}} (i\frac{g_W}{2}(W_\mu^1 + iW_\mu^2)(v+h) \quad 2\partial_\mu h(x) + i(-g_W W_\mu^3 + g' B_\mu)(v+h)) \quad (1.155)$$

y por tanto:

$$(D_\mu \phi)^\dagger D^\mu \phi = \frac{1}{8} [4(\partial_\mu h)(\partial^\mu h) + (g_W W^{3\mu} - g' B^\mu)(g_W W_{3\mu} - g' B_\mu)(v + h)^2 + \frac{g_W}{2}(W^{\mu 1} - iW^{\mu 2})(W_\mu^1 + iW_\mu^2)(v + h)^2] \quad (1.156)$$

Ejercicio 1.15 – Transformación del doblete de Higgs bajo $SU(2)$

Demuestre que el campo ϕ_c transforma bajo $SU(2)$ de la misma forma que ϕ (el doblete de Higgs), donde

$$\phi = \begin{pmatrix} \phi^+ \\ \phi^0 \end{pmatrix}, \quad \phi_c = -i\sigma_2 \phi^* = -\frac{i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 - i\phi_2 \\ \phi_3 - i\phi_4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -\phi_3 + i\phi_4 \\ \phi_1 - i\phi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\phi^{0*} \\ \phi^{+*} \end{pmatrix}.$$

Veamos que $SU(2)$ implica la transformación

$$\phi \rightarrow \phi' = U\phi \quad (1.157)$$

siendo $U = e^{\frac{i}{2}\mathbf{W}\sigma}$. Así puesm tenemos queda

$$\phi'_c = -i\sigma_2 \phi'^* = -i\sigma_2 (U\phi)^* = -i\sigma_2 U^* \phi^* \quad (1.158)$$

Basta ver que

$$U^* = e^{-i\mathbf{W}\sigma^*} \approx 1 - i\sigma^* \mathbf{W} \rightarrow \sigma_2 U^* \sigma_2 \approx \sigma_2 (1 - i\sigma^* \mathbf{W}) \sigma_2 = 1 - i\sigma_2 \sigma^* \sigma_2 \mathbf{W} \quad (1.159)$$

lo que demostremos para una rotación infinitesimal se verifica para la rotación completa $SU(2)$. Para evaluar los términos $\sigma_2 \sigma^* \sigma_2$ vemos que:

$$\sigma_2 \sigma_1^* \sigma_2 = \sigma_2 \sigma_1 \sigma_2 = -(\sigma_2 \sigma_2) \sigma_1 = -\sigma_1 \quad (1.160)$$

$$\sigma_2 \sigma_2^* \sigma_2 = -\sigma_2 \sigma_2 \sigma_2 = -(\sigma_2 \sigma_2) \sigma_2 = -\sigma_2 \quad (1.161)$$

$$\sigma_2 \sigma_3^* \sigma_2 = \sigma_2 \sigma_3 \sigma_1 = -(\sigma_2 \sigma_2) \sigma_3 = -\sigma_3 \quad (1.162)$$

y por tanto:

$$1 - i\sigma_2 \sigma^* \sigma_2 \mathbf{W} = 1 + \sigma \mathbf{W} \quad (1.163)$$

De lo que se deduce que:

$$\sigma_2 (1 - i\sigma \mathbf{W}) \sigma_2 = 1 + \sigma \mathbf{W} \implies \sigma^2 U^* \sigma^2 = U \quad (1.164)$$

y por tanto

$$\phi'_c = -i\sigma_2 U^* \phi^* = -i\sigma_2 U^* (\sigma_2 \sigma_2) \phi^* = -iU \sigma_2 \phi^* = U(-i\sigma_2 \phi^*) = U\phi_c \quad (1.165)$$

demostrando que transforma igual que ϕ bajo $SU(2)$.

Ejercicio 1.16 – Estados físicos del fotón y del bosón Z

A partir de la matriz de masas de los campos $W^{(3)}$ y B , demuestre que los autoestados en la base diagonal son

$$A_\mu = \frac{g' W_\mu^{(3)} + g_W B_\mu}{\sqrt{g_W^2 + g'^2}}, \quad Z_\mu = \frac{g_W W_\mu^{(3)} - g' B_\mu}{\sqrt{g_W^2 + g'^2}},$$

donde A_μ y Z_μ son los campos físicos correspondientes al fotón y al bosón Z.

Tenemos que la matriz de masas de los campos $W^{(3)}$ y B es:

$$M = \begin{pmatrix} g_W^2 & -g_W g' \\ -g_W g' & g'^2 \end{pmatrix} \quad (1.166)$$

Primero calculamos los autovalores:

$$\det \begin{pmatrix} g_W^2 - \lambda & -g_W g' \\ -g_W g' & g'^2 - \lambda \end{pmatrix} = 0 \rightarrow \lambda^2 - (g_W^2 + g'^2)\lambda = 0 \quad (1.167)$$

Así pues:

$$\lambda_1 = (g_W^2 + g'^2) \quad \lambda_2 = 0 \quad (1.168)$$

Una vez tenemos la matriz de autovalores, sacar los autoestados es trivial:

- El *primerautoestado*:

$$M Z_\mu = (g_W^2 + g'^2) v \rightarrow \begin{pmatrix} g_W^2 & -g_W g' \\ -g_W g' & g'^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = (g_W^2 + g'^2) \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \quad (1.169)$$

de donde se deducen las ecuaciones:

$$v_1(g_W^2 - (g_W^2 + g'^2)) = g_W g' v_2 \quad v_2(g'^2 - (g_W^2 + g'^2)) = g_W g' v_1 \quad (1.170)$$

tal que:

$$v_2 = -\frac{g'}{g_W} v_1 \quad (1.171)$$

y por tanto:

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ -g'/g_W \end{pmatrix} v \rightarrow \hat{v} = \frac{1}{\sqrt{g'^2 + g_W^2}} \begin{pmatrix} g_W \\ -g' \end{pmatrix} \quad (1.172)$$

donde \hat{v} es el autovector normalizado.

- El *segundo autoestado*:

$$M Z_\mu = (g_W^2 + g'^2) u \rightarrow \begin{pmatrix} g_W^2 & -g_W g' \\ -g_W g' & g'^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1.173)$$

de donde se deducen las ecuaciones:

$$u_1(g_W^2) = g_W g' u_2 \quad u_2(g'^2) = g_W g' u_1 \quad (1.174)$$

tal que:

$$u_2 = \frac{g_W}{g'} u_1 \quad (1.175)$$

y por tanto:

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ g_W/g \end{pmatrix} u \rightarrow \hat{u} = \frac{1}{\sqrt{g'^2 + g_W^2}} \begin{pmatrix} g' \\ g_W \end{pmatrix} \quad (1.176)$$

donde \hat{u} es el autovector normalizado.

Con los autovectores calculados queda claro entonces que la matriz S de cambio de base es:

$$S = \frac{1}{\sqrt{g_W^2 + g'^2}} \begin{pmatrix} g_W & g' \\ -g' & g_W \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} W_\mu^{(3)} \\ B_\mu \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} Z_\mu \\ A_\mu \end{pmatrix} \quad (1.177)$$

de lo que se deduce que efectivamenet:

$$\begin{pmatrix} Z_\mu \\ A_\mu \end{pmatrix} = S^T \begin{pmatrix} W_\mu^{(3)} \\ B_\mu \end{pmatrix} \quad (1.178)$$

nos lleva a

$$Z_\mu = \frac{G_W W_\mu^{(3)} - g' B_\mu}{\sqrt{g_W^2 + g'^2}} \quad A_\mu = \frac{g_W W_\mu^{(3)} + g' B_\mu}{\sqrt{g_W^2 + g'^2}} \quad (1.179)$$

que es lo que queríamos demostrar, correspondiendo a Z_μ asociado con la masa $m_Z = \frac{1}{2}v\sqrt{g_W^2 + g'^2}$ y con $m_A = 0$.

Ejercicio 1.17 – Decaimiento del W^-

Calcule los elementos de matriz para el decaimiento

$$W^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e$$

considerando las tres posibles polarizaciones iniciales del bosón W^- . Puede trabajar en el límite ultrarrelativista y despreciar las masas de las partículas finales.

Veamos que el diagrama de Feynman de menor orden es:




Figura 1.4: Diagrama de Feynman para $W^- \rightarrow \ell^- \bar{\nu}_\ell$.

Y ahora tenemos que:

$$-i\mathcal{M}_{fi} = \frac{-ig_W}{2\sqrt{2}}\epsilon_\mu(\bar{u}(p)(\gamma^\mu(1-\gamma^5))v(k)) \quad (1.180)$$

Como ya se ha dicho, debemos calcularlo para las tres posibles polarizaciones iniciales de W^- , que son:

$$\epsilon_-^\mu = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -i, 0) \quad \epsilon_L^\mu = \frac{1}{m_W}(p_Z, 0, 0, E) \quad \epsilon_+^\mu = -\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, i, 0) \quad (1.181)$$

representando ϵ_\pm el estado donde el espín esta en un estado de polarización circular y ϵ_L el estado donde está longitudinal.

$$q^\mu = (m_W, 0, 0, 0) \quad p^\mu = (E_l, p \sin \theta, 0, p \cos \theta) \quad k^\mu = (E_\nu, -p \sin \theta, 0, -p \cos \theta) \quad (1.182)$$

Es obvio que debido al factor $(1-\gamma^5)$ que elige los estados de helicidad -1 para partículas y estados de helicidad +1 para antipartículas actuará sobre nuestros. Sin embargo si las partículas tienen masa (o si la masa es comparable a la energía) helicidad \neq quiralidad. Dado que estamos en el límite ultrarrelativista, podemos suponer que efectivamente $E_l = p$ y $E_\nu = -p$, y que el anterior elemento de matriz se puede reescribir como:

$$-i\mathcal{M}_{fi} = \frac{-ig_W}{2\sqrt{2}}\epsilon_\mu(\bar{u}_\uparrow(p)\gamma^\mu v_\downarrow(k)), \quad j_l^\mu = (\bar{u}_\uparrow(p)\gamma^\mu v_\downarrow(k)) \quad (1.183)$$

Los autoestados de quiralidad aquí escritos:

$$u_\downarrow(p, \theta_1) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} -s \\ c \\ s \\ -c \end{pmatrix} \quad v_\uparrow(k, \theta_2) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} s \\ -c \\ -s \\ c \end{pmatrix} \quad (1.184)$$

y como $\theta_2 = \pi + \theta_1$ y $s = \sin \theta/2$ y $c = \cos \theta/2$, tenemos que ($\theta_1 \equiv \theta$)

$$u_\downarrow(p, \theta) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} -s \\ c \\ s \\ -c \end{pmatrix} \quad v_\uparrow(k, \theta) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} c \\ s \\ -c \\ -s \end{pmatrix} \quad (1.185)$$

donde hemos usado también las reglas trigonométricas $\cos(\pi/2 + \theta) = -\sin \theta$ y $\sin(\pi/2 + \theta) = \cos \theta$. Usando las relaciones [2, 3]

$$\bar{\psi}\gamma^0\phi = \psi^\dagger\gamma^0\gamma^0\phi = \psi_1^*\phi_1 + \psi_2^*\phi_2 + \psi_3^*\phi_3 + \psi_4^*\phi_4, \quad (1.186)$$

$$\bar{\psi}\gamma^1\phi = \psi^\dagger\gamma^0\gamma^1\phi = \psi_1^*\phi_4 + \psi_2^*\phi_3 + \psi_3^*\phi_2 + \psi_4^*\phi_1, \quad (1.187)$$

$$\bar{\psi}\gamma^2\phi = \psi^\dagger\gamma^0\gamma^2\phi = -i(\psi_1^*\phi_4 - \psi_2^*\phi_3 + \psi_3^*\phi_2 - \psi_4^*\phi_1), \quad (1.188)$$

$$\bar{\psi}\gamma^3\phi = \psi^\dagger\gamma^0\gamma^3\phi = \psi_1^*\phi_3 - \psi_2^*\phi_4 + \psi_3^*\phi_1 - \psi_4^*\phi_2. \quad (1.189)$$

podemos llegar a:

$$\begin{aligned}
\bar{u}_\downarrow(p)\gamma_0 v_\uparrow(k) &= 0 \\
\bar{u}_\downarrow(p)\gamma_1 v_\uparrow(k) &= 2s^2 - 2c^2 = -2E \cos(\theta) \\
\bar{u}_\downarrow(p)\gamma_2 v_\uparrow(k) &= -i(-c^2 + s^2 + c^2 + s^2) = -i2E \\
\bar{u}_\downarrow(p)\gamma_3 v_\uparrow(k) &= 4cs = 2E \sin(\theta)
\end{aligned}$$

tal que

$$j_l^\mu = 2E(0, -\cos \theta, -i, \sin \theta) \quad (1.190)$$

y recordando que (hacemos que $q = 0$ y $E_W = m_W$)

$$\epsilon_-^\mu = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -i, 0) \quad \epsilon_L^\mu = (0, 0, 0, 1) \quad \epsilon_+^\mu = -\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, i, 0) \quad (1.191)$$

que es exactamente lo que se quería demostrar [2, 3]. Ahora, veamos el producto de la corriente leptónica con el estado de polarización:

$$\mathcal{M}_- = \epsilon_{-\mu} j_l^\mu = \frac{g_W E}{2}(1 + \cos(\theta)) \quad (1.192)$$

$$\mathcal{M}_+ = \epsilon_{+\mu} j_l^\mu = \frac{g_W E}{2}(1 - \cos(\theta)) \quad (1.193)$$

$$\mathcal{M}_L = -\epsilon_{L\mu} j_l^\mu = \frac{g_W E}{\sqrt{2}} \sin \theta \quad (1.194)$$

y dado que:

$$|\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{3}(|\mathcal{M}_-|^2 + |\mathcal{M}_+|^2 + |\mathcal{M}_L|^2) \quad (1.195)$$

tenemos que:

$$|\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{3}(g_W M_W)^2 \quad (1.196)$$

Ejercicio 1.18 – Elemento de matriz y razón de decaimiento del Z

Calcule en detalle el elemento de matriz asociado al diagrama de Feynman de orden más bajo para el proceso

$$Z \rightarrow f\bar{f},$$

y determine la correspondiente tasa de decaimiento parcial, expresando el resultado en términos de los acoplos vectorial y axial del bosón Z . Tomando $\sin^2 \theta_W = 0.2315$, demuestre que

$$R_\mu = \frac{\Gamma(Z \rightarrow \mu^+ \mu^-)}{\Gamma(Z \rightarrow \text{hadrons})} \approx \frac{1}{20}.$$

Puede suponer que se trabaja en el límite ultrarrelativista, donde las masas de los fermiones son despreciables y los autoestados quirales se aproximan a autoestados de helicidad. También puede utilizar técnicas de trazas y realizar el cálculo completo.

Veamos que el diagrama de Feynman de menor orden es:




Figura 1.5: Diagrama de Feynman para $Z \rightarrow f^- \bar{f}$.

Este ejercicio sería trivial habiendo hecho el anterior (ejercicio 1.17), de no ser porque el acoplamiento del Z no es puramente a izquierdas, si no que tiene una componente a derechas. Así pues:

$$-i\mathcal{M}_{fi} = \frac{-ig_W}{2\sqrt{2}} \epsilon_\mu (\bar{u}(p) c_L (\gamma^\mu (1 + \gamma^5)) v(k) + \bar{u}(p) c_R (\gamma^\mu (1 - \gamma^5)) v(k)) \quad (1.197)$$

$$-i\mathcal{M}_{fi} = \frac{-ig_W}{2\sqrt{2}} \epsilon_\mu (c_L \bar{u}_\uparrow(p) \gamma^\mu v_\downarrow(k) + c_L \bar{u}_\downarrow(p) \gamma^\mu v_\uparrow(k)) = \frac{-ig_W}{2\sqrt{2}} \epsilon_\mu (c_L j_L^\mu + c_R j_R^\mu) \quad (1.198)$$

Con los mismos estados de helicidad que el bosón W en el ejercicio anterior.

$$\epsilon_-^\mu = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -i, 0) \quad \epsilon_L^\mu = (0, 0, 0, 1) \quad \epsilon_+^\mu = -\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, i, 0) \quad (1.199)$$

Los autoestados de quiralidad aquí escritos:

$$u_\uparrow(p, \theta_1) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} c \\ s \\ c \\ s \end{pmatrix} \quad u_\downarrow(p, \theta_1) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} -s \\ c \\ s \\ -c \end{pmatrix} \quad (1.200)$$

$$v_\uparrow(k, \theta_2) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} s \\ -c \\ -s \\ c \end{pmatrix} \quad v_\downarrow(k, \theta_2) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} c \\ s \\ c \\ s \end{pmatrix} \quad (1.201)$$

y como $\theta_2 = \pi + \theta_1$ y $s = \sin \theta/2$ y $c = \cos \theta/2$, tenemos que ($\theta_1 \equiv \theta$)

$$u_\uparrow(p, \theta) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} c \\ s \\ c \\ s \end{pmatrix} \quad u_\downarrow(p, \theta) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} -s \\ c \\ s \\ -c \end{pmatrix} \quad (1.202)$$

$$v_\uparrow(k, \theta) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} c \\ s \\ -c \\ -s \end{pmatrix} \quad v_\downarrow(k, \theta) = \sqrt{E} \begin{pmatrix} -s \\ c \\ -s \\ c \end{pmatrix} \quad (1.203)$$

donde hemos usado también las reglas trigonométricas $\cos(\pi/2 + \theta) = -\sin \theta$ y $\sin(\pi/2 + \theta) = \cos \theta$. Usando las relaciones [2, 3]

$$\bar{\psi}\gamma^0\phi = \psi^\dagger\gamma^0\gamma^0\phi = \psi_1^*\phi_1 + \psi_2^*\phi_2 + \psi_3^*\phi_3 + \psi_4^*\phi_4, \quad (1.204)$$

$$\bar{\psi}\gamma^1\phi = \psi^\dagger\gamma^0\gamma^1\phi = \psi_1^*\phi_4 + \psi_2^*\phi_3 + \psi_3^*\phi_2 + \psi_4^*\phi_1, \quad (1.205)$$

$$\bar{\psi}\gamma^2\phi = \psi^\dagger\gamma^0\gamma^2\phi = -i(\psi_1^*\phi_4 - \psi_2^*\phi_3 + \psi_3^*\phi_2 - \psi_4^*\phi_1), \quad (1.206)$$

$$\bar{\psi}\gamma^3\phi = \psi^\dagger\gamma^0\gamma^3\phi = \psi_1^*\phi_3 - \psi_2^*\phi_4 + \psi_3^*\phi_1 - \psi_4^*\phi_2. \quad (1.207)$$

podemos llegar a:

$$\begin{aligned} \bar{u}_\downarrow(p)\gamma_0v_\uparrow(k) &= 0 \\ \bar{u}_\downarrow(p)\gamma_1v_\uparrow(k) &= 2s^2 - 2c^2 = -2E\cos(\theta) \\ \bar{u}_\downarrow(p)\gamma_2v_\uparrow(k) &= -i(-c^2 + s^2 + c^2 + s^2) = -i2E \\ \bar{u}_\downarrow(p)\gamma_3v_\uparrow(k) &= 4cs = 2E\sin(\theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{u}_\uparrow(p)\gamma_0v_\downarrow(k) &= 0 \\ \bar{u}_\uparrow(p)\gamma_1v_\downarrow(k) &= 2c^2 - 2s^2 = 2E\cos(\theta) \\ \bar{u}_\uparrow(p)\gamma_2v_\downarrow(k) &= -i2E \\ \bar{u}_\uparrow(p)\gamma_3v_\downarrow(k) &= -4cs = -2E\sin(\theta) \end{aligned}$$

que junto con

$$\epsilon_-^\mu = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -i, 0) \quad \epsilon_L^\mu = (0, 0, 0, 1) \quad \epsilon_+^\mu = -\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, i, 0) \quad (1.208)$$

nos permite obtener:

$$\mathcal{M}_- = \epsilon_{-\mu}j_l^\mu = \frac{g_W E}{2}((c_L + c_R) + (c_L - c_A)\cos(\theta)) \quad (1.209)$$

$$\mathcal{M}_+ = \epsilon_{+\mu}j_l^\mu = \frac{g_W E}{2}((c_L + c_R) - (c_L - c_A)\cos(\theta)) \quad (1.210)$$

$$\mathcal{M}_L = -\epsilon_{L\mu}j_l^\mu = \frac{g_W E}{\sqrt{2}}(c_L - c_R)\sin\theta \quad (1.211)$$

y usando que

$$|\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{3}(|\mathcal{M}_-|^2 + |\mathcal{M}_+|^2 + |\mathcal{M}_L|^2) \quad (1.212)$$

tenemos que, usando $c_V = c_L + c_R$ y $c_A = c_L - c_R$:

$$|\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{3}(g_W M_Z)^2(c_A^2 + c_V^2) \quad (1.213)$$

Como podemos ver tiene un valor diferente en función de la partícula ya que:

f	c_V	c_A
e^-, μ^-, τ^-	-0.037	-0.5
u, c, t	0.192	0.5
d, s, b	-0.346	-0.5

Tabla 1.1: Valores numéricos de los acoplos vectoriales y axiales para $\sin^2 \theta_W = 0.2315$.

donde hemos sustituido $\sin^2 \theta_W = 0.2315$ en las respectivas tablas [2, 3]. Así pues:

$$\mu : c_V^2 + c_A^2 = 0.2516, \quad d : c_V^2 + c_A^2 = 0.3725 \quad \text{and} \quad u : c_V^2 + c_A^2 = 0.2861,$$

de lo que se deduce (el cociente de los Γ solo depende de $c_V^2 + c_A^2$ ya que en la producción de los quarks o leptones estamos en el régimen ultrarrelativista):

$$R = \frac{\Gamma(Z \rightarrow \mu^+ \mu^-)}{\Gamma(Z \rightarrow \text{hadrons})} = \frac{0.2516}{9 \times 0.3725 + 6 \times 0.2861} \approx 0.0497 \approx \frac{1}{20} \quad (1.214)$$

teniendo 3 quarks del tipo d (d,s,b) y 2 del tipo u (u,c, el quark top es demasiado pesado $m_t > m_Z$ como para generarse por una desintegración). El factor 3 extra viene de los 3 posibles estados de color que pueden producirse.

Ejercicio 1.19 – Número de sabores de neutrinos ligeros

Tras corregir los efectos de QED (incluyendo la radiación del estado inicial), las secciones eficaces medidas en la resonancia del Z para los procesos $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ y $e^+e^- \rightarrow \text{hadrons}$ son:

$$\sigma^0(e^+e^- \rightarrow Z \rightarrow \mu^+\mu^-) = 1.9993 \text{ nb}, \quad \sigma^0(e^+e^- \rightarrow Z \rightarrow \text{hadrons}) = 41.476 \text{ nb}.$$

Asumiendo la universalidad leptónica, determine $\Gamma_{\ell\ell}$ y Γ_{hadrons} . Usando el valor medido de $\Gamma_Z = 2.4952 \pm 0.0023 \text{ GeV}$ y el valor teórico de $\Gamma_{\nu\nu}$ dado por

$$\Gamma(Z \rightarrow f\bar{f}) = \frac{g_Z^2 m_Z (c_V^2 + c_A^2)}{48\pi},$$

obtenga una estimación del número de sabores de neutrinos ligeros.

Asumiendo que Solo tenemos que usar que

f	c_V	c_A
ν_e, ν_μ, ν_τ	0.5	0.5
e^-, μ^-, τ^-	-0.037	-0.5
u, c, t	0.192	0.5
d, s, b	-0.346	-0.5

Tabla 1.2: Valores numéricos de los acoplos vectoriales y axiales para $\sin^2 \theta_W = 0.2315$.

$$m_Z = 91.19 \text{ GeV} \quad g_Z = 0.745 \quad (1.215)$$

de lo que se deduce que

$$\frac{g_Z m_Z}{48\pi} \approx 0.336 \text{ GeV} \quad (1.216)$$

$$\Gamma_{\ell\ell} = 3(0.336 \times (0.5^2 + 0.037^2)) \approx 0.253 \text{ GeV} \quad (1.217)$$

$$\Gamma_{\text{hadrones}} = 9(0.336 \times (0.5^2 + 0.346^2)) + 6(0.336 \times (0.5^2 + 0.192^2)) \approx 1.128 + 0.578 = 1.706 \text{ GeV} \quad (1.218)$$

Ahora solo tenemos que calcular el número de neutrinos. Primero:

$$\Gamma_{\nu\nu} = (0.336 \times (0.5^2 + 0.5^2)) \approx 0.168 \quad (1.219)$$

Tla que entonces:

$$n\Gamma_{\nu\nu} = \Gamma_Z - \Gamma_{\ell\ell} - \Gamma_{\text{hadrones}} \quad (1.220)$$

tal que:

$$n = \frac{2.4952 - 1.706 - 0.253}{0.168} \approx 3.2 \quad (1.221)$$

es decir, tendríamos *tres sabores de neutrinos* (es el entero más proximo).

Ejercicio 1.20 – Asimetría izquierda-derecha en el SLC

El colisionador lineal e^+e^- de Stanford (SLC), operando a $\sqrt{s} = m_Z$, utilizó haces longitudinalmente polarizados (izquierda y derecha). Esto permitió medir la sección eficaz $e^+e^- \rightarrow Z \rightarrow f\bar{f}$ de forma separada para electrones de helicidad izquierda y derecha. Suponiendo que el haz de electrones está 100 % polarizado y que el haz de positrones no lo está, demuestre que la asimetría izquierda-derecha está dada por:

$$A_{LR} = \frac{\sigma_L - \sigma_R}{\sigma_L + \sigma_R} = \frac{(c_L^e)^2 - (c_R^e)^2}{(c_L^e)^2 + (c_R^e)^2} = A_e.$$

Ejercicio 1.21 – Determinación de $\sin^2 \theta_W$ a partir de la asimetría del muón

A partir de la medida del parámetro de asimetría del muón,

$$A_\mu = 0.1456 \pm 0.0091,$$

determine el valor correspondiente de $\sin^2 \theta_W$ junto con su incertidumbre.

Ejercicio 1.22 – Decaimiento del quark top

Despreciando la masa del quark b y trabajando en el sistema de referencia del centro de masas (CM), demuestre que el elemento de matriz al cuadrado promediado sobre los espines para el decaimiento

$$t \rightarrow b W^+$$

es

$$\langle |\mathcal{M}|^2 \rangle = \frac{1}{2} g_W^2 m_t p^* \left(2 + \frac{m_t^2}{m_W^2} \right),$$

donde p^* es el momento del quark b o del bosón W^+ en el sistema CM.

Ejercicio 1.23 – Producción del bosón de Higgs en el LHC

Suponiendo una sección eficaz total de producción del Higgs de 20 pb y una luminosidad integrada de 25 fb^{-1} , calcule el número esperado de eventos $H \rightarrow \gamma\gamma$ y $H \rightarrow \mu^+\mu^-\mu^+\mu^-$ en cada uno de los detectores ATLAS y CMS.

Ejercicio 1.24 – Diagramas de Feynman para la producción de Higgs

Dibuje los diagramas de Feynman de orden más bajo para los procesos

$$e^+e^- \rightarrow HZ \quad \text{y} \quad e^+e^- \rightarrow H\nu_e\bar{\nu}_e,$$

que son los mecanismos principales de producción de Higgs en un colisionador lineal de alta energía.

Ejercicio 1.25 – Producción directa del Higgs en un colisionador de muones

En el futuro podría ser posible construir un colisionador de muones donde el bosón de Higgs se produzca directamente mediante

$$\mu^+\mu^- \rightarrow H.$$

Compare las secciones eficaces de los procesos

$$e^+e^- \rightarrow H \rightarrow b\bar{b}, \quad \mu^+\mu^- \rightarrow H \rightarrow b\bar{b}, \quad e^+e^- \rightarrow \gamma \rightarrow b\bar{b} \quad \text{a} \quad \sqrt{s} = m_H.$$

Discuta las conclusiones que se pueden extraer de los resultados obtenidos.

Bibliografía

- [1] Michele Maggiore. *A Modern introduction to quantum field theory*. Oxford Master Series in Physics. 2005. ISBN: 978-0-19-852074-0.
- [2] Juan Jose Saborido Silva. *Particle Physics I: Fundamentals of QED and Electro-Weak Theory. Handouts*. Academic year 2025/2026. Lecture notes. Santiago de Compostela, Spain, sep. de 2025.
- [3] Mark Thomson. *Modern particle physics*. New York: Cambridge University Press, oct. de 2013. ISBN: 978-1-107-03426-6, 978-1-139-52536-7. DOI: [10.1017/CB09781139525367](https://doi.org/10.1017/CB09781139525367).
- [4] Anthony G. Williams. *Introduction to Quantum Field Theory: Classical Mechanics to Gauge Field Theories*. Cambridge University Press, 2022.