
1. D2, D3, D4 도파민 수용체의 활성화 시, 작동하는 이차 신호 전달 단백질의 종류는?

1) cation channel

2) anion channel



3) Gi

4) Gq

5) Gs

답: 3) Gi

Dopamine



D1 like: D1, 5 Gs

D2 like: D2, 3, 4 Gi

2. 신장으로 대사되며, 알코올 사용과 갈망을 줄여주는 경구투여 약물은?

- 1) naloxone
- 2) naltrexone
- 3) acamprosate
- 4) gabapentine
- 5) larazepam

답: 3

신장으로 대사되며 알코올 갈망과 사용을 줄이는 건 *acamprosate* 입니다.

알코올 중독에서 자주 쓰이는 또다른 약인 *naltrexone*은 간으로 대사됩니다.

Tx of alcohol use disorder

- **naltrexone**, μ opioid blocker, once daily (FDA)
 - reduce alcohol self-administration; reduce the rate and severity
 - s/e: nausea, fatigue, low appetite, liver metabolism
 - rarely, interstitial pneumonia, eosinophilic pneumonia
- **acamprosate**, glutamate modulator, tid (FDA)
 - reduce alcohol consumption rates
 - safe, renal excretion
- Topiramate
 - more frequent s/e: cognitive dulling, weight loss, mood changes
- Gabapentin