

2025년도 계절학기 정신계 시험문제 복원 - 인하대학교 의학과 37기

주의사항

* 복원 후 나갔다 다시 들어와서 제대로 업로드 되었는지 확인해주세요. 오류로 인해 업로드가 안되어도 벌금 부과하니 꼭 확인 바랍니다.

* 문제는 번호, 마침표, 스페이스바 하고 써주세요.

* 객관식 보기는 스페이스바, 번호, 괄호, 스페이스바 하고 써주세요.

* 문제와 문제 사이에 엔터키 한 번 쳐주세요.

* 사진자료는 강의록에서 찾아 첨부해주세요.

1. [김양식] 다음 중 interoception, 자기 상태를 담당하는 영역은?

- 1) Medulla
- 2) Insula
- 3) Hippocampus
- 4) Amygdala
- 5) Anterior cingulate gyrus

2. [김양식] 다음 중 다른 수용체와 다른 작동방식을 갖는 것은?

- 1) GABA B 수용체
- 2) H1 수용체
- 3) 5HT2A 수용체
- 4) mGluR1 수용체
- 5) 5HT3 수용체

3. [김양식] 다음 중 고위인지능력 중 억제 기능을 담당하는 것은?

- 1) Premotor gyrus
- 2) Precentral gyrus
- 3) Orbitofrontal cortex
- 4) Superior temporal gyrus
- 5) Dorsolateral prefrontal cortex

4. [김양식] D2, D3, D4 도파민 수용체의 활성화 시, 작동하는 이차 신호 전달 단백질의 종류는?

- 1) cation channel
- 2) anion channel
- 3) Gi
- 4) Gq
- 5) Gs

5. [김양식] 다음 서술과 맞는 용어는? '지속적이고 주관적인 정서상태'

- 1) feeling
- 2) mood
- 3) affect
- 4) perception
- 5) emotion

6. [김양식] 기분장애에서 좋음과 나쁨, 선함과 악함 등과 같이 양극단에 감정 사이에서 발생하는 갈등을 설명하는 이론은?

- 1) Melancholia

- 2) Psychobiology
- 3) Learned helplessness
- 4) Ambivalence
- 5) Manic-depressive illness

7. 관해의 시간적 기준으로 옳은 것은?

- 1) 1주
- 2) 2주
- 3) 3주
- 4) 4주
- 5) 5주

8. 주요우울삽화를 만족하면서 조증삽화 2개의 기준을 만족한 질환은?

- 1) major depress disorder , with maniac episode
- 2) Bipolar I Disorder, most recent episode depressed
- 3) Bipolar II Disorder, most recent episode depressed

9. 다음중 heritability가 가장 높은 정신 질환은

- 1) Schizophrenia
- 2) Major Depressive Disorder
- 3) Bipolar I Disorder
- 4) Panic Disorder
- 5) Generalized Anxiety Disorder

10. [김양식] 만성질환, 우울증 등 정신질환에 임상적으로 적용되는 의사-환자 관계 모델은?

- 1) 상호참여
- 2) 능동적-수동적
- 3) 지도-협조
- 4) 상호관리
- 5) 전이
- 6)

16. 마약과 수용체 연결 바른 것은?

- 1) 코카인 5HT2
- 2) 필로폰 Ach 수용체
- 3) 케타민 cb1
- 4) 실로다닐 5HT2
- 5) 오피오이드 AMPA

17. 다음 중 효과 다른 것?

- 1) MDMA
- 2) Caffeine
- 3) Ephedrine
- 4) Amphetamine
- 5) Methylphenidate

18. 현재 위협이 있을 때 뇌의 반응과 그 위치

- 1) 공격 시상하부
- 2) 불안 해마
- 3) 공포 해마
- 4) 불안 편도체
- 5) 공포 편도체

19. 54세 여성환자 1년 전부터 사람이 많은 지하철, 광장, 공항에서 불안, 호흡곤란, 죽을 것 같은 느낌을 받으며 활동 제한이 나타남. 환자의 진단으로 적절한 것은?

- 1) 공항장애
- 2) 공항발작
- 3) 특정공포증
- 4) 광장공포증
- 5) 사회공포증

20. 남성 환자 호흡곤란, 불안, 가슴 두근거림으로 응급실 내원함. 고려해야 할 신체적 상태는?

- 1) Cannabinoid intoxication
- 2) Opioid intoxication
- 3) Opioid withdrawal
- 4) Addison disease
- 5) Hypothyroidism

21. 나머지와 다른 약물은? (약물 이름 영어로 나옴)

- 1) 벤라팍신
- 2) 데스벤라팍신
- 3) 돌록세틴
- 4) 밀나시프란
- 5) 아미트리틸린

22. 강박장애중 가장 흔한것

- 1) symmetry
- 2) Taboo thought
- 3) Contamination
- 4) Hoarding
- 5) harm related

23. 전문직인 의사의 설명으로 옳은것?

- 1) 외부규제가 필요함
- 2) 자신의 경제적보상을 중요시해야함
- 3) 필수적이고 독특한 서비스 제공함
- 4) 윤리강령을 세우기 어려움
- 5) 일차적 관심사는 개인의 이득임

24. 전문직의 위기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1) 의료 정책에서 의학적 결정이 우선시된다.

- 2) 의료 정책 결정시 의사가 중심이 된다.
- 3) 전통적인 의사의 의무가 중요시된다.
- 4) 자율성에 대한 요구가 커지면서 고지된 동의라는 필수적 절차를 거쳐야한다.

25. Code of Medical Ethics의 핵심 원칙으로 옳지 않은 것은?

- 1) 환자의 감정, 존엄에 대한 이해
- 2) 공감 및 책임
- 3) 실수, 위험 인식 시 회피, 회유
- 4) 비밀 유지
- 5) 모든 환자에 대한 평등한 태도

26. 환자 진료시 감정 발생한 경우 대처 방법으로 옳은 것은?

- 1) 본인과 옷차림, 키, 나이 등이 비슷하면 스스럼 없이 대한다.
- 2) 의사 본인이나 가족의 투병 혹은 가족의 상실 시 내 일과 같이 슬퍼한다.
- 3) 부정적 감정이 발생하면 즉시 진료를 중단한다.
- 4) 약물 남용 시 이를 은폐한다.
- 5) 진료 시 감정적 변화가 발생하면 동료 의사와 상의한다.

27. 다음 설명에 적합한 것은?[김원형]

증상을 완화시키고 정보를 얻기도 하면서 주변 사람 들에게 환자임을 알리고 의무나 활동에 대해서 잠시 지연시키는 것에 대 한 확인 및 동의를 얻는 과정.

- 1.증상의 경험
- 2.환자역할 가정단계
- 3.의료접촉 단계
- 4.의존적 환자역할 단계
- 5.회복과 재활

28. 당뇨를 앓고있는 지훈이는 병원에 방문하여 진료를 받았다. 의사선생님 친절하기 책장과 인슐린에 관해 그림으로 설명해주었지만 ‘내 뱃속에 벌레가 생긴거야?’라고 하였고 엄마에게 “엄마 내가 어제 친구랑 놀다가 늦게 들어와서 이렇게 아픈거야?”라고 하였다. 이에 따라 추정되는 지훈이의 나이는??답:2번

- 1.0-2세
2. 2-6세
- 3.6-12세
- 4.12-18세
- 5.17-20세

29. 다음 글을 읽고 가장 적합한 노인환자의 심리를 고르시오.

용욱씨(78세)는 몇 년 전 배우자를 먼저 떠나보낸 뒤 혼자 지내고 있다. 자녀들은 모두 타지에서 생활해 평소 집에서 대부분의 시간을 보내며 사람들과의 교류가 줄어들었다. 최근 들어 주변에 이야기할 사람이 없어 외로움을 자주 느끼며 지난 시간을 떠올리며 지내는 날이 많아졌다.답:3번

- 1.불안
2. 두려움
- 3.외로움
- 4.부정
- 5.분노

30. 다음 진료실의 상황에서 일어나고 있는 현상으로 적합한 것은?

엄격한 아버지와 갈등을 겪다가 성인이 되고 가족과 연락을 단절한 20대 여성이 우울감을 호소하며 내원하였다. 중년의 남성 치료자는 부드럽고 중립적인 태도로 환자의 증상에 대해 질문했지만, 환자는 자신에게 여러 질문을 하는 치료자가 불편했다. 처음에는 긴장을 했다가 이내 짜증을 냈고 이 의사와는 말이 통하지 않는다고 하며 화를 냈다.

- 1) 긍정적 전이 (positive transference)
- 2) 부정적 전이 (negative transference)
- 3) 역전이 (countertransference)
- 4) 투사적 동일시 (projective identification)

32. 다음 중 조현병의 음성증상이 아닌 것은?

1. 언어 저하
2. 정동 둔마
3. 무연증
4. 주의력 결핍
5. 무의욕증

33. 환청과 망상을 보이는 환자가 있다. 주치의와 상담 도중 머리를 계속 쓸어넘긴다. 이후 머리가 말끔하게 정돈되어 있어도 넘기는 행동을 반복한다(목적성이 없음). 또한 무서운 환청에 대해 이야기하면서 반복적으로 코를 찡긋거리고 입을 한쪽으로 늘어뜨린다. 이 환자의 증상으로 옳은 것은?

- 1) 긴장형 행동
- 2) 상동증
- 3) 매너리즘
- 4) 자동복종
- 5) 거부증

34. 조현병 환자가 정기적으로 치료를 받고 있다. 환청은 더 이상 들리지 않는다고 한다. 하지만 아직 집 밖으로 나가면 사람들이 자신을 욕한다고 생각하여 밖으로 나가지 않는다. 주치의는 환자에게 밖으로 나가 직접 사람들의 대화를 들어보고 그것이 사실인지, 본인만의 생각인지 확인해보라고 한다. 또한 환자에 대한 욕이 아닌 다른 이야기를 하고 있을 수도 있다는 '대안적인 설명'을 제시한다. 이 치료에 대해 옳은 것은?

- 1) 약물 치료 중단
- 2) 인지행동치료

- 3) 미술치료
- 4) 안구운동 탈감작 및 재처리(EMDR)
- 5) 정신분석

35. 중년 남성이 아내의 바람을 의심한다. 의심이 심해져 도청기와 위치추적기를 사용하여 아내 몰래 감시를 한다. 별다른 증거가 나오지 않았음에도 의심을 멈추지 못 한다. 이 환자의 망상의 종류로 옳은 것은?

- 1) 과대형
- 2) 색정형
- 3) 신체형
- 4) 질투형
- 5) 피해형

36. [김원형] 32세 여성이 직장 동료들이 날 죽이려고 음모를 꾸미고 있다며 책상 뒤집어 었었다. 내원 3일 전 일 망치고 직장 상사에게 인격 모독적인 발언을 들었고 그후로 잠을 거의 못 잤다. 병원에 내원하여 다 알고 있으니 살려달라고 소리를 질렀고 환청에 대답하는 모습 보였다. 입원하여 차분한 병원 환경에서 휴식을 취하자 4일 후 환자는 평소대로 차분해졌다. 환자는 그때 내가 왜 그랬는지 부끄럽고 그때는 진짜로 환청이 들렸고 실체라고 믿게 되었다고 했다. 진단은?

- 1) 조현병
- 2) 망상장애
- 3) 조현양상장애
- 4) 조현정동장애
- 5) 단기정신병적장애

37. 중년 여성이 복부팽만 소화불량으로 내원하였다. 이전에 5곳의 대형병원에서 검사를 반복하였으며 가벼운 위염 외에 소견은 없었다. 환자는 의사들이 내 병을 안 믿고 정밀검사를 안 해준다고 화를 내었다. 집에서 계속 복암에 대해 인터넷 검색을 하고 조금만 복부팽만이 느껴지면 복암이 커지고 있다고 불안해한다. 가족들이 안심하려고 해도 화를 낸다. 진단은?

- 1) 인위장애
- 2) 전환장애
- 3) 신체증상장애
- 4) 질병불안장애
- 5) 신체이형장애

38. 25세 여성이 가족과 함께 응급실로 내원하였다. 그녀는 의식을 잃은 것 같고 자신의 머리를 좌우로 흔들며 팔과 다리가 마치 자전거 타는 패턴처럼 따로 움직이는 듯 보인다. 이러한 삽화들은 하루에도

수차례 발생하고 있고 그 때마다 2-5분간 지속된다 뇌전도검사 결과에 의하면 이러한 삽화 동안 아무런 발작성 활동은 나타나지 않는다. 발작이 일어난 직후 그녀의 감각증추는 아무런 이상이 없어 보인다.
이 사례에 가장 적절한 치료는?

- 1) 증상 자체에 대해 반복적으로 질문하여 구체적인 사항을 기록한다.
- 2) 이차적인 이득을 최대화한다.
- 3) 공감적 지지와 암시를 해준다.
- 4) 항경련제를 투여한다.
- 5) 모든 증상이 심리적인 원인이라고 직면시킨다.

39.과호흡 증후군에 대해 맞는 설명은?

1. 혈중 산소 농도 감소
2. 호흡성 산증
3. plastic bag 처지
4. 뇌혈관 확장
5. 1,2분 동안 지켜보다가 과호흡이라고 알려주며 안심시킨다

40.위암 3기 진단 받았다. 처음에는 병을 부정하였으나 점차 인식하게 되었다. 교회에 가서 우리 딸이 초등학교 들어갈 때까지만 살 수 있게 해달라고 기도하고 의사에게도 딸이 초등학교에 들어갈 때까지 살 수 있게 해달라고 부탁한다.

1. 부정
2. 분노
3. 타협
4. 우울
5. 수용

41.PTSD, ASD의 진단기준 A에 해당하지 않는 것은?

1. 가족같은 반려견에 고통스럽게 사망하는 것을 눈 앞에서 봄
2. 군대에 간 아들이 사고로 죽음
3. 소방관이 업무상 대형 화재사고에서 시신을 수습함
4. 강력계 형사가 잔인한 아동 살해 사건을 지속적으로 조사함

42. 6개월 전 남편이 사별한 70세 할머니 환자, "이제 남편이 없으니 사는게 아무런 의미가 없다"라며 집 밖에 나가지 않으려 한다. 가족들이 도와주려 하니 짜증만 낸다. 진단은?

- 1) 정상 애도 반응
- 2) 주요 우울 장애
- 3) PTSD
- 4) 가성치매
- 5) 조현정동장애

43. 해리성 기억 상실과 함께 진단 가능한 질환은?

- 1) 일과성 전체 기억 소실
- 2) 두개내 손상
- 3) 뇌내 손상
- 4) 해리성 둔주
- 5) 조현병

44. 23세 여대생이 드라마 촬영 세트장을 방문하였다. 갑자기 주변이 현실이 아닌 것 같고 영화 세트장처럼 느껴진다고 하며, 마치 꿈속에 있는 것 같은 느낌이 든다고 하였다. 그러나 자신이 실제로 그 장소에 있다는 것은 알고 있었다. 이 환자의 증상으로 가장 적절한 것은?

1. 해리성 기억상실
2. 이인증
3. 비현실감
4. 조현병
5. 환각

45. 35세 여자가 이웃과 다툼을 일으켜 병원에 왔다. 1년 전부터 옆집 사람들이 자신의 행동을 CCTV로 감시하여 전국으로 생중계를 하고 있으며, 이를 본 사람들이 자신의 행동을 그대로 말한다고 생각하였다. 2년 전부터 직장 동료들이 자신을 헐뜯는다고 생각하여 출근하지 않았고, 외출도 하지 않고 집 안에만 있었다. 환자는 당뇨병으로 치료 중이며 BMI는 32 kg/m²이다. 이 환자에게 가장 적절한 치료 약물은?

1. 리튬

2. 클로자핀
3. 올란자핀
4. 멀타자핀
5. 지프라시돈

46. 35세 여자가 강박사고와 반복적인 확인 행동으로 정신건강의학과에서 치료받고 있다. 환자는 clomipramine을 복용한 지 5일이 되었는데 효과가 없는 것 같이라며 약을 중단하고 싶다고 한다. 다음 중 가장 적절한 조치는?

1. 약물을 즉시 중단한다
2. 다른 항우울제로 변경한다
3. 항정신병약을 추가한다
4. 같은 약물을 계속 복용하도록 한다
5. 전기경련치료를 시행한다

47. [김원형] 조현병으로 약물 치료 중이던 25세 여성이 최근 수개월 전부터 시작된 양측 유즙 분비를 주소로 내원하였다. 환자는 조현병으로 약물 치료 중이며, 최근 월경도 불규칙해졌다고 한다. 임신 테스트는 음성이며, 다른 내분비 질환의 증거는 없다. 이 환자의 증상을 가장 잘 설명하는 약물은 무엇인가?

- 1) 클로자핀
- 2) 아리피프라졸
- 3) 리스페리돈
- 4) 퀘티아핀
- 5) 올란자핀

48. [김원형] 34세 남자가 조현병으로 치료받고 있다. 환자는 여러 항정신병약물 치료에도 불구하고 환청과 망상이 지속되어 약물을 클로자핀으로 변경하였다. 이 환자에서 약물 치료 중 가장 중요하게 정기적으로 확인해야 할 검사는 무엇인가?

- 1) WBC
- 2) TFT
- 3) AST/ALT
- 4) Serum prolactin
- 5) Serum creatinine

49. [김원형] 79세 남성 환자가 조현병으로 20년 이상 할로페리돌을 복용 중이었다. 최근 들어 입을 싹룩거리거나 혀를 내미는 불수의적 움직임이 반복적으로 나타난다. 이 환자의 증상에 해당하는 진단은?

- 1) 급성 근긴장이상 (acute dystonia)
- 2) 정좌불능증 (akathisia)
- 3) 파킨슨증 (drug-induced parkinsonism)
- 4) 지연성 운동장애 (tardive dyskinesia)
- 5) 신경이완제 악성 증후군 (NMS)

50. [김원형] 다음 중 장기지속형 주사제가 있는 약물은? (약물 이름은 전부 한글로 주어짐)

- 1) 아리피프라졸
- 2) 지프라시돈
- 3) 록사핀
- 4) 아미선프라이드
- 5) 클로르프로마진

51. [김원형] 다음 중 전기경련 치료 시 철저한 감시 하에 해야하는 경우는?

- 1) 자살사고가 심한 임신 초기 우울증
- 2) 조현정동장애
- 3) 파킨슨증
- 4) 최근에 발생한 심근경색증
- 5) 항정신병약물 악성 증후군

52. [김원형] 48세 여성 환자가 '만사가 귀찮고 무기력하다'며 내원하였다. 5년 전부터 매년 11월이 되면 10시간을 자도 개운하지가 않고 자도 자도 계속 졸리다 하였으며, 식욕이 증가해 체중이 많이 증가하였다고 한다. 이러한 증상은 이듬해 2월이 지나면 나아진다고 한다. 이 환자에 대한 알맞은 치료는?

- 1) 전기경련요법
- 2) 미주신경자극
- 3) 광치료
- 4) 두개경유자기자극술 (transcranial magnetic stimulation)
- 5) 최면치료

53. [김원형] 다음 중 자살 위험이 있는 사람이 보이는 행동으로 옳지 않은 것은?

1. 새로운 취미 시작
2. 주변 관계 정리
3. 충동적 행동, 공격적 행동
4. 자살과 관련된 도구 준비
5. SNS에 자살을 암시하는 글 게시

54. [김원형] 다음 중 자살 의사를 밝힌 사람에게 보일 반응으로 가장 적절한 것은?

1. 죽을 각오로 열심히 살아봐
2. 너가 힘든 걸 내가 그동안 몰라 줬구나.
3. 나도 비슷한 경험이 있었는데 ~~하니까 금방 괜찮아지더라.
4. 너가 죽고 혼자 남을 부모님 생각도 해야지.
- 5.

55. [김원형] 다음 중 상대방이 자살 계획을 밝힌 경우 할 대처로 적절하지 않은 것은?

1. 즉시 의료 기관에 동행
2. 상대방의 의사를 존중하여 잠시 혼자 있을 시간 주기
3. 자살과 관련된 도구 치우기
4. 부모님, 친구 등 가까운 보호자에게 알리기
- 5.

56번. [김원형] 한국생명존중희망재단에서 자살 예방을 위해 만든 한국형 표준 생명 지킴이(게이트키퍼) 교육의 이름은?

- ① 보고듣고말하기
- ②
- ③ 함께하고공감하고위로하기
- ④ 공감하고위로하기
- ⑤ 지켜보고함께하기

57번. [맹세리] 프로이트의 발달단계 과정 이론에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 남근기 갈등 해소 시 성인기에 신경증이 발생한다
- ② 구강기 갈등 해소 실패 시 강박적 사고가 나타난다
- ③ 항문기....
- ④ 구강기 고착화 될 경우 자기 표현을 잘 하지 못한다 (뭐가 더 있긴 했는데 일단 틀림)
- ⑤ 남근기; 동성부모에 대한 집착과 이성부모에 대한 질투를 하는데...이걸 배변으로 표출한다 (진짜 개소리였음)

58번. [맹세리] 다음 중 자아, 이드, 초자아에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 무의식과 의식의 분리는 환자에게서만 나타난다
- ② 의식이 무의식보다 크기가 더 크다
- ③ 전의식에 대한 선지였는데 무의식에 대한 설명을 써놔서 틀린 선지였음
- ④ 자아가 이드의 충동성, 외부세계의 입력, 초자아의 압박과 요구 사이에서 갈등이 생기고 이를 해결하기 위해 복잡한 타협 형성을 하게 된다
- ⑤ 이드는 부모와의 동일시를 통해 5세경 형성되며 10~12세가 되어야 제대로 기능 가능하다

59. [맹세리] 대상관계이론에 대하여 가장 적합한 것은?

- 1. 전형적인 신경증 수준의 환자에 적합하다.
- 2. 오이디푸스 전 단계 (pre-oedipal)의 정신병리에 초점을 맞춘다.
- 3. 심리의 근본 동기가 쾌락-지향 (pleasure-seeking) 이라고 생각한다.
- 4. 핵심 정신병리는 심리구조 간의 갈등 (conflict)이다.
- 5. 어렸을 때 내재화된 모아의 관계가 그 후 모든 대인관계에서 관련이 없다.

60. [맹세리] 자기심리학에 대한 핵심적인 내용으로 가장 알맞은 것은?

- 1. Narcissistic PD는 약한 자기구조가 핵심 병리이다.
- 2. 자기애는 Narcissistic PD 환자에게서만 관찰된다.
- 3. 출생 초기부터 자아가 기능한다고 본다.
- 4. 리비도보다는 공격성을 강조한다.
- 5. 자아의 초자아와 이드의 중재 이외의 본연의 중요성을 강조한다.

61. [맹세리] 55세 남자가 교통사고 이후 기억이 나지 않는다고 내원하였다. 환자는 재활치료로

일상생활 회복을 하였지만, 교통사고로 머리를 다친 사고 이전 순간부터 상당기간 동안 전혀 기억이 나지 않는다고 한다. 이 환자에서 관찰되는 정신 병리는?

- 1) 전향성 기억상실 (anterograde amnesia)
- 2) 후향성 기억상실 (retrograde amnesia)
- 3) 심인성 기억상실 (psychogenic amnesia)
- 4) 기억착오 (paramnesia)
- 5) 회상성 조작 (retrospective falsification)

62. [맹세리] 엉뚱한 말을 한다고 어머니가 데려온 21세 남자환자와의 면담 내용이다. 관찰되는 정신병리는?

의사 : 직업이 어떻게 되세요?

환자 : 뭐든지 될 수 있어요. 도전하는 게 중요하잖아요. 저는 도전정신이 강해요. 선생님도 그렇죠? 저랑 선생님이란 옷 색깔이 같네요. 저는 흰색을 좋아해요. 흰색하면 병원이 떠올라요. 깨끗함의 상징이죠. 그런거 가르쳐주지 않아도 알잖아요. 저는 학생인데요. 아무도 그런거 알려주지 않았어요. 그래도 다 알고 있으니 대단하죠?

- 1) 사고의 이탈
- 2) 사고의 우원
- 3) 사고의 비약
- 4) 보속증
- 5) 사고의 지연

63. [맹세리] 다음은 북한이 자기를 잡아간다고 흥분하며 공격성을 보여 경찰에 의해 입원한 18세 남자환자와의 면담이다. 다음 중 가장 합당한 사고내용의 장애는?

환자 : 제발 저 좀 살려주세요. 북한이 저를 잡아가려고 해요. 저를 생체실험에 이용한다고요. 제가 아무리 도망가도 제 말이 북한 방송에 실시간으로 송출되고 있어서 소용이 없어요.

- 1) 지배관념 (overvalued idea)
- 2) 사고전파 (Thought broadcasting)
- 3) 사고비약 (flight of idea)
- 4) 지리멸렬 (incoherence))
- 5) 신체망상 (somatic delusion)

67. [맹세리] 방어기제에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

- 1) 유머는 미성숙한 방어기제이다
- 2) 억제는 무의식적 과정을 통해 이루어지는 반면 억압은 의식적으로 이루어지는 과정이다
- 3) 신체화는 심리적인 고통을 신체적인 아픔으로 표현하는 것으로, 상징적인 의미를 가진다
- 4) 방어기제는 항상 같은 단계에 머물러있지 않고 상황 혹은 대상에 따라 변화한다

- 5) 반동형성은 심리적인 고통을 반대의 내용으로 대체하고자 하는 것으로 스스로 만족감을 느낀다

68. [맹세리] 경계성 성격장애 환자에게 정신분석 치료를 하던 의사가 환자로부터 안좋은 소리를 듣다 보니 본인이 정말 실력없는 의사라는 부정적인 생각을 갖게 되었다. 이러한 상황을 의미하는 방어기제는?

- 1) 부정
- 2) 회피
- 3) 내재화
- 4) 투사적 동일시
- 5) 전치

69. [맹세리] 다음 변태성욕장애 가운데 위법 행위로 처벌되는 경우가 가장 많은 것은 무엇인가?

- 1) 의상도착증
- 2) 성적가학증
- 3) 소아성애증
- 4) 노출증
- 5) 여성물건애

70. 35세 남자가 직장생활에서 사소한 일에도 심하게 화가 나며, 기물을 파손한다.

상사에게도 화를 내어 문제가 되었다고 한다. 그러나 자신의 행동에 대해 후회나 자책감이 생긴다고 하였다. 가족들은 환자가 평소에는 별다른 문제가 없고 온화한 사람인데 왜 저러는지 모르겠다고 말한다. 진단은?

- ① 조현병
- ② 간헐적 폭발장애
- ③ 반사회인격장애
- ④ 양극성 장애
- ⑤ 파괴적기분조절부전장애

② 간헐적 폭발 장애 말고 나머지는 임의복원입니다..!

크게 중요하지 않고 답이 간헐적 폭발 장애인 것 만 아시면 됩니다 ㅎㅎ

71. 자살에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자살기도율은 남자에서, 자살성공률은 여자에서 높다
- ② 자살 기도 후 3개월 이내 자살 재시도 가능성은 낮다
- ③ 우울감 있는 사람보다 조증 있는 사람의 자살 위험도가 더 높다
- ④ 조현병 환자의 10%가 자살을 하고, 노년기에 비율이 더 높다

⑤ 자살 가족력이 있으면 자살 기도율과 자살 위험도가 높다

72. 정신병 환자에서 나타나는 난폭행동에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 가장 일반적인 정신병적 증상은 음성 증상이다
- ② 비순응적 태도는 폭력 행동과 관련이 없다
- ③ 정신질환자에서 폭력 행동은 남녀 차이가 뚜렷하지 않다
- ④ 난폭한 환자를 강박하는 것은 흥분성을 증가시켜 적절하지 않다
- ⑤ 과거에 있던 폭력행위는 난폭행동과 관련이 없다

⑤ 선지는 확실하지 않음... 근데 상식 선에서 틀린 걸 알 수 있는 내용이었음!

73. [맹세리] 다음 섭식장애와 관련된 내용 중 가장 적절한 것을 고르시오.

- 1) 적게 체중 증가에 대한 두려움으로 적게 먹고 바로 토하지만 정상 체중이 유지되는 식이 행동은 섭식장애에 해당하지 않는다.
- 2) 폭식과 구토는 신경성 식욕부진과 신경성 대식증 모두에서 나타날 수 있으며 두 질환을 감별하는 차이점이 아니다.
- 3) 신경성 식욕부진증에서 강박증이나 우울증이 동반되어 있을 경우, 치료 반응과 예후에는 상관이 없다.
- 4) 신경성 식욕부진증의 극심한 체중 감소로 체중 회복을 위해 입원을 할 경우, 가능한 당일부터 정상 식사량을 섭취하는 것이 중요하다.
- 5) 체중과 체형에 대한 집착, 왜곡된 자기 평가는 섭식장애 중 신경성 식욕부진증 고유의 질환 특성이다.

74. [맹세리] 다음 중 신경성 식욕부진증에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- 1) 무월경이 진단 기준에 필수적으로 포함된다.
- 2) 정신질환 중 사망률이 가장 높다.
- 3) 치료가 수월하며 예후가 좋은 편이다.
- 4) 청소년기에 잘 발생하지 않으며 성인기에 주로 발생한다.
- 5) 주요 증상은 식욕부진이며 폭식과 보상행동은 일어나지 않는다.

75. [맹세리] 다음은 어떤 저항에 관한 설명인가?

한 남자 환자가 분석가에게 자주 화를 내기 시작했다. 치료시간에 결석도 했다. 결석한 다음날, 환자는 치료시간을 착각하고 30분이나 빨리 왔다 환자는 분석가에게 동성애적 욕구를 느끼고 당황했었다.

- 1) 2차 이득 저항
- 2) 억압 저항
- 3) 초자아 저항

- 4) 이드 저항
- 5) 전이 저항

76. [맹세리] 다음 진료실의 상황에서 일어나고 있는 현상으로 적합한 것은?

엄격한 아버지와 갈등을 겪다가 성인이 되고 가족과 연락을 단절한 20대 여성이 우울감을 호소하며 내원하였다. 중년의 남성 치료자는 부드럽고 중립적인 태도로 환자의 증상에 대해 질문했지만, 환자는 자신에게 여러 질문을 하는 치료자가 불편했다. 처음에는 긴장을 했다가 이내 짜증을 냈고 이 의사와는 말이 통하지 않는다고 하며 화를 냈다.

- 1) 긍정적 전이 (positive transference)
- 2) 부정적 전이 (negative transference)
- 3) 역전이 (countertransference)
- 4) 투사적 동일시 (projective identification)
- 5) 정서적 차가움 (emotional coldness)

77. [맹세리] 집단 정신 치료에 대하여 옳은 것은?

- 1) 집단 전체가 저항을 보이는 현상이 나타날 경우 즉시 치료를 포기한다.
- 2) 동질성 집단의 경우 소외감을 유도할 수 있으므로 이질성 집단을 구성하는 것이 좋다.
- 3) 신체장애로 인한 정신치료를 진행할때는 적합하지 않은 방법이다.
- 4) 피해망상이 심해서 구성원이나 치료집단을 가해집단으로 믿어버리는 환자의 경우에 시행하기 어렵다.
- 5) 집단 구성원들이 병리적 특성을 공유하여 악화될 수 있다.

78.[맹세리] 지지적치료 옳은 것?

- 1.안심시키기
안심의 기법을 사용
- 2. 초자아 강화시킴
- 3. 무의식 주로 탐구
- 4. 방어기제 약화시킴
- 5. 자아 기능의 약화

79. [맹세리] 전이에 대한 설명 옳은 것 ?

1. 외부 관계없이 환자내부에서 일어난다
2. 통찰에 방해
3. 무의식 중에 일어난다.
4. 이성적 감정은 없다
5. 최고조 도달시 해소 어렵다

80. [맹세리] 25세 여성 내과적 질환으로 병원 방문. 55세 남성 의사에게 권위적인 태도로 긴장함, 아버지의 모습을 봄. 설명하는 용어는?

1. 역전이
2. 전이
3. 퇴행
4. 투사적 동일화
5. 취소

81. Pattison이 이야기한 “임종과정에서 겪는 두려움”에 해당되지 않는 것은?

- 1) 통증에 대한 두려움
- 2) 고독에 대한 두려움
- 3) 신체를 잃는다는 두려움
- 4) 재산 상실에 대한 두려움
- 5) 정체성 상실에 대한 두려움

82. 비로소 죽음을 성인의 수준으로 이해하기 시작하는 연령은?

- 1) 2-3세
- 2) 5-6세
- 3) 9-10세

4) 12-13세

5) 15-16세

83. Reichard가 주장한 '노년기의 적응 형태'가 아닌 것은?

1) 성숙형

2) 은둔형

3) 성공형

4) 분노형

5) 자책형

84. [배재남] 노년기의 성격 변화 특징으로 옳지 않은것?

1) 독립성 증가

2) 조심성 증가

3) 남녀 성역할 바뀜

4) 의존성 증가

5) 먹는 것에서 낙을 찾음

85. [배재남] DSM-5에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1) 원인에 대한 설명이 없다

2) 임상 소견에 대해 자세한 설명이 있다

3) 치료에 대한 설명이 있다

4) 특징적인 임상양상에 대해 나와있다

5) 감별진단 및 유병률이 나와있다


86. [배재남] 환자의 면담 진행을 촉진하기 위한 요소가 아닌 것은?

- 1) 환자를 파악하기 전까지는 위로하거나 충고하지 않는다
- 2) 환자가 전달하는 바를 명확하게 하기 위해 다시 말하게끔 한다
- 3) 환자의 특이한 표정이나 말실수를 유머스럽게 지적한다
- 4) 왜라는 질문 대신에 어떻게 그렇게 생각하게 되었는지를 물어본다
- 5) 억양이나 표정을 통해 이해하고 있음을 전달한다

87. [배재남] 정신상태검사(Mental Status Examination) 평가 항목으로 적절하지 않은 것은?

1. 말
2. 성격 유형
3. 운동 활동
4. 외모와 행동
5. 추상적 사고능력

88. [배재남] 다음 검사에 대해 가장 옳은 설명은?



- 1) 표준화 방법이 명확하게 있다.
- 2) 뇌 손상 정도를 파악할 수 있다
- 3) 모호한 자극에 대한 반응을 평가한다.
- 4) 검사자가 반응을 보고 직접 평가한다
- 5) 지적장애가 있을 때에도 이용할 수 있다.

89. [배재남] 다음 중 경도인지장애에서 치매로 진행될 가능성이 높은 특징은?

- 1) APO E 4/4 유전자형
- 2) 신경인지검사 결과 지속적 주의력 저하
- 3) CSF 검사 결과 세로토닌 대사체 감소
- 4) MRI 상 후두엽 크기 감소
- 5) PET 상 도파민 수용체 수의 증가

90. [배재남] 72세 여자 환자가 기능저하로 내원하였다. 이 환자의 감별진단을 위한 초기검사가 아닌 것은?

(2018년 56번 문제와 동일)

- 1) 혈당검사
- 2) 매독과 에이즈 검사
- 3) 갑상선 기능 검사
- 4) Serum folate, vit B12
- 5) 덱사메타손 억제 검사 (Dexamethasone suppression test)

91. [배재남] 다음 중 섬망의 특징이 아닌 것은?

- 1) 섬망은 단기기억 및 즉각기억이 손상된다.
- 2) 섬망은 사고가 비체계적이고 와해된다.
- 3) 섬망은 밤에는 활발하고 낮에는 잠을 자는 수면각성주기의 붕괴를 보인다
- 4) 섬망은 안정적이고 점진적으로 발병한다
- 5) 섬망은 가역적인 경우가 흔하다.

92. [배재남] 76세 남자 환자가 복막염 수술 후에 갑자기 침대에서 수시로 내려오려고 하고 엉뚱한 대답을 하여 가족들도 못 알아보기도 한다. 이 환자에서 적절한 간호적 중재를 고르시오. (2023년 84번과 동일)

- 1) 밤 동안 환한 조명을 계속 유지한다.
- 2) 시술을 할 때는 간단하지만 명확하게 설명해준다.
- 3) 안정을 취할 수 있도록 보호자 간병을 차단한다
- 4) 집중력을 높이기 위해 수시로 낮잠을 자도록 한다.
- 5) 밤에는 사고를 막기 위해 신체적 강박을 계속 유지한다.

96. 다음 중 청소년기의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? *죽 문제 동일하게 출제

- 1) 형식적 조작기
- 2) 자아정체성 혼돈
- 3) 근면성 확립
- 4) 논리적 사고
- 5) 합리성 확립

97. 에릭슨의 발달 단계상 후기 아동기의 특징이 아닌 것은? *죽 문제 동일하게 출제

- 1) 자율성을 얻느냐 아니면 수치심에 빠지느냐 하는 과제가 주어지는 시기이다.
- 2) 지적인 호기심이 활발해지는 시기이다.
- 3) 또래 친구들과 놀이를 통한 교류에 몰두한다.
- 4) 놀이를 통하여 성적, 공격성 환상을 다룬다.

5) 부모의 지나친 제약이나 비난, 처벌로 매사에 소극적으로 변할 수 있다.

98. 우리나라의 정신건강복지법에 명시되어 있는 정신과

입원의 유형이 아닌 것은?

1) 자의입원

2) 동의입원

3) 영장청구에 의한입원

4) 보호의무자에 의한 입원

5) 시장, 군수, 구청장에 의한 입원

99. 인격장애와 특징적 양상이 바르게 연결된 것은?

1) 분열성인격장애-반복적인 불법행동

2) 반사회성인격장애-과도한 충동성

3) 자기애성인격장애-자기극화, 연극적행동

4) 히스테리성인격장애-강한 의존성

5) 경계성인격장애-주체성 혼란

100. 인격장애 환자들의 공통적인 특징으로 맞는 조합은?

가. 스트레스에 직면하여 탄력있게 대처하지 못한다.

나. 자아 비동적이다.

다. 청소년기 초기 성인기에 시작하며 부적응적 행동을 나타낸다.

라. 부적응적 행동에 수반되어 심한 불안이 나타난다.

1) 가, 나, 다

2) 가, 다

3) 나, 라

4) 라

5) 가, 나, 다, 라

101. 다음 중 지적장애에 대한 기술 중 틀린 것은?

1) 심한 정신지체자의 정신질환 빈도는 일반 인구보다 높다.

2) IQ 50-70은 경도의 지적장애에 속한다.

3) 경한 지적장애의 경우 단순작업 등 기술교육이 가능하다.

4) 경한 지적장애의 경우 나이가 들어도 유치원 수준의 지능밖에는 도달하지 못한다.

5) 지적장애자 중 경도의 지적장애가 차지하는 비율은 가장 높다.

102. Tourette's disorder에 관한 설명 중 맞는 조합은?

가) 다양한 motor and vocal tics가 나타난다.

나) 약물로는 haloperidol, clonidine을 흔히 사용한다.

다) 강박증세를 동반하기도 한다.

라) 유병율은 아동의 1%를 차지한다

1. 가,나,다

2. 가,다

3. 나,라

4. 라

5. 가,나,다,라

103. 주의력결핍 과잉행동장애에 주로 사용하는 치료 약물의 옳은 조합은?

가) Dextroamphetamine

나) Chlorpromazine

다) Methylphenidate

라) Flurazepam

1. 가,나,다

2. 가,다

3. 나,라

4. 라

5. 가,나,다,라

104. 격리불안장애에 대한 설명 중 옳은 것의 조합은?

가) 종종 부모나 자신에게 무슨 일이 벌어질까 걱정한다.

나) 흔히 오심, 구토, 복통 등의 신체적 증상을 동반하기도 한다.

다) 갑자기 갑자기 학교 가기를 거부한다.

라) 행동치료보다 정신치료가 효과적이다.

1) 가,나, 다

2) 가, 다

3) 나, 라

4) 라

5)가,나,다,라

105. 소아학대에 관한 설명중 맞는 조합은?

가) 가정외 성학대가 가정 내 성학대보다 많다.

나) 폭행의 경우 학대자의 90%는 자신의 부모에게 학대당한 경험이 있다.

다) 유병률은 사회경제적인 수준과 관계가 없다.

라) 성학대의 경우 피해대자는 자신의 잘못으로 생각하여 심한 죄책감을 갖기도 한다.

1) 가, 나, 다

2) 가, 다

3) 나, 라

4) 라

5) 가, 나, 다, 라

106. 3세 여아가 말이 늦다하여 소아정신과를 방문하였다. 말은 잘 알아들었으나 엄마, 아빠 등의 몇몇 단어 이외에 두 단어 이상을 연결하여 말을 못한다고 한다. 그러나 자신의 의사표현은 행동으로한다고 한다. 병력상 운동발달은 정상적이었고, 8개월 무렵 낯가림을 하였고, 장난감은 적절히 사용하여 놓고 새로운 것에 대한 호기심도 무척 많은것으로 보였다. 가장 가능성이 높은 진단은?

1) 발달성언어장애

2) 자폐증

3) 분리불안장애

4) 정신지체

5) 실어증

107. 수면과 각성에 관한 설명 중 옳은 것은?

1) SCN은 빛이 없어도 24.2시간이라는 주기를 유지할 수 있다.

2) Ach은 N3에 가장 활발하게 분비된다.

3) Adenosine

4) melatonin은 빛이 강해야 분비가 가장 활발하게 촉진된다.

5) orexin은 rem으로의 전환에 도움을 준다.

108. [조은정] 불면증의 치료로 옳지 않은 것은?

- 1) 일정한 시간에 잠드는 것보다 수면량에 상관없이 일정한 시간에 기상하는 것이 중요하다.
- 2) 낮잠을 최대한 제한하되 이른 오후에 최대 20분 정도까지는 허용할 수 있다.
- 3) 졸리지 않으면 침실에서 나와 졸릴 때에만 침실에 들어가는 것은 조건화를 유도하는 것이다.
- 4) 취침 전 따뜻한 우유 정도의 간단한 요깃거리는 도움이 된다.
- 5) 수면제한법은 밤잠을 제한하여 다음날의 수면량을 늘리는 것으로, 잠깐의 낮잠은 허용된다.

109. [조은정] 다음 중 옳은 것은?

- 1) 렘수면: 근마비
- 2) 렘수면: 델타파
- 3) 렘수면: 항온성
- 4) 비렘수면: 뇌혈류량이 깨어 있을 때보다 증가
- 5) 비렘수면: 전체 수면의 25% 정도를 차지하며, 새벽녘에 주로 나타남

110. [조은정] 하지불안증후군에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1) DA가 1차 치료이다.
- 2) 철분 주사는 페리틴 수치와 관계없이 금기이다.
- 3) DA를 쓰면 오히려 augmentation이 생길 수 있다.
- 4) Gabapentine은 2차 치료이다.
- 5) 수면다원검사서 PLMS가 없으면 진단할 수 없다.

111. 아동기 발달에 대해 옳지 않은 것은?

- 1) 숨겨진 장난감이 보이지 않아도 존재한다는 것을 아는 것은 구체적 조작기에 해당한다
- 2) 막대를 칼처럼 쓰거나 상자를 자동차처럼 가지고 노는 것은 전조작기 아동의 특징이다.
- 3) 다른 사람의 관점에서 보지 못하고 나의관점에서만 볼수 있는 것은 전조작기 아동의 특징이다
- 4) 물컵 모양이 달라도 물의 양이 같다는 것을 아는 것은 구체적 조작기 아동의 특징이다.
- 5) 대상영속성이 생기면 더이상 분리불안을 느끼지 않는 것이 감각 운동기의 특징이다.

112. 수업시간에 계속 떠드는 학생에게 숙제를 부여했더니 학생이 더이상 떠들지 않게 됨. 이에 해당하는 것은?

- 1) 부정적 강화
- 2) 긍정적 강화
- 3) 긍정적 벌
- 4) 부정적 벌
- 5) 소거

113. 에릭 벤의 우울의 인지 삼제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 1) 자신을 결함이 있는 존재로 보는 부정적 견해
- 2) 세상이 자기에게 가혹하다는 부정적 해석
- 3) 미래가 고통으로 가득할 것이라는 부정적 기대

- 4) 다른 사람들의 도덕적 결핍에 대한 분노
- 5) 자신, 세계, 미래에 대한 왜곡된 인지

114. 다음 중 파블로프의 실험으로 대표되는 고전적 조건형성의 핵심 원리로 옳은 것은?

- 1. 행동의 결과로 주어지는 보상이나 벌이 학습을 결정한다
- 2. 유기체가 특정 목적의 달성을 위해 도구적으로 행동한다
- 3. 중립 자극과 무조건 자극이 반복적으로 연합(association)되어 반응을 유도한다
- 4. 타인의 행동을 관찰하거나 모방함으로써 새로운 기술을 습득한다
- 5. 왜곡된 사고 패턴을 찾아내서 논리적으로 수정하는 치료 기법이다

115. 주요우울장애의 필수적 요소 2가지를 고르시오.

- 1. Insomnia
- 2. Suicidal idea
- 3. Guilty feeling
- 4. Depressed mood
- 5. Loss of interest

116. 다음 중 소아청소년에게서 강박행동이 나타났을 때, 함께 동반될 가능성이 높은 질환 두가지는?

- 1. Conduct disorder
- 2. Transient tic disorder
- 3. Bipolar affective disorder
- 4. Generalized anxiety disorder
- 5. ADHD