

鞅过程可选停止定理的数值模拟

杨逸飞¹

摘要

本文以可选停止定理（Optional Stopping Theorem, OST）为主线，结合 Monte Carlo 数值模拟研究鞅在不同停时结构下的表现。文章选取 Moran 种群遗传过程、Cramér-Lundberg 保险破产过程、赌徒破产过程、秘书问题和美式期权定价五个模型，分别展示 OST 直接成立、需构造辅助鞅、条件失效以及向最优停时理论推广的情形。数值实验验证了有界性、有限期望停时和一致可积性在 OST 中的作用，并通过 Snell 包络与 Longstaff-Schwartz 算法说明 OST 思想在最优停时问题中的延伸。

关键词

可选停止定理 — 鞅 — Monte Carlo 模拟 — 最优停时 — 停时 — Snell 包络

¹ 化学化工学院，上海交通大学，上海，200240

目录

1 绪论	1	5 最优停时与 Snell 包络：秘书问题	10
1.1 研究背景	1	5.1 背景介绍	10
1.2 理论准备	2	5.2 理论分析	10
鞅与停时 ■ 可选停止定理 ■ 经典的 OST 反例		5.3 数值实验设计与参数设置	12
1.3 数值模拟方法论	3	5.4 结果与讨论	12
1.4 章节安排	3	6 美式期权定价与 Longstaff-Schwartz 算法	13
2 Moran 模型中的基因固定概率与停时	3	6.1 背景介绍	13
2.1 背景介绍	3	6.2 理论分析	13
2.2 理论分析	4	6.3 数值实验设计与参数设置	14
2.3 数值实验设计与参数设置	4	6.4 结果与讨论	14
2.4 结果与讨论	5	7 总结与展望	15
3 保险破产模型与指数鞅	5	7.1 各模型 OST 角色对比	15
3.1 背景介绍	5	7.2 OST 的理论谱系	15
3.2 理论分析	6	7.3 数值方法的经验	15
3.3 数值实验设计与参数设置	7	7.4 展望	15
3.4 结果与讨论	7	参考文献	17
4 赌徒破产中 OST 的条件失效	8		
4.1 背景介绍	8		
4.2 理论分析	8		
4.3 数值实验设计与参数设置	9		
4.4 结果与讨论	9		

1. 绪论

1.1 研究背景

鞅（martingale）是概率论中最重要的概念之一，最早由 Paul Lévy 于 1934 年引入，后经 Joseph L. Doob 在 20 世纪 40–50 年代系统发展，成为现代随机过程理论的基石。鞅刻画了直观上的“公平博弈”：设一个赌徒在第 n 局结束后的财富为 X_n ，若赌局公平，则在已知前

n 局全部信息 $\mathcal{F}_n$ 的条件下, 下一局后财富的条件期望应等于当前财富:

$$\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n. \quad (1)$$

满足这一性质的随机过程即为鞅。需要强调的是, 鞅是一类非常广泛的随机过程: 独立同分布零均值随机变量的部分和、布朗运动、补偿泊松过程、Doob 鞅 ($\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_t]$ 的形式) 等均均为鞅。

可选停止定理 (Optional Stopping Theorem, OST) 是鞅论中最深刻的结果之一, 由 Doob 在其 1953 年的经典著作中首次完整给出 [1]。OST 的核心陈述是: 在适当的正则条件下, 即使在一个随机停时 τ 处停止鞅过程, 其期望仍然不变:

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]. \quad (2)$$

这一结论具有广泛的应用: 从赌徒破产问题 [2] 到序贯假设检验 (Wald 的序贯概率比检验)、从美式期权定价 [3] 到种群遗传学中基因频率的固定概率 [4], OST 提供了将这些看似不同的问题统一在同一数学框架下的工具。

然而, OST 并非无条件成立。Doob 给出了三个充分条件中的任何一个都可保证 OST 成立: (1) 停时 τ 几乎必然有界; (2) 在停时前的整个过程 $|X_{t \wedge \tau}|$ 几乎必然有界; (3) $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 且增量 $|X_t - X_{t-1}|$ 一致有界。当这三个条件全部不满足时, OST 可能失效——对称随机游走在单边首达时 $\tau = \inf\{n : S_n = +1\}$ 处的行为是这一失效的经典反例: τ 几乎必然有限, 但 $\mathbb{E}[S_\tau] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]$ 。失效的深层原因在于一致可积性 (uniform integrability) 的缺失——被停过程 $\{X_{n \wedge \tau}\}$ 在 τ 无界时可能“泄漏”概率质量, 使极限与期望无法交换。

近年来, 随着计算机性能的提升, Monte Carlo 数值模拟为研究 OST 在不同条件下的行为提供了强有力的工具。通过生成大量独立样本路径, 可以以高精度估计 $\mathbb{E}[X_\tau]$, 并与理论预测进行对比。更重要的是, 数值模拟可以直观地展示 OST 失效的微观机制——例如单边停时下路径可以“先任意深地走负再回来”——这是纯解析推导难以传达的洞见。

本文选取五个具有代表性的随机过程模型, 逐一进行数值研究: Moran 种群遗传过程 (OST 完美成立)、Cramér-Lundberg 保险破产模型 (需构造指数鞅)、赌徒破产过程 (OST 条件失效分析)、秘书问题 (引出 Snell 包络的最优停时理论)、以及美式期权定价 (Longstaff-Schwartz Monte Carlo 算法)。这五个模型形成了一个从

“OST 直接成立”到“OST 不适用, 需要更一般的最优停时框架”的完整谱系。

1.2 理论准备

1.2.1 鞅与停时

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间, $\{\mathcal{F}_t\}_{t \in \mathbb{T}}$ 为单调递增的 σ -代数流 (即信息流)。 $\mathbb{T}$ 为时间参数空间, 可以是 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ (离散时间) 或 $[0, \infty)$ (连续时间)。

定义 1.1 (鞅). 称 $\{\mathcal{F}_t\}$ -适应过程 $\{X_t\}_{t \in \mathbb{T}}$ 为鞅 (*martingale*), 若:

1. $\mathbb{E}[|X_t|] < \infty$ 对所有 $t \in \mathbb{T}$ 成立;
2. 对任意 $s < t$, $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s$ (几乎必然)。

若 $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] \geq X_s$, 则称为下鞅 (*submartingale*); 若 $\leq$, 则称为上鞅 (*supermartingale*)。

对于离散时间 $\mathbb{T} = \mathbb{N}$, 鞅性质等价于对任意 $n \geq 1$ 有 $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1}$ 。常见的鞅例子包括:

- 独立零均值随机变量的部分和: $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k, \mathbb{E}[\xi_k] = 0$;
- 独立增量平方的补偿和: $S_n^2 - \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[\xi_k^2]$;
- Doob 鞅: $X_t = \mathbb{E}[X | \mathcal{F}_t]$, 其中 X 为可积随机变量;
- Wald 鞅: $W_n = (\phi(\lambda))^{-n} \exp\{\lambda S_n\}$, 其中 $\phi(\lambda) = \mathbb{E}[e^{\lambda \xi_1}]$;
- 布朗运动相关鞅: $B_t, B_t^2 - t, \exp(\lambda B_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t)$ 。

定义 1.2 (停时). 取值于 $\mathbb{T} \cup \{+\infty\}$ 的随机变量 τ 称为 $\{\mathcal{F}_t\}$ -停时 (*stopping time*), 若对任意 $t \in \mathbb{T}, \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ 。即“是否已经停止”这一事件仅依赖于到当前时刻为止的信息。

停时的典型例子包括: $\tau \equiv t_0$ (固定时刻)、 $\tau = \inf\{t : X_t \geq a\}$ (首达时)、 $\tau = \inf\{t : X_t \notin (a, b)\}$ (首出时)。对停时 τ , 定义被停过程 (stopped process) $X_t^\tau = X_{t \wedge \tau}$ 。

1.2.2 可选停止定理

定理 1.3 (可选停止定理 — Doob). 设 $\{X_t\}$ 为鞅, τ 为停时。若以下三个条件之一成立, 则 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$:

1. τ 几乎必然有界, 即存在常数 K 使 $\mathbb{P}(\tau \leq K) = 1$;
2. $\{X_{t \wedge \tau}\}$ 有界, 即存在常数 M 使 $|X_{t \wedge \tau}| \leq M$ 几乎必然对所有 t 成立;
3. $\mathbb{E}[\tau] < \infty$, 且存在常数 C 使 $\mathbb{E}[|X_{t+1} - X_t| | \mathcal{F}_t] \leq C$ 在 $\{\tau > t\}$ 上成立。

证明（离散时间情形，条件 1）。设 $\tau \leq K$ 几乎必然。利用指示分解 $\mathbf{1}_{\{\tau < n\}} + \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}} = 1$ ：

$$\mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] = \mathbb{E}\left[X_{\tau \wedge n} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{\tau=k\}} + \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}} \right)\right] \quad (3)$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau=k\}}] + \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}}]. \quad (4)$$

由于 $\{\tau = k\} \in \mathcal{F}_k$ 且 $\{X_n\}$ 为鞅， $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_k] = X_k$ ，故 $\mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{\tau=k\}}] = \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau=k\}}]$ 。代入得

$$\mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] = \sum_{k=0}^n \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau=k\}}] = \mathbb{E}[X_n]. \quad (5)$$

当 n 很大时 $X_{\tau \wedge n} = X_\tau$ （因 $\tau \leq K$ ），取 $n \geq K$ 即得 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X_0]$ 。□

条件 2 和 3 的证明分别依赖有界收敛定理和 Wald 引理。这三个条件本质上共同保证了一致可积性（uniform integrability）——即极限与期望可以交换：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] = \mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_{\tau \wedge n}\right] = \mathbb{E}[X_\tau]. \quad (6)$$

当一致可积性缺失时，被停过程的极限虽然几乎必然存在，但“概率质量”在未停止的路径上可能集中于极端值，破坏期望等式。

1.2.3 经典的 OST 反例

考虑对称随机游走 $S_n = \sum_{i=1}^n \eta_i$ ， $\eta_i = \pm 1$ 各概率 $1/2$ ， $S_0 = 0$ 。令 $\tau = \inf\{n : S_n = +1\}$ 。一维随机游走的常返性保证 $\tau < \infty$ 几乎必然。然而：

- τ 无界：对任意 K ，存在正概率使 $\tau > K$ ——游走可以在达到 $+1$ 之前长时间在负半轴游荡。
- $S_{n \wedge \tau}$ 无界：在 τ 之前， S_n 可以取任意大的负值。
- $\mathbb{E}[\tau] = \infty$ ：首达时期望为无穷（因停时分布的重尾性， $P(\tau > t) \sim 1/\sqrt{\pi t}$ ）。

因此三个充分条件全部失效。事实上 $S_\tau \equiv 1$ 以概率 1 成立，故 $\mathbb{E}[S_\tau] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]$ 。

这一反例正是本文第四章数值研究的核心。

1.3 数值模拟方法论

本文统一采用 Monte Carlo 方法进行数值实验。对每个模型，基本流程如下：

1. 对模型参数进行设置（包括初始状态、边界条件等）；
2. 独立生成 M 条样本路径，每条路径模拟至停时触发或达到预设的最大步数/时间；

3. 记录每条路径的停时 $\tau^{(i)}$ 和停时处的过程值 $X_{\tau^{(i)}}$ ；
4. 计算 $\mathbb{E}[X_\tau]$ 的 Monte Carlo 估计 $\hat{\mu} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M X_{\tau^{(i)}}$ ，标准误 $\text{SE} = \hat{\sigma}/\sqrt{M}$ （ $\hat{\sigma}$ 为样本标准差）；
5. 以 $\hat{\mu} \pm 1.96 \times \text{SE}$ 构造 95% 渐进置信区间。

对于需要参数扫描的实验（如破产概率随初始资本的变化），对每个参数值重复上述过程。所有代码以 Python 3.13 编写，数值计算依赖 NumPy 和 SciPy，图形绘制使用 Matplotlib。代码采用面向对象架构：core/ 模块提供过程、停时和 Monte Carlo 模拟引擎等公共组件，各章节代码通过组合复用，避免重复实现。完整代码随论文附于项目仓库中。

1.4 章节安排

第二章至第六章依次研究五个模型，构成了 OST 从“完美成立”到“不再适用”的完整谱系：第二章的 Moran 模型展示 OST 在过程有界时无条件成立；第三章的保险破产模型展示如何通过指数变换构造辅助鞅来应用 OST（且只能得到上界而非等式）；第四章的赌徒破产模型展示 OST 三个充分条件全部失效时的反例行为；第五章的秘书问题展示 OST 为何不适用于最优停时问题，并引入 Snell 包络的统一框架；第六章的美式期权定价展示 Snell 包络的数值实现（Longstaff-Schwartz 算法）。第七章对全文进行总结和对比。

2. Moran 模型中的基因固定概率与停时

2.1 背景介绍

种群遗传学的一个核心问题是：在一个有限种群中，某等位基因的频率如何随时间演化？在缺乏自然选择、突变和迁移的情况下，等位基因频率的演化完全由随机性驱动——每代中哪个个体繁殖、哪个个体死亡都是随机事件。这种现象被称为遗传漂变（genetic drift）。Moran (1958) 提出的模型是研究漂变最简单的数学框架之一 [4]。

考虑一个包含 N 个单倍体个体的种群（单倍体意味着每个个体只携带一个等位基因拷贝，为 A 或 a）。每代进行两步操作：（1）从 N 个个体中随机等概率选出一个个体进行繁殖，产生一个与其基因型相同的后代；（2）从原来的 N 个个体中随机等概率选出一个个体将其杀死，由后代填补空位。令 X_n 表示第 n 代中等位基因 A 的个数，则 X_n 取值为 $\{0, 1, \dots, N\}$ 。当 $X_n = 0$ 时，所有个体均为 a 型（A 灭绝）；当 $X_n = N$ 时，所有个体均为 A 型（A 固定）。0 和 N 为吸收态——一旦进入便无法离开。

2.2 理论分析

X_n 的 Markov 链结构与鞅性质

首先分析 X_n 的一步转移概率。若当前有 i 个 A 型个体 ($0 < i < N$)，则：

- 繁殖出 A 个体的概率为 i/N ；
- 杀死 A 个体的概率为 i/N （被杀死的从原来的 N 个中等概率选出）。

当且仅当繁殖出 A 且杀死 a 时（概率 $\frac{i}{N} \cdot \frac{N-i}{N}$ ）A 的数量增加 1；当且仅当繁殖出 a 且杀死 A 时（概率 $\frac{N-i}{N} \cdot \frac{i}{N}$ ），A 的数量减少 1。即

$$\begin{aligned} P(X_{n+1} = i+1 | X_n = i) &= P(X_{n+1} = i-1 | X_n = i) \\ &= \frac{i(N-i)}{N^2}, \end{aligned} \quad (7)$$

其余概率为 $P(X_{n+1} = i | X_n = i) = 1 - 2i(N-i)/N^2$ 。

由此计算条件期望：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_{n+1} | X_n = i] &= (i+1) \frac{i(N-i)}{N^2} + (i-1) \frac{i(N-i)}{N^2} \\ &\quad + i \left(1 - \frac{2i(N-i)}{N^2} \right) \\ &= i + \frac{i(N-i)}{N^2} (+1) + \frac{i(N-i)}{N^2} (-1) = i. \end{aligned} \quad (8)$$

所以 $\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n$ ，即 $\{X_n\}$ 是一个鞅。这是非常优美的性质：没有任何选择压力的有限种群中，等位基因的频率在期望意义下保持不变——尽管在单条轨迹上它必然漂变至吸收。

OST 与固定概率

定义停时 $\tau = \inf\{n \geq 0 : X_n = 0 \text{ 或 } X_n = N\}$ 。由于 X_n 是有限状态不可约 Markov 链（除去两个吸收态）， τ 几乎必然有限。由于 $|X_{n \wedge \tau}| \leq N$ （过程始终在吸收边界内），OST 的条件 2（过程有界）成立，因此

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0] = x_0. \quad (9)$$

X_τ 只能取两个值：0（灭绝）或 N （固定）。设 $P_N = \mathbb{P}(X_\tau = N | X_0 = x_0)$ 为固定概率，则

$$\mathbb{E}[X_\tau] = 0 \cdot (1 - P_N) + N \cdot P_N = NP_N. \quad (10)$$

联立式 (9) 得 $NP_N = x_0$ ，即

$$P(\text{固定}) = \frac{x_0}{N}. \quad (11)$$

这是 OST 在这一模型中给出的最简洁且深刻的结论：初始频率即固定概率。假如初始时 A 的频率为 30%，则其最终在种群中固定的概率就是 30%。没有任何选择、突变或迁移时，所有等位基因的命运在期望意义上由初始频率唯一决定。

$\mathbb{E}[\tau]$ 的数值求解

为利用 OST 求解停时期望，需使用 Doob 分解。注意到 $\{X_n\}$ 是鞅，由 Jensen 不等式知 $\{X_n^2\}$ 是下鞅。对 X_n^2 做 Doob 分解 $X_n^2 = M_n + A_n$ ，其中 M_n 为鞅， A_n 为可料增过程。增过程的构造为：

$$A_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_k^2 - X_{k-1}^2 | \mathcal{F}_{k-1}]. \quad (12)$$

一步条件期望平方增量：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_k^2 | X_{k-1} = i] - i^2 &= (i+1)^2 \frac{i(N-i)}{N^2} + (i-1)^2 \frac{i(N-i)}{N^2} \\ &\quad + i^2 \left(1 - \frac{2i(N-i)}{N^2} \right) - i^2 \\ &= \frac{2i(N-i)}{N^2}. \end{aligned} \quad (13)$$

因此 $A_n = \sum_{k=1}^n \frac{2X_{k-1}(N-X_{k-1})}{N^2}$ 。对停时 τ 应用 OST（因其满足条件 2），有 $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0] = \mathbb{E}[X_0^2]$ 。故

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_\tau^2] - x_0^2 &= \mathbb{E}[A_\tau] \\ &= \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^{\tau} \frac{2X_{k-1}(N-X_{k-1})}{N^2} \right]. \end{aligned} \quad (14)$$

由于 $X_\tau \in \{0, N\}$ ， $\mathbb{E}[X_\tau^2] = N^2 \cdot P_N = Nx_0$ 。因此

$$Nx_0 - x_0^2 = \frac{2}{N^2} \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^{\tau} X_{k-1}(N-X_{k-1}) \right]. \quad (15)$$

更为直接的方法是利用出生-死亡链的标准结果。对于转移概率 $p_{i,i+1} = p_{i,i-1} = i(N-i)/N^2$ 的生灭过程，从状态 i 出发的平均吸收时间 $t_i = \mathbb{E}[\tau | X_0 = i]$ 满足三对角线性方程组：

$$p_{i,i-1}t_{i-1} + p_{i,i+1}t_{i+1} - (p_{i,i-1} + p_{i,i+1})t_i = -1, \quad 1 \leq i \leq N-1, \quad (16)$$

边界条件为 $t_0 = t_N = 0$ 。以 $At = -1$ 的形式，该稀疏三对角系统可通过标准数值线性代数高效求解（本文使用 SciPy 的 solve）。

2.3 数值实验设计与参数设置

实验在 Python 3.13 环境下运行，使用 NumPy 的随机数生成器（种子 42 以保证可复现性）。实验参数设置如下：

表 1. Moran 模型数值实验参数设置

参数	实验一：固定概率	实验二：停时分布
种群规模 N	100	100
初始 A 个数 x_0	{10, 20, ..., 90}	50
模拟路径数 M	5000 × 9 组	10000
随机种子	42	42

2.4 结果与讨论

图 1 展示了在 $N = 100$ 、初始频率 0.5 时 10 条代表性基因频率轨迹（5 条最终固定、5 条最终灭绝）。每条轨迹呈现典型的锯齿状随机漂变特征：频率在 0.5 附近波动，波动的幅度与当前频率有关——当频率接近 0.5 时波动最大（此时 $i(N - i)/N^2$ 最大），接近吸收边界时波动减小。最终所有轨迹被 0（灭绝）或 1（固定）吸收。注意到即使没有选择压力，固定和灭绝的发生也是必然的——随机漂变本身足以消除种群中的遗传多样性。从 $x_0 = 50$ 出发，固定的概率应为 $50/100 = 0.5$ ，在这 10 条展示路径中表现为 5 条固定、5 条灭绝，与理论值一致。

图 2 比较了 $N = 100$ 时 Monte Carlo 估计的固定概率与理论值 $P_{\text{fix}} = x_0/N$ 。九个不同初始频率下的 Monte Carlo 估计均紧密落在对角线 $y = x$ 上，最大偏差不超过 0.02，且所有数据点均位于 95% 置信带宽内。这一结果验证了 OST 在这一模型中的精确成立——由于过程有界 ($|X_n| \leq N$)，OST 的条件 2 无保留地满足，等式 $E[X_\tau] = E[X_0]$ 严格成立，进而导出 $P(\text{固定}) = x_0/N$ 这一简洁解析公式。

图 3 展示了 $N = 100$ 、 $x_0 = 50$ 时停时 τ （代数）的经验分布。直方图呈现典型的右偏单峰形态，叠加指数分布拟合后可以看到拟合效果在大 τ 区域较好，在小 τ 区域存在系统性偏差——这是因为 Moran 过程的吸收不可能在极短时间内完成（从 $x_0 = 50$ 到 0 或 100，最少需要 50 步纯漂变），所以停时存在一个物理上的下界。停时均值为 6961 代，中位数为 5486 代，均值大于中位数反映了分布的右偏性质。这一数值可以通过前文所述的三对角线性系统精确求解来交叉验证，实验值与数值解的一致性很好（相对误差小于 1%）。对于 $N = 100$ 的种群，即使没有任何自然选择，遗传漂变也只需要约 7000 代就能固定一个等位基因——这在进化时间尺度上是相当迅速的。




图 1. Moran 模型基因频率轨迹 ($N = 100$ ，初始频率 0.5)。蓝色路径表示最终固定（A 取代 a），红色路径表示最终灭绝（a 取代 A）。每条轨迹为锯齿状随机游走，最终被 0 或 1 吸收。圆点标记停时位置。




图 2. 固定概率与初始频率的关系 ($N = 100$)。散点为 Monte Carlo 估计（5000 条路径 × 9 个初始频率），误差棒为 95% 置信区间。红色虚线为理论值 $y = x_0/N$ ，是 OST 的直接推论。模拟与理论高度吻合，所有误差棒均跨越对角线。

3.1 背景介绍

保险公司的基本商业模式依赖于大数定律：向大量投保人收取保费，对冲少数人的索赔风险。然而，由于索赔的发生时间和金额具有随机性，即使保费收入在长期平均上超过期望赔付，保险公司仍有可能遭遇一系列不利的索赔事件导致资本耗尽。评估这一“破产”风险是精算学的核心问题之一。Cramér 和 Lundberg 在 20 世纪初期独立提出了描述保险盈余动态的经典数学模型 [5]，至今仍然是破产理论的基础框架。

模型假设如下：（1）保费以恒定速率 $c > 0$ 连续流入；（2）索赔事件按强度为 $\lambda > 0$ 的泊松过程 $\{N_t\}_{t \geq 0}$ 发生；（3）第 i 次索赔金额 Y_i 独立同分布，与索赔到达过程独立，均值为 $\mu = E[Y]$ ；（4）初始资本为 $u > 0$ 。时




图 3. Moran 模型停时分布 ($N = 100, x_0 = 50$, 10000 条路径)。直方图为经验密度, 红色实线为指数分布拟合。均值为 6961 代, 中位数为 5486 代。停时分布的右偏性反映了纯漂变过程的随机性: 少数路径可能在吸收边界附近长时间“犹豫”。

刻 t 的盈余为

$$U_t = u + ct - \sum_{i=1}^{N_t} Y_i. \quad (17)$$

盈余过程的典型形态是“线性上升 + 随机跳跃下跌”。破产 (ruin) 定义为 $\tau = \inf\{t > 0 : U_t < 0\}$, 即盈余首次为负的时刻。核心问题是破产概率 $\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty \mid U_0 = u)$ ——初始资本为 u 时最终破产的概率。

3.2 理论分析

安全负荷条件

保险公司的长期期望盈余变化率为 $\mathbb{E}[U_t - u]/t = c - \lambda\mu$ 。若 $c \leq \lambda\mu$ (保费收入不足以覆盖期望赔付, 即“安全负荷”为零或负), 则由强大数定律可证破产概率为 1——公司最终必然破产。因此我们始终假设安全负荷条件成立:

$$c > \lambda\mu, \quad \text{定义安全负荷系数 } \theta = \frac{c}{\lambda\mu} - 1 > 0. \quad (18)$$

在安全负荷条件下, U_t 具有向上的期望漂移, $\mathbb{E}[U_t] = u + (c - \lambda\mu)t$ 随时间线性增长。然而, U_t 不是鞅——它的期望随时间增加。

指数鞅构造

为应用 OST, 我们需要一个与盈余过程相关的鞅。关键技巧是取指数变换。令 $M_t = e^{-rU_t}$, 计算其期望:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_t] &= \mathbb{E}[e^{-r(u+ct-\sum_{i=1}^{N_t} Y_i)}] \\ &= e^{-ru-rc t} \cdot \mathbb{E}[e^{r \sum_{i=1}^{N_t} Y_i}]. \end{aligned} \quad (19)$$

由于 $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$ 且索赔独立, 利用复合泊松分布的矩母函数:

$$\mathbb{E}[e^{r \sum_{i=1}^{N_t} Y_i}] = \exp\{\lambda t(\mathbb{E}[e^{rY}] - 1)\} = \exp\{\lambda t(M_Y(r) - 1)\}, \quad (20)$$

其中 $M_Y(r) = \mathbb{E}[e^{rY}]$ 为索赔额的矩母函数。代入得

$$\mathbb{E}[M_t] = e^{-ru} \cdot \exp\{t[\lambda(M_Y(r) - 1) - rc]\}. \quad (21)$$

若存在 $r > 0$ 使指数项 $\lambda(M_Y(r) - 1) - rc = 0$, 则 $\mathbb{E}[M_t] = e^{-ru}$ 为常数, 且可进一步验证 M_t 是一个鞅 (利用泊松过程的独立增量性和指数函数的可乘性)。这个特殊的 r 被称为调整系数 (adjustment coefficient), 记为 R 。 R 满足方程

$$\lambda(M_Y(R) - 1) = Rc. \quad (22)$$

在安全负荷条件 $c > \lambda\mu$ 下, 函数 $f(r) = \lambda(M_Y(r) - 1) - rc$ 满足 $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = \lambda\mathbb{E}[Y] - c < 0$, 且当 r 趋于 M_Y 的收敛半径时 $f(r) \rightarrow +\infty$ 。故存在唯一的正根 $R > 0$ 。

Lundberg 不等式的 OST 推导

考虑截断停时 $\tau \wedge T$ (有界停时, OST 无条件成立), 对鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ 应用 OST:

$$\mathbb{E}[e^{-RU_{\tau \wedge T}}] = M_0 = e^{-Ru}. \quad (23)$$

取期望的下界:

$$\begin{aligned} e^{-Ru} &= \mathbb{E}[e^{-RU_{\tau \wedge T}}] \\ &\geq \mathbb{E}[e^{-RU_{\tau \wedge T}} \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] \\ &\geq \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] = \mathbb{P}(\tau \leq T), \end{aligned} \quad (24)$$

其中第一个不等式成立是因为 $e^{-RU_{\tau \wedge T}} \geq 0$ 且我们截取了 $\{\tau \leq T\}$ 上的积分; 第二步利用了 $\tau \leq T$ 时 $U_\tau < 0$ (破产), 因此 $e^{-RU_\tau} \geq e^{-R \cdot 0} = 1$ (因 $R > 0$ 且 U_τ 在破产瞬间略小于 0, 严格不等但在极限下趋于 1)。令 $T \rightarrow \infty$, 由单调收敛定理得

$$\boxed{\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty) \leq e^{-Ru}}. \quad (25)$$

这就是著名的 Lundberg 不等式: 破产概率以指数速率随初始资本衰减。初始资本每增加一个单位, 破产概率的上界缩小一个固定因子 e^{-R} 。

这里有一个值得注意的技术细节: 与第二章 Moran 模型中 OST 直接给出等式不同, 此处 OST 只能给出不

等式。原因在于破产是单边吸收（只有下界，没有上界），无法像双边吸收问题那样通过两个边界值的线性组合解出精确概率。从 OST 推导等式需要知道 U_τ 在破产时刻的精确分布（称为“破产赤字”分布），这通常没有简单的闭式解。

指数索赔分布的精确解

当索赔额 $Y \sim \text{Exp}(1/\mu)$ 时，矩母函数为 $M_Y(r) = 1/(1 - \mu r)$ ($r < 1/\mu$)。调整系数方程 $\lambda \cdot \frac{\mu R}{1 - \mu R} = R c$ 的解为

$$R = \frac{\theta}{\mu(1 + \theta)}. \quad (26)$$

利用破产理论中更精细的分析方法（如更新方程或 Gerber-Shiu 函数），可以导出指数索赔下破产概率的精确解析表达式：

$$\psi(u) = \frac{1}{1 + \theta} \exp\left(-\frac{\theta u}{\mu(1 + \theta)}\right). \quad (27)$$

值得注意的是， $\psi(0) = 1/(1 + \theta) < 1$ ——即使没有初始资本，保险公司仍有正概率存活。这反映了泊松过程的性质：在破产发生前可能有幸“拖欠”了早期的索赔。随着 u 增加， $\psi(u)$ 以指数速率衰减，其指数系数正是调整系数 R ——验证了 Lundberg 上界的指数衰减速率是最优的（对于指数索赔而言甚至是紧的，即 Lundberg 上界恰等于精确解，因 $1/(1 + \theta) < 1$ 且 $\exp(-Ru) > \frac{1}{1 + \theta} \exp(-Ru)$ ；精确解与上界之间相差一个常数因子 $1/(1 + \theta)$ ）。

3.3 数值实验设计与参数设置

实验设置索赔强度 $\lambda = 1$ ，索赔额服从指数分布 $Y \sim \text{Exp}(1)$ ($\mu = 1$)，安全负荷 $\theta = 0.2$ ($c = 1.2$)。调整系数为 $R = \theta/(1 + \theta) = 0.166667$ 。对每个初始资本 $u \in \{0, 1, \dots, 20\}$ 模拟 $M = 50000$ 条独立路径，每条路径模拟至时间 $T = 100$ 或触犯破产线。因此 Monte Carlo 估计的是有限时窗破产概率 $\mathbb{P}(\tau \leq 100)$ ，它是最终破产概率 $\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty)$ 的下界。本文同时绘制指数索赔下的精确最终破产概率，用于区分有限时窗模拟误差与解析极限。

3.4 结果与讨论

图 4 展示了 15 条代表性的盈余轨迹。每条路径呈现“线性上升 + 偶发跳跃”的特征：保费收入推动盈余以速率 $c = 1.2$ 匀速增长，而随机到达的索赔（期望值 $\mathbb{E}[Y] = 1$ ）不时将其下拉。在 15 条展示路径中有 3 条最终破产（红色 × 标记）。所有破产路径的共同特征是：在

破产前经历了一连串密集且（或）大额的索赔，超过了线性保费收入的补偿能力。存活路径（灰色）则可以看到盈余在初始波动后稳定增长——安全负荷的长期效果使它们的期望盈余持续增加。

图 5 以半对数坐标展示了破产概率随初始资本的变化。 y 轴为对数刻度，因此指数衰减关系表现为近似直线。三条曲线/数据分别为：（1）有限时窗 Monte Carlo 估计（蓝色圆点 + 95% 置信区间， $T = 100$ ）；（2）最终破产概率的精确解（红色实线，式 (27)）；（3）Lundberg 上界（橙色虚线， e^{-Ru} ）。在 u 较小的区域，破产通常较早发生，有限时窗估计与精确解吻合较好；当 u 增大时，部分破产路径会在 $T = 100$ 之后才发生，因此蓝色点系统性低于红色精确曲线。这不是 OST 或 Lundberg 上界的失败，而是有限模拟时窗对最终破产概率的右删失效应。若要用纯 Monte Carlo 逼近 $\psi(u)$ ，需要显著增加模拟时长或使用重要性抽样等方差缩减方法。

Lundberg 上界（橙色虚线）确实始终位于 Monte Carlo 估计和精确解之上，验证了指数鞅构造和 OST 推导的正确性。同时注意到上界与精确解之间存在一个近乎恒定的垂直距离（在半对数图中对应常数比值 $1/(1 + \theta) = 0.8333$ ），这反映了单边停时下 OST 只能给不等式而非等式的技术限制。

图 6 通过一条具体路径展示了盈余过程 U_t 与对应指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ 的关系。这条路径幸运地没有破产，可以看到 U_t 随时间平均上升（正向漂移使 $\mathbb{E}[U_t] = u + 0.2t$ ），但 M_t 作为一个真正的鞅，没有明显的趋势——它围绕初始值 e^{-Ru} 上下波动。在没有破产的时段内， M_t 的行为确实呈现鞅的特征：无漂移、无明显趋势、通过条件期望约束在未来价值的预期上。




图 4. Cramér-Lundberg 盈余过程轨迹 ($\theta = 0.2$, $u = 5$, $T = 50$)。红色路径为最终破产的样本 (3/15)，标记 × 指示破产时刻。灰色路径为存活样本。水平虚线 $U = 0$ 为破产线。




图 5. 破产概率的半对数图。Monte Carlo 估计（蓝色圆点， $M = 50000$ ， $T = 100$ ）对应有限时窗破产概率；红色实线为指数索赔下最终破产概率的精确解（式 (27)）。Lundberg 上界（橙色虚线）始终位于精确解之上，且在半对数图中与精确解保持近似恒定的垂直距离，反映了因子 $1/(1 + \theta)$ 。




图 6. 同一路径的盈余过程与对应指数鞅（ $R = 0.1667$ ）。上子图：盈余 U_t 随时间平均上升（正向漂移 $c - \lambda\mu = 0.2$ ）。下子图：指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ ，无趋势，围绕初始值波动——展示了指数变换如何将一个带有漂移的过程转化为鞅。

4. 赌徒破产中 OST 的条件失效

4.1 背景介绍

赌徒破产问题是概率论中最古老的随机过程模型之一，其历史可追溯至 Pascal 和 Fermat 关于赌博问题的通信。从现代鞅论的角度看，它是研究 OST 的天然试验场：过程是简单的对称随机游走（最经典的鞅），停时是首次吸收边界，且可以通过选择单边或双边边界来切换 OST 是否成立。

考虑赌徒甲初始资金为 a 元，赌徒乙初始资金为 b 元。每局甲以概率 p 赢 1 元，以概率 $q = 1 - p$ 输 1 元。令 S_n 为甲在前 n 局后的净赢额（ $S_0 = 0$ ），即 $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$ ，其中 $\xi_i = \pm 1$ 。当 $p = 1/2$ 时， $\{S_n\}$ 是一个鞅；当 $p \neq 1/2$ 时， $\{S_n\}$ 不是鞅，但可以构造 Wald 鞅 $W_n = (q/p)^{S_n}$ 或补偿鞅 $S_n - (2p - 1)n$ 。

本文第四章聚焦于 $p = 1/2$ （即公平赌博）的情况。此时 OST 成立与否完全取决于停时的选择。

4.2 理论分析

情形 A：双边障碍——OST 完美成立

定义停时 $\tau_{\text{two}} = \inf\{n : S_n = -a \text{ 或 } S_n = +b\}$ （甲输光或乙输光）。由于 τ_{two} 是双边首次出时， $S_{n \wedge \tau_{\text{two}}}$ 始终被约束在 $[-a, b]$ 之内，故 $|S_{n \wedge \tau_{\text{two}}}| \leq \max(a, b)$ 。OST 的条件 2（被停过程有界）满足。此外，随机游走在有限区间内的首次出时具有有限的期望值， $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$ 。因此 OST 无条件成立， $\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}}}] = \mathbb{E}[S_0] = 0$ ，即

$$-a \cdot \mathbb{P}(S_{\tau_{\text{two}}} = -a) + b \cdot \mathbb{P}(S_{\tau_{\text{two}}} = +b) = 0. \quad (28)$$

解之得甲的输光概率和乙的输光概率分别为

$$P_a = \frac{b}{a+b}, \quad P_b = \frac{a}{a+b}. \quad (29)$$

这就是经典的赌徒破产公式：甲的破产概率等于乙的初始资金占总资金的比例。

进一步，利用 $\{S_n^2 - n\}$ 也是鞅（教材例 6.3.2），类似地应用 OST 可得

$$\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] = ab. \quad (30)$$

例如，两人各有 10 元时，平均需要 100 局才有一方输光。

情形 B：单边障碍——OST 的三个条件全部失效

现在定义停时 $\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +b\}$ ——甲停手不赌了，乙有无限资本。这是单边首次达时。一维随机游走的常返性保证 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然（即甲最终一定会赢到 b 元），然而：

1. **停时无界**：对任意 K ， $\mathbb{P}(\tau_{\text{one}} > K) > 0$ 。游走可以在碰到 $+b$ 之前在负半轴逗留任意长的时间。
2. **过程在停时前无（下）界**：在 τ_{one} 之前， S_n 可以取任意大的负值——游走可以先去到 $-1, -10, -100$ ，再折返碰到 $+b$ 。
3. **停时期望无限**： $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ 。原因见下面的尾部分析。

条件 1、2、3 全部不成立。相应地，OST 失效：

$$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] = b \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]. \quad (31)$$

一致可积性的缺失

OST 失效的深层数学原因在于被停过程 $\{S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}\}$ 不是一致可积的。回顾一致可积性的定义：一族随机变量 $\{X_\alpha\}$ 是一致可积的，若

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{\alpha} \mathbb{E}[|X_\alpha| \cdot \mathbf{1}_{\{|X_\alpha| > M\}}] = 0. \quad (32)$$

对于 $\{S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}\}$ ，虽然 $\tau_{\text{one}} < \infty$ a.s.，但那些在 $\tau_{\text{one}} > n$ 条件下的路径上 S_n 可能取到非常大的负值。具体来说， $\mathbb{E}[S_n^- | \tau_{\text{one}} > n]$ 随 n 增长而增大，使得对于任意的 M ，始终存在某个 n 使 $\mathbb{E}[|S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}| \mathbf{1}_{\{|S_{n \wedge \tau_{\text{one}}| > M\}}]$ 不可忽略。一致可积性的缺失导致极限与期望的交换不合法：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}] = 0 \quad (\text{每个有限 } n \text{ 的 OST 成立}), \quad (33)$$

但

$$\mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}\right] = \mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] = b \neq 0. \quad (34)$$

停时分布的尾部行为

双边停时和单边停时的尾部行为有本质区别。对于双边障碍 $[-a, b]$ ，由生灭链的谱理论知 $\mathbb{P}(\tau_{\text{two}} > n)$ 以指数速率衰减（因为状态空间有限，转移矩阵的次大特征值严格小于 1）。指数衰减意味着所有阶矩有限，特别地 $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$ 。

对于单边障碍 $\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +b\}$ ，由随机游走理论可得（当 $b = 1$ 时）

$$\mathbb{P}(\tau_{\text{one}} > n) \sim \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi n}}, \quad n \rightarrow \infty. \quad (35)$$

这是一个以 $n^{-1/2}$ 速率衰减的重尾分布，其积分 $\int_0^\infty \mathbb{P}(\tau > t) dt$ 发散，因此 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ 。重尾性使得“绝大多数”路径会在相对较短的时间内碰到 $+b$ ，但极少数“顽固”路径（游走先大幅下跌再缓慢回升）贡献了无穷的期望——这是期望与中位数之间存在巨大差异的典型示例。

截断停时与不可交换极限

为展示 OST 失效的精确机制，引入截断停时 $\tau_N = \min(\tau_{\text{one}}, N)$ 。对任意固定的 N ， τ_N 有界（ $\leq N$ ），OST 的条件 1 满足，因此

$$\mathbb{E}[S_{\tau_N}] = \mathbb{E}[S_0] = 0, \quad \forall N < \infty. \quad (36)$$

另一方面，由于 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然成立，随机变量序列逐点收敛：

$$S_{\tau_N} = S_{\tau_{\text{one}} \wedge N} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{a.s.} S_{\tau_{\text{one}}} = b. \quad (37)$$

于是出现了 OST 反例最核心的现象：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}[S_{\tau_N}] = 0, \quad \mathbb{E}\left[\lim_{N \rightarrow \infty} S_{\tau_N}\right] = b. \quad (38)$$

二者不相等，说明 $\{S_{\tau_N}\}_{N \geq 1}$ 不是一致可积的。直观地看，在大多数已经命中 $+b$ 的路径上， $S_{\tau_N} = b$ ；但少数尚未命中的路径可能位于很深的负半轴，其负值贡献恰好抵消前者，使每个固定 N 的期望仍为 0。随着 N 增大，这些负值路径越来越少但也越来越极端，导致 Monte Carlo 估计方差增大，有限样本很难稳定观察到理论均值。

4.3 数值实验设计与参数设置

设置 $a = b = 10$ （双方各有 10 元初始资金）。为了对比双边和单边停时的收敛行为，对不同的 Monte Carlo 路径数 $M \in \{10^2, 10^3, \dots, 10^4\}$ （对数均匀分布），各重复 3 次独立实验估计 $\mathbb{E}[S_\tau]$ 。单边自然停时实验只记录在模拟上限内已经命中 $+b$ 的路径；这些路径的停时值均为 $S_\tau = b$ ，未命中路径的比例由尾部实验单独解释。对于截断序列实验，将单边停时 τ_{one} 截断在不同的 N 值（对数均匀分布于 10^1 至 10^5 ），每级用 1000 条路径估计 S_{τ_N} 的样本均值。对于尾部实验，用 5000 条路径（最大步数 5000）估计双边和单边停时的生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$ 。

4.4 结果与讨论

图 7 是本章最核心的实验结果。横轴为 Monte Carlo 路径数 M （对数刻度），纵轴为 $\mathbb{E}[S_\tau]$ 的估计值（带 95% CI）。蓝色曲线（双边障碍 τ_{two} ）快速收敛至水平虚线 $\mathbb{E}[S_\tau] = 0$ （OST 预测），且置信区间随 M 增大而缩小——这是典型的 Monte Carlo 收敛行为。红色曲线（单边障碍 τ_{one} ）则完全不同：凡是命中 $+b$ 的自然停时路径都有 $S_\tau = b = 10$ ，估计值稳定地落在 10 附近，而不是 0。注意蓝色曲线收敛到 0 并非偶然，它被 OST 精确预测；红色曲线则说明自然单边停时下 $\mathbb{E}[S_\tau] = b \neq 0$ ，OST 不能直接应用。

图 8 展示了截断序列的数值行为。横轴为截断值 N （对数刻度），纵轴为 $S_{\tau \wedge N}$ 的样本均值。灰色水平线标出理论事实 $\mathbb{E}[S_{\tau \wedge N}] = 0$ （对每个固定 N 成立），红色虚线标出几乎处处极限 $S_\tau = b = 10$ 。模拟点没有稳定地趋向红线，而是在 0 附近出现越来越宽的置信区间，这

正是式 (38) 的数值表现：几乎处处收敛并不保证期望收敛。对大 N ，少数未命中路径携带极大的负值，显著放大样本方差；若有限样本没有充分覆盖这些极端路径，样本均值会出现明显波动。

图 9 以双对数坐标展示了两种停时分布的尾部。双边停时 τ_{two} （蓝色）快速衰减，反映有限区间首出时的轻尾性质，故 $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$ 。单边停时 τ_{one} （红色）在对数-对数坐标下呈现缓慢的近似线性衰减，与参考线 $Ct^{-1/2}$ （灰色虚线）平行——这是重尾衰减的特征签名。这里常数 C 与上障碍 b 有关，因此图中只强调斜率 $-1/2$ 。这一重尾性直接导致 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ ，而 $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 是 OST 三个充分条件之一。因此图 9 从微观层面解释了图 7 中 OST 失效的根本机理。




图 7. 双边停时与单边自然停时的 $\mathbb{E}[S_\tau]$ Monte Carlo 估计对比。双边（蓝色）快速收敛至 OST 预测值 0（虚线）；单边（红色）命中 $+b$ 后恒有 $S_\tau = b = 10$ ，因此不可能收敛到 0。




图 8. 截断序列与不可交换极限。对每个固定 N ，OST 给出 $\mathbb{E}[S_{\tau \wedge N}] = 0$ （灰色线）；但随机变量本身几乎处处收敛到 $S_\tau = b = 10$ （红色虚线）。样本均值在大 N 下方差显著增大，说明一致可积性缺失时不能将极限与期望交换。




图 9. 停时生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$ 的双对数图。双边停时为轻尾， $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ ；单边停时呈 $Ct^{-1/2}$ 型重尾， $\mathbb{E}[\tau] = \infty$ 。重尾性是 OST 条件 3 失效的微观原因。

5. 最优停时与 Snell 包络：秘书问题

5.1 背景介绍

前三章讨论了 OST 在给定鞅过程和一个固定的停时规则下的表现——第二章展示了 OST 完美成立的情况，第三章展示了如何构造辅助鞅来应用 OST，第四章展示了 OST 三个充分条件全部失效时的反例行为。这些都属于 OST 的描述性应用：给定鞅和停时，OST 告诉我们 $\mathbb{E}[X_\tau]$ 等于（或不等） $\mathbb{E}[X_0]$ 。

然而，概率论中还有一类与此对偶的问题：如果可以自己选择停时以最大化某个期望收益，最优策略是什么？这就是最优停时（optimal stopping）问题。其中秘书问题是最优雅的经典例子： N 个候选人依次面试，每次面试后必须立即决定录用此人并结束面试，或拒绝此人（不可回头）继续面试。目标为最大化录用到最优（排名第 1）候选人的概率。

该问题的最优策略具有简洁的形式：前 $r-1$ 个候选人仅用于建立基准，之后一旦遇到一个比之前所有人都好的候选人（称为“纪录保持者”，record），立即录用。当 $N \rightarrow \infty$ 时，最优 $r^* \approx N/e$ ，成功概率 $\approx 1/e \approx 36.8\%$ 。这被称为“37% 法则”。

一个自然的问题是：能否用 OST 来研究这个最优停时问题？答案是不能——秘书问题的核心过程不是鞅。但这一“不能”本身构成了本章的研究动因。

5.2 理论分析

“纪录指示过程”不是鞅

令 $I_n = 1$ 表示第 n 个候选人是前 n 个中最好的（即是一个 record）， $I_n = 0$ 否则。候选人的到达顺序是 $1, 2, \dots, N$ 的一个随机排列，等概率 $1/N!$ 。由对称性，第

n 个候选人在前 n 个中排第一的概率为 $1/n$ ，即 $\mathbb{P}(I_n = 1) = 1/n$ 。此外，不同位置上的纪录事件是独立的¹：

$$\mathbb{P}(I_{n+1} = 1 \mid I_1, \dots, I_n) = \mathbb{P}(I_{n+1} = 1) = \frac{1}{n+1}. \quad (39)$$

条件期望 $\mathbb{E}[I_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = 1/(n+1)$ 是常数（不依赖于 $\mathcal{F}_n$ ），而 I_n 要么是 0 要么是 1，绝不等于常数 $1/(n+1)$ ，故 $\{I_n\}$ 不是鞅。更准确地说， I_n 构成一个独立但非同分布的 Bernoulli 序列，其均值 $\mathbb{E}[I_n] = 1/n$ 随 n 衰减。这意味着信息是有价值的：越早的候选人越不可能是 record（因为比较集合小），越晚的候选人越可能是 record（但此时后悔已经来不及了）。正是这种“信息衰减”赋予了最优停时以非平凡的结构——OST 告诉我们“如果是鞅，任何停时都改变不了期望”，秘书问题之所以有非零的优化空间（37% 远高于随机选的 $1/N$ ），恰恰因为其核心过程逃脱了 OST 的约束。

Snell 包络——最优停时的统一框架

尽管 $\{I_n\}$ 不是鞅，最优停时问题仍然可以通过鞅论的延伸工具——**Snell 包络** [1]——来统一刻画。对于带有收益函数 g 的最优停时问题 $\sup_{\tau} \mathbb{E}[g(X_{\tau})]$ ，定义**值函数**

$$V_n = \operatorname{ess\,sup}_{\tau \geq n} \mathbb{E}[g(X_{\tau}) \mid \mathcal{F}_n], \quad (40)$$

其中 supremum 取遍所有满足 $\tau \geq n$ 的停时。 V_n 表示‘在时刻 n 尚未停止的前提下，从 n 开始采用最优策略能获得的最大期望收益’。Snell 包络具有以下核心性质：

1. **上鞅性**： $\{V_n\}$ 是使得 $V_n \geq g(X_n)$ 成立的最小 $\{\mathcal{F}_n\}$ -上鞅。这在直观上是合理的——等待的期望价值不可能一直增长，必须受到某种“贴现”。
2. **最优停时的刻画**：最优停时就是 Snell 包络首次触及收益函数的时刻，

$$\tau^* = \inf\{n : V_n = g(X_n)\}. \quad (41)$$

即在 τ^* 之前 $V_n > g(X_n)$ （继续等待严格更好），在 τ^* 处 $V_n = g(X_n)$ （立即停止与继续等待无差异）。

3. **Doob 分解**：由 Doob-Meyer 定理，上鞅可唯一分解为 $V_n = M_n - A_n$ ，其中 $\{M_n\}$ 为鞅， $\{A_n\}$ 为可料增过程（ $A_0 = 0$ ）。增过程 A_n 恰好衡量了“等待的时间成本”——随着时间的流逝，剩余的时间越来越少，最优期望收益逐渐被蚕食。最优策略在 A_n 的变化速率超过某个阈值之前停止。

¹这是随机排列中“纪录值”的经典结论：设 σ 为 $\{1, \dots, N\}$ 的均匀随机排列，则 $\mathbf{1}_{\sigma(k)=\min_{1 \leq i \leq k} \sigma(i)}$ 相互独立。

秘书问题的 Snell 包络

对于秘书问题，以下使用 $n = 1, \dots, N$ 表示候选人的到达序号。若第 n 个候选人是 record，则其成为全局最优的条件概率为

$$g_n = \mathbb{P}(\text{第 } n \text{ 个候选人为全局最优} \mid \text{它是 record}) = \frac{n}{N}; \quad (42)$$

若它不是 record，则立即录用必然失败。精确的 Snell 包络可通过逆向递推计算：设 V_n 为第 n 个候选人是 record 时的最优条件成功概率。从 $n = N$ 向前递推：

$$V_N = 1 \quad (\text{最后一个候选人若为 record，则必为全局最优}), \quad (43)$$

$$V_n = \max \left\{ g_n, \sum_{k=n+1}^N \mathbb{P}(\text{下一个 record 在 } k) V_k \right\}. \quad (44)$$

下一个 record 出现在位置 k ($k > n$) 的概率为 $\frac{n}{k(k-1)}$ ²，故

$$V_n = \max \left\{ \frac{n}{N}, \sum_{k=n+1}^N \frac{n}{k(k-1)} V_k \right\}. \quad (45)$$

最优停止区域为使得 $\frac{n}{N} \geq \sum_{k=n+1}^N \frac{n}{k(k-1)} V_k$ 的第一个 n ——即“立即录用”的收益第一次大于或等于“继续等待”的期望收益。可以解析证明，当 $N \rightarrow \infty$ 时，这一阈值趋近于 $\lceil N/e \rceil$ 。

OST 为什么不冲突

现在可以清晰地看出 OST 与秘书问题的关系。OST 说：如果一个过程是鞅，那么任意停时下 $\mathbb{E}[X_{\tau}] = \mathbb{E}[X_0]$ 。秘书问题中的过程不是鞅，所以 OST 没有做出任何断言。OST 的约束力体现在它的“反面”上——在对照组实验中，我们用零均值正态噪声（一个真正的鞅序列）取代相对排名，同样的“前 r 期观察然后停止”策略下，成功率始终接近 $1/N$ ，与 r 无关。这正是 OST 的威力：当过程确实是鞅时，任何停时规则都会被 OST“锁死”在零期望收益上。秘书问题之所以有价值，是因为其过程不在 OST 的管辖范围内。

²推导： k 是 record 且 $n+1, \dots, k-1$ 都不是 record。 $\mathbb{P}(I_k = 1) \cdot \prod_{j=n+1}^{k-1} \mathbb{P}(I_j = 0) = 1/k \cdot \prod_{j=n+1}^{k-1} (1 - 1/j) = n/(k(k-1))$ 。

5.3 数值实验设计与参数设置

实验设置 $N \in \{20, 50, 100, 200\}$ ，对每个 N 扫描 $r/N \in (0, 1)$ 共 50 个取值点，每个点模拟 5000 次独立试验估计成功率。对于 Snell 包络可视化的实验，精确计算 $N = 20$ 时的 V_n （通过式 (45) 递推）。对照组实验用标准正态噪声序列替代相对排名，采用相同的策略观察成功率与 r/N 的关系。

5.4 结果与讨论

图 10 展示了四个 N 值下成功率随观察比例 r/N 的变化曲线。每条曲线呈现鲜明的单峰形态： r 太小时观察样本不足，基准太低，容易过早录用到不是全局最优的候选人（方差过大）； r 太大时则剩余的选择太少，可能已经错过了最优候选人。最优 r^*/N 出现在 0.35–0.39 区间，随 N 增大逐步趋近 $1/e \approx 0.368$ 。最大成功率也从 $N = 20$ 时的 ~ 0.39 逐渐接近 $1/e \approx 0.368$ 。Monte Carlo 散点与 $N \rightarrow \infty$ 时的理论极限曲线高度吻合。值得注意的一个细节是， $N = 20$ 时的最优成功率略高于 $1/e$ ——这是因为有限 N 下最优策略的收益通常略高于渐近极限（小 N 时信息更集中）。

图 11 展示了 $N = 20$ 时精确计算的条件值函数 V_n （蓝色实线）与即时 payoff $g(n)$ （红色虚线）。这里的 V_n 表示“当前候选人已经是 record 时”的最优条件成功概率；因此它在阈值前由继续等待价值支配，约为 0.384，在阈值后与即时收益重合并随序号上升。两条曲线的首次交汇对应阈值 $r^* = 7$ ：先观察前 7 位候选人，之后从第 8 位开始，一旦当前候选人是 record 就立即录用。 $7/20 = 0.35$ ，接近 $1/e$ 。




图 10. 秘书问题成功率与观察比例 r/N 的关系。散点为 Monte Carlo 估计（每种 N 各 5000 次试验）。实线为 $N \rightarrow \infty$ 时的理论曲线。灰色竖虚线标记最优观察比例 $r^*/N = 1/e$ ，灰色水平虚线标记最优成功率极限 $1/e$ 。




图 11. Snell 包络条件值 V_n 与即时 payoff $g(n)$ 的对比 ($N = 20$)。阈值前继续等待价值高于即时收益；阈值 $r^* = 7$ 之后两者重合，表示一旦遇到 record（历史最优）就应立即停止。 $7/20 = 0.35 \approx 1/e$ 。

图 12 直接将秘书问题与鞅对照组并列对比，构成了本章的“核心信息图”。蓝色数据来自经典的秘书问题 ($N = 100$)，呈现熟悉的单峰曲线，最优成功率接近 $1/e$ 。红色方格数据来自对照组——将候选人相对排名替换为零均值独立正态噪声，采用完全相同的策略（“前 r 个观察，之后选第一个超过基准的”）。在鞅信号下，成功率恒为 $1/N = 0.01$ （红色虚线），与 r 完全无关。这正是 OST 的“反面”体现：当底层过程是鞅时，任何停时规则下期望收益等于初始期望——噪声序列的“全局最优”出现在每个位置的概率均等，所以无论用什么策略，选到全局最优的概率恒为 $1/N$ 。秘书问题之所以有意义，恰因为其过程不在此列。




图 12. 秘书问题与鞅对照组的直接对比 ($N = 100$)。秘书问题（蓝色）：成功率呈现非平凡的 r 依赖性，存在最优观察比例，最大成功率 $\approx 1/e$ 。鞅噪声对照组（红色）：成功率恒为 $1/N$ （红色虚线），与 r 完全无关——OST 的“反面”含义：当过程是鞅时，任何停时策略都无法改变期望。

6. 美式期权定价与 Longstaff-Schwartz 算法

6.1 背景介绍

期权定价是金融数学的核心问题,而其数学本质——特别是在美式期权中——是一个最优停时问题。欧式看跌期权给予持有者在到期日 T 以执行价 K 卖出标的资产的权利,其 payoff 为 $\max(K - S_T, 0)$ 。美式看跌期权则赋予持有者在到期前任意时刻行权的权利,因此其价值必然不低于欧式期权。多出来的这部分价值正是提前行权溢价——即最优停时策略相对于固定行权时间的额外收益。

在风险中性定价框架下,美式期权价格由以下最优停时问题给出 [3]:

$$V_0 = \sup_{\tau \in [0, T]} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r\tau} g(S_\tau)], \quad (46)$$

其中 $g(s) = \max(K - s, 0)$ 为看跌期权的 payoff 函数, $\mathbb{Q}$ 为风险中性测度,在 $\mathbb{Q}$ 下标的资产价格服从几何布朗运动:

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t. \quad (47)$$

与秘书问题的离散有限状态空间不同,美式期权的状态空间是连续的且决策时间也是连续的(实践中可离散化为有限个时间步)。这使得 Snell 包络的递推计算无法通过简单的有限状态求和完成,需要借助 Monte Carlo 模拟和回归技术。Longstaff 和 Schwartz 于 2001 年提出的算法 [3] (简称 LSM) 正是解决这一问题的经典方法。

6.2 理论分析

Snell 包络与行权边界

将时间 $[0, T]$ 离散为 N 步,步长 $\Delta t = T/N$ 。在离散时间下,美式期权的 Snell 包络递推为

$$V_n(S_n) = \max \left\{ g(S_n), e^{-r\Delta t} \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{n+1}(S_{n+1}) | S_n] \right\}, \quad (48)$$

其中 $V_N(s) = g(s)$ (到期日只能行权或作废)。 $e^{-r\Delta t} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{n+1} | S_n]$ 称为 continuation value (继续持有的折现期望价值)。折现过程 $\{e^{-rn\Delta t} V_n\}$ 是 $\mathbb{Q}$ -上鞅——这是 OST 的核心推广:上鞅的停止定理保证任意停时下的期望不超过初始值,支持了“延续区域中等价,停止区域内行权”的最优决策。

最优行权策略由一个停时边界 $S^*(t)$ 完全刻画:当 $S_t \leq S^*(t)$ 时 (即期权深度 in-the-money), 立即行权;当 $S_t > S^*(t)$ 时,继续持有。这一边界将 (t, S) 平面划分为停时区域和延续区域。

Longstaff-Schwartz 算法

LSM 算法的核心创新在于用最小二乘回归估计 continuation value。算法流程如下:

1. **前向模拟**: 生成 M 条独立的股价路径 $\{S_n^{(i)}\}_{n=0}^N$, $i = 1, \dots, M$ 。由于几何布朗运动有显式解,本文使用保持正性的对数正态精确离散化:

$$S_{n+1}^{(i)} = S_n^{(i)} \exp \left\{ \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_n^{(i)} \right\}, \quad Z_n^{(i)} \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1). \quad (49)$$

2. **倒向递推**: 初始化每条路径的候选现金流为到期收益,并令候选行权时刻 $\tau^{(i)} = N$ 。随后从 $n = N - 1$ 倒推至 $n = 1$:

- (a) 筛选价内路径: 保留 $g(S_n^{(i)}) > 0$ 的路径索引集合 $\mathcal{J}_n$ 。

- (b) 将每条路径当前记录的的未来现金流折现回 n 时刻:

$$Y^{(i)} = e^{-r(\tau^{(i)} - n)\Delta t} g(S_{\tau^{(i)}}^{(i)}), \quad i \in \mathcal{J}_n. \quad (50)$$

- (c) 以当前股价 $X^{(i)} = S_n^{(i)}$ ($i \in \mathcal{J}_n$) 为自变量, $Y^{(i)}$ 为因变量,做多项式回归 (本文使用二阶多项式 $\beta_0 + \beta_1 S + \beta_2 S^2$):

$$\hat{C}(s) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 s + \hat{\beta}_2 s^2. \quad (51)$$

回归系数 $\hat{\beta}$ 通过普通最小二乘法获得。

- (d) 比较: 若 $g(S_n^{(i)}) > \hat{C}(S_n^{(i)})$, 则把该路径的候选行权时刻更新为 $\tau^{(i)} = n$, 现金流更新为 $g(S_n^{(i)})$; 否则保留原未来行权时刻和现金流。

3. **定价**: 美式期权价格的 Monte Carlo 估计为

$$\hat{V}_0 = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e^{-r\tau^{(i)}\Delta t} \cdot g(S_{\tau^{(i)}}^{(i)}), \quad (52)$$

其中 $\tau^{(i)}$ 为第 i 条路径上 LSM 算法判定的最优停时指数。

回归基函数的选择是 LSM 算法的关键设计决策。Longstaff 和 Schwartz 的原始论文指出,仅需少数几个基函数 (如常数项、 S 、 S^2) 就能给出良好的近似,因为继续持有价值作为 S 的函数通常较光滑 (它与 Black-Scholes 偏微分方程相联系)。本文采用二阶多项式作为基函数。

OST 在 LSM 中的结构性角色需要特别阐明: OST 并不直接用于导出美式期权的定价公式,但它是整个 Snell 包络理论合法性的基石。由递推定义可得

$$V_n \geq e^{-r\Delta t} \mathbb{E}[V_{n+1} | \mathcal{F}_n], \quad (53)$$

因此折现 Snell 包络 $\{e^{-r\Delta t} V_n\}$ 是一个上鞅。上鞅的停止定理保证任意停时的折现期望不超过初始值,这正是“比较继续持有价值和立即行权收益”这一决策逻辑的数学依据。

6.3 数值实验设计与参数设置

实验参数设置如下: 初始股价 $S_0 \in [36, 44]$ (17 个取值), 执行价 $K = 40$, 无风险利率 $r = 6\%$, 波动率 $\sigma = 20\%$, 到期时间 $T = 1$ 年, 时间步数 $N = 50$ (步长 $\Delta t = 0.02$), 模拟路径数 $M = 30000$, 随机种子 42。欧式看跌期权的基准价格由 Black-Scholes 公式直接计算:

$$P_{\text{Eur}} = Ke^{-rT} \Phi(-d_2) - S_0 \Phi(-d_1), \quad (54)$$

其中 $d_{1,2} = [\ln(S_0/K) + (r \pm \sigma^2/2)T]/(\sigma\sqrt{T})$, Φ 为标准正态分布函数。

6.4 结果与讨论

图 13 展示了 15 条几何布朗运动股价路径及 LSM 算法判定的行权时刻。红色圆点表示提前行权, 橙色三角表示到期行权; 若到期时仍为价外, 则没有 payoff, 图中不额外标记。可以看到, 提前行权集中在股价显著低于执行价 $K = 40$ 的区域 (即深度 in-the-money), 此时继续等待的时间价值可能小于立即锁定收益的价值。这一区分也说明, 美式期权的价值不仅来自到期 payoff, 还来自可在路径中途选择停止的权利。

图 14 以热力图的形式展示了 (t, S) 平面上各位置被 LSM 算法判定为“立即行权”的经验频率。颜色越亮表示行权概率越高, 白色等值线标记约 50% 的行权边界。可以清晰地看到一条分界带: 在股价较低的区域 (大约 $S \lesssim 34-36$), 行权概率高; 在股价较高的区域, 行权概率低。这条分界线并非垂直的——它在靠近到期日 ($t \rightarrow 1$) 时上移, 意味着越接近到期日, 持有者越愿意在相对高的股价水平行权 (因为剩下的时间价值已经有限)。

图 15 比较了美式 (LSM Monte Carlo) 和欧式 (Black-Scholes 公式) 看跌期权的价格随初始股价的变化。三条线/数据分别为: (1) 美式 LSM 价格 (蓝色圆点 + 95% CI) —— 30000 条路径的估计结果, 置信区间极窄, 表明 Monte Carlo 精度很高; (2) 欧式 Black-Scholes 价格 (红

色实线); (3) 立即行权 payoff $\max(K - S_0, 0)$ (灰色虚线) —— 期权内在价值的下界。

美式期权价格在所有 S_0 取值下均不低于欧式期权价格——两者之差即为提前行权溢价 (early exercise premium)。在 deep in-the-money 区域 ($S_0 \leq 37$), 美式和欧式期权价格都接近 payoff 曲线, 因为此时几乎可以确定期权会在到期日被执行, 提前行权的额外价值相对较小。在 at-the-money 附近 ($S_0 \approx 40$), 美式期权的溢价最大 (约 2.32 vs 2.07, 溢价约 12%), 因为此时不确定性最高, 等待的选择权价值最大, 提前行权的灵活性也最有价值。在 deep out-of-the-money 区域 ($S_0 \geq 43$), 两者都趋近于零。




图 13. 几何布朗运动股价路径与 LSM 判定行权时刻 ($S_0 = 40, K = 40$)。红色圆点标记提前行权, 橙色三角标记到期行权; 到期价外且 payoff 为 0 的路径不额外标记。水平虚线为执行价 K 。




图 14. 美式看跌期权的行权概率热力图。颜色越亮表示该位置被 LSM 判定为立即行权的概率越高, 白色等值线对应约 50% 行权概率。股价低于约 34-36 时为停时区域, 高于此区间时为延续区域; 边界在靠近到期日 ($t \rightarrow 1$) 时向上弯曲, 因为剩余时间价值减少。




图 15. 美式 (LSM) 与欧式 (Black-Scholes) 看跌期权价格对比。蓝色圆点为 LSM Monte Carlo 估计 ($M = 30000$, $N = 50$), 误差棒极小 (95% CI)。红色实线为欧式 BS 公式。灰色虚线为立即行权 payoff。美式期权在所有 S_0 处均高于欧式期权, 差额即为提前行权溢价。

7. 总结与展望

7.1 各模型 OST 角色对比

本文通过 Monte Carlo 数值模拟方法, 系统研究了可选停止定理在五个不同随机过程模型中的表现。这五个模型不是孤立的, 而是构成了一个从“OST 完美成立”到“OST 完全不适用, 需更一般框架”的完整理论谱系。表 2 列出了各模型的对比。

7.2 OST 的理论谱系

从本文的五个模型中, 可提炼出一条 OST 从“描述”到“规范”的理论发展脉络:

第一层: OST 直接成立。 Moran 模型和双边赌徒破产中, 过程被停时前的边界严格约束, 过程有界性 (条件 2) 自动满足, OST 给出精确等式。数值模拟可直接验证这些等式。

第二层: OST 需构造辅助鞅后成立。 保险破产模型中 U_t 本身不是鞅 (有正的期望漂移), 但通过指数变换 e^{-RU_t} 构造了一个辅助鞅。OST 在辅助鞅上的应用导出了原始过程破产概率的上界——但由于停时是单边的, 这个上界无法收紧为等式 (除非对索赔分布做更强的假设)。

第三层: OST 的条件失效。 单边赌徒破产中, 三个充分条件全部不满足, OST 彻底失效。数值实验揭示了失效的本质——一致可积性的缺失——并从停时分布的重尾性 ($\sim n^{-1/2}$) 给出了微观解释。截断修正收敛极慢, 表明在实际应用中不能简单地“加一个截断”来解决 OST

失效的问题。

第四层: OST 不适用, 但框架延伸。 秘书问题和美式期权的最优停时问题需要的是“选择”停时而非“给定”停时。OST 本身在此不直接适用, 但 OST 的数学框架——Doob 分解、Snell 包络 (最小的支配上鞅)、Doob-Meyer 分解——是解决最优停时问题的基础语言。

7.3 数值方法的经验

Monte Carlo 模拟在本研究中展现了强大的能力, 但同时也揭示了其局限性:

1. 对于 OST 成立的情形 (第二章、第三章), Monte Carlo 能以适中的计算成本 (10^3 – 10^4 条路径) 给出与理论一致的高精度估计。
2. 对于 OST 失效的情形 (第四章单边停时), Monte Carlo 的收敛极慢——由于被估计量 ($E[S_\tau]$) 本身就处于“极限不存在”的边界状态, 增加路径数并不会显著改善估计精度。这实际上构成了 Monte Carlo 方法的一个警示性案例。
3. 对于小概率事件 (第三章大 u 下的破产概率), Monte Carlo 需要极大的路径数才能获得可靠估计, 这对于计算资源提出了很高要求。重要性抽样等方差缩减技术可能在此处有所帮助。

7.4 展望

后续研究可以从以下几个方向深入: (1) 为赌徒破产的截断偏误提供精确的收敛速率分析 ($\sim N^{-1/2}$), 将数值观察转化为严格的数学证明; (2) 在保险破产模型中引入更多索赔分布 (如 Pareto 厚尾分布), 考察 Lundberg 上界在厚尾情形下的紧度变化; (3) 将 LSM 算法推广至更高维度的美式期权 (如篮子期权), 验证 Snell 包络方法在高维情形下的适用性和计算效率; (4) 探索更现代的机器学习方法 (如神经网络回归替代多项式回归) 在最优停时问题中的表现。

表 2. 五个模型的 OST 角色对比

模型	底层过程	鞅的构造	OST 的角色	核心结论
Moran 模型	离散 Markov 链 X_n	X_n 自身是鞅	直接成立：过程有界 $\Rightarrow$ 条件 2 满足	$P(\text{固定}) = x_0/N$ (等式), $\mathbb{E}[\tau]$ 由三对角系统给出
保险破产	复合泊松盈余 U_t	$M_t = e^{-RU_t}$ (指数鞅)	构造后成立：单边停时 $\Rightarrow$ 只能得不等式上界	$\psi(u) \leq e^{-Ru}$, 指数索赔下 $\psi(u) = \frac{1}{1+\theta} \exp(-\frac{\theta u}{\mu(1+\theta)})$
赌徒破产	对称随机游走 S_n	S_n 自身是鞅	双边障碍：成立；单边障碍：三条条件全失效	双边： $\mathbb{E}[\tau] = ab$ ；单边： $\mathbb{E}[S_\tau] = b \neq 0$, 截断法修正收敛极慢
秘书问题	纪录指示过程 I_n	无—— I_n 不是鞅	OST 不适用，引入 Snell 包络	最优策略： $r^* \approx N/e$, $P_{\max} \approx 1/e$; Doob 分解 $V_n = M_n - A_n$
美式期权	几何布朗运动 S_t	折现 $e^{-rt}V_t$ 是上鞅	结构性保证：Snell 包络递推的合法性	LSM 算法： $\hat{V}_0 = \frac{1}{M} \sum e^{-r\tau^{(i)}} g(S_{\tau^{(i)}})$; 行权边界 $S^*(t)$

参考文献

- [1] David Williams. *Probability with Martingales*. Cambridge University Press, 1991.
- [2] 钱敏平 and 龚光鲁. 随机过程论 (第 3 版). 电子工业出版社, 2021.
- [3] Francis A. Longstaff and Eduardo S. Schwartz. Valuing american options by simulation: A simple least-squares approach. *The Review of Financial Studies*, 14(1):113–147, 2001.
- [4] P. A. P. Moran. Random processes in genetics. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 54(1):60–71, 1958.
- [5] Søren Asmussen and Hansjörg Albrecher. *Ruin Probabilities*. World Scientific, 2nd edition, 2010.