



Ficha de Identificação Botânica

Nome científico	<i>Acer buergerianum</i> Miq.	
Nome comum	Acer-tridente	
Ordem	Sapindales	
Família	Sapindaceae	

Características morfológicas	Ciclo anual
<p>Arbusto ou árvore de pequeno porte, até 10 m. Ritidoma que se destaca em escamas, mostrando diferentes tonalidades. Ramos ascendentes quando jovens e na maturidade mostram uma copa mais arredondada. Folha pequena trilobada, com 2.5-8 cm por 3.5-6.5 cm, muda a coloração no Outono. Possui pequenas flores verde-amareladas de 2 mm, pendentes. A sâmara de duas asas é o seu fruto, e alberga a semente com 4-7 mm. Espécie caducifólia.</p>	<p>Ciclo anual de Floração e Frutificação</p> 

Ecologia	Solos drenados e áreas soalheiras ou parcialmente ensombradas.
Origem	Espécie alóctone, proveniente da China, Coreia e Japão.
Distribuição	Austrália e América do Norte.

Utilizações	Ornamento de jardins.
Observações	Tolerante a poluição atmosférica. Pouco suscetível a pragas. Muito apreciado como bonsai. O seu nome foi escolhido para homenagear um botânico alemão do século XIX, Heinrich Buerger.

Referências Bibliográficas
<p>Metro Trees (s/d). <i>Acer buergerianum</i>. Disponível [online]: http://www.metrotrees.com.au/acer-buergerianum/ (Consultado a 12/12/2016).</p> <p>Speciality Trees (s/d). <i>Acer buergerianum</i> – Trident Maple. Disponível [online]: https://www.specialitytrees.com.au/library/acer/buergerianum (Consultado a 12/12/2016).</p> <p>Gilman E. & Watson D. (1993). <i>Acer buergerianum</i> – Trident Maple. US Forest Service / University of Florida. 3 pp. Disponível [online]: http://hort.ifas.ufl.edu/database/documents/pdf/tree_fact_sheets/acebuea.pdf (Consultado a 12/12/2016).</p>