



# Ficha de Identificação Botânica

<b>Nome científico</b>	<i>Arbutus unedo</i> L.	
<b>Nome comum</b>	Medronheiro	
<b>Ordem</b>	Ericales	
<b>Família</b>	Ericaceae	

Características morfológicas	Ciclo anual
Arbusto ou pequena árvore até 10 m, de copa densa e arredondada. Tronco geralmente curto, com ritidoma, inicialmente, vermelho e, mais tarde, retalhado e obscurecido por tiras pendentes castanhas. Folhas de dimensão 4-11 cm x 1,5-4 cm, oblongo – lanceoladas, serradas, glabras exceto na base, lustrosas e verde – escuras na página superior, mais claras na página inferior com nervura central saliente. O fruto é uma drupa 1-2 cm, amarela, passando a vermelha na maturação, verrugosa.	<p><b>Ciclo anual de Floração e Frutificação</b></p>  <p>Floração</p> <p>Frutificação</p>

<b>Ecologia</b>	Azinhais, sobreirais e bosques mistos, em precipícios e desfiladeiros fluviais. Solos rochosos, frescos ou profundos. Climas temperados.
<b>Origem</b>	Espécie autóctone, Sul da Europa e Norte de África
<b>Distribuição</b>	Europa, África, Irlanda. Em Portugal é espontânea em todo o país.

<b>Utilizações</b>	Produção de fruto. As folhas e o ritidoma contêm taninos úteis no curtimento de peles.
<b>Observações</b>	O fruto é muito utilizado na produção de licor.

Referências Bibliográficas
<p>Bingre P, Aguiar C, Espírito-Santo D, Arsénio P e Monteiro-Henriques T [Coord.s Cient.] (2007): Guia de Campo - As árvores e os arbustos de Portugal continental. 462 pp. in vol. IX de a Sande Silva J [Coord. Ed.] (2007): Coleção Árvores e Florestas de Portugal. Jornal Público/ Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento/ Liga para a Protecção da Natureza. Lisboa. 9 vols.</p> <p>Humphries C. J., Press J. R. &amp; Sutton D. A. (2005). Árvores de Portugal e Europa. Guia FAPAS, Fapas, Porto. 320 pp.</p>