



Ficha de Identificação Botânica

Nome científico	<i>Acer platanoides</i> L. var. Crimson King	
Nome comum	Bordo-da-noruega Crimson King	
Ordem	Sapindales	
Família	Sapindaceae	

Características morfológicas	Ciclo anual
<p>Árvore de porte médio, habitualmente mantém-se pelos 12 m, com copa abobadada e difusa. Ritidoma curto, liso, de cor cinzenta e com pequenas estrias. Ramos verdes-baço ou avermelhados, e nos raminhos observam-se gemas ovóides matizadas de vermelho. As folhas são bordô, com cerca de 10-15 cm, apresentam 5-7 lóbulos acuminados e providos de uma pequena quantidade de grandes dentes. Antes das folhas, surgem as pequenas flores amarelo-avermelhadas, unidas em panículas na extremidade dos ramos. O fruto são sâmaras duplas com 6-10 cm de largura, roxas, em que as suas asas formam um ângulo obtuso. Espécie caducifólia.</p>	<p>Ciclo anual de Floração e Frutificação</p> 

Ecologia	Bosques mistos. Zonas soalheiras ou parcialmente ensombradas. Tolerante à poluição urbana.
Origem	Espécie alóctone, de origem europeia.
Distribuição	Europa, América, Cáucaso e Oeste da Ásia.

Utilizações	Ornamento de parques, jardins e ruas.
Observações	Pouco suscetível a pragas.

Referências Bibliográficas

Missouri Botanical Garden (s/d). *Acer platanoides* 'Crimson King'. Disponível [online]: <http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=b975> (Consultado a 18/01/2017).