



Ficha de Identificação Botânica

Nome científico	<i>Acer platanoides</i> L.	
Nome comum	Bordo-da-noruega	
Ordem	Sapindales	
Família	Sapindaceae	

Características morfológicas	Ciclo anual
<p>Árvore que pode atingir os 30 m, com copa abobadada e difusa. Ritidoma curto, liso, de cor cinzenta e com pequenas estrias. Ramos verdes-baço ou avermelhados e nos raminhos observam-se gemas ovoides matizadas de vermelho. As folhas, com cerca de 10-15 cm, apresentam 5-7 lóbulos acuminados, providos de uma pequena quantidade de grandes dentes. De cor verde-brilhante na página superior, mais claras e com pelos nas axilas das nervuras na inferior. Providas com um pecíolo até 20 cm. Antes das folhas, surgem as pequenas flores amarelas, unidas em panículas na extremidade dos ramos. O fruto são sâmaras duplas com 6-10 cm de largura, amareladas, em que as suas asas formam um ângulo obtuso. Espécie caducifólia.</p>	<p>Ciclo anual de Floração e Frutificação</p>  <p>Floração Frutificação</p>

Ecologia	Bosques mistos, planícies ou montanha até 1100 m.
Origem	Espécie alóctone, de origem europeia.
Distribuição	Europa com exceção da zona Oeste, Cáucaso e Oeste da Ásia.

Utilizações	Ornamental em parques, jardins e ruas. A madeira é apreciada na carpintaria pela sua cor e dureza.
Observações	No seu género, é a espécie mais resistente a condições de encharcamento temporário.

Referências Bibliográficas
<p>Bingre P, Aguiar C, Espírito-Santo D, Arsénio P e Monteiro-Henriques T [Coord.s Cient.] (2007): Guia de Campo - As árvores e os arbustos de Portugal continental. 462 pp. in vol. IX dea Sande Silva J [Coord. Ed.] (2007): Colecção Árvores e Florestas de Portugal. Jornal Público/ Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento/ Liga para a Protecção da Natureza. Lisboa. 9 vols.</p> <p>Humphires C. J., Press J. R. & Sutton D. A. (2005). Árvores de Portugal e Europa. Guia FAPAS, Fapas, Porto. 320 pp.</p>