



Ficha de Identificação Botânica

Nome científico	<i>Acer rubrum</i> L.	
Nome comum	Ácer	
Ordem	Sapindales	
Família	Sapindaceae	

Características morfológicas	Ciclo anual
<p>Árvore de crescimento rápido até 25 m, apresentando uma copa irregular. Ritidoma cinzento, liso. Ramos ascendentes ou um pouco arqueados, raminhos finos e vermelhos. Folhas com cerca de 8-10 cm tanto na largura como comprimento, providas de 3-5 lóbulos. Verde escuras na página superior e verde-avermelhada na página inferior, ganhando por completo a tonalidade vermelha no Outono. O pecíolo é avermelhado. As flores femininas destacam-se das masculinas, são vermelhas e surgem antes da folha. Como frutos encontramos sâmaras duplas, vermelho-vivo, com cerca de 1 cm, em que as asas divergem num ângulo agudo. Espécie caducifólia.</p>	<p>Ciclo anual de Floração e Frutificação</p> 

Ecologia	Pouco adaptada a climas secos. Aprecia exposição solar total ou parcial. Dá preferência a solos húmidos e ricos em matéria orgânica, não resultando bem em solos calcários.
Origem	Espécie alóctone, originária do Este da América do Norte
Distribuição	América e Europa

Utilizações	Ornamental.
Observações	Espécie apreciada na condução em bonsai.

Referências Bibliográficas

Humphires C. J., Press J. R. & Sutton D. A. (2005). Árvores de Portugal e Europa. Guia FAPAS, Fapas, Porto. 320 pp.