

SKILL 03_BLS PEDIATRICO (> 1 anno di vita)

NOMINATIVO: _____ Associazione: _____ Data: _____

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE				
1. Valuta la scena	Scena sicura			
2. Chiama il paziente; Valuta presenza e qualità del respiro	NON risponde, NON respira (o respiro anormale compatibile con ACC)			
3. Posiziona la persona supina; Inizia o fa iniziare le CTE	Individua il punto corretto di compressione ed esegue CTE fino a DAE pronto (conta ad alta voce)			
4. Chiede DAE Allerta o fa allertare la SOREU	Comunica ACC all'equipe e alla SOREU			
5. Prepara il DAE e il torace	Scopre il torace quanto basta, rade e asciuga se necessario			
6. Accende il DAE e Applica gli elettrodi (non interrompendo CTE)	Accende il DAE applica gli elettrodi e consente l'analisi			
7. Allontana i presenti, garantisce sicurezza per tutti durante l'analisi del DAE e l'erogazione dello shock	Allontana i presenti e l'O₂, pronuncia la filastrocca durante l'analisi			
8. Erega shock se consigliato	Erega la scarica			
9. Riprende (o fa riprendere) immediatamente CTE	Esegue CTE (valutare tecnica ed efficacia)			
10. Apre le vie aeree, ispeziona la cavità orale e posiziona la cannula orofaringea (opzionale)	Estende il capo, solleva il mento, rimuove eventuali corpi estranei evidenti			
11. Effettua 2 lente ventilazioni con pallone autoespansibile + reservoir collegati ad O ₂ ad alti flussi	Valutare correttezza della manovra (1 secondo per ognuna) ed efficacia (espansione del torace)			
12. Prosegue con RCP 15:2 efficace con O ₂ , fino alla successiva analisi del DAE	Ad ogni analisi interrompe RCP esegue il cambio per le CTE			
13. Riconosce e risolve i messaggi di allarme/malfunzione del DAE	Allerta la SOREU, continua con RCP e rimuove la causa se possibile			

PUNTI DI FORZA: _____

ASPETTI MIGLIORABILI: _____

INDICAZIONI/SUGGERIMENTI: _____

ISTRUTTORE (nominativo) _____ (firma) _____