



ANÁLISIS

RESULTADO

INTERVALO DE REFERENCIA

HEMATOLOGÍA

HEMOGRAMA

RECuento DE GLOBULOS ROJOS MÉTODO AUTOMATIZADO	4.520.000	4.600.000 a 6.000.000 /mm ³
HEMATOCRITO MÉTODO AUTOMATIZADO	40	40 a 54 %
HEMOGLOBINA DOSAJE MÉTODO AUTOMATIZADO	13,30	13,00 a 17,00 g/g
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM) MÉTODO AUTOMATIZADO	88,0	80,0 a 98,0 fL
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (HCM) MÉTODO AUTOMATIZADO	29,40	27,00 a 33,00 pg
CC DE HB CORPUSCULAR MEDIA (CHCM) MÉTODO AUTOMATIZADO	33,4	32,0 a 36,0 g/dL
AMPLITUD DE DISTRIBUCION ERITROCITARIA (RDW) MÉTODO AUTOMATIZADO	13,1	11,0 a 14,5 %
LEUCOCITOS MÉTODO AUTOMATIZADO	5.530	4.000 a 10.000 /mm ³

FORMULA LEUCOCITARIA

NEUTROFILOS SEGMENTADOS - % Método MICROSCOPIA	48	50 a 70 %
EOSINOFILOS - % MÉTODO MICROSCOPIA	6	1 a 5 %
BASOFILOS - % MÉTODO MICROSCOPIA	0	0 a 2 %
LINFOCITOS - % MÉTODO MICROSCOPIA	41	20 a 40 %
MONOCITOS - % MÉTODO MICROSCOPIA	5	3 a 12 %

OBSERVACIONES

Elementos de morfología normal.

ERITROSEDIMENTACION
MÉTODO WESTERGREN

6 mm

Hasta 15 mm

QUIMICA CLINICA

GLUCEMIA
MÉTODO HEXOCINSA/G-6-PDH

0,88 g/L

0,70 a 1,00 g/L
Valores de referencia recomendados por la SAD
(Sociedad Argentina de Diabetes) basados en los
criterios de la ADA (Asociación Americana de
Diabetes)UREA (S)
MÉTODO UREASA UV

0,39 g/l

0,13 a 0,43 g/l

CREATININA SUERO
MÉTODO JAFFE CINETICO

1,24 mg/dL

0,60 a 1,20 mg/dL

Protocolo firmado electrónicamente por : Luis Cabrera - MP 370



ANÁLISIS

RESULTADO

INTERVALO DE REFERENCIA

IONOGRAMA SERICO

POTASIO SERICO - K SUERO
MÉTODO ISE - ION SELECTIVO

4,4 mEq/L

3,5 a 5,1 mEq/L

SODIO SERICO - NA SUERO
MÉTODO ISE - ION SELECTIVO

143 mEq/L

136 a 145 mEq/L

HEPATOGRAMA

BILIRRUBINA TOTAL
MÉTODO COLORIMETRICO-DIAZO CON SULFANÍLICO

1,46 mg/dL

0,20 a 1,20 mg/dL mg/dl

BILIRRUBINA DIRECTA
MÉTODO COLORIMETRICO-DIAZO CON SULFANÍLICO

0,50 mg/dL

0,00 a 0,50 mg/dL

BILIRRUBINA INDIRECTA
MÉTODO COLORIMETRICO-DIAZO CON SULFANÍLICO

0,96 mg/dL

FOSFATASA ALCALINA
MÉTODO AMP/P-NPP

55 U/L

40 a 150 U/L

GOT
MÉTODO NADH SIN 5PP

23 U/L

5 a 34 U/L

GPT
MÉTODO NADH SIN 5PP

20 U/L

0 a 55 U/L

COLESTEROL TOTAL
MÉTODO COLESTEROLESTERASA

201 mg/dL

Hasta 200 mg/dL

COLESTEROL HDL

COLESTEROL HDL
MÉTODO COLORIMETRICO

63 mg/dL

Valores Optimos : Mas de 60 mg/dl
Valores de Riesgo: Menos de 40 mg/dl
Segun NCEP - ATP III

COLESTEROL LDL

COLESTEROL LDL
MÉTODO ENZIMATICO DIRECTO

127 mg/dL

Hasta 130 mg/dL
Valores deseables : Hasta 130 mg/dl
Valores limites : 130 - 159 mg/dl
Valores de Riesgo: Desde 160 mg/dl
Segun NCEP- ATP III

TRIGLICERIDOS
MÉTODO GPO COLOR

0,45 g/L

Hasta 1,50 g/L
Deseable: hasta 1.5 g/l
Moderado: 1.5 a 2.0 g/l
Elevado: mayor a 2.0 g/l

HEMOGLOBINA GLICOSILADA

HB GLICOSILADA %
MÉTODO ENZIMATICO - EFM

5,4 %

4,2 a 6,2 %

ALBUMINA
MÉTODO VERDE DE BROMOCRESOL

4,60 g/dL

3,50 a 5,20 g/dL

PROTEINA C REACTIVA - PCR
MÉTODO INMUNOTURBIDIMETRICO

Menor de 1 mg/L

Hasta 5 mg/L

VITAMINA C - ÁCIDO ASCÓRBICO SERICO
MÉTODO HPLC

2,00 mg/L

4,00 a 20,00 mg/L

Protocolo firmado electrónicamente por : Luis Cabrera - MP 370



ANÁLISIS

RESULTADO

INTERVALO DE REFERENCIA

PERFILES ENDÓCRINOS

TSH - TIROTROFINA MÉTODO CMIA	1,60 uU/mL	Adulto: 0.4 a 4.0 uU/mL Embarazada Primer trimestre: 0.1 a 2.5 uU/mL Segundo trimestre: 0.2 a 3.0 uU/mL Tercer trimestre: 0.3 a 3.0 uU/mL
T4 LIBRE - TIROXINA LIBRE MÉTODO CMIA	0,91 ng/dL	0,75 a 1,94 ng/dL
VITAMINA B12 MÉTODO CMIA	473,0 pg/mL	187,0 a 883,0 pg/mL
VITAMINA D2+D3 (25-OH-Ergocalciferol+Colecalciferol) MÉTODO CMIA	26,8 ng/mL	Deficiencia: Menos de 20 ng/ml Insuficiencia: 21 - 30 ng/ml Suficiencia: Mayor de 30 ng/ml Toxicidad: Mayor de 100 ng/ml

INMUNOSEROLOGÍA

V.D.R.L. CUANTITATIVA

V.D.R.L. CUALITATIVA MÉTODO MICROFLOCULACIÓN	No reactivo	No reactivo
---	-------------	-------------

HEPATITIS B ANTIGENO SUPERFICIE - HBsAg

RESULTADO: MÉTODO CMIA	No reactivo	Valor de Referencia: No Reactivo
RELACIÓN DE POSITIVIDAD (AGHBS): MÉTODO CMIA	0,00 UI/mL	No Reactivo: Menor a 0.05 UI/ml Reactivo: Mayor a 0.05 UI/ml

HEPATITIS B CORE ANTICUERPOS- AchBc

RESULTADO: MÉTODO CMIA	No reactivo	Valor de Referencia: No Reactivo
RELACIÓN DE POSITIVIDAD (CORE): MÉTODO CMIA	0,06	S/CO Menor a 1.0: No Reactivo S/CO Mayor a 1.0: Reactivo

HEPATITIS C ANTICUERPOS IgG - HCV IgG

RESULTADO: MÉTODO CMIA	No reactivo	Valor de Referencia: No Reactivo
RELACIÓN DE POSITIVIDAD (HCV): MÉTODO CMIA	0,120	S/CO Menor a 0.9: No reactivo S/CO de 0.9 a 1.1: Indeterminado S/CO Mayor a 1.1: Reactivo

Protocolo firmado electrónicamente por : Luis Cabrera - MP 370