

# 1. Resolución de EDO de primer orden con series de potencias

## 1.1. Criterios de converxencia

Sea a serie  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ , dise que converxe se existe o seguinte límite:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N a_n$$

Unha condición necesaria pero non suficiente para que converxa é que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Para determinar a converxencia ou non converxencia dunha serie podemos utilizar diversos criterios, entre eles destacan dous, o criterio do cociente e o criterio da raíz:

- O criterio do cociente se basa no cálculo deste límite:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$$

En función do valor deste límite  $L$  o criterio distingue entre tres situacións:

1.  $L < 1 \Rightarrow$  A serie converxe
2.  $L > 1 \Rightarrow$  A serie diverxe
3.  $L = 1 \Rightarrow$  O criterio non decide

- O criterio da raíz se basa no cálculo do seguinte límite:

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

En función do valor deste límite  $\rho$  o criterio distingue entre tres situacións:

1.  $\rho < 1 \Rightarrow$  A serie converxe
2.  $\rho > 1 \Rightarrow$  A serie diverxe
3.  $\rho = 1 \Rightarrow$  O criterio non decide

## 1.2. Series de potencias

Definimos unha serie de potencias como unha suma infinita de potencias de orden  $n$ , donde  $x_0$  é o punto onde está centrada a serie:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

Para  $x = x_0$  a serie converge trivialmente a  $a_0$  pero para outros valores de  $x$  temos que estudar a súa converxencia, aplicando o criterio do cociente en moitas ocasións:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} (x - x_0)^{n+1}}{a_n (x - x_0)^n} \right| = |x - x_0| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

O valor de  $L$  depende do termo  $|x - x_0|$ , por tanto a serie converge ( $L < 1$ ) se  $x$  pertence ao radio de converxencia, que se define como:

$$|x - x_0| < \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \equiv R$$

De forma análoga se  $|x - x_0| > R$  a serie diverxe. Nos extremos do intervalo ( $x = x_0 \pm R$ ) a serie pode ser converxente ou non, hai que estudar cada caso particular. Se no cálculo do radio de converxencia obtemos  $R = 0$  a serie diverxe  $\forall x \in \mathbb{R}$ , mentres que se  $R = \infty$  entón a serie converge  $\forall x \in \mathbb{R}$ . O radio de converxencia tamén se pode obter a partir do criterio da raíz:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$$

Un exemplo de serie de potencias moi común é a que se relaciona coa exponencial:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Esta serie converge  $\forall x \in \mathbb{R}$ , como vamos a demostrar a continuación:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! x^n}{n! x^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{x} \right| = \infty$$

### 1.2.1. Propiedades das series de potencias

Supoñamos dúas series de potencias con  $R > 0$   $f(x)$  e  $g(x)$  centradas en  $x_0$  e de término xeral  $a_n$  e  $b_n$  respectivamente. Algunhas das súas propiedades son:

- Por definición, xa que  $R > 0$ ,  $f(x)$  é **analítica** en  $x_0$

- $f(x) + g(x)$  pode calcularse sumando termo a termo

■

$$f(x)g(x) = \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n \right) \cdot \left( \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-x_0)^n \right)$$

- $f(x)$  pode integrarse termo a termo no intervalo de converxencia
- $f(x)$  é continua e ten derivadas continuas de todas as ordes no intervalo de converxencia que se poden calcular termo a termo:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1} \\ f''(x) &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n (x-x_0)^{n-2} \\ f'''(x) &= \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2) a_n (x-x_0)^{n-3} \end{aligned}$$

A expresión da derivada n-ésima resulta ser:

$$f^{(n)}(x_0) = n! a_n \Rightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

Polo que a serie de potencias é a serie de Taylor no punto  $x_0$ :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

A última propiedade marca unha clara relación entre as funcións coñecidas e as súas series de Taylor. O teorema de Taylor nos di que sexa unha función  $h(x)$  continua e infinitamente derivable en  $|x-x_0|$  podemos expresala como:

$$h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + R_N(x)$$

Onde o resto é  $R_N(x)$ , que se define como:

$$R_N(x) = \frac{h^{N+1}(\bar{x})}{(N+1)!} (x - x_0)^{N+1}$$

Non obstante o teorema de Taylor non asegura que a serie de potencias sea converxente  $\forall x \in \mathbb{R}$ , a función só se pode expesar como serie de potencias nun determinado intervalo, no que se cumpre que:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} R_N(x) = 0$$

### 1.3. A ecuación $y' = y$

A solución de esta ED é ben coñecida,  $y = Ce^x$ , pero vamos a obtela a partir de series de potencias:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{\text{Buscamos } x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} (n+1) x^n$$

Sustituimos na ED e igualamos os coeficientes:

$$a_n = a_{n+1} (n+1) \Rightarrow a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$$

Unha vez obtida a relación de recorrencia vamos a buscar o termo xeral  $a_n$ :

$$\begin{aligned} n=0 &\Rightarrow a_1 = \frac{a_0}{1} = a_0; & n=1 &\Rightarrow a_2 = \frac{a_1}{2} = \frac{a_0}{2} \\ n=2 &\Rightarrow a_3 = \frac{a_2}{3} = \frac{a_0}{3 \cdot 2}; & n=3 &\Rightarrow a_4 = \frac{a_3}{4} = \frac{a_0}{4 \cdot 3 \cdot 2} \quad \dots \end{aligned}$$

Por tanto, o termo xeral da serie é:

$$a_n = \frac{a_0}{n!}$$

Por tanto a expresión final da serie de potencias sería:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_0}{n!} x^n = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Unha vez coñecida a serie debemos estudar a súa converxencia, neste caso é moi sinxelo pois é a serie da exponencial, que como demostramos anteriormente converxe  $\forall x \in \mathbb{R}$ . A solución final é  $y = a_0 e^x$ .

## 1.4. A serie do binomio

Este método de resolución é moi útil para coñecer a serie de Taylor dunha determinada función coñecida unha ecuación diferencial que a función satisfaga. En concreto vamos a estudar a función do binomio:

$$y = (1 + x)^p \quad \text{con } p \in \mathbb{R}$$

Esta función cumpre a seguinte ecuación diferencial:

$$(1 + x)y' = py \quad \text{con } y(0) = 1$$

Vamos a buscar unha solución por series de potencias arredor de  $x_0 = 0$ , o que nos permite calcular  $y$  e  $y'$  como:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1}$$

Para substituír na ED primeiro vamos a operar o paréntesis para facilitar as operacións:

$$\text{ED: } y' + xy' = py$$

$$xy' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n$$

Sustituindo todas as expresións na ED obtemos que:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n &= p \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} (x - x_0)^n + \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n &= p \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ \sum_{n=0}^{\infty} [n a_n + (n+1) a_{n+1}] x^n &= p \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ n a_n + (n+1) a_{n+1} &= p a_n \quad n = 0, 1, 2, \dots \\ a_{n+1} &= \frac{p-n}{n+1} a_n \end{aligned}$$

Unha vez obtida a relación de recorrencia vamos a buscar o termo xeral  $a_n$  por inducción dando valores a  $n$ :

$$\begin{aligned} n = 0 &\Rightarrow a_1 = pa_0 \\ n = 1 &\Rightarrow a_2 = \frac{p-1}{2}a_0 = \frac{p(p-1)}{2}a_0 \\ n = 2 &\Rightarrow a_3 = \frac{p-2}{3}a_2 = \frac{p(p-1)(p-2)}{3 \cdot 2}a_0 \\ n = 3 &\Rightarrow \frac{p-3}{4}a_3 = \frac{p(p-1)(p-2)(p-3)}{4 \cdot 3 \cdot 2}a_0 \end{aligned}$$

Por inducción podemos ver que o termo xeral é:

$$a_n = \frac{p(p-1)(p-2) \cdots (p-n+1)}{n!}a_0$$

Como a ED ten a condición de  $y(0) = 1$  a denominada serie do binomio queda da seguinte forma:

$$(1+x)^p = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p-1)(p-2) \cdots (p-n+1)}{n!} x^n$$

Esta serie queda en función do parámetro  $p$ , dependendo do seu valor a serie vai ter comportamentos diferentes. O caso máis común é o de  $p \in \mathbb{N}$ . Neste caso os coeficientes a partir de  $a_{p+1}$  se cancelan (Teñen o termo  $p - (p-1) + 1 = 0$  multiplicando no numerador) polo que a suma se reduce a unha suma finita, trúncase. Ademais mentres que  $p \geq n$  cúmplase que:

$$p(p-1)(p-2) \cdots (p-n+1) = \frac{p!}{(p-n)!}$$

Polo que podemos escribir a serie como o binomio de Newton:

$$(1+x)^p = \sum_{n=0}^p \frac{p!}{n!(p-n)!} x^n = \sum_{n=0}^p \binom{p}{n} x^n \quad p \in \mathbb{N}$$

No caso de  $p \notin \mathbb{N}$  podemos estudar a converxencia da serie co criterio do cociente (Empregando a relación de recorrencia):

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{p-n} \right| = 1$$

Polo tanto, se  $p \notin \mathbb{N}$  a serie converge se  $|x| < 1$  e diverxe se  $|x| > 1$ .

## 2. A función Gamma de Euler

Esta función nos permite unha xeralización da función factorial ( $p!$ ) cando  $p \notin \mathbb{N}$ . Defínese como:

$$\Gamma(p) = \int_0^\infty t^{p-1} e^{-t} dt \quad 0 < p \in \mathbb{R}$$

A propiedade principal desta función é a que relaciona dous términos consecutivos:

$$\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$$

Podemos demostrala integrando por partes:

$$\begin{aligned} \Gamma(p+1) &= \int_0^\infty t^p e^{-t} dt & \begin{array}{l} u = t^p \rightarrow du = pt^{p-1} \\ dv = e^{-t} \rightarrow v = -e^{-t} \end{array} \\ &= -t^p e^{-t} \Big|_0^\infty + p \int_0^\infty t^{p-1} e^{-t} dt = p\Gamma(p) \end{aligned}$$

Vamos a calcular  $\Gamma(1)$  e logo para o resto de valores tales que  $p \in \mathbb{N}$  por recurrencia:

$$\begin{aligned} \Gamma(1) &= \int_0^\infty e^{-t} dt = -e^{-t} \Big|_0^\infty = 1 = 0! \\ \Gamma(2) &= 1\Gamma(1) = 1 \cdot 1 = 1! \\ \Gamma(3) &= 2\Gamma(2) = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2! \\ \Gamma(4) &= 3\Gamma(3) = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 3! \\ \Gamma(5) &= 4\Gamma(4) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 5! \end{aligned}$$

Por inducción demostramos a relación que hai entre o factorial e a función gamma:

$$\Gamma(n+1) = n! \quad n \in \mathbb{N}$$

Unha vez coñecidos os valores da función gamma nos naturais temos que estendela a toda a recta real. Un caso particular que ten un resultado analítico simple é  $\Gamma(\frac{1}{2})$ :

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt \stackrel{t=s^2}{=} 2 \int_0^\infty e^{-s^2} ds$$

Obtemos así a integral da metade da gaussiana, que por ser unha función par podemos cambiar o límite de integración:

$$2 \int_0^{\infty} e^{-s^2} ds = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-s^2} ds = \sqrt{\pi}$$

Desta forma obtivemos o seguinte resultado, que nos permite calcular factoriales de números non enteiros negativos:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} = \left(-\frac{1}{2}\right)!$$

Aplicando a relación de recorrencia  $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$  podemos calcular o valor da función gamma para calquera semienteiro positivo, por exemplo:

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)!$$




Figura 1: Gráfica de  $\Gamma(p)$

Se reescribimos a relación de recorrencia como:

$$\Gamma(p) = \frac{\Gamma(p+1)}{p}$$



Podemos extender aos semienteiros negativos o procedemento anterior para obter resultados analíticos, un exemplo sería:

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(-\frac{1}{2} + 1\right)}{-\frac{1}{2}} = -2\sqrt{\pi}$$

Podemos aplicar esta mesma lóxica para calcular o valor da función no intervalo  $(-1, 0)$  a partir dos seus valores no intervalo  $(0, 1)$  e así sucesivamente. Esta extensión é válida  $\forall x < 0 | x \notin \mathbb{Z}$ . Nos valores enteiros a función non está definida porque tampouco o está no cero:

$$\lim_{p \rightarrow 0} \Gamma(p) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{\Gamma(p+1)}{p} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{p} = \pm\infty$$

En consecuencia a función tampouco está definida en ningún dos enteiros negativos, probáremolo para  $p = -1$ :

$$\lim_{p \rightarrow -1} = \lim_{p \rightarrow -1} \frac{\Gamma(p+1)}{p} = \lim_{p \rightarrow -1} \frac{\Gamma(0)}{-1} = \pm\infty$$

Por último, podemos relacionar os valores da función gamma de dous números que disten entre si un enteiro:

$$\begin{aligned} \Gamma(p+1) &= p\Gamma(p) \\ &= p(p-1)\Gamma(p-1) \\ &= p(p-1)(p-2)\Gamma(p-2) \\ &= p(p-1)(p-2)\cdots(p+1-n)\Gamma(p+1-n) \end{aligned}$$

O produto anterior aparece tamén na serie do binomio, polo que podemos reescribila como:

$$(1+x)^p = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(p+1)}{n!\Gamma(p+1-n)} \quad \begin{cases} \text{Se } p = 0, 1, 2, \dots & \forall x \\ \text{Se } p \neq 0, 1, 2, \dots & |x| < 1 \end{cases}$$

### 3. Resolución de EDO de segunda orde

#### 3.1. Puntos singulares e ordinarios

Vamos a considerar a seguinte ED en forma normal (Se non o está hai que normalizala!!):

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

**Definición 1.** *Por definición diremos que  $x_0$  é un punto ordinario se  $P(x)$  e  $Q(x)$  son analíticas nese punto. Se o punto non é ordinario denomínase singular.*

**Teorema 1.** *Sexa  $x_0$  un punto ordinario e sexan  $a_0$  e  $a_1$  constantes arbitrarias. Existe unha función  $f(x)$  analítica en  $x_0$  que verifica a ED e as condicións iniciais de  $y(x_0) = a_0$  e  $y'(x_0) = a_1$ .*

*Ademais cúmplese que o radio de converxencia do desenvolvemento en series da solución é, polo menos, o menor dos radios dos desenvolvementos en serie de Taylor de  $P(x)$  e  $Q(x)$ .*

#### 3.2. Ecuacións de Legendre

Denominamos funcións de Legendre á familia de funcións que verifican a seguinte ED:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + p(p + 1)y = 0 \quad p \in \mathbb{R}$$

En forma normal:

$$y'' - \frac{2x}{1 - x^2}y' + \frac{p(p + 1)}{1 - x^2}y = 0$$

Polo tanto as funcións  $P(x)$  e  $Q(x)$  son:

$$\left. \begin{aligned} P(x) &= -\frac{2x}{1 - x^2} \\ Q(x) &= \frac{p(p + 1)}{1 - x^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{Analíticas en } x_0 = 0 \text{ con } R = 1$$

Vamos a buscar unha solución xeral da forma  $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , calculando o resto de termos implicados na ecuación:

$$\begin{aligned}
y' &= \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} \Rightarrow -2xy' = -\sum_{n=0}^{\infty} 2n a_n x^n \\
y'' &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_n x^n \\
-x^2 y'' &= -\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n \Rightarrow -\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^n
\end{aligned}$$

No paso intermedio da segunda liña definimos un cambio de variable  $j = n-2$  e despois cambiando  $j$  por  $n$ . Podemos facer isto porque o índice é unha variable muda, que solo existe dentro do sumatorio. Unha vez temos os nosos sumatorios cos índices iguais podemos substituír na ED:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} p(p+1) a_n x^n &= 0 \Rightarrow \\
\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1) a_{n+2} - [n(n-1) - 2n + p(p+1)] a_n] x^n &= 0
\end{aligned}$$

Temos unha serie de Taylor igualada a función 0, polo que podemos igualar todos os termos a 0:

$$\begin{aligned}
(n+2)(n+1) a_{n+2} - [n(n-1) - 2n + p(p+1)] a_n &= 0 \quad n = 0, 1, 2, \dots \\
(n+2)(n+1) a_{n+2} - (p-n)(p+n-1) a_n &= 0
\end{aligned}$$

Así calculamos a relación de recorrencia:

$$a_{n+2} = -\frac{(p-n)(p+n-1)}{(n+1)(n+2)} a_n \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned}
a_2 &= -\frac{p(p+1)}{1 \cdot 2} a_0 \\
a_4 &= -\frac{(p-2)(p+2+1)}{3 \cdot 4} a_2 = -\frac{(p-2)p(p+1)(p+3)}{4!} a_0 \\
a_6 &= -\frac{(p-4)(p+4+1)}{5 \cdot 6} a_4 = -\frac{(p-4)(p-2)p(p+1)(p+3)(p+5)}{6!} a_0
\end{aligned}$$

Estes termos se relacionan mediante índices pares, os termos de índices impares siguen unha recorrencia indepenete, non hai conexión entre os termos pares e os impares. Os termos impares  $a_{2n+1}$  seguen a seguinte relación:

$$\begin{aligned}
a_3 &= -\frac{(p-1)(p+2)}{2 \cdot 3} a_1 \\
a_5 &= -\frac{(p-3)(p+3+1)}{4 \cdot 5} a_3 = \frac{(p-3)(p-1)(p+2)(p+4)}{5!} a_1 \\
a_7 &= -\frac{(p-5)(p+5+1)}{6 \cdot 7} a_5 = -\frac{(p-5)(p-3)(p-1)(p+2)(p+4)(p+6)}{7!} a_1
\end{aligned}$$

Polo tanto, temos dúas solucións LI que depende de  $a_0$  e de  $a_1$ , como nos expresaba o Th.1. Este resultado ten moito sentido, pois as constantes  $a_0$  e  $a_1$  son as constantes da ED, que ten 2 por ser de segundo grao.

$$\begin{aligned}
y_1 &= 1 - \frac{p(p+1)}{2!} x^2 + \frac{(p-2)p(p+1)(p+3)}{4!} x^4 \\
&\quad - \frac{(p-4)(p-2)p(p+1)(p+3)(p+5)}{6!} x^6 + \dots \\
y_2 &= x - \frac{(p-1)(p+2)}{3!} x^3 + \frac{(p-3)(p-1)(p+2)(p+4)}{5!} x^5 \\
&\quad - \frac{(p-5)(p-3)(p-1)(p+2)(p+4)(p+6)}{7!} x^7 + \dots
\end{aligned}$$

Estas dúas solucións denomínanse **funcións de Legendre**. Estas funcións son unha serie infinita de potencias, cuxa converxencia estudaremos a continuación.

### 3.3. Converxencia e polinomios de Legendre

Se  $p \in \mathbb{Z}$  a serie trúncase nun momento dado, coverténdose nun polinomio finito. Se  $p$  é par e positivo ou impar e negativo trúncase  $y_1$ , mentres que se  $p$  é impar e positivo ou par e negativo, trúncase  $y_2$ . No caso de que  $p \notin \mathbb{Z}$  vamos a estudar a converxencia aplicando o criterio do cociente, por exemplo a  $y_1$ :

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{2n+2} x^{2n+2}}{a_{2n} x^{2n}} \right| = x^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(p-2n)(p+2n+1)}{(2n+1)(2n+2)} \right| = x^2$$

Polo tanto, a serie converge se  $|x| < 1$ . A demostración para  $y_2$  é análoga.

O caso máis interesante é aquel no que  $p = L \in \mathbb{Z}$ . Neste caso consideraremos só as series que quedan truncadas. Ademais, en vez de usar as funcións  $y_1$  e  $y_2$ , soen multiplicarse por unha constante de xeito que o coeficiente que acompaña a potencia máis alta sexa:

$$a_L = \frac{(2L)!}{2^L (L!)^2} = \frac{(2L-1)(2L-3)(2L-5) \dots 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1}{L!}$$

Polo tanto as novas funcións, os **polinomios de Legendre**, quedan da seguinte forma:

$$P_L(x) = \sum_{k=0}^{[L/2]} \frac{(-1)^k (2L-2k)!}{2^L k! (L-k)! (L-2k)!} x^{L-2k}$$

onde  $[L/2]$  é o maior enteiro menor ou igual a  $L/2$  :

$$[L/2] = \begin{cases} L/2 & \text{se } L \text{ par} \\ (L-1)/2 & \text{se } L \text{ impar} \end{cases}$$

A forma máis útil de facer os cálculos dos polinomios de Legendre é empregando a fórmula de Rodrigues:

$$P_L(x) = \frac{1}{2^L L!} \frac{d^L}{dx^L} [(x^2 - 1)^L], \quad L \in \mathbb{N}_0$$

Para  $L = 0$  obtemos a recta  $y = 1$ , para  $L = 1$  obtemos a recta  $y = x$ , para  $L = 2$  obtemos o seguinte polinomio:

$$P_2(x) = \frac{1}{2^2 2!} \frac{d^2}{dx^2} [(x^2 - 1)^2] = \frac{1}{8} \frac{d^2}{dx^2} [x^4 - 2x^2 + 1] = \frac{3x^2 - 1}{2}$$

Na seguinte figura podemos ver representados polinomios de Legendre ata orde 5, con  $p = n$ :




Figura 2: Polinomios de Legendre

Onde os polinomios teñen as seguintes ecuacións:

$$\begin{aligned}P_3(x) &= \frac{5x^3 - 3x}{2} \\P_4(x) &= \frac{35x^4 - 30x^2 + 3}{8} \\P_5(x) &= \frac{63x^5 - 70x^3 + 15x}{8}\end{aligned}$$

### 3.4. Algunhas propiedades

Os polinomios de Legendre:

- verifican  $P_L(1) = 1$  e  $P_L(-1) = (-1)^L$
- son ortogonais:  $\int_{-1}^1 P_L(x)P_{L'}(x)dx = 0$  se  $L \neq L'$

## 4. Puntos singulares e series de Frobenius

### 4.1. Introducción

Partimos dunha ecuación de Euler de segunda orde da forma:

$$x^2y'' + pxy' + qy = 0$$

Onde  $p, q \in \mathbb{R}$  son constantes. Escribindo en forma normal a ecuación temos que:

$$y'' + \frac{p}{x}y' + \frac{q}{x^2}y = 0$$

En  $x_0 = 0$  a función ten un punto non ordinario xa que as funcións  $P(x)$  e  $Q(x)$  non son analíticas. Non podemos aplicar o Th.1 para afirmar que existen solucións, pero por ser unha ecuación de Euler sabemos que existen solucións da forma:

$$y = x^m$$

Respecto a estas solucións temos que notar que, salvo que  $m \in \mathbb{N}$ , non son infinitamente derivables en  $x_0 = 0$ , por iso non son analíticas.

$$y^{(k)} = m(m-1) \cdots (m-k+1)x^{m-k}$$

A expresión da derivada  $k$ -ésima non se pode avaliar se  $k > m$  e a derivada nunca se anula (Só se anula se  $m \in \mathbb{N}$ ), xa que temos unha indeterminación do tipo  $[\frac{k}{0}]$ . A idea intuitiva disto é que a recta tanxente ten pendente infinita cando  $x \rightarrow 0$ . Podemos velo gráficamente coa función  $f(x) = \sqrt{x}$ . En  $x_0 = 0$  a pendente da recta tanxente vaise ao infinito, polo que non é derivable, aínda que si que exista  $f(0)$ .




Figura 3:  $f(x) = \sqrt{x}$

Podemos aplicar esta lóxica e buscar solucións non analíticas en  $x_0$  para ecuacións de segunda orde máis xerais, do tipo de:

$$y'' + \frac{p_0 + p_1x + p_2x^2 + \cdots}{x}y' + \frac{q_0 + q_1x + q_2x^2 + \cdots}{x^2}y = 0$$

En este tipo de ecuacións, cando  $x \ll 1$  os termos  $p_0$  e  $q_0$  dominarán nos numeradores, facendo que podamos desprezar aos outros termos con potencias de  $n$  e buscar solucións do tipo  $x^m$ , como se tratáramos cunha ecuación de Euler. En certos casos que estudaremos a continuación as ED deste tipo poden resolverse por series de potencias, obtendo solucións do tipo:

$$y = x^m (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots) = x^m \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad m \in \mathbb{R}$$

Este tipo de series de potencias denomínanse **series de Frobenius**.

## 4.2. Clasificación e estudo dos puntos non regulares

Sexa  $x = x_0$  un punto singular da ecuación diferencial:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

**Definición 2.** Dise que  $x_0$  é un punto singular regular da ecuación diferencial se as funcións  $(x - x_0)P(x)$  e  $(x - x_0)^2Q(x)$  son analíticas en  $x = x_0$ . Se algunha destas funcións non é analítica, dise que  $x_0$  é un punto singular irregular.

Supoñendo que  $x_0 = 0$  é un punto singular regular na nosa ecuación de partida vamos a tratar de resolver a ED por series de Frobenius. Trataremos

de determinar cando obteremos dúas solucións LI e cando existirá solo unha (Th. de Fuchs):

$$\begin{aligned}
 y &= x^m \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{m+n} \Rightarrow \\
 y' &= \sum_{n=0}^{\infty} (m+n) a_n x^{m+n-1} \Rightarrow \\
 y'' &= \sum_{n=0}^{\infty} (m+n)(m+n-1) a_n x^{m+n-2} = x^{m-2} \sum_{n=0}^{\infty} (m+n)(m+n-1) a_n x^n
 \end{aligned}$$

O seguinte paso é tratar de expresar as funcións  $P(x)$  e  $Q(x)$  como unha serie de Taylor para substituír todas as series na ecuación e poder operar con elas. Unha vez convertidas as funcións en series de Taylor temos que operar o produto entre a serie de Taylor e a expresión en forma de serie da derivada  $n$ -ésima da función. O exemplo do produto de  $Q(x)$  e  $y$  será representado a continuación, en forma de táboa:

$$\begin{aligned}
 Q(x)y &= \frac{1}{x^2} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n \right] \left[ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right] x^m \\
 &= x^{m-2} \sum_{n=0}^{\infty} \left[ \sum_{k=0}^n q_{n-k} a_k \right] x^n
 \end{aligned}$$

Para operar buscamos agrupar as diagonais coa mesma potencia de  $x$ :

$q_0$	$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$
$+ q_1 x$	$q_0 a_0 + q_0 a_1 x + q_0 a_2 x^2 + q_0 a_3 x^3 + \dots$
$+ q_2 x^2$	$+ q_1 a_0 x + q_1 a_1 x^2 + q_1 a_2 x^3 +$
$+ q_3 x^3$	$+ q_2 a_0 x^2 + q_2 a_1 x^3 +$
$\vdots$	$+ q_3 a_0 x^3 +$
$\vdots$	$\vdots$
$= \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n$	

$$\begin{aligned}
 P(x)y' &= \frac{1}{x} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n \right] \left[ \sum_{n=0}^{\infty} (m+n) a_n x^{m+n-1} \right] \\
 &= x^{m-2} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n \right] \left[ \sum_{n=0}^{\infty} (m+n) a_n x^n \right] \\
 &= x^{m-2} \sum_{n=0}^{\infty} \left[ \sum_{k=0}^n p_{n-k} (m+k) a_k \right] x^n
 \end{aligned}$$



Agora facemos a substitución que anunciábamos, sacamos factor común  $x^{m-2}$  e unimos os sumatorios con índice  $n$  :

$$x^{m-2} \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ (m+n)(m+n-1)a_n x^n + \left[ \sum_{k=0}^n p_{n-k}(m+k)a_k \right] x^n + \left[ \sum_{k=0}^n q_{n-k}a_k \right] x^n \right\} = 0$$

Dentro do sumatorio sacamos factor común  $x^n$  e agrupamos os sumatorios interiores:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left\{ (m+n)(m+n-1)a_n + \sum_{k=0}^n [p_{n-k}(m+k) + q_{n-k}] a_k \right\} x^n = 0$$

Nesta expresión temos a serie de Taylor igualada á función 0, polo que podemos afirmar que todos os termos da serie valen 0:

$$(m+n)(m+n-1)a_n + \sum_{k=0}^n [p_{n-k}(m+k) + q_{n-k}] a_k = 0$$

Esta expresión depende do valor de  $n$  no que nos atopemos, estudaremos en primeiro lugar o caso máis simple,  $n = 0$  (Supoñendo sen perda de xeralidade que  $a_0 \neq 0$ ):

$$m(m-1) + mp_0 + q_0 = 0 \Rightarrow m^2 + m(p_0 - 1) + q_0 = 0$$

Esta ecuación denomínase ecuación indicial e nos permitirá calcular os valores de  $m$  válidos. Garda unha relación moi estreita coa ecuación característica das ED de Euler, que obtemos despois de facer a substitución  $y = x^m$  para buscar solucións en forma de potencias.

Se en vez de  $n = 0$  estudamos o resto dos casos obteremos ecuacións que nos relacionan, en xeral, cada término  $a_n$  cos  $n$  términos anteriores ( $a_0, a_{n-1}$ ). Por exemplo para  $n = 1$  obtemos:

$$(m+1)ma_1 + [p_1m + q_1]a_0 + [p_0(m+1) + q_0]a_1 = 0, \Rightarrow \\ [(m+1)(m+p_0) + q_0]a_1 = -[p_1m + q_1]a_0$$

Esta ecuación relaciona  $a_1$  con  $a_0$ , podemos despegar  $a_1$  se  $(m+1)(m+p_0)q_0 \neq 0$ . Podemos obter a ecuación xeral de recorrencia para todos os valores de  $n$  se calculamos o termo que acompaña a  $a_n$  e o sacamos do sumatorio:

$$\sum_{k=0}^n [p_{n-k}(m+k) + q_{n-k}] a_k = [(m+n)p_0 + q_0] a_n + \sum_{k=0}^{n-1} [p_{n-k}(m+k) + q_{n-k}] a_k$$

Polo tanto obtemos a seguinte ecuación de recorrencia para  $n \geq 0$ :

$$[(m+n)(m+n-1) + (m+n)p_0 + q_0] a_n + \sum_{k=0}^{n-1} [p_{n-k}(m+k) + q_{n-k}] a_k = 0 \quad n = 1, 2, \dots$$

Para poder obter  $a_n$  en función do termo anterior o coeficiente que o acompaña debe ser distinto de 0. Para estudar cando isto ocorre ou non vamos a definir a seguinte función:

$$f(m) = m(m-1) + mp_0 + q_0$$

Se representamos esta función obtemos unha parábola cuxos ceros están situados nos valores  $m_1$  e  $m_2$ , onde  $m_1 \geq m_2$ . Esta función está definida para que o seu valor coincida co coeficiente que acompaña a cada termo  $a_i$  cando calculamos  $f(m+i)$ . Por exemplo, queda claro cando calculamos o valor de  $f(m+n)$ :

$$f(m+n) = [(m+n)(m+n-1) + (m+n)p_0 + q_0]$$

A partir desta función podemos escribir a relación de recorrencia para os 5 primeiros valores de  $n$ :

$$f(m+1)a_1 + (p_1m + q_1) a_0 = 0$$

$$f(m+2)a_2 + (p_2m + q_2) a_0 + [p_1(m+1) + q_1] a_1 = 0$$

$$f(m+3)a_3 + (p_3m + q_3) a_0 + [p_2(m+1) + q_2] a_1 + [p_1(m+2) + q_1] a_2 = 0$$

Polo tanto podemos concluir que o coeficiente de  $a_n$  é  $f(m+n)$ . Ese valor de  $m$  só pode ser  $m_1$  ou  $m_2$ , as solucións da ecuación indicial. Se tomamos o maior dos valores de  $m$ ,  $m_1$ , entón  $f(m_1+n)$  nunca se anula porque  $n > 0$ . Se tomamos  $m_2$  podemos enfrentarnos a tres posibles situacións:

- Se  $m_1 = m_2$  a segunda solución non se pode expresar como serie de Frobenius.
- Se  $m_1 - m_2 = L \in \mathbb{N}^+$ ,  $f(m_2 + L) = f(m_2 + m_1 - m_2) = 0$ , entón  $a_L$  desaparece da ecuación  $L$ -ésima, quedándonos  $L$  ecuacións lineais homoxéneas con  $L$  incógnitas. Agora ben:

- Se son linealmente dependentes, podemos prescindir da ecuación para  $n = L$ , polo que  $a_L$  quedaría libre, podendo tomar calquera valor (por exemplo cero). Coas ecuacións para  $n = L+1$  e sucesivas, calcularíamos os valores de  $a_{L+1}, a_{L+2} \dots$
  - Se estas ecuacións son linealmente independentes, a única solución posible é  $a_0 = a_1 = \dots = a_{L-1} = 0$  en contradición coa hipótese. Poderíamos pensar que agora tamén somos libres para asignar calquera valor a  $a_L$  e proseguir coas seguintes ecuacións, pero estaríamos construíndo outra vez a solución para  $m_1$ .
- Se  $m_1 - m_2 = L \notin \mathbb{N}$ , tamén podemos calcular os coeficientes para  $m_2$ , o menor dos dous valores de  $m$ .

### 4.3. Teorema de Fuchs

**Teorema 2.** *Supoñamos que  $x = x_0$  é un punto singular regular da ecuación diferencial (2):  $y'' + P(x)y' + Q(x) = 0$ , e que os desenvolvementos en serie de potencias de  $(x - x_0)P(x)$  e  $(x - x_0)^2 Q(x)$  converxen para  $|x - x_0| < R$  con  $R > 0$ . Sexan  $m_1$  e  $m_2$  as raíces da ecuación indicial (4) con  $m_2 \leq m_1$ . Entón a ecuación diferencial ten polo menos unha solución en serie de Frobenius:*

$$y_1 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{m_1+n}$$

*válida en  $|x - x_0| < R$ , onde os  $a_n$  quedan determinados en función de  $a_0 \neq 0$  pola fórmula de recorrencia (5). Ademais, se  $m_1 - m_2$  non é un enteiro positivo ou cero, a ecuación diferencial ten unha segunda solución independente:*

$$y_2 = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - x_0)^{m_2+n}$$

*válida no mesmo intervalo, onde de novo  $b_0 \neq 0$  e  $b_n$  ven dado unha fórmula de recorrencia análoga.*

## 5. Ecuación de Bessel

Consideremos a familia de ecuacións diferenciais:

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - p^2)y = 0 \quad p \geq 0, p \in \mathbb{R}.$$

Escrita en forma normal:

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{p^2}{x^2}\right)y = 0$$

En primeiro lugar vamos a estudar o comportamento xeral da ecuación, para poder facernos unha idea de cales poden ser as súas solucións en función da relación entre  $x$  e  $p$ :

- Se  $x \ll p$  o termo  $x^2$  perde importancia fronte a  $p^2$ , polo que a ED acaba parecendo unha ED de Euler, que admite solucións do tipo  $y = x^m$ .
- Se  $x \gg p$  podemos desprezar o termo  $\frac{1}{x}y$  e aproximar a ED a outra máis coñecida:  $y'' + y = 0$ . Esta ecuación admite solucións do tipo  $y = A \cos x + B \sin x$ , funcións periódicas.

Na seguinte figura podemos ver representadas varias solucións da ecuación de Bessel:




Figura 4: Funcións de Bessel para  $p = 0, 1, 2$

O punto  $x_0 = 0$  non é ordinario, pero si que é singular regular xa que cumpre que:

$$xP(x) = 1 \quad \text{e} \quad x^2Q(x) = x^2 - p^2$$

son funcións analíticas con radio de converxencia infinito. Entón ten que existir polo menos unha solución en forma de serie de Frobenius (Th. de

Fuchs). Para buscar esta solución vamos a calcular a forma que teñen todos os termos que participan na ED a partir da expresión base da serie de Frobenius:

$$\begin{aligned}
 y &= x^m \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+m} \Rightarrow x^2 y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+m+2} = \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^{n+m} \\
 y' &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+m) a_n x^{n+m-1} \Rightarrow x y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+m) a_n x^{n+m} \\
 y'' &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+m)(n+m-1) a_n x^{n+m-2} \Rightarrow x^2 y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+m)(n+m-1) a_n x^{n+m}
 \end{aligned}$$

No cálculo de  $x^2 y$  fixemos un cambio de índice  $n' = n - 2$ , que nos servirá para agrupar potencias de  $x$  cando substituíamos as series na ED. Podemos facer este cambio de índice porque é unha variable muda, que só pertence ao sumatorio. Unha idea intuitiva para velo é que adiantamos o índice dúas unidades e rebaixamos o interior do sumatorio en dúas unidades. Se substituímos todas as series na ecuación de Bessel obtemos:

$$\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} (n+m)(n+m-1) a_n x^{n+m}}_{x^2 y''} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} (n+m) a_n x^{n+m}}_{x y'} + \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^{n+m}}_{x^2 y} - \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} p^2 a_n x^{n+m}}_{p^2 y} = 0$$

Podemos agrupar o primeiro, segundo e cuarto sumatorio xa que empezan en  $n = 0$ . Sacando factor común  $x^m$  en todos os sumatorios obtemos:

$$x^m \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} [(n+m)^2 - p^2] a_n x^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n \right\} = 0.$$

O seguinte paso é agrupar todos os sumatorios, pero precisamos sacar os dous primeiros termos do primeiro sumatorio para que teñan o mesmo índice inicial:

$$\begin{aligned}
 [m^2 - p^2] a_0 + [(m+1)^2 - p^2] a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} [(n+m)^2 - p^2] a_n x^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n &= 0 \Rightarrow \\
 [m^2 - p^2] a_0 + [(m+1)^2 - p^2] a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} \{ [(n+m)^2 - p^2] a_n + a_{n-2} \} x^n &= 0.
 \end{aligned}$$