

## ROZDZIAŁ V

### CAŁKA RIEMANNA

#### § 1. Całka pojedyncza

**1. Podział przedziału.** Weźmy pod uwagę w przedziale zamkniętym  $\langle a, b \rangle$  skończoną liczbę punktów  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ .

Zbiór przedziałów zamkniętych  $\langle x_0, x_1 \rangle, \dots, \langle x_{n-1}, x_n \rangle$  nazywamy *podziałem*  $\Delta$  przedziału  $\langle a, b \rangle$ .

Długość przedziału  $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$  oznaczamy przez  $\delta x_i$ :

$$\delta x_i = x_i - x_{i-1} \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, n,$$

a przez  $|\Delta|$  — największą z liczb  $\delta x_1, \dots, \delta x_n$ .

Ciąg podziałów  $\{\Delta_n\}$  nazywamy *normalnym*, jeżeli  $|\Delta_n| \rightarrow 0$  dla  $n \rightarrow \infty$ , tzn. jeżeli długość najdłuższego przedziału podziału  $\Delta_n$  dąży do zera, gdy  $n$  wzrasta nieograniczenie.

Jeżeli np.  $\Delta_n$  jest podziałem przedziału  $\langle a, b \rangle$  na  $n$  równych przedziałów, to ciąg  $\{\Delta_n\}$  jest ciągiem normalnym, gdyż  $|\Delta_n| = (b-a)/n \rightarrow 0$  dla  $n \rightarrow \infty$ .

**2. Całka Riemanna.** Niech  $f(x)$  będzie funkcją ograniczoną, określoną w przedziale zamkniętym  $\langle a, b \rangle$ . Weźmy pod uwagę w każdym przedziale  $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$  podziału  $\Delta$  dowolny punkt  $\xi_i$  i utwórzmy sumę

$$(1) \quad R = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \delta x_i.$$

Jeżeli dla każdego ciągu normalnego podziałów  $\{\Delta_n\}$  odpowiadające im sumy  $R_n$  dążą do jednej i tej samej granicy (niezależnie od wyboru punktów  $\xi_i$ ), to granicę tę nazywamy *całką Riemanna* funkcji  $f(x)$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$  i oznaczamy przez

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Funkcję  $f(x)$  nazywamy wówczas *całkowalną*  $\mathfrak{R}$  czyli *całkowalną w sensie Riemanna* w przedziale  $\langle a, b \rangle$ .

*Uwaga.* Jeżeli dla każdego ciągu normalnego podziałów odpowiednie sumy (1) są zbieżne, to są zawsze zbieżne do tej samej granicy. Jeżeli bowiem  $\{\Delta_n\}$  i  $\{\Delta'_n\}$  są dowolnymi ciągami normalnymi podziałów przedziału  $\langle a, b \rangle$ , a  $\{R_n\}$  i  $\{R'_n\}$  — ciągami zbieżnymi odpowiednich sum, to ponieważ ciąg  $\{\Delta_1, \Delta'_1, \Delta_2, \Delta'_2, \dots\}$  jest również ciągiem normalnym podziałów, ciąg  $\{R_1, R'_1, R_2, R'_2, \dots\}$  jest zbieżny. Zatem ciągi  $\{R_n\}$  i  $\{R'_n\}$  są zbieżne do tej samej granicy.

(2.1) Dla każdej funkcji  $f$  całkowanej  $\mathfrak{R}$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$  zachodzi wzór:

$$(2) \quad m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a),$$

gdzie  $m$  i  $M$  oznaczają kresy dolny i górny funkcji  $f(x)$  dla  $a \leq x \leq b$ .

Dowód. Dla każdego podziału  $\Delta$  i każdej sumy (1) mamy  $m \leq f(\xi_i) \leq M$ , gdzie  $i=1, 2, \dots, n$ . Zatem

$$m(\delta x_1 + \dots + \delta x_n) \leq R \leq M(\delta x_1 + \dots + \delta x_n).$$

Ponieważ  $\delta x_1 + \dots + \delta x_n = b - a$ , więc otrzymujemy nierówność (2), c. b. d. d.

(2.2) Jeżeli funkcja  $f(x)$  jest całkowna  $\mathfrak{R}$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , to

$$(3) \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq L(b-a),$$

gdzie  $L$  oznacza kres górny wartości  $|f(x)|$  w tym przedziale.

Nierówność (3) wynika łatwo z (2), gdyż  $-L \leq m \leq M \leq L$ .

(2.3) Jeżeli funkcja  $f(x)$  jest całkowna  $\mathfrak{R}$  i nieujemna w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , to

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

Wynika to z tw. (2.1), gdyż  $m \geq 0$ .

### 3. Całka sumy funkcji. Okażemy teraz, że:

(3.1) Suma oraz różnica dwu funkcji  $f(x)$  i  $\varphi(x)$  całkownych  $\Re$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$  jest całkowna  $\Re$  i

$$\int_a^b [f(x) \pm \varphi(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b \varphi(x) dx.$$

Dowód. Biorąc jakiegolwiek punkty  $\xi_i$  w przedziałach podziału  $\Delta$  i oznaczając przez  $R, R'$  i  $R''$  odpowiednie sumy dla  $f \pm \varphi, f$  i  $\varphi$ , mamy  $R = R' \pm R''$ . Dla ciągu normalnego podziałów  $\{\Delta_n\}$  mamy zatem  $R_n = R'_n \pm R''_n$ . Ponieważ  $R'_n$  i  $R''_n$  dążą do całek z funkcji  $f(x)$  i  $\varphi(x)$ , więc  $R_n$  dąży również do granicy, którą jest suma (różnica) całek funkcji  $f$  i  $\varphi$ .

Równie prosto dowodzi się, że:

(3.2) Iloczyn funkcji  $f(x)$  całkownej  $\Re$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$  przez liczbę stałą  $c$  jest funkcją całkowną  $\Re$  w tym przedziale i

$$\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx.$$

(3.3) Jeżeli  $f_1(x), \dots, f_n(x)$  są funkcjami całkownymi  $\Re$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , a  $c_1, \dots, c_n$  są dowolnymi stałymi, to

$$\int_a^b [c_1 f_1(x) + \dots + c_n f_n(x)] dx = c_1 \int_a^b f_1(x) dx + \dots + c_n \int_a^b f_n(x) dx.$$

Dowód wynika od razu z (3.1) i (3.2).

**4. Sumy dolna i górna.** Oznaczmy przez  $m_i$  i  $M_i$  kresy dolny i górny funkcji  $f(x)$  w przedziale  $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$  podziału  $\Delta$ . Niech

$$(4) \quad s = \sum_{i=1}^n m_i \delta x_i, \quad S = \sum_{i=1}^n M_i \delta x_i.$$

Sumę  $s$  nazywamy *sumą dolną*,  $S$  zaś — *sumą górną* odpowiadającą podziałowi  $\Delta$ .

Niech  $m$  i  $M$  oznaczają dolny i górny kres funkcji  $f(x)$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$ ; wówczas mamy oczywiście na mocy (3) i (1):

$$(5) \quad m(b-a) \leq s \leq R \leq S \leq M(b-a).$$

Udowodnimy, że  $S$  jest kresem górnym wartości sumy  $R$ , odpowiadającej podziałowi  $\Delta$  dla wszelkich możliwych wyborów punktów  $\xi_i$  (p. wzór (1), str. 162).

Niech bowiem  $\varepsilon > 0$ . W  $i$ -tym przedziale podziału  $\Delta$  możemy wyznaczyć taki punkt  $\xi_i$ , by  $f(\xi_i) \geq M_i - \frac{\varepsilon}{b-a}$ , skąd:

$$R = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \delta x_i \geq \sum_{i=1}^n \left( M_i - \frac{\varepsilon}{b-a} \right) \delta x_i = S - \varepsilon.$$

Ponieważ  $\varepsilon > 0$  jest dowolne oraz  $R \leq S$  na mocy (5), więc  $S$  jest kresem górnym wartości sumy  $R$ .

Podobnie dowodzi się, że  $s$  jest kresem dolnym wartości sumy  $R$  dla podziału  $\Delta$ .

Zauważmy, że na mocy (3)

$$S - s = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \delta x_i.$$

Oznaczając więc przez  $\omega_i$  oscylację funkcji  $f(x)$  w przedziale  $\delta x_i$ , tzn. przyjmując  $\omega_i = M_i - m_i$ , dostajemy

$$(6) \quad S - s = \sum_{i=1}^n \omega_i \delta x_i.$$

**5. Całki górna i dolna.** Kres dolny sum górnych  $S$  przy dowolnych podziałach  $\Delta$  przedziału  $\langle a, b \rangle$  nazywamy *całką górną* funkcji  $f(x)$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$  i oznaczamy przez

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Analogicznie kres górny sum dolnych  $s$  nazywamy *całką dolną* funkcji  $f(x)$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$  i oznaczamy przez

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Dla każdego podziału  $\Delta$  mamy na mocy określenia całek górnej i dolnej:

$$(7) \quad s \leq \int_a^b f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx \leq S.$$

PRZYKŁAD. Niech  $y=f(x)$  będzie funkcją Dirichleta określoną w przedziale  $\langle 0,1 \rangle$ , tzn.  $f(x)=\begin{cases} 0 & \text{dla } x \text{ wymiernych,} \\ 1 & \text{dla } x \text{ niewymiernych.} \end{cases}$

Dla każdego podziału  $\Delta$  mamy wówczas  $s=0$  i  $S=1$ , zatem:

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 f(x) dx = 1.$$

(5.1) Do każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje takie  $\eta > 0$ , że jeżeli podział  $\Delta$  spełnia nierówność

$$(8) \quad |\Delta| \leq \eta,$$

to sumy  $s$  i  $S$  spełniają nierówności

$$(9) \quad s \geq \int_a^b f(x) dx - \varepsilon, \quad S \leq \int_a^b f(x) dx + \varepsilon.$$

Dowód. Udowodnimy drugą z nierówności (9). Ponieważ całka górna jest dolnym kresem sum górnych, więc do liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje podział  $\bar{\Delta}$ , dla którego suma górna  $\bar{S}$  spełnia nierówność

$$(10) \quad \bar{S} \leq \int_a^b f(x) dx + \varepsilon/2.$$

Niech  $\eta$  spełnia nierówność

$$(11) \quad 0 < \eta \leq |\bar{\Delta}|$$

i weźmy pod uwagę podział  $\Delta$  spełniający nierówność (8).

Niech  $\bar{I}_k$  będzie dowolnym odcinkiem podziału  $\bar{\Delta}$ , a  $I_i, I_{i+1}, \dots, I_j$  odcinkami podziału  $\Delta$ , które całkowicie leżą w  $\bar{I}_k$ , a więc które zawierają każdy punkt przedziału  $\bar{I}_k$  odległy od jego końców o więcej niż  $|\bar{\Delta}|$ . Z (9) dostajemy zatem

$$(12) \quad \bar{I}_k - \sum_{r=i}^j I_r \leq 2\eta.$$

Niech  $M$  i  $m$  oznaczają kresy górny i dolny funkcji  $f(x)$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , a  $\bar{M}_k$  i  $M_r$  — kresy górne tej funkcji w przedziałach  $\bar{I}_k$  i  $I_r$ . Mamy

$$(13) \quad \bar{\delta}_k(M - \bar{M}_k) = \sum_{r=i}^j \delta_r(M - \bar{M}_k) + (\bar{\delta}_k - \sum_{r=i}^j \delta_r)(M - \bar{M}_k).$$

Ponieważ  $\bar{M}_k \geq M_r$ , więc  $M - \bar{M}_k \leq M - M_r$  dla  $r = i, i+1, \dots, j$ ; zatem na mocy (12) i (13)

$$(14) \quad \bar{\delta}_k(M - \bar{M}_k) \leq \sum_{r=i}^j \delta_r(M - M_r) + 2\eta(M - m).$$

Podobne nierówności zachodzą dla pozostałych przedziałów podziału  $\bar{\Delta}$ . Dodając te nierówności stronami, otrzymujemy po lewej stronie  $M(b-a) - \bar{S}$ . W sumach po prawej stronie nierówności (14) nie występują składniki odpowiadające tym odcinkom podziału  $\Delta$ , które nie mieszczą się całkowicie w żadnym przedziale podziału  $\bar{\Delta}$ . Sumy te po dodaniu nie przekroczą więc

$$\sum_{r=1}^p \delta_r(M - M_r) = M(b-a) - S.$$

Niech  $\bar{n}$  będzie liczbą odcinków podziału  $\bar{\Delta}$ . Ostatnie wyrazy po prawej stronie nierówności (14) nie przekroczą więc łącznie  $2\bar{n}\eta(M - m)$ . Tym sposobem w wyniku dodawania stronami wszystkich nierówności (14) otrzymamy

$$M(b-a) - \bar{S} \leq M(b-a) - S + 2\bar{n}\eta(M - m),$$

skąd

$$(15) \quad S \leq \bar{S} + 2\bar{n}\eta(M - m).$$

Przyjmując zatem, że  $\eta$  spełnia prócz nierówności (11) jeszcze nierówność

$$(16) \quad 2\bar{n}\eta(M - m) \leq \varepsilon/2,$$

otrzymamy z (15) i (10) nierówność  $S \leq \int_a^b f(x)dx + \varepsilon$ , t.j. drugą z nierówności (9), zachodzącą — jak udowodniliśmy — dla każdego podziału  $\Delta$  spełniającego nierówność (8), gdy tylko  $\eta$  spełnia nierówności (11) i (16).

Podobnie dowodzi się pierwszej z nierówności (9).

(5.2) Dla każdego ciągu normalnego podziałów  $\{\Delta_n\}$  ciąg sum  $\{S_n\}$  dąży do całki górnej, a ciąg sum  $\{s_n\}$  — do całki dolnej.

Dowód. Niech dane będzie dowolne  $\varepsilon > 0$  i dobrane do niego  $\eta > 0$  według lematu (5.1). Ponieważ  $\{\Delta_n\}$  jest z założenia ciągiem normalnym, więc istnieje takie  $N$ , że  $n > N$  pociąga  $|\Delta_n| \leq \eta$ . Na mocy (5.1) otrzymujemy zatem

$$(17) \quad S_n \leq \int_a^b f(x)dx + \varepsilon \quad \text{dla } n > N.$$

Ponieważ całka górna jest kresem dolnym sum górnych  $S$ , więc

$$(18) \quad \int_a^b f(x) dx \leq S_n.$$

Z (17) i (18) dostajemy

$$0 \leq S_n - \int_a^b f(x) dx \leq \varepsilon \quad \text{dla } n > N.$$

Wynika stąd, że  $S_n$  dąży do całki górnej.

Podobnie dowodzi się twierdzenia dla sum dolnych  $s_n$ .

(5.3) *Całka dolna jest niewiększa od całki górnej:*

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx.$$

Wynika to z (5.2), ponieważ  $s_n \leq S_n$  dla dostatecznie wielkich  $n$ .

## 6. Warunki całkowalności funkcji według Riemanna.

(6.1) *Jeżeli całki dolna i górna funkcji  $f(x)$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$  są równe, to funkcja  $f(x)$  jest całkowalna  $\Re$  w tym przedziale i*

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Dowód. Dla każdego ciągu normalnego podziałów  $\{\Delta_n\}$  mamy  $s_n \leq R_n \leq S_n$ . Ponieważ  $s_n$  i  $S_n$  dążą dla  $n \rightarrow \infty$  do całek dolnej i górnej, które według założenia są równe, więc  $R_n$  dąży również do granicy. Wynika stąd, że funkcja  $f(x)$  jest całkowalna w przedziale  $\langle a, b \rangle$  i że jej całka równa się całce górnej i dolnej, c. b. d. d.

(6.2) *Jeżeli funkcja  $f(x)$  jest całkowalna w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , to jej całki górna i dolna w tym przedziale są równe.*

Dowód. Niech  $\{\Delta_n\}$  będzie dowolnym ciągiem normalnym podziałów. Ponieważ suma dolna  $s_n$  jest według określenia kresem dolnym, suma zaś górna  $S_n$  — kresem górnym sum  $R_n$  odpowiadających podziałowi  $\Delta_n$ , więc istnieją dla podziału  $\Delta_n$  sumy  $R'_n$  i  $R''_n$  dostatecznie wielkie, by

$$(19) \quad R'_n \leq s_n + 1/n \quad \text{oraz} \quad S_n - 1/n \leq R''_n.$$

Ponieważ  $R'_n$  i  $R''_n$  dążą do całki funkcji  $f(x)$ , więc  $s_n$  i  $S_n$  dążą na mocy (19) również do całki tej funkcji. Na mocy tw. (5.3) całka górna i dolna funkcji  $f(x)$  są więc równe całce funkcji  $f(x)$ .

Z twierdzeń (6.1) i (6.2) wynika od razu twierdzenie

(6.3) *Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, by funkcja ograniczona w przedziale  $\langle a, b \rangle$  była w nim całkowalna  $\mathfrak{R}$ , jest, żeby jej całki górna i dolna w tym przedziale były równe.*

Twierdzeniu (6.3) można nadać postać następującą:

(6.4) *Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, by funkcja ograniczona  $f(x)$  była w przedziale  $\langle a, b \rangle$  całkowalna  $\mathfrak{R}$ , jest, żeby do każdej liczby  $\varepsilon > 0$  istniał podział  $\Delta$ , dla którego zachodziłaby nierówność*

$$(20) \quad S - s = \sum_{i=1}^n \omega_i \delta x_i < \varepsilon,$$

gdzie  $\omega_i$  oznacza oscylację funkcji  $f(x)$  w przedziale  $\delta x_i$ .

Do wó d. Jeżeli funkcja  $f(x)$  jest całkowalna w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , to na mocy tw. (6.3) jej całki górna i dolna w tym przedziale są równe. Zatem dla każdego ciągu normalnego podziałów  $\{\Delta_n\}$  ciągu  $\{S_n\}$  i  $\{s_n\}$  dążą do tej samej granicy, skąd  $S_n - s_n \rightarrow 0$ . Wynika stąd, że do każdej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje taki podział  $\Delta_n$ , dla którego  $S_n - s_n < \varepsilon$ , tzn. dla którego zachodzi nierówność (20). Warunek jest więc konieczny.

Na odwrót, jeżeli do liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje podział  $\Delta$  o własności (20), to na mocy (7), str. 165

$$0 \leq \int_a^b f(x) dx - \int_a^b f(x) dx < \varepsilon.$$

Ponieważ  $\varepsilon > 0$  jest dowolne, więc wynika stąd, że całki górna i dolna są równe. Na mocy tw. (6.3) funkcja  $f(x)$  jest zatem całkowalna  $\mathfrak{R}$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$ . Warunek jest więc także dostateczny, c. b. d. d.

PRZYKŁADY. 1. Każda funkcja  $f(x)$  ciągła w przedziale  $\langle a, b \rangle$  jest w nim całkowalna  $\mathfrak{R}$ .

Z jednostajnej ciągłości funkcji  $f(x)$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$  (tw. (4.2), str. 112) wynika bowiem, że do każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje taki podział  $\Delta$  na odcinki  $I_1, I_2, \dots, I_n$ , że oscylacja  $\omega_i$  funkcji  $f$  na odcinku  $I_i$  spełnia nierówność  $\omega_i \leq \varepsilon / (b - a)$  dla  $i = 1, 2, \dots, n$ . Stąd dla podziału  $\Delta$

$$S - s = \sum_{i=1}^n \omega_i \delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{b - a} \sum_{i=1}^n \delta x_i = \varepsilon,$$

na mocy więc tw. (6.4) funkcja  $f$  jest całkowalna w przedziale  $\langle a, b \rangle$ .



2. Każda funkcja  $f(x)$  monotoniczna w przedziale  $\langle a, b \rangle$  jest w nim całkowalna  $\mathfrak{R}$ .

Niech bowiem  $f(x)$  będzie funkcją niemalejącą w  $\langle a, b \rangle$ , a  $\Delta$  dowolnym podziałem tego przedziału punktami  $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$ . Ponieważ oscylacja  $\omega_i$  w przedziale  $I_i = \langle x_{i-1}, x_i \rangle$  jest nie większa niż  $f(x_i) - f(x_{i-1})$ , więc

$$S - s = \sum_{i=1}^n \omega_i \delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \omega_i |\Delta| \leq [f(b) - f(a)] \cdot |\Delta|.$$

Jeżeli zatem do dowolnie danej liczby  $\varepsilon > 0$  dobierzemy  $\Delta$  tak, by  $[f(b) - f(a)] \cdot |\Delta| \leq \varepsilon$ , to otrzymamy  $S - s \leq \varepsilon$ . Na mocy tw. (6.4) wynika stąd całkowalność  $\mathfrak{R}$  funkcji  $f(x)$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$ .

**7. Zbiory miary Lebesgue'a 0.** Mówimy, że zbiór liniowy  $E$  ma miarę Lebesgue'a zero, albo że jego miara  $\mathfrak{L}$  jest 0, i piszemy  $m(E) = 0$ , jeżeli do każdej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje skończony lub przeliczalny ciąg przedziałów  $\{I_n\}$ , spełniający warunki: .

$$(i) \quad E \subset \sum_n I_n$$

$$(ii) \quad \sum_n \delta_n \leq \varepsilon, \quad \text{gdzie} \quad \delta_n = \delta(I_n).$$

**PRZYKŁADY.** 1. Punkt jest miary  $\mathfrak{L}$  zero. Punkt  $a$  mieści się bowiem w przedziale  $\langle a - \varepsilon/2, a + \varepsilon/2 \rangle$  o długości  $\varepsilon$ , gdzie  $\varepsilon$  jest dowolną liczbą dodatnią.

2. Każdy zbiór skończony lub przeliczalny jest miary  $\mathfrak{L}$  zero. Jeżeli bowiem  $E$  jest zbiorem skończonym lub przeliczalnym złożonym z punktów  $\{a_n\}$ , a  $\varepsilon$  — dowolną liczbą dodatnią, to oznaczając przez  $I_n$  przedział  $\langle a_n - \varepsilon/2^n, a_n + \varepsilon/2^n \rangle$ , stwierdzamy łatwo, że spełnione są warunki (i) i (ii).

3. Zbiór Cantora  $\mathcal{C}$  jest zbiorem miary  $\mathfrak{L}$  zero. Przy konstrukcji bowiem zbioru Cantora (str. 65) po wyrzuceniu przedziałów otwartych środkowych w  $n$  pierwszych przybliżeniach pozostaje z przedziału  $\langle 0, 1 \rangle$   $2^n$  równych przedziałów zamkniętych  $I_1, \dots, I_{2^n}$  o łącznej długości  $2^n \cdot (\frac{1}{3})^n = (\frac{2}{3})^n$ . Oczywiście  $\mathcal{C} \subset I_1 + \dots + I_{2^n}$ . Do każdej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje takie  $n$ , że  $(\frac{2}{3})^n \leq \varepsilon$ , skąd  $|I_1| + \dots + |I_{2^n}| \leq \varepsilon$ . Miara  $\mathfrak{L}$  zbioru  $\mathcal{C}$  jest więc zerem.

Na mocy określenia

(7.1) *Każda część zbioru miary  $\mathcal{Q}$  zero jest zbiorem miary  $\mathcal{Q}$  zero.*

Np. każda część zbioru Cantora jest zbiorem miary zero.

(7.2) *Jeżeli zbiór  $E$  jest miary  $\mathcal{Q}$  zero, to do każdej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje skończony lub przeliczalny zbiór przedziałów  $\{I'_n\}$  spełniających warunki (i) i (ii) oraz stanowiących pokrycie zbioru  $E$ .*

Dowód. Na mocy założenia istnieje skończony lub przeliczalny zbiór przedziałów  $\{I'_n\}$  spełniający warunki:

$$(i') \quad E \subset I'_1 + I'_2 + \dots,$$

$$(ii') \quad |I'_1| + |I'_2| + \dots \leq \varepsilon/2.$$

Oznaczając przez  $I_n$  przedział zawierający w swoim wnętrzu  $I'_n$  i taki, by  $|I'_n| \leq 2|I_n|$ , stwierdzamy łatwo, że przedziały  $\{I_n\}$  spełniają warunki (i) i (ii) oraz stanowią pokrycie (str. 69) zbioru  $E$ .

Z tw. (7.2) wynika w szczególności, że:

(7.3) *Jeżeli  $E$  jest zbiorem zamkniętym ograniczonym miary  $\mathcal{Q}$  zero, wówczas do każdej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje skończony zbiór przedziałów  $I_1, I_2, \dots, I_N$  spełniający warunki (i), (ii) i stanowiący pokrycie zbioru  $E$ .*

Jeżeli bowiem przedziały  $\{I_n\}$  tworzą pokrycie zbioru  $E$  i  $|I_1| + |I_2| + \dots \leq \varepsilon$ , to na mocy tw. (6.2), str. 70, istnieje wśród tych przedziałów skończona liczba przedziałów  $I_1, \dots, I_N$  stanowiących również pokrycie zbioru  $E$  i oczywiście mamy tym bardziej  $|I_1| + \dots + |I_N| \leq \varepsilon$ .

(7.4) *Suma skończonej lub przeliczalnej ilości zbiorów miary  $\mathcal{Q}$  zero jest zbiorem miary  $\mathcal{Q}$  zero.*

Dowód. Niech  $E_1, E_2, \dots, E_n, \dots$  będą zbiorami miary  $\mathcal{Q}$  zero. Na mocy tw. (7.2) do każdej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje więc ciąg przedziałów  $I_1^{(1)}, I_2^{(1)}, \dots$  pokrywający  $E_1$ , ciąg przedziałów  $I_1^{(2)}, I_2^{(2)}, \dots$  pokrywający  $E_2$  itd. tak, by

$$(21) \quad |I_1^{(1)}| + |I_2^{(1)}| + \dots \leq \varepsilon/2, \quad |I_1^{(2)}| + |I_2^{(2)}| + \dots \leq \varepsilon/2^2 \quad \text{itd.}$$

Przedziały  $I_1^{(1)}, I_2^{(1)}, \dots, I_1^{(2)}, I_2^{(2)}, \dots$  itd. pokrywają oczywiście sumę  $E_1 + E_2 + \dots$  i ponadto na mocy (21)

$$(|I_1^{(1)}| + |I_2^{(1)}| + \dots) + (|I_1^{(2)}| + |I_2^{(2)}| + \dots) + \dots \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2^2 + \dots \leq \varepsilon.$$

Ponieważ  $\varepsilon > 0$  jest dowolne, więc miara  $\mathcal{Q}$  sumy  $E_1 + E_2 + \dots$  jest zerem.

(7.5) *Przedział nie jest zbiorem miary  $\mathcal{Q}$  zero.*

Dowód. Przypuśćmy, że miara  $\mathfrak{L}$  przedziału  $\langle a, b \rangle$  jest zerem. Zatem dla  $\varepsilon = \frac{1}{2}(b-a)$  istnieje takie pokrycie przedziału  $\langle a, b \rangle$  przedziałami  $I_1, I_2, \dots, I_n, \dots$ , że

$$(22) \quad |I_1| + |I_2| + \dots + |I_n| + \dots \leq \frac{1}{2}(b-a).$$

Przedział zamknięty  $\langle a', b' \rangle$ , gdzie  $a' = a + \varepsilon/4$  i  $b' = b - \varepsilon/4$ , jest zawarty w  $\langle a, b \rangle$ ; zatem przedziały  $I_1, I_2, \dots$  tworzą również pokrycie przedziału  $\langle a', b' \rangle$ . Na mocy (7.3) istnieje więc takie  $N$ , że przedziały  $I_1, I_2, \dots, I_n$  pokrywają przedział  $\langle a', b' \rangle$ . Wynika stąd, że

$$|I_1| + |I_2| + \dots + |I_n| \geq b' - a' = b - a - \varepsilon/2 = \frac{3}{4}(b-a),$$

wbrew (22). Doszliśmy więc do sprzeczności.

(7.6) *Zbiór miary  $\mathfrak{L}$  zero nie posiada punktów wewnętrznych.*

Dowód. Gdyby bowiem punkt  $a$  zbioru  $E$  miary  $\mathfrak{L}$  zero był jego punktem wewnętrznym, wówczas istniałby przedział otwarty  $\langle a', b' \rangle \subset E$ . Ponieważ na mocy (7.5) przedział nie jest zbiorem miary  $\mathfrak{L}$  zero, więc na mocy (7.1) miara  $\mathfrak{L}$  zbioru  $E$  też nie mogłaby być zerem.

W szczególności

(7.7) *Żaden zbiór otwarty nie jest miary  $\mathfrak{L}$  zero.*

## 8. Warunki Lebesgue'a całkowalności $\mathfrak{R}$ funkcji.

(8.1) *Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, by funkcja  $f(x)$  ograniczona w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , była w nim całkowalna  $\mathfrak{R}$ , jest żeby zbiór punktów nieciągłości funkcji  $f(x)$  w tym przedziale był zbiorem miary  $\mathfrak{L}$  zero.*

Dowód. Załóżmy, że funkcja  $f(x)$  jest całkowalna w  $\langle a, b \rangle$ . Oznaczmy przez  $\omega(x)$  oscylację tej funkcji w punkcie  $x$  i przez  $E_k$  zbiór tych punktów  $x$  przedziału  $\langle a, b \rangle$  w których  $\omega(x) \geq 1/k$ . Na mocy tw. (6.4) do każdej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje taki podział  $\Delta$  przedziału  $\langle a, b \rangle$ , że

$$(23) \quad \sum_{i=1}^n \omega_i \delta x_i \leq \varepsilon/k.$$

Weźmy pod uwagę te spośród odcinków  $I_i$  podziału  $\Delta$ , na których oscylacja funkcji  $f$  przybiera wartości  $\omega_i \geq 1/k$ . Oznaczmy te odcinki przez  $I'_1, I'_2, \dots, I'_r$ , a oscylację funkcji  $f$  na nich przez  $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_r$ . Zatem

$$(24) \quad \omega'_i \geq 1/k \quad \text{dla} \quad i = 1, 2, \dots, r.$$

Pozostałe odcinki podziału  $\Delta$  oznaczmy przez  $I'_1, I'_2, \dots, I'_s$ , a oscylacje funkcji  $f$  na nich przez  $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_s$ . Zatem

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \delta x_i = \sum_{i=1}^r \omega'_i |I'_i| + \sum_{i=1}^s \omega''_i |I''_i| \geq \sum_{i=1}^r \omega'_i |I'_i|,$$

skąd na mocy (23) i (24)

$$(25) \quad \frac{1}{k} \sum_{i=1}^r |I'_i| \leq \frac{\varepsilon}{k} \quad \text{czyli} \quad \sum_{i=1}^r |I'_i| \leq \varepsilon.$$

Ponieważ oscylacje funkcji  $f$  na odcinkach  $I'_1, I'_2, \dots, I'_s$  są mniejsze od  $1/k$ , więc w punktach położonych wewnątrz tych odcinków są one również mniejsze od  $1/k$ . Wynika stąd, że każdy punkt zbioru  $E_k$  należy do jednego z odcinków  $I'_1, I'_2, \dots, I'_r$ . Zatem na mocy (25) miara  $\mathfrak{Q}$  zbioru  $E_k$  jest zerem, gdyż  $\varepsilon > 0$  jest dowolne.

Niech  $H$  będzie zbiorem punktów nieciągłości funkcji  $f$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$ . Oczywiście

$$(26) \quad H = \sum_{k=1}^{\infty} E_k,$$

w każdym bowiem punkcie nieciągłości  $x$  oscylacja  $\omega(x)$  jest dodatnia, a zatem punkt ten należy do jakiegoś zbioru  $E_k$ , mianowicie do takiego, że  $\omega(x) > 1/k$ .

Ponieważ każdy ze zbiorów  $E_k$  jest miary  $\mathfrak{Q}$  zero, więc na mocy (26) i tw. (7.4) zbiór  $H$  jest też zbiorem miary  $\mathfrak{Q}$  zero. Warunek jest zatem konieczny.

Na odwrót, założmy, że zbiór punktów nieciągłości funkcji  $f(x)$  na odcinku  $\langle a, b \rangle$  jest miary  $\mathfrak{Q}$  zero. Dla każdej liczby naturalnej  $k$  zbiór tych punktów  $x$ , w których  $\omega(x) \geq 1/k$ , tj. zbiór  $E_k$ , jest na mocy (7.1) miary  $\mathfrak{Q}$  zero.

Ponieważ nadto  $E_k$  jest na mocy tw. (2.6), str. 108, zbiorem zamkniętym i ograniczonym, więc na mocy (6.2), str. 69, istnieje do każdego  $\varepsilon > 0$  skończony zbiór przedziałów otwartych  $I_1, I_2, \dots, I_n$  tworzący pokrycie zbioru  $E_k$ , przy czym  $|I_1| + |I_2| + \dots + |I_n| \leq \varepsilon$ .

Utwórzmy taki podział  $\bar{\Delta}$  przedziału  $\langle a, b \rangle$ , by każdy z odcinków  $I_1, \dots, I_n$  był sumą skończonej liczby odcinków podziału  $\bar{\Delta}$ . Oznaczmy przez  $I'_1, I'_2, \dots, I'_r$  odcinki podziału  $\bar{\Delta}$  pokryte przez odcinki  $I_1, I_2, \dots, I_n$ , a przez  $\omega'_1, \dots, \omega'_r$  oscylacje funkcji  $f$  na tych odcinkach. Mamy

$$(27) \quad |I'_1| + |I'_2| + \dots + |I'_r| \leq \varepsilon.$$

Pozostałe odcinki podziału  $\bar{\Delta}$  oznaczmy przez  $\bar{I}_1, \dots, \bar{I}_m$ . W każdym punkcie  $x$  przedziału zamkniętego  $\bar{I}_j$ , gdzie  $j=1, 2, \dots, m$ , oscylacja funkcji  $f$  spełnia nierówność  $\omega(x) < 1/k$ , gdyż  $x \in E_k$ . Możemy więc podzielić odcinek  $\bar{I}_i$  na tak małe odcinki, by oscylacja na żadnym z nich nie przekraczała  $1/k$ . Dzieląc w ten sposób każdy z przedziałów  $\bar{I}_1, \bar{I}_2, \dots, \bar{I}_m$ , otrzymamy nowe odcinki  $I'_1, I'_2, \dots, I'_s$ , na których oscylacje  $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_s$  funkcji  $f$  spełniają nierówności

$$(28) \quad \omega'_i \leq 1/k \quad \text{dla } i=1, 2, \dots, s.$$

Przedziały  $I'_1, I'_2, \dots, I'_r, I''_1, I''_2, \dots, I''_s$  tworzą pewien podział  $\Delta$ , dla którego

$$S - s = \sum_{i=1}^r \omega'_i |I'_i| + \sum_{i=1}^s \omega''_i |I''_i|,$$

skąd na mocy (27) i (28) otrzymujemy

$$S - s \leq \omega \varepsilon + \frac{1}{k} (b - a),$$

gdzie  $\omega$  jest oscylacją funkcji  $f$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$ .

Ponieważ  $\varepsilon$  i  $1/k$  mogą być dowolnie małymi liczbami dodatnimi, więc na mocy tw. (6.4) funkcja  $f(x)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w  $\langle a, b \rangle$ . Warunek jest zatem dostateczny, c. b. d. d.

**PRZYKŁADY.** 1. *Każda funkcja ciągła w przedziale zamkniętym jest w nim całkowalna  $\mathfrak{R}$ .*

Jest bowiem na nim ograniczona i jej zbiór punktów nieciągłości jest pusty, zatem miary  $\mathfrak{Q}$  zero.

2. *Każda funkcja ograniczona w przedziale zamkniętym i mająca w nim skończony lub przeliczalny zbiór punktów nieciągłości jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w tym przedziale.*

Zbiór skończony lub przeliczalny jest bowiem miary  $\mathfrak{Q}$  zero (p. str. 170, przykład 2).

**9. Własności funkcji całkowalnych  $\mathfrak{R}$ .** Użyjemy teraz twierdzenia (8.1) do dowodu następujących twierdzeń:

(9.1) *Wartość bezwzględna funkcji całkowalnej  $\mathfrak{R}$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$  jest funkcją całkowalną  $\mathfrak{R}$  w tym przedziale.*

**Dowód.** Jeżeli funkcja  $f(x)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$ , to punkty nieciągłości funkcji  $|f(x)|$  są zarazem punktami nieciągłości funkcji  $f(x)$ . Ponieważ zbiór ostatnich jest miary  $\mathfrak{Q}$  zero na mocy tw. (8.1),

więc zbiór punktów nieciągłości funkcji  $|f(x)|$  (jako część poprzedniego) jest na mocy tw. (7.1) również miary  $\mathfrak{L}$  zero. Na mocy tw. (8.1) funkcja  $|f(x)|$  jest więc całkowalna  $\mathfrak{R}$ , gdyż jest ograniczona.

(9.2) *Iloczyn dwu funkcji  $f_1(x)$  i  $f_2(x)$  całkowalnych  $\mathfrak{R}$  jest funkcją całkowalną  $\mathfrak{R}$ .*

Dowód. Niech  $H_1, H_2$  i  $H$  będą zbiorami punktów nieciągłości funkcji  $f_1(x)$ ,  $f_2(x)$  i  $f_1(x)f_2(x)$ . Oczywiście  $H \subset H_1 + H_2$ . Ponieważ  $H_1$  i  $H_2$  są na mocy tw. (8.1) zbiorami miary  $\mathfrak{L}$  zero, więc na mocy tw. (7.4)  $H$  jest miary  $\mathfrak{L}$  zero. Ponieważ nadto  $f_1(x)f_2(x)$  jest funkcją ograniczoną, więc na mocy tw. (8.1) jest całkowalna  $\mathfrak{R}$ .

(9.3) *Funkcja całkowalna  $\mathfrak{R}$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w każdym przedziale zawartym w  $\langle a, b \rangle$ .*

Dowód. Wówczas jej zbiór punktów nieciągłości w całym przedziale jest miary  $\mathfrak{L}$  zero na mocy tw. (8.1). Tym bardziej więc miary  $\mathfrak{L}$  zero jest, na mocy tw. (7.1), zbiór jej punktów nieciągłości w każdym przedziale częściowym.

(9.4) *Jeżeli funkcja  $f(x)$  ograniczona w przedziale  $\langle a, b \rangle$  przybiera w nim wszędzie wartość 0 z wyjątkiem punktów pewnego zbioru zamkniętego  $A$  miary  $\mathfrak{L}$  zero, to jest ona całkowalna  $\mathfrak{R}$  w tym przedziale i  $\int_a^b f(x)dx = 0$ .*

Dowód. Jeżeli jakiś punkt  $x$  nie należy do  $A$ , to z uwagi, że  $A$  jest zbiorem zamkniętym,  $x$  nie jest punktem skupienia tego zbioru i wobec tego istnieje pewne otoczenie punktu  $x$  rozłączne z  $A$  (p. tw. (7.5), str. 72). W tym otoczeniu funkcja  $f(x)$ , jako tożsamościowo równa 0, jest ciągła, w szczególności więc jest ciągła w punkcie  $x$ .

Punkty nieciągłości funkcji  $f(x)$  mieszczą się zatem w  $A$  i przeto stanowią z założenia zbiór miary  $\mathfrak{L}$  zero. Na mocy tw. (8.1) funkcja  $f(x)$  jest więc całkowalna  $\mathfrak{R}$ .

Niech  $\Delta$  będzie dowolnym podziałem przedziału  $\langle a, b \rangle$ . Ponieważ  $A$ , jako zbiór miary  $\mathfrak{L}$  zero, nie zawiera na mocy tw. (7.6) żadnego odcinka, więc w każdym odcinku  $\delta x_i$  podziału  $\Delta$  istnieje punkt  $x_i$  nie należący do  $A$ . Oczywiście  $f(x_i) = 0$ , skąd  $R = \sum_i f(x_i) \delta x_i = 0$ , a zatem  $\int_a^b f(x)dx = 0$ , c. b. d. d.

(9.5) Jeżeli ciąg funkcji  $\{f_n(x)\}$  całkowalnych  $\Re$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$  jest w nim jednostajnie zbieżny do funkcji  $f(x)$ , to funkcja  $f(x)$  jest całkowalna w tym przedziale i

$$(29) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Dowód. Niech  $H_n$  będzie zbiorem punktów nieciągłości funkcji  $f_n(x)$  i niech  $H = H_1 + H_2 + \dots$ . Ponieważ zbiory  $H_1, H_2, \dots$  są miary  $\mathfrak{L}$  zero, zatem na mocy tw. (7.4)  $H$  jest również zbiorem miary  $\mathfrak{L}$  zero. Jeżeli więc punkt  $x$  przedziału  $\langle a, b \rangle$  nie należy do  $H$ , to wszystkie funkcje ciągu  $\{f_n(x)\}$  są ciągłe w  $x_0$ , skąd na mocy tw. (2.5), str. 125, funkcja  $f(x)$  jest ciągła w  $x_0$ . Zatem zbiór punktów nieciągłości funkcji  $f(x)$  mieści się w  $H$ , więc jego miara  $\mathfrak{L}$  jest również zerem na mocy tw. (7.1). Ponieważ nadto funkcja  $f(x)$  jest na mocy tw. (2.4), str. 125, ograniczona w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , więc na mocy tw. (8.1) jest ona całkowalna  $\Re$  w tym przedziale.

Wobec założenia, że  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , istnieje dla każdego  $\varepsilon > 0$  takie  $N$ , że  $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$  dla  $n > N$ , skąd

$$(30) \quad \left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^b [f_n(x) - f(x)] dx \right| \leq \varepsilon |b - a|$$

dla  $x \in \langle a, b \rangle$  i  $n \geq N$ . Z nierówności (30) wynika (29), ponieważ  $\varepsilon > 0$  było dowolne.

**10. Całka Riemanna a funkcja pierwotna.** Możemy teraz dowieść następujących własności całki Riemanna:

(10.1) Jeżeli funkcja  $f(x)$  jest całkowalna  $\Re$  w przedziałach  $\langle a, c \rangle$  i  $\langle c, b \rangle$ , oraz  $a < c < b$ , to funkcja  $f(x)$  jest całkowalna w przedziale  $\langle a, b \rangle$  i

$$(31) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Dowód. Zbiór punktów nieciągłości funkcji  $f(x)$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$  jest na mocy tw. (7.1) miary  $\mathfrak{L}$  zero, jako suma zbiorów punktów nieciągłości tej funkcji w przedziałach  $\langle a, c \rangle$  i  $\langle c, b \rangle$ , które są miary  $\mathfrak{L}$  zero na mocy tw. (8.1). Zatem na mocy tw. (8.1) funkcja  $f(x)$  jest całkowalna w przedziale  $\langle a, b \rangle$ .

Niech  $\{\Delta_n\}$  będzie ciągiem podziałów przedziału  $\langle a, b \rangle$  zachowujących stale punkt  $c$  jako punkt podziału. Oznaczając przez  $R_n$  sumę dla podziału  $\Delta_n$ , a przez  $R'_n$  i  $R''_n$  sumę składników, które odpowiadają odcinkom podziału  $\Delta_n$  mieszczącym się w przedziałach  $\langle a, c \rangle$  i  $\langle c, b \rangle$ , otrzymamy  $R_n = R'_n + R''_n$ . Otrzymujemy stąd równość (30), przechodząc do granicy dla  $n \rightarrow \infty$ .

*Uwaga.* Jeżeli funkcja  $f(x)$  jest całkowalna w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , to przyjmujemy, że

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx, \quad \int_a^a f(x) dx = 0.$$

Dowodzi się łatwo, że w tym znakowaniu wzór (31) zachodzi dla dowolnych liczb  $a, b, c$ , byleby istniały wszystkie całki występujące w tym wzorze.

Jeżeli funkcja  $f(x)$  jest całkowalna w przedziale o końcach  $a, b$  i  $K$  jest kresem górnym funkcji  $|f(x)|$  w tym przedziale, to

$$(32) \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq |b - a| K.$$

Gdy  $a < b$ , nierówność (32) jest identyczna z nierównością (3), str. 163. Stąd wynika łatwo nierówność (32) dla  $a \geq b$ .

(10.2) Jeżeli funkcja  $f(x)$  jest całkowalna  $\Re$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , to funkcja

$$F(x) = \int_c^x f(t) dt, \quad \text{gdzie } a \leq c \leq b \text{ i } a \leq x \leq b,$$

jest ciągła w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , a ponadto w każdym punkcie  $x_0$ , w którym funkcja  $f(x)$  jest ciągła, istnieje pochodna  $F'(x_0)$  i

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

Dowód. Oznaczmy przez  $K$  kres górny funkcji  $|f(x)|$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$ . Dla dowolnych punktów  $x'$  i  $x''$  tego przedziału mamy, stosując tw. (10.1),

$$\begin{aligned} |F(x') - F(x'')| &= \left| \int_c^{x'} f(t) dt - \int_c^{x''} f(t) dt \right| = \left| \int_c^{x''} f(t) dt + \int_{x''}^{x'} f(t) dt - \int_c^{x''} f(t) dt \right| = \\ &= \left| \int_{x''}^{x'} f(t) dt \right| \leq |x' - x''| K. \end{aligned}$$



Funkcja  $F(x)$  spełnia więc w przedziale  $\langle a, b \rangle$  warunek Lipschitza, a tym samym jest ciągła w  $\langle a, b \rangle$ .

Niech teraz  $x_0 \in \langle a, b \rangle$  będzie punktem ciągłości funkcji  $f(x)$ . Dla każdego  $x \in \langle a, b \rangle$  oznaczmy przez  $K_x$  kres górny różnicy  $|f(x) - f(x_0)|$  w przedziale  $\langle x_0, x \rangle$ . Wówczas

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| = \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x [f(t) - f(x_0)] dt \right| \leq K_x.$$

Z ciągłości funkcji  $f(x)$  w punkcie  $x_0$  wynika, że  $K_x \rightarrow 0$  dla  $x \rightarrow x_0$ , skąd

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = f(x_0),$$

czyli  $F'(x_0) = f(x_0)$ , c. b. d. d.

Funkcję  $F(x)$  nazywamy *funkcją pierwotną* funkcji  $f(x)$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , gdy w każdym punkcie tego przedziału  $F'(x) = f(x)$ .

(10.3) Jeżeli  $F(x)$  jest funkcją pierwotną funkcji  $f(x)$  całkowalnej  $\Re$  w przedziale  $\langle a, b \rangle$ , to

$$(33) \quad \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Dowód. Niech  $\Delta$  będzie dowolnym podziałem odcinka  $\langle a, b \rangle$  punktami  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ . Mamy

$$F(b) - F(a) = (F(x_1) - F(x_0)) + (F(x_2) - F(x_1)) + \dots + (F(x_n) - F(x_{n-1})).$$

Na mocy twierdzenia o wartości średniej

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i) (x_i - x_{i-1}), \quad \text{gdzie } x_{i-1} < \xi_i < x_i.$$

Ponieważ  $F'(\xi_i) = f(\xi_i)$ , więc dla  $\delta x_i = \langle x_{i-1}, x_i \rangle$  otrzymujemy

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \delta x_i = R.$$

Jeżeli więc  $\{\Delta_n\}$  jest dowolnym ciągiem normalnym podziałów, dostaniemy  $F(b) - F(a) = R_n$ , skąd otrzymujemy (33), przechodząc do granicy dla  $n \rightarrow \infty$ .

## § 2. Całki wielokrotne.

**1. Podział przedziału.** Niech  $I$  będzie dowolnym przedziałem zamkniętym przestrzeni  $\mathcal{E}^n$ .

*Podziałem* przedziału  $I$  nazywamy dowolny skończony zbiór  $\Delta$  nie zachodzących na siebie przedziałów zamkniętych  $I_1, \dots, I_m$ , których sumą jest  $I$ .

Podział przedziału  $I = \langle a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n \rangle$  możemy otrzymać np., tworząc najpierw dla każdego  $i=1, 2, \dots, n$  dowolny podział  $\Delta_i$  przedziału  $\langle a_i, b_i \rangle$  za pomocą punktów

$$(1) \quad a_i = x_i^{(0)} < x_i^{(1)} < \dots < x_i^{(k_i)} = b_i.$$

Podziałem przedziału  $I$  będzie wówczas zbiór wszystkich przedziałów postaci

$$(2) \quad \langle x_1^{(j_1)}, \dots, x_n^{(j_n)}; x_1^{(j_1+1)}, \dots, x_n^{(j_n+1)} \rangle,$$

gdzie  $j_i$  jest dowolną z liczb  $0, 1, \dots, k_i-1$ , a więc gdzie  $\langle x_i^{(j_i)}, x_i^{(j_i+1)} \rangle$  jest dowolnym odcinkiem podziału  $\Delta_i$  odcinka  $\langle a_i, b_i \rangle$ .

Taki podział nazywamy *siatką* przedziału  $I$ .

Siatkę prostokąta otrzymujemy np., dzieląc go na prostokąty za pomocą prostych równoległych do jego boków. Podobnie, siatkę prostopadłościanu  $I = \langle a_1, a_2, a_3; b_1, b_2, b_3 \rangle$  dostajemy, dzieląc go na prostopadłościany płaszczyznami równoległymi do płaszczyzn  $xy$ ,  $yz$  i  $zx$ .

(1.1) *Jeżeli przedziały  $I_1, \dots, I_m$  (zachodzące na siebie lub nie) leżą w przedziale  $I$ , to istnieje siatka  $\Delta$  o tej własności, że każdy przedział  $I_l$ , gdzie  $l=1, \dots, m$ , jest sumą pewnych przedziałów tej siatki.*

Niech bowiem  $I_l$  będzie postaci (2). Utwórzmy podział  $\Delta_l$  odcinka  $\langle a_l, b_l \rangle$  za pomocą punktów (1). Siatka  $\Delta$  otrzymana z podziałów  $\Delta_i$  dla  $i=1, 2, \dots, n$  spełnia oczywiście tezę twierdzenia.

*Uwaga.* W szczególności, jeżeli przedziały  $I_1, \dots, I_m$  nie zachodzą na siebie, to dołączając do nich te przedziały siatki  $\Delta$ , które nie są w nich zawarte, otrzymamy siatkę, w której skład wchodzi przedziały  $I_1, \dots, I_m$ .

Podział  $\Delta_1$  nazywamy *podziałem następczym* podziału  $\Delta$ , jeżeli każdy przedział podziału  $\Delta_1$  jest zawarty w jakimś przedziale podziału  $\Delta$ .

Oczywiście

(1.2) Jeżeli  $\Delta_2$  jest podziałem następczym podziału  $\Delta_1$ , a  $\Delta_3$  podziału  $\Delta_2$ , to  $\Delta_3$  jest podziałem następczym podziału  $\Delta_1$ .

Z (1.1) wynika, że

(1.3) Dla każdego podziału  $\Delta$  istnieje siatka  $\Delta_1$ , która jest jego podziałem następczym.

(1.4) Dla każdych dwóch siatek  $\Delta'$  i  $\Delta''$  przedziału  $I$  istnieje siatka  $\Delta$ , która jest podziałem następczym zarówno siatki  $\Delta'$  jak siatki  $\Delta''$ .

Niech bowiem siatka  $\Delta'$  powstaje z podziałów odcinków  $\langle a_i, b_i \rangle$  dla  $i=1, \dots, n$  za pomocą punktów  $a_i = \xi_i^{(0)} < \xi_i^{(1)} < \dots < \xi_i^{(r_i)} = b_i$ , a  $\Delta''$  za pomocą punktów  $a_i = \eta_i^{(0)} < \eta_i^{(1)} < \dots < \eta_i^{(s_i)} = b_i$ . Wówczas siatkę  $\Delta$  następczą siatek  $\Delta'$  i  $\Delta''$  otrzymamy, tworząc siatkę powstającą z podziałów odcinków  $\langle a_i, b_i \rangle$  za pomocą punktów  $\xi_i^{(0)}, \xi_i^{(1)}, \dots, \xi_i^{(r_i)}, \eta_i^{(0)}, \eta_i^{(1)}, \dots, \eta_i^{(s_i)}$ .

(1.5) Dla każdych dwóch podziałów  $\Delta'$  i  $\Delta''$  przedziału  $I$  istnieje siatka  $\Delta$ , która jest podziałem następczym zarówno podziału  $\Delta'$  jak podziału  $\Delta''$ .

Na mocy tw. (1.3) istnieją bowiem siatki  $\bar{\Delta}'$  i  $\bar{\Delta}''$  następcze podziałów  $\Delta'$  i  $\Delta''$ . Na mocy zaś tw. (1.4) istnieje siatka  $\Delta$  następcza siatek  $\Delta'$  i  $\Delta''$ . Oczywiście siatka  $\Delta$  jest na mocy (1.2) podziałem następczym podziałów  $\Delta'$  i  $\Delta''$ .

Największą średnicę przedziałów  $I_1, \dots, I_m$  podziału  $\Delta$  oznaczamy przez  $|\Delta|$ :

$$|\Delta| = \max_{i=1, \dots, m} d(I_i).$$

Ciąg podziałów  $\{\Delta_\nu\}_{\nu=1, 2, \dots}$  nazywamy *normalnym*, jeżeli  $|\Delta_\nu| \rightarrow 0$  dla  $\nu \rightarrow \infty$ .

Np. dzieląc przedziały  $\langle a_i, b_i \rangle$  na  $\nu=1, 2, \dots$  równych części i tworząc do tych podziałów siatki  $\Delta_\nu$ , otrzymamy ciąg normalny podziałów. Mamy bowiem  $|\Delta_\nu| = \frac{1}{\nu} \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + \dots + (b_n - a_n)^2} \rightarrow 0$  dla  $\nu \rightarrow \infty$ .

**2. Miara przedziału.** Miarą przedziału zamkniętego lub otwartego  $I = [a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n]$  nazywamy iloczyn

$$(3) \quad |I| = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \dots (b_n - a_n) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

W szczególności więc miarą przedziału  $[a, b]$  linii prostej jest jego długość  $|b - a|$ ; miarą przedziału  $[a_1, a_2; b_1, b_2]$  płaszczyzny  $\mathcal{E}^2$  jest jego pole  $(b_1 - a_1)(b_2 - a_2)$ ; miarą przedziału  $[a_1, a_2, a_3; b_1, b_2, b_3]$  przestrzeni  $\mathcal{E}^3$  jest jego objętość  $(b_1 - a_1)(b_2 - a_2)(b_3 - a_3)$  itd.

(2.1) *Jeżeli przedział zamknięty  $I$  jest sumą skończonej liczby przedziałów  $I_1, \dots, I_m$  nie zachodzących na siebie, to*

$$(4) \quad |I| = |I_1| + \dots + |I_m|.$$

Dowód. Załóżmy najpierw, że przedziały te tworzą siatkę  $\Delta$  otrzymaną z podziałów punktami  $a_i = x_i^{(0)} < x_i^{(1)} < \dots < x_i^{(k_i)} = b_i$ , gdzie  $i = 1, 2, \dots, n$ . Wówczas  $|b_i - a_i| = |x_i^{(1)} - x_i^{(0)}| + \dots + |x_i^{(k_i)} - x_i^{(k_i-1)}|$ , a zatem na mocy (3)

$$|I| = (|x_1^{(1)} - x_1^{(0)}| + \dots + |x_1^{(k_1)} - x_1^{(k_1-1)}|) \cdot \dots \cdot (|x_n^{(1)} - x_n^{(0)}| + \dots + |x_n^{(k_n)} - x_n^{(k_n-1)}|).$$

Składniki sumy, jakie otrzymamy po wykonaniu mnożenia, są to miary przedziałów  $I_1, \dots, I_m$  tworzących siatkę  $\Delta$ .

Założmy teraz ogólnie, że przedziały te tworzą dowolny podział  $\Delta$  przedziału  $I$ . Utwórzmy siatkę  $\Delta'$  będącą podziałem następnym podziału  $\Delta$  (p. str. 180). Każdy przedział  $I_j$  dla  $j = 1, \dots, m$  jest sumą pewnej liczby przedziałów siatki  $\Delta'$  (które, jak łatwo widzieć, tworzą siatkę przedziału  $I_j$ ). Zatem miara przedziału  $I_j$  jest sumą miar tych przedziałów. Wynika stąd, że suma miar przedziałów  $I_1, \dots, I_m$  równa jest sumie miar przedziałów siatki  $\Delta'$ , a więc mierze przedziału  $I$ , c. b. d. d.

(2.2) *Jeżeli przedziały  $I_1, \dots, I_m$  nie zachodzą na siebie i zawarte są w sumie przedziałów  $J_1, \dots, J_l$ , to*

$$(5) \quad |I_1| + \dots + |I_m| \leq |J_1| + \dots + |J_l|.$$

Dowód. Niech  $I$  będzie dowolnym przedziałem zamkniętym, zawierającym wszystkie przedziały

$$(6) \quad I_1, \dots, I_m, \quad J_1, \dots, J_l.$$

Na mocy tw. (1.1) istnieje siatka  $\Delta$  przedziału  $I$  o tej własności, że każdy z przedziałów (6) jest sumą pewnej liczby przedziałów siatki  $\Delta$ . A zatem miara każdego z przedziałów (6) jest sumą miar tych przedziałów siatki  $\Delta$ , które w nim leżą. Stąd wynika już łatwo (5).

**3. Określenie całki wielokrotnej.** Niech  $f(x_1, \dots, x_n)$  będzie funkcją ograniczoną, określoną w przedziale zamkniętym

$$I = \langle a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n \rangle.$$

Utwórzmy dowolny podział  $\Delta$  przedziału  $I$ , złożony z przedziałów  $I_1, \dots, I_m$ . Dla każdego  $j=1, \dots, m$  weźmy pod uwagę w przedziale  $I_j$  dowolny punkt  $p_j$  o współrzędnych  $\xi_1^{(j)}, \xi_2^{(j)}, \dots, \xi_n^{(j)}$  i niech

$$(7) \quad R = \sum_{j=1}^m f(\xi_1^{(j)}, \xi_2^{(j)}, \dots, \xi_n^{(j)}) \cdot |I_j| = \sum_{j=1}^m f(p_j) \cdot |I_j|.$$

Jeżeli dla wszystkich ciągów normalnych podziałów  $\{\Delta_\nu\}$  przedziału  $I$  sumy  $R$  dążą do tej samej granicy (niezależnie od wyboru punktów  $p_j$ ), wówczas granicę tą nazywamy *n-krotną całką Riemanna funkcji  $f(x_1, \dots, x_n)$  w  $I$*  i oznaczamy ją przez

$$\int_I \dots \int_I f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n \quad \text{lub przez} \quad \int_I f(p) dp.$$

Funkcję  $f$  nazywamy wówczas *całkowalną  $\mathfrak{R}$  (czyli całkowalną według Riemanna)* w przedziale  $I$ .

*Uwaga.* Jeżeli dla każdego ciągu normalnego podziałów sumy (7) są zbieżne, to są one zbieżne do tej samej granicy (p. str. 163).

(3.1) Niech  $f(p)$  będzie funkcją całkowalną  $\mathfrak{R}$  w przedziale  $I$ . Wówczas:

(i) Jeżeli  $k$  i  $K$  są kresami dolnym i górnym funkcji  $f(p)$  w  $I$ , to

$$k|I| \leq \int_I f(p) dp \leq K|I|.$$

(ii) Jeżeli  $L$  jest kresem górnym funkcji  $|f(p)|$  w  $I$ , to

$$\left| \int_I f(p) dp \right| \leq L|I|.$$

(iii) Dla każdej liczby  $c$  funkcja  $cf(p)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w  $I$  i

$$\int_I cf(p) dp = c \int_I f(p) dp.$$

(iv) Jeżeli  $\varphi(p)$  jest również funkcją całkowalną  $\mathfrak{R}$  w przedziale  $I$ , to suma  $f(p) + \varphi(p)$  jest funkcją całkowalną  $\mathfrak{R}$  w  $I$  i

$$\int_I [f(p) + \varphi(p)] dp = \int_I f(p) dp + \int_I \varphi(p) dp.$$

Dowody przebiegają podobnie jak dowód tw. (3.1), str. 164.

**4. Sumy dolne i górne.** Oznaczmy przez  $k_j$  i  $K_j$  kresy dolny i górny funkcji  $f$  w przedziale  $I_j$ .

*Sumą dolną  $s$  i górną  $S$  nazywamy wyrażenia (p. str. 164):*

$$s = \sum_{j=1}^m k_j |I_j|, \quad S = \sum_{j=1}^m K_j |I_j|.$$

Oznaczając przez  $k$  i  $K$  kresy dolny i górny funkcji  $f$  w przedziale  $I$ , mamy  $k_j \geq k$  i  $K_j \leq K$ , więc

$$k|I| \leq s \leq S \leq K|I|.$$

Podobnie jak na str. 165, można udowodnić, że  $S$  jest kresem górnym,  $s$  zaś kresem dolnym sum  $R$  odpowiadających podziałowi  $\Delta$  przedziału  $I$  i dowolnie obranym punktom  $p_j \in I_j$ . Oznaczając oscylację funkcji  $f$  w przedziale  $I_j$  przez  $\omega_j$ , t. zn. przyjmując  $\omega_j = K_j - k_j$ , mamy (p. str. 165):

$$S - s = \sum_{j=1}^m \omega_j |I_j|.$$

**5. Całki dolne i górne.** Kres górny sum dolnych  $s$  i kres dolny sum górnych  $S$  nazywamy odpowiednio *całką dolną* i *całką górną* funkcji  $f$  w przedziale  $I$ . Całkę dolną oznaczamy przez

$$\int_I \dots \int_I f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n \quad \text{lub} \quad \int_I f(p) dp,$$

całkę zaś górną przez

$$\int_I \dots \int_I \overline{f(x_1, \dots, x_n)} dx_1 \dots dx_n \quad \text{lub} \quad \int_I \overline{f(p)} dp.$$

Podobnie jak dla całek pojedynczych (str. 166), dla całek wielokrotnych zachodzi następujący lemat:

(5.1) Dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje takie  $\eta > 0$ , że jeżeli podział  $\Delta$  spełnia nierówność  $|\Delta| \leq \eta$ , to

$$(8) \quad \int_I f(p) dp - \varepsilon \leq s \quad \text{oraz} \quad S \leq \int_I \overline{f(p)} dp + \varepsilon.$$

Dowód. Dla każdej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje podział  $\bar{\Delta}$ , dla którego suma górna  $\bar{S}$  spełnia nierówność

$$(9) \quad \bar{S} \leq \int_I f(p) dp + \varepsilon/2.$$

Oznaczmy przez  $\bar{\eta}$  najmniejszą szerokość (str. 76) przedziałów podziału  $\bar{\Delta}$  i niech

$$(10) \quad 0 < \eta < \bar{\eta}/2.$$

Utwórzmy dowolny podział  $\Delta$  przedziału  $I$  tak, by

$$(11) \quad |\Delta| \leq \eta.$$

Weźmy pod uwagę dowolny przedział  $\bar{I}_j$  podziału  $\bar{\Delta}$  i oznaczmy przez  $I_1, \dots, I_r$  przedziały podziału  $\Delta$  zawarte w  $\bar{I}_j$ . Przedziały te pokrywają zatem wszystkie punkty przedziału  $\bar{I}_j$  odległe od jego brzegu co najmniej o  $\eta$ . Jeżeli więc  $\bar{I}_j = \langle a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n \rangle$ , to  $I_1 + \dots + I_r$  zawiera przedział  $\langle a_1 + \eta, \dots, a_n + \eta; b_1 - \eta, \dots, b_n - \eta \rangle$ . Zatem

$$\sum_{i=1}^r |I_i| \geq (b_1 - a_1 - 2\eta) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n - 2\eta),$$

skąd

$$(12) \quad \begin{aligned} |\bar{I}_j| - \sum_{i=1}^r |I_i| &\leq [(b_1 - a_1) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n)] - [(b_1 - a_1 - 2\eta) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n - 2\eta)] \leq \\ &\leq (b_1 - a_1) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n) \left[ 1 - \left( 1 - \frac{2\eta}{b_1 - a_1} \right) \cdot \dots \cdot \left( 1 - \frac{2\eta}{b_n - a_n} \right) \right]. \end{aligned}$$

Z określenia liczby  $\eta$  wynika, że

$$\bar{\eta} \leq |b_1 - a_1|, \dots, \bar{\eta} \leq |b_n - a_n|.$$

Na mocy (10) mamy więc

$$2\eta/(b_1 - a_1) \leq 1 \quad \text{itd.}$$

Opierając się na nierówności  $(1 - \varepsilon_1) \cdot \dots \cdot (1 - \varepsilon_n) \geq 1 - \varepsilon_1 \cdot \dots \cdot \varepsilon_n$  dla  $0 \leq \varepsilon_1 \leq 1, \dots, 0 \leq \varepsilon_n \leq 1$ , otrzymujemy tedy z (12)

$$(13) \quad |\bar{I}_j| - \sum_{i=1}^r |I_i| \leq |\bar{I}_j| \left[ \frac{2\eta}{b_1 - a_1} + \dots + \frac{2\eta}{b_n - a_n} \right] \leq \frac{2n|I|}{\bar{\eta}} \eta.$$

Oznaczając przez  $k$  i  $K$  kresy dolny i górny funkcji  $f$  w  $I$ , a przez  $\bar{K}_j$  i  $K_i$  jej kresy górne w  $\bar{I}_j$  i  $I_i$ , mamy

$$|\bar{I}_j|(K - \bar{K}_j) = \sum_{i=1}^r |I_i|(K - \bar{K}_j) + [|\bar{I}_j| - \sum_{i=1}^r |I_i|](K - \bar{K}_j),$$

a ponieważ  $\bar{K} \geq K_i$  dla  $i=1, \dots, r$ , więc na mocy (13)

$$|\bar{I}_j|(K - \bar{K}_j) \leq \sum_{i=1}^r |I_i|(K - \bar{K}) + \frac{2n|I|}{\eta} \eta(K - k).$$

Sumując ostatnie dwa wzory stronami dla wszystkich  $\bar{m}$  przedziałów  $\bar{I}_j$  podziału  $\bar{\Delta}$  i stosując podobne rozumowanie jak na str. 167, otrzymujemy

$$K|I| - \bar{S} \leq K|I| - S + \frac{2n\bar{m}|I|}{\eta} \eta(K - k),$$

skąd

$$(14) \quad S \leq \bar{S} + \frac{2n\bar{m}|I|}{\eta} \eta(K - k).$$

Dobierając więc liczbę  $\eta$  tak, aby prócz nierówności (10) spełniona była jeszcze nierówność

$$(15) \quad \frac{2n\bar{m}|I|}{\eta} \eta(K - k) \leq \frac{\varepsilon}{2},$$

otrzymamy z (14) i (9)

$$S \leq \int_I f(p) dp + \varepsilon$$

dla każdego podziału  $\Delta$  spełniającego warunek (11) i dla każdej liczby  $\eta > 0$ , spełniającej warunki (10) i (15).

Podobnie wyprowadza się pierwszą z nierówności (8).

(5.2) Dla każdego ciągu normalnego podziałów  $\{\Delta_v\}$  przedziału  $I$  ciąg sum  $\{s_v\}$  dąży dla  $v \rightarrow \infty$  do całki dolnej, a ciąg  $\{S_v\}$  do górnej.

(5.3) Całka dolna jest niewiększa od całki górnej:

$$\int_I f(p) dp \leq \int_I \bar{f}(p) dp.$$

Dowody twierdzeń (5.2) i (5.3) za pomocą lematu (5.1) są podobne do dowodów twierdzeń (5.2) i (5.3), str. 167 i 168, za pomocą lematu (5.1).



(5.4) Jeżeli  $f(p)$  jest funkcją ograniczoną w przedziale  $I$ , a  $\Delta$  jest dowolnym podziałem tego przedziału na przedziały  $I_1, \dots, I_m$ , to

$$(16) \quad \int_I \bar{f}(p) dp = \sum_{i=1}^m \int_{I_i} \bar{f}(p) dp, \quad \int_I f(p) dp = \sum_{i=1}^m \int_{I_i} f(p) dp.$$

Dowód. Niech  $\{\Delta_j\}$  będzie ciągiem normalnym podziałów następczych podziału  $\Delta$ . Oznaczając przez  $S_j$  sumę górną dla podziału  $\Delta_j$ , a przez  $S_j^{(i)}$  składniki (sumy górnej) odpowiadające tym przedziałom podziału  $\Delta_j$ , które zawarte są w przedziale  $I_i$  (gdzie  $i=1, \dots, m$ ), dostajemy

$$(17) \quad S_j = \sum_{i=1}^m S_j^{(i)} \quad \text{dla } j=1, 2, \dots$$

Ponieważ na mocy tw. (5.2)  $S_j$  dla  $j \rightarrow \infty$  dąży do lewej strony pierwszej z równości (16), a  $S_j^{(i)}$  — do całki górnej  $\int_{I_i} \bar{f}(p) dp$ , więc z (17) otrzymujemy pierwszą z równości (16) dla  $j \rightarrow \infty$ .

Podobnie dowodzi się drugiej z równości (16) (dla całek dolnych).

**6. Warunki całkowalności  $\mathfrak{R}$ .** Następujących twierdzeń dowodzi się podobnie jak twierdzeń (6.1)-(6.4) dla całek pojedynczych (str. 168 i 169):

(6.1) Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, by funkcja ograniczona  $f(x_1, \dots, x_n)$  w przedziale  $I$  była w tym przedziale całkowalna według Riemanna, jest to, żeby jej całki dolna i górna były równe.

(6.2) Jeżeli funkcja  $f(x_1, \dots, x_n)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w przedziale  $I$ , wówczas

$$(18) \quad \int_I \bar{f}(p) dp = \int_I f(p) dp = \int_I f(p) dp.$$

(6.3) Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, by funkcja  $f(x_1, \dots, x_n)$  była całkowalna  $\mathfrak{R}$  w przedziale  $I$ , jest, żeby do każdej liczby  $\varepsilon > 0$  istniał podział  $\Delta$  przedziału  $I$  na przedziały  $I_1, \dots, I_m$ , czyniący zadość nierówności

$$(19) \quad S - s = \sum_{i=1}^m \omega_i |I_i| \leq \varepsilon$$

(gdzie  $\omega_i$  oznacza, jak poprzednio, oscylację funkcji  $f$  w przedziale  $I_i$ ).

(6.4) Każda funkcja ciągła w przedziale  $I$  jest w tym przedziale całkowalna  $\mathfrak{R}$ .

**7. Zbiory miary Lebesgue'a 0.** Mówimy, że zbiór  $E$ , leżący w przestrzeni  $\mathcal{E}^n$ , jest *miary Lebesgue'a zero* lub *miary 0 zero*, jeżeli do każdej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje skończony lub przeliczalny zbiór przedziałów  $\{I_i\}$ , dla którego

$$(i) \quad E \subset \sum_i I_i \qquad (ii) \quad \sum_i |I_i| \leq \varepsilon.$$

Twierdzenia (7.1)-(7.6), str. 171 i 172, dla zbiorów liniowych miary 0 zero zachodzą również dla zbiorów miary 0 zero w przestrzeni  $\mathcal{E}^n$  i dowodzą się podobnie.

(7.1) *Brzeg każdego przedziału  $I \subset \mathcal{E}^n$  jest zbiorem miary 0 zero.*

Dowód. Niech  $I = \langle a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n \rangle$ . Oznaczmy dla każdego  $i = 1, \dots, n$  przez  $A_i$  zbiór punktów  $(x_1, \dots, x_n)$  przedziału  $I$ , dla których  $x_i = a_i$ , a przez  $B_i$  zbiór punktów przedziału  $I$ , dla których  $x_i = b_i$ . Brzeg przedziału  $I$  jest oczywiście sumą zbiorów  $A_i$  i  $B_i$ . Wystarczy zatem dowieść, że każdy ze zbiorów  $A_i$  i  $B_i$  jest miary 0 zero. Ze względu na symetrię założeń można ograniczyć dowód np. do zbiorów  $A_i$ .

Niech  $\varepsilon > 0$ . Łatwo stwierdzić, że zbiór  $A_i$  zawarty jest w przedziale

$$I'_i = \langle a_1, \dots, a_{i-1}, a_i - \varepsilon, \dots, a_n; b_1, \dots, b_{i-1}, b_i + \varepsilon, \dots, b_n \rangle.$$

Ponieważ miara przedziału  $I_i$  jest równa  $|I|2\varepsilon/(b_i - a_i)$ , więc z uwagi na to, że  $\varepsilon > 0$  jest dowolne,  $A_i$  jest zbiorem miary 0 zero, c. b. d. d.

Rzutem punktu  $(x_1, \dots, x_{n+1})$  przestrzeni  $\mathcal{E}^{n+1}$  na  $\mathcal{E}^n$  nazywamy punkt  $(x_1, \dots, x_n)$  przestrzeni  $\mathcal{E}^n$ , a rzutem zbioru  $A \subset \mathcal{E}^{n+1}$  na  $\mathcal{E}^n$  — zbiór rzutów punktów należących do  $A$ , t.j. zbiór (p. Rozdział I, str. 13)

$$r(A) = \bigcup_{x_1, \dots, x_n, x_{n+1}} [(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \in A].$$

(7.2) *Jeżeli rzut zbioru  $A \subset \mathcal{E}^{n+1}$  na  $\mathcal{E}^n$  jest miary 0 zero w  $\mathcal{E}^n$ , to  $A$  jest miary 0 zero w  $\mathcal{E}^{n+1}$ .*

Dowód. Ponieważ zbiór  $r(A)$  jest z założenia miary 0 zero w  $\mathcal{E}^n$ , więc do każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje skończony lub przeliczalny zbiór przedziałów  $\{I_i\}$  przestrzeni  $\mathcal{E}^n$ , spełniających warunki:

$$(i) \quad r(A) \subset \sum_i I_i, \qquad (ii) \quad \sum_i |I_i| \leq \varepsilon.$$

Dla dowolnego  $k=1, 2, \dots$  weźmy pod uwagę w przestrzeni  $\mathcal{E}^{n+1}$  przedział  $I_k = \langle -k, \dots, -k; +k, \dots, +k \rangle$  oraz przedziały  $J_i$  złożone z punktów  $(x_1, \dots, x_{n+1})$ , dla których  $(x_1, \dots, x_n) \in I_i$  i  $-k \leq x_{n+1} \leq k$ :

$$J_i = E_{x_1, \dots, x_{n+1}}[(x_1, \dots, x_n) \in I_i] [-k \leq x_{n+1} \leq k].$$

Oczywiście  $|J_i| = 2k|I_i|$ . Zatem na mocy (ii)

$$(20) \quad \sum_i |J_i| \leq 2k \sum_i |I_i| \leq 2k\varepsilon.$$

Ponieważ, jak łatwo widzieć,  $A \cdot I_k \subset \sum_i J_i$ , więc dla każdego  $k=1, 2, \dots$  zbiór  $A \cdot I_k$  jest na mocy (20) miary  $\mathcal{Q}$  zero w  $\mathcal{E}^{n+1}$  (gdyż wzór (20) zachodzi dla dowolnego  $\varepsilon > 0$ ). Z uwagi na to, że  $A = A \cdot I_1 + A \cdot I_2 + \dots$ , zbiór  $A$  jest również miary  $\mathcal{Q}$  zero w  $\mathcal{E}^{n+1}$  jako suma przeliczalnej rodziny zbiorów miary  $\mathcal{Q}$  zero.

*Wykresem* lub *wykresem geometrycznym* funkcji o wartościach rzeczywistych  $f(x_1, \dots, x_n)$  określonej w zbiorze  $A \subset \mathcal{E}^n$  nazywamy zbiór takich punktów  $(x_1, \dots, x_{n+1})$  przestrzeni  $\mathcal{E}^{n+1}$ , że  $(x_1, \dots, x_n) \in A$  i  $x_{n+1} = f(x_1, \dots, x_n)$ , tj. zbiór

$$W = E_{x_1, \dots, x_{n+1}}[(x_1, \dots, x_n) \in A] \cdot [x_{n+1} = f(x_1, \dots, x_n)].$$

Udowodnimy obecnie twierdzenie, z którego w szczególności wynika, że wykres funkcji ciągłej nie może zawierać przedziału przestrzeni  $\mathcal{E}^{n+1}$ .

(7.3) *Jeżeli funkcja  $f(x_1, \dots, x_n)$  jest ciągła w zbiorze zamkniętym  $A$  przestrzeni  $\mathcal{E}^n$ , to jej wykres jest zbiorem miary  $\mathcal{Q}$  zero w przestrzeni  $\mathcal{E}^{n+1}$ .*

Dowód. Niech  $I$  będzie dowolnym przedziałem zamkniętym przestrzeni  $\mathcal{E}^n$ . Iloczyn  $A \cdot I$  jest więc zbiorem ograniczonym zamkniętym, a przeto funkcja  $f(x_1, \dots, x_n)$  jest jednostajnie ciągła w  $A \cdot I$ . Dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje więc takie  $\eta > 0$ , że

$$(21) \quad \varrho(p', p'') \leq \eta \quad \text{pociąga} \quad |f(p') - f(p'')| \leq \varepsilon \quad \text{dla} \quad p', p'' \in A \cdot I.$$

Utwórzmy dowolny podział  $\Delta$  przedziału  $I$  i oznaczmy przez  $I_1, \dots, I_r$  te przedziały podziału  $\Delta$ , które mają punkty wspólne ze zbiorem  $A$ . Niech  $k_i$  i  $K_i$  będą kresami dolnym i górnym funkcji  $f$

w  $I_i$  i niech  $J_i$  będzie przedziałem przestrzeni  $\mathcal{E}^{n+1}$  złożonym z punktów  $(x_1, \dots, x_{n+1})$ , dla których  $(x_1, \dots, x_n) \in I_i$  i  $k_i \leq x_{n+1} \leq K_i + \varepsilon$ :

$$J_i = E_{x_1, \dots, x_{n+1}} [(x_1, \dots, x_n) \in I_i] \cdot [k_i \leq x_{n+1} \leq K_i + \varepsilon].$$

Oczywiście  $|J_i| = (K_i - k_i + \varepsilon)|I_i|$  dla  $i = 1, 2, \dots, r$ . Jeżeli przyjmemy  $|\Delta| \leq \eta$ , to na mocy (21) będzie  $K_i - k_i \leq \varepsilon$ , zatem  $|J_i| \leq 2\varepsilon|I_i|$ , skąd

$$(22) \quad |J_1| + \dots + |J_r| \leq 2\varepsilon(|I_1| + \dots + |I_r|) \leq 2\varepsilon|I|.$$

Łatwo widzieć, że wykres geometryczny funkcji  $f$  dla zbioru  $A \cdot I$  jest zawarty w sumie  $J_1 + \dots + J_r$ . Na mocy więc (22) ta część wykresu funkcji  $f$  jest zbiorem miary  $\mathcal{Q}$  zero (gdyż  $\varepsilon > 0$  jest dowolne).

Jeżeli teraz przestrzeń  $\mathcal{E}^n$  podzielimy na przeliczalną mnogość przedziałów zamkniętych  $I$  (por. pojęcie kraty, str. 77), to części wykresu funkcji  $f$ , odpowiadające tym przedziałom, będą zbiorami miary  $\mathcal{Q}$  zero. Na mocy tw. (7.4), str. 171, cały wykres funkcji  $f$ , jako suma przeliczalnej rodziny zbiorów miary  $\mathcal{Q}$  zero, jest więc zbiorem miary  $\mathcal{Q}$  zero, c. b. d. d.

(7.4) *Jeżeli współrzędne  $x_1, \dots, x_n$  punktów zbioru ograniczonego  $A$  leżącego w przestrzeni  $\mathcal{E}^n$  spełniają równanie*

$$(23) \quad a + a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0,$$

*w którym przynajmniej jeden ze współczynników  $a_1, \dots, a_n$  jest różny od 0, to  $A$  jest zbiorem miary  $\mathcal{Q}$  zero w  $\mathcal{E}^n$ .*

Dowód. Twierdzenie jest prawdziwe dla  $n=1$ , gdyż w tym przypadku zbiór  $A$  redukuje się do jednego punktu  $x_1 = -a/a_1$ . Załóżmy, że twierdzenie jest prawdziwe dla  $n-1$ .

Jeżeli  $a_n = 0$ , to punkty rzutu zbioru  $A$  na  $\mathcal{E}^{n-1}$  spełniają równanie  $a + a_1x_1 + \dots + a_{n-1}x_{n-1} = 0$ , zatem rzut jest zbiorem miary  $\mathcal{Q}$  zero w  $\mathcal{E}^{n-1}$ , wobec czego na mocy tw. (7.2) zbiór  $A$  jest miary  $\mathcal{Q}$  zero w  $\mathcal{E}^n$ .

Jeżeli zaś  $a_n \neq 0$ , to zbiór  $A$  jest zawarty w wykresie geometrycznym funkcji  $x_n = (a + a_1x_1 + \dots + a_{n-1}x_{n-1})/a_n$ , ciągłej w  $\mathcal{E}^{n-1}$ , wobec czego na mocy tw. (7.3)  $A$  jest zbiorem miary  $\mathcal{Q}$  zero w  $\mathcal{E}^n$ .

Na mocy zasady indukcji twierdzenie zachodzi więc dla każdego  $n=1, 2, \dots$ , c. b. d. d.

Z tw. (7.4) wynika od razu dla zbiorów płaskich (p. str. 75), że

(7.5) *Każdy zbiór płaski w  $\mathcal{E}^n$  jest miary  $\mathcal{Q}$  zero w  $\mathcal{E}^n$ .*

W szczególności zbiorem miary  $\mathcal{L}$  zero jest linia prosta w  $\mathcal{E}^n$  dla  $n \geq 2$ , płaszczyzna w  $\mathcal{E}^n$  dla  $n \geq 3$  itd. Na mocy tw. (7.5), zbiorem miary  $\mathcal{L}$  zero jest więc także odcinek w  $\mathcal{E}^n$  dla  $n \geq 2$ , wielokąt płaski w  $\mathcal{E}^n$  dla  $n \geq 3$  itd. Wynika stąd, że linia łamana w  $\mathcal{E}^n$  dla  $n \geq 2$ , brzeg wielościanu w  $\mathcal{E}^n$  dla  $n \geq 3$  itd. są również zbiorami miary  $\mathcal{L}$  zero w tych przestrzeniach.

**PRZYKŁADY.** 1. Wykres funkcji  $y=f(x)$ , ciągłej w przedziale liniowym  $\langle a, b \rangle$ , jest zbiorem płaskim miary  $\mathcal{L}$  zero, gdy tymczasem — jak widzieliśmy (p. tw. (2.1), str. 152) — wykres dwóch funkcji ciągłych w przedziale liniowym (krzywa ciągła) może zawierać przedział płaski (kwadrat).

2. Powierzchnia, która jest wykresem geometrycznym funkcji  $z=f(x, y)$ , ciągłej w przedziale płaskim  $a_1 \leq x \leq b_1, a_2 \leq y \leq b_2$  (t.j. w przedziale  $\langle a_1, a_2; b_1, b_2 \rangle$ ), jest zbiorem miary  $\mathcal{L}$  zero w przestrzeni trójwymiarowej.

3. Okrąg koła  $x^2 + y^2 = 1$  jest zbiorem miary  $\mathcal{L}$  zero w płaszczyźnie, gdyż jest sumą wykresów funkcji  $y = -\sqrt{1-x^2}$  i  $y = \sqrt{1-x^2}$ , ciągłych w przedziale  $\langle -1, 1 \rangle$ , a więc sumą dwu zbiorów miary  $\mathcal{L}$  zero w płaszczyźnie.

4. Powierzchnia kuli  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  jest zbiorem miary  $\mathcal{L}$  zero w przestrzeni  $\mathcal{E}^3$  jako suma wykresów funkcji  $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$  i  $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$ , ciągłych w kole  $x^2 + y^2 \leq 1$ .

**8. Warunki Lebesgue'a całkowalności  $\mathcal{R}$ .** Następujące twierdzenia dowodzą się zupełnie podobnie do twierdzeń dla całek pojedynczych:

(8.1) *Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, by funkcja ograniczona  $f(p)$ , określona w przedziale  $I$  przestrzeni  $\mathcal{E}^n$ , była w tym przedziale całkowalna  $\mathcal{R}$ , jest, żeby zbiór jej punktów nieciągłości był zbiorem miary  $\mathcal{L}$  zero.*

(8.2) *Wartość bezwzględna funkcji całkowalnej  $\mathcal{R}$  jest funkcją całkowalną  $\mathcal{R}$ .*

(8.3) *Iloczyn dwóch funkcji całkowalnych  $\mathcal{R}$  jest funkcją całkowalną  $\mathcal{R}$ .*

(8.4) *Funkcja całkowalna  $\mathcal{R}$  w przedziale  $I$  jest całkowalna  $\mathcal{R}$  w każdym przedziale  $J \subset I$ .*

(8.5) Funkcja ograniczona  $f(p)$ , określona w przedziale  $I$  przestrzeni  $\mathcal{E}^n$ , która przybiera w nim wartość 0 z wyjątkiem zbioru zamkniętego miary  $\mathfrak{L}$  zero, jest funkcją całkowalną  $\mathfrak{R}$  w  $I$  i jej całka równa jest zero:  $\int_I f(p) dp = 0$ .

Z tw. (8.5) otrzymujemy następujący wniosek:

(8.6) Jeżeli wartości funkcji ograniczonej  $\varphi(p)$  całkowalnej  $\mathfrak{R}$  w przedziale  $I$  zmienić dowolnie w zbiorze zamkniętym miary  $\mathfrak{L}$  zero, tak jednak, by otrzymana funkcja  $\psi(p)$  też była ograniczona, to  $\psi(p)$  będzie również funkcją całkowalną  $\mathfrak{R}$  w  $I$  i  $\int_I \varphi(p) dp = \int_I \psi(p) dp$ .

Wynika to łatwo z twierdzenia (8.5), jeżeli zastosować je do funkcji  $f(p) = \varphi(p) - \psi(p)$ .

**9. Własności całki wielokrotnej.** Poprzestaniemy tu na następujących trzech twierdzeniach:

(9.1) Jeżeli ciąg funkcji  $\{f_n(p)\}$  całkowalnych  $\mathfrak{R}$  w przedziale  $I$  dąży w nim jednostajnie do funkcji  $f(p)$ , wówczas  $f(p)$  jest funkcją całkowalną  $\mathfrak{R}$  w  $I$  i

$$(23) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n(p) dp = \int_I f(p) dp.$$

Dowód przebiega podobnie do dowodu tw. (9.5), str. 176.

(9.2) Jeżeli przedział  $I$  jest podzielony na przedziały  $I_1, \dots, I_m$  i funkcja  $f(p)$  jest w nich całkowalna  $\mathfrak{R}$ , to jest ona całkowalna  $\mathfrak{R}$  w całym przedziale  $I$  i

$$(24) \quad \int_I f(p) dp = \sum_{i=1}^m \int_{I_i} f(p) dp.$$

Dowód. Ponieważ dla każdego  $i=1, \dots, m$  punkty nieciągłości funkcji  $f(p)$  w przedziale  $I_i$  tworzą na mocy tw. (8.1) zbiór  $H_i$  miary  $\mathfrak{L}$  zero, więc zbiór  $H = H_1 + \dots + H_m$  punktów nieciągłości tej funkcji w całym przedziale  $I$  jest również miary  $\mathfrak{L}$  zero.

Ponieważ ponadto funkcja  $f(p)$  jest ograniczona w  $I$ , jako ograniczona w każdym z przedziałów  $I_1, \dots, I_m$ , więc na mocy tw. (8.1) jest ona całkowalna  $\mathfrak{R}$  w  $I$ . Stąd i z tw. (5.3) wynika łatwo wzór (24).

(9.3) Jeżeli funkcja  $f(p)$  jest ograniczona w przedziale  $I$ , a poza tym przedziałem wszędzie  $f(p) = 0$ , wówczas dla każdego przedziału  $J \subset I$ :

$$(25) \quad \int_J f(p) dp = \int_I f(p) dp, \quad \int_{\bar{J}} f(p) dp = \int_{\bar{I}} f(p) dp.$$

Dowód. Utwórzmy dowolny podział  $\Delta$  przedziału  $J$ , tak jednak, by  $I$  był jednym z przedziałów podziału  $\Delta$ . We wnętrzu każdego przedziału  $I_i$  podziału  $\Delta$ , różnego od  $I$ , funkcja  $f(p)$  jest zerem. Ponieważ brzeg przedziału  $I_i$  jest zbiorem miary  $\mathfrak{L}$  zero na mocy tw. (7.1), str. 187, więc na mocy tw. (8.1) funkcja  $f(p)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w  $I_i$  i całka jej w tym przedziale jest równa zeru. Wzory (25) wynikają stąd na mocy tw. (5.3), str. 185.

*Uwaga.* Jeżeli do założeń twierdzenia (9.3) dodamy założenie, że funkcja  $f(p)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w  $I$ , wówczas — jak to wynika ze wzorów (25) — funkcja  $f(p)$  jest całkowalna w każdym przedziale  $J \supset I$  i

$$(26) \quad \int_J f(p) dp = \int_I f(p) dp.$$

**10. Całka wielokrotna jako całka iterowana.** Niech dany będzie w przestrzeni  $\mathcal{E}^n$  przedział

$$(27) \quad I = \langle a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n \rangle,$$

a w przestrzeni  $\mathcal{E}^k \subset \mathcal{E}^n$ , gdzie  $k$  jest jedną z liczb  $1, \dots, n$ , przedział

$$(28) \quad J' = \langle a_1, \dots, a_k; b_1, \dots, b_k \rangle;$$

wreszcie, w przestrzeni  $\mathcal{E}^{n-k} \subset \mathcal{E}^n$  zmiennych  $x_{k+1}, \dots, x_n$  — przedział

$$(29) \quad J'' = \langle a_{k+1}, \dots, a_n; b_{k+1}, \dots, b_n \rangle.$$

(10.1) Jeżeli funkcja  $f(x_1, \dots, x_n)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w przedziale  $I$ , wówczas funkcje:

$$(i) \quad \varphi(x_1, \dots, x_k) = \int_{J''} \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_{k+1} \dots dx_n,$$

$$(ii) \quad \psi(x_{k+1}, \dots, x_n) = \int_{J'} \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_k$$

są całkowalne  $\mathfrak{R}$ : pierwsza w  $J'$ , a druga w  $J''$ , i ponadto

$$(iii) \quad \begin{aligned} \int_I f(p) dp &= \int_{J'} \dots \int \left[ \int_{J''} \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_{k+1} \dots dx_n \right] dx_1 \dots dx_k = \\ &= \int_{J''} \dots \int \left[ \int_{J'} \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_k \right] dx_{k+1} \dots dx_n, \end{aligned}$$

przy czym całki górne we wzorach (i)-(iii) można zastąpić dolnymi.

Dowód. Niech  $\Delta'$  będzie dowolnym podziałem przedziału  $J'$  na przedziały  $J'_1, \dots, J'_\mu$ , a  $\Delta''$  podziałem przedziału  $J''$  na przedziały  $J''_1, \dots, J''_\nu$ . Oznaczmy przez  $I_{ij}$  przedział przestrzeni  $\mathcal{E}^n$ , złożony z punktów  $p = (x_1, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n)$ , dla których  $(x_1, \dots, x_k) \in J'_i$  oraz  $(x_{k+1}, \dots, x_n) \in J''_j$ . Wszystkie tak określone przedziały  $I_{ij}$  dla  $i = 1, 2, \dots, \mu$  i  $j = 1, 2, \dots, \nu$  tworzą pewien podział  $\Delta$  przedziału  $I$  i miary ich spełniają równości

$$(30) \quad |I_{ij}| = |J'_i| \cdot |J''_j|,$$

a średnice ich czynią zadość nierównościom

$$d(I_{ij}) = \sqrt{[d(J'_i)]^2 + [d(J''_j)]^2} \leq \sqrt{|\Delta'|^2 + |\Delta''|^2}$$

czyli

$$(31) \quad |\Delta| \leq \sqrt{|\Delta'|^2 + |\Delta''|^2}.$$

Weźmy pod uwagę dla każdego  $i = 1, 2, \dots, \mu$  dowolny punkt  $(\xi_1^{(i)}, \dots, \xi_k^{(i)}) \in J'_i$  i utwórzmy sumę

$$(32) \quad R = \sum_{i=1}^{\mu} \varphi(\xi_1^{(i)}, \dots, \xi_k^{(i)}) \cdot |J'_i|.$$

Na mocy tw. (9.2)

$$(33) \quad \begin{aligned} \varphi(\xi_1^{(i)}, \dots, \xi_k^{(i)}) &= \int_{J''} \dots \int f(\xi_1^{(i)}, \dots, \xi_k^{(i)}, x_{k+1}, \dots, x_n) dx_{k+1} \dots dx_n = \\ &= \sum_{j=1}^{\nu} \int_{J''_j} \dots \int f(\xi_1^{(i)}, \dots, \xi_k^{(i)}, x_{k+1}, \dots, x_n) dx_{k+1} \dots dx_n. \end{aligned}$$

Niech  $m_{ij}$  i  $M_{ij}$  oznaczają kresy dolny i górny funkcji  $f(x_1, \dots, x_n)$  w przedziale  $I_{ij}$ . Wówczas na mocy określenia przedziału  $I_{ij}$

$$m_{ij}|J''_j| \leq \int_{J''_j} \dots \int f(\xi_1^{(i)}, \dots, \xi_k^{(i)}, x_{k+1}, \dots, x_n) dx_{k+1} \dots dx_n \leq M_{ij}|J''_j|,$$

skąd na mocy (33)

$$\sum_{j=1}^{\nu} m_{ij}|J''_j| \leq \varphi(\xi_1^{(i)}, \dots, \xi_k^{(i)}) \leq \sum_{j=1}^{\nu} M_{ij}|J''_j|,$$

a stąd wobec (32)

$$\sum_{i=1}^{\mu} \left[ \sum_{j=1}^{\nu} m_{ij}|J''_j| \right] |J'_i| \leq R \leq \sum_{i=1}^{\mu} \left[ \sum_{j=1}^{\nu} M_{ij}|J''_j| \right] |J'_i|.$$



Na mocy więc (30)

$$\sum_{i=1}^{\mu} \sum_{j=1}^{\nu} m_{ij} |I_{ij}| \leq R \leq \sum_{i=1}^{\mu} \sum_{j=1}^{\nu} M_{ij} |I_{ij}|.$$

Lewa strona powyższej nierówności jest sumą dolną  $s$ , a prawa — sumą górną  $S$  dla funkcji  $f(x_1, \dots, x_n)$ , dla podziału  $\Delta$  przedziału  $I$ . Zatem

$$(34) \quad s \leq R \leq S.$$

Niech teraz  $\{\Delta_l'\}$  i  $\{\Delta_l''\}$  będą ciągami normalnymi podziałów przedziałów  $J'$  i  $J''$ . Utwórzmy za ich pomocą ciąg podziałów  $\{\Delta_l\}$  przedziału  $I$  tak, jak poprzednio utworzyliśmy podział  $\Delta$  za pomocą podziałów  $\Delta'$  i  $\Delta''$ . Z (31) wynika, że ciąg  $\{\Delta_l\}$  będzie ciągiem normalnym podziałów przedziału  $I$  i na mocy (34) otrzymamy

$$(35) \quad s_l \leq R_l \leq S_l \quad \text{dla } l = 1, 2, \dots$$

Ponieważ sumy  $s_l$  i  $S_l$  dążą dla  $l \rightarrow \infty$  do całki funkcji  $f(x_1, \dots, x_n)$  w przedziale  $I$ , więc na mocy (35)

$$R_l \rightarrow \int_I \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n \quad \text{dla } l \rightarrow \infty.$$

Wynika stąd całkowalność  $\Re$  funkcji  $\varphi(x_1, \dots, x_k)$  w przedziale  $J''$ , a ponadto pierwsza część wzoru (iii). Podobnie dowodzi się drugiej części wzoru (iii), jak również analogicznego twierdzenia dla całek dolnych.

(10.2) *Jeżeli funkcja  $f(x_1, \dots, x_n)$  jest ciągła w przedziale zamkniętym  $I$ , wówczas*

$$(iv) \quad \begin{aligned} \int_I f(p) dp &= \int_{J'} \dots \int \left[ \int_{J''} \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_{k+1} \dots dx_n \right] dx_1 \dots dx_k = \\ &= \int_{J''} \dots \int \left[ \int_{J'} \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_k \right] dx_{k+1} \dots dx_n. \end{aligned}$$

Wzór (iv) wynika ze wzoru (iii) twierdzenia (10.1), w którym dzięki założeniu ciągłości możemy całki górne zastąpić całkami zwykłymi (p. tw. (8.1), str. 190).

*Uwaga.* Wzór (iv) zachodzi przy założeniach ogólniejszych. Wystarczy założyć, że funkcja  $f(x_1, \dots, x_n)$  jest całkowalna w  $I$  i że istnieją całki występujące w nawiasach  $[ ]$ : pierwsza dla każdego układu wartości  $(x_1, \dots, x_k) \in J'$ , a druga dla każdego układu wartości  $(x_{k+1}, \dots, x_n) \in J''$ .

Wzór (iv) wyraża również *twierdzenie o zmianie porządku całkowania*.

(10.3) Jeżeli funkcja  $f(x_1, \dots, x_n)$  jest ciągła w przedziale

$$I = \langle a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n \rangle,$$

wówczas

$$(v) \quad \int_I f(p) dp = \int_{a_1}^{b_1} \dots \int_{a_i}^{b_i} \dots \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

We wzorze tym granice  $a_i$  i  $b_i$ , gdzie  $i=1, 2, \dots, n$ , odnoszą się oczywiście do zmiennej  $x_i$ , przy czym całki pojedyncze można napisać w dowolnym porządku.

Dowód polega na zastosowaniu wzoru (iii) nie do całki w przedziale  $I$ , lecz do całek w przedziałach  $J'$  i  $J''$  itd., aż się dojdzie do całek pojedynczych.

**PRZYKŁADY.** 1. Jeżeli  $f(x, y)$  jest funkcją ciągłą w prostokącie  $a \leq x \leq b$ ,  $c \leq y \leq d$ , tj. w przedziale płaskim  $I = \langle a, c; b, d \rangle$ , wówczas

$$\int_I f(x, y) dx dy = \int_a^b \left[ \int_c^d f(x, y) dy \right] dx = \int_c^d \left[ \int_a^b f(x, y) dx \right] dy.$$

2. Jeżeli  $f(x, y, z)$  jest funkcją ciągłą w prostopadłościanie  $I$   $a \leq x \leq b$ ,  $c \leq y \leq d$  i  $e \leq z \leq f$ , to

$$\begin{aligned} \int_I f(x, y, z) dx dy dz &= \int_a^b \left[ \int_c^d \int_e^f f(x, y, z) dy dz \right] dx = \\ &= \int_a^b \int_c^d \left[ \int_e^f f(x, y, z) dz \right] dx dy = \int_a^b \left\{ \int_c^d \left[ \int_e^f f(x, y, z) dz \right] dy \right\} dx. \end{aligned}$$

### § 3. Miara Jordana. Całka $\mathfrak{R}$ na zbiorze.

**1. Miara zewnętrzna  $\mathfrak{J}$ .** Niech  $A$  będzie zbiorem ograniczonym w przestrzeni  $\mathcal{E}^n$ , a  $I_1, \dots, I_k$  dowolną skończoną rodziną przedziałów tej przestrzeni, których suma zawiera (pokrywa) zbiór  $A$ .

Kres dolny sumy miar przedziałów dla wszelkich takich rodzin nazywamy *miarą zewnętrzną Jordana* lub *miarą zewnętrzną  $\mathfrak{J}$  zbioru  $A$*  w przestrzeni  $\mathcal{E}^n$  i oznaczamy przez  $m_z(A)$ . Zatem:

(1.1) Jeżeli  $A \subset I_1 + \dots + I_k$ , to

$$m_z(A) \leq |I_1| + \dots + |I_k|.$$

(1.2) Do każdej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje taka skończona rodzina przedziałów  $I_1, \dots, I_k$ , że

$$(i) \quad A \subset I_1 + \dots + I_k, \quad (ii) \quad m_z(A) + \varepsilon > |I_1| + \dots + |I_k|.$$

W szczególności:

(1.3) Dla przedziałów (otwartych i zamkniętych) miara zewnętrzna  $\mathfrak{J}$  i miara (w sensie określonym w Rozdziale III, § 2, str. 76) są równe:

$$m_z(I) = |I|.$$

Istotnie,  $|I| \leq m_z(I)$ , więc  $m_z(I) \leq |I|$ . Z drugiej strony, jeżeli  $I \subset I_1 + \dots + I_k$ , to  $|I| \leq |I_1| + \dots + |I_k|$ , a zatem  $|I| \leq m_z(I)$ .

Z określenia miary zewnętrznej  $\mathfrak{J}$  wynika bezpośrednio, że:

(1.4) Jeżeli zbiór  $A$  składa się z jednego punktu, to  $m_z(A) = 0$ .

(1.5) Jeżeli  $A \subset B$ , to  $m_z(A) \leq m_z(B)$ .

**2. Miara wewnętrzna  $\mathfrak{J}$ .** Niech  $I'_1, \dots, I'_l$  będzie dowolną skończoną rodziną niezachodzących na siebie przedziałów przestrzeni  $\mathcal{E}^n$ , zawartych w zbiorze  $A$ .

Kres górny sumy miar przedziałów dla wszelkich takich rodzin nazywamy *miarą wewnętrzną Jordana* lub *miarą wewnętrzną  $\mathfrak{J}$*  zbioru  $A$  w przestrzeni  $\mathcal{E}^n$  i oznaczamy przez  $m_w(A)$ .

Przy tym, jeżeli  $A$  jest zbiorem brzegowym w  $\mathcal{E}^n$ , a przeto (p. definicję str. 62 i tw. (4.1), str. 79) nie zawierającym żadnego przedziału, wówczas przyjmujemy  $m_w(A) = 0$ . Zatem:

(2.1) Jeżeli  $I'_1 + \dots + I'_l \subset A$  i przedziały  $I'_1, \dots, I'_l$  nie zachodzą na siebie, to

$$|I'_1| + \dots + |I'_l| \leq m_w(A).$$

(2.2) Jeżeli  $m_w(A) \neq 0$ , to do każdej liczby  $\varepsilon > 0$  istnieje taka skończona rodzina niezachodzących na siebie przedziałów  $I'_1, \dots, I'_l$ , że:

$$(i') \quad I'_1 + \dots + I'_l \subset A, \quad (ii') \quad |I'_1| + \dots + |I'_l| > m_w(A) - \varepsilon.$$

W szczególności:

(2.3) Dla przedziałów (otwartych i zamkniętych) miara wewnętrzna  $\mathfrak{J}$  i miara (w sensie określonym w Rozdziale III, § 2, str. 76) są równe:

$$m_w(I) = |I|.$$

Istotnie,  $I \subset I$ , więc  $|I| \leq m_w(I)$ . Z drugiej strony, jeżeli  $I'_1 + \dots + I'_l \subset I$  i przedziały  $I'_1, \dots, I'_l$  nie zachodzą na siebie, to  $|I'_1| + \dots + |I'_l| \leq |I|$ , a zatem  $m_w(I) \leq |I|$ .

Z określenia miary wewnętrznej  $\mathfrak{J}$  wynika wprost, że

(2.4) *Jeżeli  $A \subset B$ , to  $m_w(A) \leq m_w(B)$ .*

**3. Własności miary Jordana.** Między miarami zewnętrzną  $\mathfrak{J}$  a wewnętrzną  $\mathfrak{J}$  dowolnego zbioru  $A$  zachodzi związek

$$(3.1) \quad m_w(A) \leq m_z(A).$$

Dowód. Jeżeli  $m_w(A) = 0$ , nierówność (3.1) jest oczywista. W przeciwnym razie do każdego  $\varepsilon > 0$  istnieją na mocy (1.2) i (2.2) przedziały  $I_1, \dots, I_k$  oraz  $I'_1, \dots, I'_l$ , czyniące zadość warunkom (ii) oraz (ii'), skąd na mocy tw. (2.2), str. 181,  $|I'_1| + \dots + |I'_l| \leq |I_1| + \dots + |I_k|$ , więc  $m_w(A) - \varepsilon \leq m_z(A) + \varepsilon$ . Stąd wobec dowolności liczby  $\varepsilon$  wynika nierówność (3.1), c. b. d. d.

Ponieważ dla każdego zbioru  $A$  mamy oczywiście  $m_z(A) \geq 0$  i  $m_w(A) \geq 0$ , więc wnosimy stąd na mocy (3.1), że

$$(3.2) \quad \text{Jeżeli } m_z(A) = 0, \text{ to również } m_w(A) = 0.$$

(3.3) *Dla każdej rodziny skończonej zbiorów ograniczonych  $A_1, \dots, A_r$  zachodzi wzór*

$$m_z(A_1 + \dots + A_r) \leq m_z(A_1) + \dots + m_z(A_r).$$

Dowód. Wystarczy oczywiście dowieść, że

$$(1) \quad m_z(A_1 + A_2) \leq m_z(A_1) + m_z(A_2).$$

Do każdego  $\varepsilon > 0$  istnieją na mocy tw. (1.2) przedziały  $I_1, \dots, I_{k_1}$  i  $I_{k_1+1}, \dots, I_{k_2}$  o własnościach:

$$(2) \quad A_1 \subset I_1 + \dots + I_{k_1}, \quad A_2 \subset I_{k_1+1} + \dots + I_{k_2},$$

$$(3) \quad |I_1| + \dots + |I_{k_1}| < m_z(A_1) + \varepsilon, \quad |I_{k_1+1}| + \dots + |I_{k_2}| < m_z(A_2) + \varepsilon.$$

Na mocy (2) jest  $A_1 + A_2 \subset I_1 + \dots + I_{k_2}$ , skąd

$$m_z(A_1 + A_2) \leq |I_1| + \dots + |I_{k_2}|,$$

a stąd na mocy (3)

$$m_z(A_1 + A_2) < m_z(A_1) + m_z(A_2) + 2\varepsilon.$$

Wobec dowolności liczby  $\varepsilon$  wynika stąd nierówność (1), c. b. d. d.

(3.3') Dla każdej rodziny skończonej zbiorów ograniczonych rozłącznych  $A_1, \dots, A_r$  zachodzi wzór

$$m_w(A_1) + \dots + m_w(A_r) \leq m_w(A_1 + \dots + A_r).$$

Dowód. Wystarczy oczywiście dowieść, że

$$(1') \quad m_w(A_1) + m_w(A_2) \leq m_w(A_1 + A_2).$$

Do każdego  $\varepsilon > 0$  istnieją na mocy (2.1) niezachodzące na siebie przedziały  $I'_1, \dots, I'_l$  i niezachodzące na siebie przedziały  $I'_{l+1}, \dots, I'_{l_2}$  o własnościach:

$$(2') \quad I'_1 + \dots + I'_l \subset A_1, \quad I'_{l+1} + \dots + I'_{l_2} \subset A_2,$$

$$(3') \quad m_w(A_1) - \varepsilon < |I'_1| + \dots + |I'_l|, \quad m_w(A_2) - \varepsilon < |I'_{l+1}| + \dots + |I'_{l_2}|.$$

Wobec rozłączności zbiorów  $A_1$  i  $A_2$ , wnosimy z (2'), że przedziały całej rodziny  $I'_1, \dots, I'_{l_2}$  nie zachodzą na siebie, a ponadto że  $I'_1 + \dots + I'_{l_2} \subset A_1 + A_2$ , skąd  $|I'_1| + \dots + |I'_{l_2}| \leq m_w(A_1 + A_2)$ , a stąd na mocy (3')

$$m_w(A_1) + m_w(A_2) - 2\varepsilon < m_w(A_1 + A_2).$$

Wobec dowolności liczby  $\varepsilon$  wynika stąd nierówność (1'), c. b. d. d.

(3.4) Dla miar  $\mathfrak{J}$  dowolnego zbioru ograniczonego  $A$  i jego pochodnej  $A'$  (p. str. 59) zachodzi wzór

$$m_w(A) \leq m_w(A') \leq m_z(A') = m_z(A).$$

Dowód. Pierwsza z nierówności wynika stąd, że jeżeli przedział jest zawarty w zbiorze, to jest zawarty także w jego pochodnej. Druga jest bezpośrednim wnioskiem z (3.1).

Niech  $I_1, \dots, I_k$  będą takimi przedziałami zamkniętymi, że  $A \subset I_1 + \dots + I_k$ . Ponieważ suma tych przedziałów jest zbiorem zamkniętym, więc  $A' \subset I_1 + \dots + I_k$ . Zatem

$$(4) \quad m_z(A') \leq m_z(A).$$

Z drugiej strony, dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieją takie przedziały otwarte  $J_1, \dots, J_r$ , że

$$(5) \quad A' \subset J_1 + \dots + J_r,$$

$$(6) \quad |J_1| + \dots + |J_r| < m_z(A') + \varepsilon.$$

Na mocy (5) zbiór  $A$  nie ma punktów skupienia poza przedziałami  $J_1, \dots, J_r$ , a więc poza tymi przedziałami leży co najwyżej skończona liczba punktów zbioru  $A$ . Punkty te można tedy pokryć skończoną liczbą przedziałów  $J_{r+1}, \dots, J_s$  o sumie miar nie przekraczającej  $\varepsilon$ . Ponieważ  $A \subset J_1 + \dots + J_s$ , więc

$$m_z(A) \leq |J_1| + \dots + |J_s| \leq m_z(A') + 2\varepsilon$$

na mocy (6). Wobec dowolności  $\varepsilon$  mamy zatem

$$(7) \quad m_z(A) \leq m_z(A').$$

Z (4) i (7) wynika równość  $m_z(A') = m_z(A)$ , c. b. d. d.

PRZYKŁADY. 1. Zbiór liczb postaci  $1/n$ , gdzie  $n=1, 2, \dots$ , ma miarę zewnętrzną  $\mathfrak{J}$  równą zeru, taka jest bowiem miara pochodnej tego zbioru, jako złożonej z jednego punktu (punktu 0).

2. Zbiór liczb wymiernych przedziału  $\langle 0, 1 \rangle$  ma miarę zewnętrzną  $\mathfrak{J}$  równą jedności, czyli mierze tego przedziału (jako swej pochodnej), miarę zaś wewnętrzną  $\mathfrak{J}$  równą zeru, ponieważ jest zbiorem brzegowym.

To samo dotyczy zbioru liczb niewymiernych przedziału  $\langle 0, 1 \rangle$ .

3. Każdy zbiór gęsty w przedziale ma miarę zewnętrzną  $\mathfrak{J}$  równą mierze tego przedziału.

(3.5) Jeżeli  $A$  jest zbiorem ograniczonym, a  $B(A)$  jego brzegiem, to:

$$m_w[B(A)] = 0, \quad m_z[B(A)] = m_z(A) - m_w(A).$$

Dowód. Pierwsza równość jest oczywista, ponieważ zbiór  $B(A)$  nie ma punktów wewnętrznych.

Na mocy (i), (ii), (i') i (ii') istnieją dla każdego  $\varepsilon > 0$  przedziały zamknięte  $I_1, \dots, I_k$ ,  $I_{k+1}, \dots, I_r$  i niezachodzące na siebie przedziały  $I'_1, \dots, I'_l$  o własnościach:

$$(8) \quad I'_1 + \dots + I'_l \subset A \subset I_1 + \dots + I_k,$$

$$(9) \quad m_z(A) + \varepsilon > |I_1| + \dots + |I_k|, \quad m_w(A) - \varepsilon < |I'_1| + \dots + |I'_l|,$$

$$(10) \quad B(A) \subset I_{k+1} + \dots + I_r,$$

$$(11) \quad m_z[B(A)] + \varepsilon > |I_{k+1}| + \dots + |I_r|.$$

Niech  $I$  będzie przedziałem zamkniętym, zawierającym  $I_1, \dots, I_r$ , a  $\Delta$  podziałem przedziału  $I$  na takie podprzedziały, żeby  $I_1, \dots, I_r$  były ich sumami.

Oznaczmy przez  $J_1, \dots, J_\mu$  te spośród przedziałów podziału  $\Delta$ , których wnętrza zawarte są w różnicy  $(I_1 + \dots + I_k) - (I'_1 + \dots + I'_l)$ , a przez  $J'_1, \dots, J'_\nu$  te, których wnętrza zawarte są w różnicy  $A - (I_{k+1} + \dots + I_r)$ . Zatem:

$$I_1 + \dots + I_k = J_1 + \dots + J_\mu + I'_1 + \dots + I'_l,$$

$$A \subset J'_1 + \dots + J'_\nu + I_{k+1} + \dots + I_r$$

i na mocy (8) i (10) po prawej stronie każdego z tych wzorów występują przedziały nie zachodzące na siebie. Na mocy (9) i (11) otrzymujemy więc:

$$(12) \quad \begin{aligned} m_z(A) + \varepsilon &\geq |J_1| + \dots + |J_\mu| + m_w(A) - \varepsilon, \\ m_z(A) &\leq |J'_1| + \dots + |J'_\nu| + m_z[B(A)] + \varepsilon. \end{aligned}$$

Ponieważ zbiór  $B(A)$ , jako brzeg zbioru  $A$ , jest zawarty na mocy (8) w  $J_1 + \dots + J_\mu$ , więc

$$(13) \quad m_z[B(A)] \leq |J_1| + \dots + |J_\mu|,$$

a ponieważ wnętrza przedziałów  $J'_1, \dots, J'_\nu$  są zawarte w  $A$ , więc

$$(14) \quad m_w(A) \geq |J'_1| + \dots + |J'_\nu|.$$

Z nierówności (12), (13) i (14) otrzymujemy

$$m_z(A) - m_w(A) - \varepsilon \leq m_z[B(A)] \leq m_z(A) - m_w(A) + 2\varepsilon$$

dla każdego  $\varepsilon > 0$ , a więc równość, c. b. d. d.

(3.6) *Jeżeli  $A$  jest zbiorem ograniczonym, a  $W(A)$  jego wnętrzem, to*

$$m_w[W(A)] = m_w(A).$$

Istotnie, wobec  $W(A) \subset A$  mamy na mocy (1.5)

$$m_w[W(A)] \leq m_w(A).$$

Z drugiej strony, każdy przedział otwarty, zawarty w  $A$ , jest zawarty w  $W(A)$ , skąd  $m_w(A) \leq m_w[W(A)]$ .

**4. Zbiory mierzalne  $\mathfrak{J}$ .** Zbiór ograniczony  $A$  nazywamy *mierzalnym w sensie Jordana* lub *mierzalnym  $\mathfrak{J}$* , jeżeli jego miary zewnętrzna  $\mathfrak{J}$  i wewnętrzna  $\mathfrak{J}$  są równe, t.j. jeżeli  $m_w(A) = m_z(A)$ .

Wspólną wartość obu miar nazywamy wówczas *miarą  $\mathfrak{J}$*  zbioru  $A$  i oznaczamy przez  $m(A)$ .

**PRZYKŁADY.** 1. Każdy przedział  $I$  jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$  i  $m(I) = |I|$  (por. (1.3) i (2.3)).

2. Zbiór  $W$  liczb wymiernych przedziału  $\langle 0, 1 \rangle$  nie jest mierzalny  $\mathfrak{J}$ , gdyż  $m_w(W) = 0$  i  $m_z(W) = 1$  (p. przykład 2, str. 199).

(4.1) Jeżeli  $m(A) = 0$ , to  $A$  jest zbiorem miary  $\mathfrak{Q}$  zero.

Wynika to wprost z określenia miary zewnętrznej  $\mathfrak{J}$  i miary  $\mathfrak{Q}$  zero.

(4.2) Jeżeli  $m_z(A) = 0$ , to  $A$  jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$  i  $m(A) = 0$ .

Na mocy bowiem (3.1), str. 197, mamy wtedy  $m_w(A) = 0$ .

Natomiast zbiór miary  $\mathfrak{Q}$  zero może nie być mierzalny  $\mathfrak{J}$ , jak wskazuje przykład zbioru liczb wymiernych, który nie jest mierzalny  $\mathfrak{Q}$ , a jako przeliczalny jest miary  $\mathfrak{Q}$  zero.

(4.3) Każdy zbiór  $A$  zamknięty, ograniczony i miary  $\mathfrak{Q}$  zero jest mierzalny  $\mathfrak{J}$  i  $m(A) = 0$ .

Istotnie, na mocy tw. (8.2), str. 92, dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje wówczas skończona liczba przedziałów pokrywających zbiór  $A$ , których suma miar jest mniejsza niż  $\varepsilon$ . Zatem  $m_z(A) < \varepsilon$  dla każdego  $\varepsilon > 0$ , skąd  $m_z(A) = 0$ . Zatem na mocy tw. (4.1) jest  $m(A) = 0$ .

W szczególności, ponieważ brzeg przedziału jest zbiorem zamkniętym i ograniczonym o mierze  $\mathfrak{Q}$  zero (tw. (7.1), str. 187), więc:

(4.4) Miara  $\mathfrak{J}$  brzegu przedziału jest zerem.

(4.5) Jeżeli  $A$  jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$ , to jego pochodna  $A'$  jest również zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$  i  $m(A) = m(A')$ .

Wynika to wprost z tw. (3.4).

*Uwaga.* Twierdzenie odwrotne byłoby fałszywe: pochodna  $A'$  może być zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$ , a sam zbiór  $A$  może nie być mierzalny  $\mathfrak{J}$ . Np. zbiór liczb wymiernych przedziału  $\langle 0, 1 \rangle$  nie jest mierzalny  $\mathfrak{J}$  (przykład 2, str. 201), podczas gdy jego pochodna jest przedziałem  $\langle 0, 1 \rangle$ , a więc zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$ .



(4.6) *Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, by zbiór ograniczony był mierzalny  $\mathfrak{J}$ , jest, żeby jego brzeg był zbiorem miary  $\mathfrak{J}$  zero.*

Wynika to z tw. (3.6).

*Uwaga.* Ponieważ brzeg jest zbiorem zamkniętym, więc tw. (4.6) pozostaje prawdziwe, gdy miarę  $\mathfrak{J}$  brzegu zastąpić miarą  $\mathfrak{Q}$ .

Z tw. (3.7) wynika, że

(4.7) *Mierzalność  $\mathfrak{J}$  zbioru  $A$  jest równoważna mierzalności  $\mathfrak{J}$  jego wnętrza  $W(A)$  i*

$$m(A) = m[W(A)].$$

**PRZYKŁADY.** 1. *Wielokąt jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$ .*

Brzeg jego jest bowiem linią łamaną, a więc zbiorem miary  $\mathfrak{Q}$  zero (p. tw. (7.3), str. 188).

2. *Koło  $x^2 + y^2 \leq r^2$  jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$ .*

Brzeg jego jest bowiem sumą wykresów funkcji  $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ ,  $y = -\sqrt{r^2 - x^2}$ , ciągłych w przedziale  $\langle -r, r \rangle$ ; na mocy tw. (7.3), str. 188, jest on więc zbiorem miary  $\mathfrak{Q}$  zero.

Podobnie, *kula jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$ .*

3. *Każdy wielościan w przestrzeni  $\mathcal{E}^n$  jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$ .*

Brzeg wielościanu tworzą bowiem jego ściany, a każda ściana jest zbiorem miary  $\mathfrak{Q}$  zero (p. str. 190).

(4.8) *Suma skończonej liczby zbiorów  $A_1, \dots, A_r$  mierzalnych  $\mathfrak{J}$  jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$  i*

$$m(A_1 + \dots + A_r) \leq m(A_1) + \dots + m(A_r).$$

Mierzalność sumy  $A_1 + \dots + A_r$  wynika z tw. (4.6), ponieważ brzeg sumy zbiorów  $A_1, \dots, A_r$  zawarty jest w sumie brzegów tych zbiorów. Wzór zaś wynika z tw. (3.3), str. 197, przez zastąpienie w nim miary zewnętrznej  $\mathfrak{J}$  przez miarę  $\mathfrak{J}$ .

(4.9) *Jeżeli zbiory  $A_1, \dots, A_r$  są mierzalne  $\mathfrak{J}$  i rozłączne, to*

$$(15) \quad m(A_1 + \dots + A_r) = m(A_1) + \dots + m(A_r).$$

Istotnie, zastępując w tw. (3.3'), str. 198, miarę wewnętrzną  $\mathfrak{J}$  przez miarę  $\mathfrak{J}$ , dostajemy

$$(16) \quad m(A_1 + \dots + A_r) \geq m(A_1) + \dots + m(A_r),$$

a nierówność odwrotną mamy z tw. (4.8).

*Uwaga.* Tw. (4.9) zachodzi już przy założeniu, że zbiory  $A_1, \dots, A_r$  mierzalne  $\mathfrak{J}$  mają wnętrza rozłączne.

Mamy bowiem wobec tw. (3.3')

$$(17) \quad m_w[W(A_1) + \dots + W(A_r)] \geq m_w[W(A_1)] + \dots + m_w[W(A_r)].$$

Ponieważ na mocy tw. (4.6) jest  $m_w[W(A_i)] = m_w(A_i) = m(A_i)$  dla  $i = 1, 2, \dots, r$  oraz  $W(A_1) + \dots + W(A_r) \subset A_1 + \dots + A_r$ , więc

$$m_w[W(A_1) + \dots + W(A_r)] \leq m(A_1 + \dots + A_r).$$

Stąd na mocy (4.7) dostajemy (16), a z (4.9) równość (15).

(4.10) *Iloczyn skończonej liczby zbiorów mierzalnych  $\mathfrak{J}$  jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$ .*

Wynika to z tw. (4.7), ponieważ brzeg iloczynu zbiorów jest zawarty w sumie ich brzegów.

(4.11) *Dopełnienie zbioru mierzalnego  $\mathfrak{J}$  do przedziału jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$ .*

Dowód. Jeżeli zbiór  $A$  jest zawarty w przedziale  $I$ , to brzeg zbioru  $I - A$  jest zawarty w sumie brzegu zbioru  $A$  i brzegu przedziału  $I$ . Ponieważ oba brzegi są zbiorami miary  $\mathfrak{L}$  zero na mocy tw. (4.1) i (4.6), więc ich suma, a tym bardziej brzeg zbioru  $I - A$ , jako jej część, ma miarę  $\mathfrak{L}$  zero. Na mocy tw. (4.6) zbiór  $I - A$  jest więc mierzalny  $\mathfrak{J}$ .

(4.12) *Jeżeli zbiory  $A$  i  $B$  są mierzalne  $\mathfrak{J}$ , to różnica  $A - B$  jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$ .*

Jeżeli ponadto  $BCA$ , wówczas

$$m(A - B) = m(A) - m(B).$$

Dowód. Niech  $I$  będzie przedziałem zawierającym  $A + B$ . Wówczas  $A - B = A \cdot (I - B)$  i różnica  $A - B$  jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$  na mocy tw. (4.10), jako iloczyn zbiorów  $A$  i  $I - B$ , z których pierwszy jest mierzalny  $\mathfrak{J}$  z założenia, a drugi na mocy tw. (4.11).

Jeżeli ponadto  $BCA$ , wówczas  $A = B + (A - B)$ , skąd

$$m(A) = m[B + (A - B)] = m(B) + m(A - B),$$

gdyż zbiory  $A$  i  $A - B$  są rozłączne.

**5. Przesunięcie równoległe.** Niech  $E$  będzie dowolnym zbiorem ograniczonym w  $\mathcal{E}^n$ , a  $(a_1, \dots, a_n)$  dowolnym układem  $n$  liczb. Niech każdemu punktowi  $p = (x_1, \dots, x_n)$  zbioru  $E$  przyporządkowany będzie punkt  $p' = (x'_1, \dots, x'_n)$  za pomocą równań

$$(18) \quad x'_i = x_i + a_i \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Przyporządkowanie to jest odwzorowaniem wzajemnie jednoznaczny i ciągłym zbioru  $E$  na zbiór  $E'$  punktów  $p'$ .

Odwzorowanie (18) nazywamy *przesunięciem (równoległym)*.

Z określenia wynika, że odwzorowanie odwrotne

$$(19) \quad x_i = x'_i - a_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

jest przesunięciem (równoległym) zbioru  $E'$  na zbiór  $E$ .

Przez przesunięcie równoległe przedział  $I = \langle a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n \rangle$  przechodzi na przedział  $I' = \langle a_1 + a_1, \dots, a_n + a_n; b_1 + a_1, \dots, b_n + a_n \rangle$  i miara przedziału zostaje zachowana, t.j.  $|I| = |I'|$ . Ogólnie:

(5.1) *Jeżeli zbiór ograniczony  $E$  przechodzi przez przesunięcie równoległe w zbiór  $E'$ , to*

$$m_w(E) = m_w(E'), \quad m_z(E) = m_z(E').$$

**Dowód.** Niech  $E \subset I_1 + \dots + I_m$ . Zbiór  $E'$  jest oczywiście zawarty w sumie przedziałów  $I'_1, \dots, I'_m$ , na które przejdą przedziały  $I_1, \dots, I_m$  przez przesunięcie (18). Ponieważ przesunięcie równoległe zachowuje miarę przedziałów, więc  $|I_1| + \dots + |I_m| = |I'_1| + \dots + |I'_m|$ , skąd  $m_z(E) \geq m_z(E')$ . Na odwrót, ponieważ przez przesunięcie (19)  $E'$  przechodzi na  $E$ , więc dostajemy  $m_z(E') \geq m_z(E)$ . Zatem  $m_z(E) = m_z(E')$ .

Podobnie dowodzi się równości miar wewnętrznych.

Wynika stąd od razu twierdzenie następujące:

(5.2) *Jeżeli zbiór  $E$  jest mierzalny  $\mathfrak{J}$ , to jego przesunięcie  $E'$  jest również zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$  i miary  $\mathfrak{J}$  obu zbiorów są równe.*

**6. Całka  $\Re$  funkcji w zbiorze.** Niech  $E$  będzie zbiorem ograniczonym w  $\mathcal{E}^n$ , a  $f(p)$  funkcją ograniczoną, określoną w  $E$ .

Oznaczmy przez  $f^*$  funkcję, która jest przedłużeniem funkcji  $f$  na całą przestrzeń  $\mathcal{E}^n$ , przyjmując  $f^*(p) = 0$  dla  $p$  nie należących do  $E$ . Zatem funkcja  $f^*(p)$  jest określona w całej przestrzeni  $\mathcal{E}^n$  i ograniczona w tej przestrzeni.

Dla dowolnych dwóch przedziałów zamkniętych  $I'$  i  $I''$ , z których każdy zawiera  $E$ , mamy

$$(20) \quad \int_{I'} \bar{f}^*(p) dp = \int_{I''} \bar{f}^*(p) dp, \quad \int_{\bar{I}'} f^*(p) dp = \int_{\bar{I}''} f^*(p) dp.$$

W przypadku, gdy  $I' \subset I''$ , wzór (20) wynika z tw. (9.3), str. 191. W przypadku przeciwnym, oznaczając przez  $I$  dowolny przedział zawierający  $I' + I''$ , widzimy, że całki funkcji  $f^*$  w  $I'$  i  $I''$  są równe jej całce w  $I$ , a zatem równe między sobą.

Całką górną (dolną) funkcji  $f(p)$  w zbiorze  $E$  nazywamy całkę górną (dolną) funkcji  $f^*(p)$  w przedziale  $I$  zawierającym  $E$  i oznaczamy ją przez

$$\int_E \bar{f}(p) dp \quad \left( \int_E f(p) dp \right).$$

Zatem według określenia

$$(21) \quad \int_E \bar{f}(p) dp = \int_I \bar{f}^*(p) dp, \quad \int_E f(p) dp = \int_I f^*(p) dp,$$

przy czym całki górna i dolna funkcji  $f$  w zbiorze  $E$  nie zależą od wyboru przedziału  $I$ , zawierającego ten zbiór.

Jeżeli całki górna i dolna w  $E$  są równe, mówimy, że funkcja  $f(p)$  jest całkowalna  $\Re$  w zbiorze  $E$  i całkę jej w tym zbiorze oznaczamy przez

$$\int_E f(p) dp.$$

Na mocy (20) funkcja  $f^*(p)$  jest wówczas całkowana  $\Re$  w każdym przedziale  $I$  zawierającym  $E$  i

$$\int_E f(p) dp = \int_I f^*(p) dp.$$

Dla całek  $\Re$  w zbiorach zachodzą niektóre spośród twierdzeń zachodzących dla całek  $\Re$  w przedziałach.

(6.1) Jeżeli funkcje  $f(p)$  i  $\varphi(p)$  są całkowalne  $\Re$  w zbiorze ograniczonym  $E$ , to funkcje  $f(p) \pm \varphi(p)$ , i  $c f(p)$ , gdzie  $c = \text{const}$ , są całkowalne  $\Re$  w  $E$  i

$$(22) \quad \int_E [f(p) \pm \varphi(p)] dp = \int_E f(p) dp \pm \int_E \varphi(p) dp,$$

$$(23) \quad \int_E c f(p) dp = c \int_E f(p) dp.$$

Dowód. Weźmy pod uwagę przedłużenia funkcji  $f(p)$  i  $\varphi(p)$ :

$$f^*(p) = \begin{cases} f(p) & \text{dla } p \in E, \\ 0 & \text{dla } p \in -E, \end{cases} \quad \varphi^*(p) = \begin{cases} \varphi(p) & \text{dla } p \in E, \\ 0 & \text{dla } p \in -E. \end{cases}$$

Łatwo zauważyć, że wówczas funkcja  $f^*(p) \pm \varphi^*(p)$  jest przedłużeniem funkcji  $f(p) \pm \varphi(p)$  i że również  $f^*(p) \pm \varphi^*(p) = 0$  dla  $p$  nie należących do  $E$ . Na mocy określenia całki funkcji w zbiorze wynika stąd całkowalność sumy (różnicy) dwóch funkcji i wzór (22) na jej całkę. Podobnie dowodzi się pozostałej części twierdzenia oraz wzoru (23).

**7. Miara Jordana jako całka.** Niech  $E \subset \mathcal{E}^n$  i niech  $f(p)$  będzie funkcją charakterystyczną zbioru  $E$ , t.j. funkcją

$$f(p) = \begin{cases} 1 & \text{dla } p \in E, \\ 0 & \text{dla } p \in -E. \end{cases}$$

(7.1) Jeżeli zbiór  $E$  jest ograniczony, to

$$(24) \quad m_w(E) = \int_{\bar{E}} 1 dp, \quad m_z(E) = \int_{\bar{E}} 1 dp.$$

Dowód. Niech  $\varepsilon > 0$ . Na mocy tw. (1.2) i (2.2), str. 196, istnieją przedziały zamknięte  $I_1, \dots, I_k$  oraz  $I'_1, \dots, I'_l$ , spełniające warunki:

$$(25) \quad I'_1 + \dots + I'_l \subset E \subset I_1 + \dots + I_k,$$

$$(26) \quad m_z(E) + \varepsilon > |I_1| + \dots + |I_k|, \quad m_w(E) - \varepsilon < |I'_1| + \dots + |I'_l|.$$

Niech  $I$  będzie dowolnym przedziałem zawierającym sumę

$$I_1 + \dots + I_k + I'_1 + \dots + I'_l.$$

Na mocy tw. (1.1), str. 179, istnieje taka siatka  $\Delta$  przedziału  $I$ , że każdy z przedziałów występujących w (25) jest sumą pewnych przedziałów tej siatki. Oznaczmy przez  $s$  i  $S$  sumę dolną i górną dla funkcji  $f$ , odpowiadającą podziałowi  $\Delta$ . Suma dolna  $s$  jest więc sumą miar tych przedziałów siatki  $\Delta$ , które są zawarte w  $E$ . Ponieważ przedziały  $I'_1, \dots, I'_l$  są zawarte w  $E$  i każdy z nich jest sumą przedziałów siatki  $\Delta$ , więc na mocy (25)

$$(27) \quad |I'_1| + \dots + |I'_l| \leq s \leq m_w(E).$$

Podobnie  $S$  jest sumą miar przedziałów siatki  $\Delta$ , mających punkty wspólne z  $E$ . Ponieważ przedziały takie pokrywają  $E$ , a zarazem są zawarte w  $I_1 + \dots + I_k$ , więc na mocy (25)

$$(28) \quad m_z(E) \leq S \leq |I_1| + \dots + |I_k|.$$

Z (27) i (28) dostajemy na mocy (26)

$$m_w(E) - \varepsilon \leq \int_I f(p) dp \leq m_w(E), \quad m_z(E) \leq \int_I \bar{f}(p) dp \leq m_z(E) + \varepsilon,$$

skąd wobec dowolności liczby  $\varepsilon > 0$

$$m_w(E) = \int_I f(p) dp, \quad m_z(E) = \int_I \bar{f}(p) dp,$$

co daje wzory (24) na mocy określenia funkcji  $f(p)$ .

Otrzymujemy stąd od razu twierdzenia następujące:

(7.2) *Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, by zbiór  $E$  był mierzalny  $\mathfrak{J}$ , jest, żeby funkcja charakterystyczna zbioru  $E$  była całkowalna w  $E$ .*

(7.3) *Jeżeli zbiór  $E$  jest mierzalny  $\mathfrak{J}$ , to*

$$m(E) = \int_E 1 dp.$$

**8. Warunki całkowalności  $\mathfrak{R}$  funkcji w zbiorze.** Udowodnimy teraz, że

(8.1) *Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, by funkcja ograniczona, określona w zbiorze  $E$  mierzalnym  $\mathfrak{J}$ , była w nim całkowalna  $\mathfrak{R}$ , jest, żeby zbiór punktów nieciągłości tej funkcji w zbiorze  $E$  był miary  $\mathfrak{Q}$  zero.*

Dowód. Załóżmy, że funkcja  $f(p)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w zbiorze  $E \subset I$ . Jej przedłużenie

$$f^*(p) = \begin{cases} f(p) & \text{dla } p \in E, \\ 0 & \text{dla } p \in -E \end{cases}$$

jest więc funkcją całkowalną  $\mathfrak{R}$  w  $I$ , a przeto na mocy tw. (8.1), str. 190, zbiór  $H^*$  jej punktów nieciągłości w przedziale  $I$  jest miary  $\mathfrak{Q}$  zero. Ponieważ  $H^*$  zawiera zbiór  $H$  punktów nieciągłości funkcji  $f(p)$  w zbiorze  $E$ , więc i  $H$  jest miary  $\mathfrak{Q}$  zero. Warunek jest zatem konieczny.

Założmy teraz, że zbiór  $H$  punktów nieciągłości funkcji  $f(p)$  jest miary  $\mathfrak{L}$  zero. Ponieważ zbiór  $E$  jest z założenia mierzalny  $\mathfrak{J}$ , więc na mocy tw. (4.6), str. 202, jego brzeg  $B(E)$  jest miary  $\mathfrak{L}$  zero. Ponieważ funkcja  $f^*(p)$  jest stała (bo równa 0), a zatem ciągła w punktach wewnętrznych zbioru  $I - E$ , więc  $H^* \subset H + B(E)$ . Wynika stąd, że  $H^*$  jest zbiorem miary  $\mathfrak{L}$  zero, a zatem że funkcja  $f^*(p)$  jest całkowalna w  $I$ , czyli że funkcja  $f(p)$  jest całkowalna w  $E$ . Warunek jest więc dostateczny.

(8.2) *Jeżeli zbiory  $A_1, \dots, A_m$  ograniczone i mierzalne  $\mathfrak{J}$  nie zachodzą na siebie i funkcja  $f(p)$  jest w każdym z nich całkowalna  $\mathfrak{R}$ , to jest ona całkowalna  $\mathfrak{R}$  w sumie  $E = A_1 + \dots + A_m$  i*

$$(29) \quad \int_E f(p) dp = \int_{A_1} f(p) dp + \dots + \int_{A_m} f(p) dp.$$

Dowód. Weźmy pod uwagę przedłużenia funkcji  $f(p)$ :

$$(30) \quad f_i^*(p) = \begin{cases} f(p) & \text{dla } p \in A_i \\ 0 & \text{dla } p \in -A_i \end{cases} \quad (i=1, \dots, m),$$

$$(31) \quad f^*(p) = \begin{cases} f(p) & \text{dla } p \in E, \\ 0 & \text{dla } p \in -E. \end{cases}$$

Ponieważ zbiory  $A_1, \dots, A_m$  mają z założenia wnętrza rozłączne, więc funkcja

$$(32) \quad \varphi(p) = f^*(p) - f_1^*(p) - \dots - f_m^*(p)$$

przybiera wartość 0 we wszystkich punktach zbioru  $E$ , z wyjątkiem być może punktów należących do brzegów zbiorów  $A_1, \dots, A_m$ , a więc do zbiorów zamkniętych miary  $\mathfrak{L}$  zero, funkcja  $\varphi(p)$  jest przeto zerem wszędzie poza sumą tych brzegów, t.j. poza pewnym zbiorem zamkniętym miary  $\mathfrak{L}$  zero. Wynika stąd na mocy tw. (8.1), że całka  $\mathfrak{R}$  funkcji  $\varphi(p)$  w każdym przedziale zamkniętym  $I$  istnieje i jest równa 0.

Niech teraz  $E \subset I$ . Ponieważ funkcje  $\varphi(p), f_1^*(p), \dots, f_m^*(p)$  są całkowalne  $\mathfrak{R}$  w  $I$ , więc wnosimy z (32) na mocy tw. (3.1), str. 182, że funkcja  $f^*(p)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w  $I$ , a stąd na mocy tw. (6.1), że funkcja  $f(p)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w  $E$ .

Wzór (32) daje zarazem

$$\int_I f^*(p) dp = \int_I f_1^*(p) dp + \dots + \int_I f_m^*(p) dp,$$

skąd wynika (29) na mocy określenia całki  $\mathfrak{R}$  w zbiorze.

**9. Całka Riemanna jako miara Jordana.** Następujące twierdzenia wyrażają związki między całkowalnością  $\mathfrak{R}$  a mierzalnością  $\mathfrak{J}$ :

(9.1) Jeżeli funkcja  $y=f(p)$ , określona w zbiorze ograniczonym  $E \subset \mathcal{E}^n$ , jest ograniczona i nieujemna, a zbiór  $D \subset \mathcal{E}^{n+1}$  składa się z punktów  $q=(x_1, \dots, x_n, x_{n+1})$ , których współrzędne spełniają warunki

$$(33) \quad (x_1, \dots, x_n) \in E, \quad 0 \leq x_{n+1} \leq f(x_1, \dots, x_n),$$

to całkowalność  $\mathfrak{R}$  funkcji  $f(p)$  w zbiorze  $E$  jest równoważna mierzalności  $\mathfrak{J}$  zbioru  $D$ .

Ponadto, jeżeli funkcja  $f(p)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w  $E$ , to jej całka  $\mathfrak{R}$  w tym zbiorze równa się mierze  $\mathfrak{J}$  zbioru  $D$  w przestrzeni  $\mathcal{E}^{n+1}$ :

$$(34) \quad \int_E f(p) dp = m(D).$$

Dowód. Niech  $E \subset I$  i niech  $\Delta$  będzie podziałem przedziału  $I$  na przedziały  $I_1, \dots, I_m$ . Przedłużmy funkcję  $f(p)$  w przedziale  $I$ :

$$(35) \quad f^*(p) = \begin{cases} f(p) & \text{dla } p \in E, \\ 0 & \text{dla } p \in I - E \end{cases}$$

i oznaczmy: przez  $k_i$  i  $K_i$  kresy dolny i górny funkcji  $f^*(p)$  w przedziale  $I_i$ , przez  $I'_i$  zbiór tych punktów  $q=(x_1, \dots, x_{n+1})$  przestrzeni  $\mathcal{E}^{n+1}$ , których współrzędne spełniają warunki

$$(x_1, \dots, x_n) \in I_i, \quad 0 \leq x_{n+1} \leq k_i,$$

wreszcie przez  $I''_i$  zbiór tych punktów przestrzeni  $\mathcal{E}^{n+1}$ , których współrzędne spełniają warunki

$$(x_1, \dots, x_n) \in I_i, \quad 0 \leq x_{n+1} \leq K_i.$$

Weźmy pod uwagę te zbiory  $I'_i$ , dla których  $k_i > 0$ ; zbiory te są niezachodzącymi na siebie przedziałami o miarach  $\mu_i = k_i |I_i|$ , zawartymi w  $D$ . Z określenia miary wewnętrznej wynika zatem, że

$$(36) \quad \sum_{i=1}^m k_i |I_i| \leq m_w(D),$$

przy czym suma powyższa dlatego mogła zostać rozciągnięta na wszystkie wskaźniki  $i=1, \dots, m$ , że dla  $k_i=0$  jest  $k_i |I_i|=0$ .



Zauważmy teraz, że  $E \subset I_1 + \dots + I_m$ . Jeżeli  $K_i > 0$ , to  $I_i''$  jest przedziałem o mierze  $K_i|I_i|$ , jeżeli zaś  $K_i = 0$ , to  $I_i''$  jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$  o mierze  $K_i|I_i| = 0$ . Na mocy więc tw. (4.8) mamy

$$(37) \quad m_z(D) \leq m_z(I_1 + \dots + I_m) \leq \sum_{i=1}^m K_i |I_i|.$$

$\sum_{i=1}^m k_i |I_i|$  jest sumą dolną, a  $\sum_{i=1}^m K_i |I_i|$  — sumą górną funkcji  $f^*(p)$  dla podziału  $\Delta$ . Ponieważ dla ciągu normalnego podziałów sumy te dążą do całek dolnej i górnej funkcji  $f^*(p)$  w  $I$ , więc z określenia pojęcia całki  $\mathfrak{R}$  w zbiorze dostajemy na mocy (36) i (37)

$$(38) \quad \int_{\overline{E}} f(p) dp \leq m_w(D) \leq m_z(D) \leq \int_E \overline{f(p)} dp.$$

Wynika stąd, że jeżeli funkcja  $f(p)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w zbiorze  $E$ , to zbiór  $D$  jest mierzalny  $\mathfrak{J}$  i miara jego wyraża się wzorem (34).

Na odwrót, założmy, że zbiór  $D$  jest mierzalny  $\mathfrak{J}$  i oznaczmy przez  $J$  przedział przestrzeni  $\mathcal{E}^{n+1}$  złożony z punktów  $q = (x_1, \dots, x_{n+1})$ , których współrzędne spełniają warunki:

$$(x_1, \dots, x_n) \in I, \quad 0 \leq x_{n+1} \leq a,$$

gdzie  $a$  jest dowolną liczbą większą od kresu górnego funkcji  $f(p)$  w zbiorze  $E$ :

$$a > K.$$

Niech  $\chi(q)$  będzie funkcją charakterystyczną zbioru  $D$ .

Z określenia tego zbioru i funkcji  $f^*(p)$  wynika, że jeżeli  $(x_1, \dots, x_n) \in I$ , to  $\chi(x_1, \dots, x_n, x_{n+1})$  jest zerem lub jednością zależnie od tego, czy  $0 \leq x_{n+1} \leq f^*(x_1, \dots, x_n)$ , czy  $f^*(x_1, \dots, x_n) < x_{n+1}$ . Zatem

$$(39) \quad \int_0^a \chi(x_1, \dots, x_{n+1}) dx_{n+1} = \int_0^{f^*(x_1, \dots, x_n)} dx_{n+1} = f^*(x_1, \dots, x_n).$$

Ponieważ zbiór  $D$  jest mierzalny  $\mathfrak{J}$ , więc funkcja  $\chi$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w  $D$ . Na mocy więc tw. (10.1), str. 192, wynika z (39), że funkcja  $f^*$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w  $I$ , czyli funkcja  $f$  w  $E$ , i że zachodzi wzór (34).

W szczególności, z tw. (9.1) otrzymujemy następujący wniosek:  
 (9.2) Jeżeli funkcja  $y=f(x_1, \dots, x_n)$  jest całkowalna w  $E$ , to jej wykres w  $\mathcal{E}^{n+1}$  jest zbiorem miary  $\mathfrak{J}$  zero.

Wykres ten jest bowiem (p. str. 188) zbiorem punktów, których współrzędne spełniają warunki

$$(x_1, \dots, x_n) \in E, \quad x_{n+1} = f(x_1, \dots, x_n),$$

a więc punktów leżących na brzegu zbioru  $D$  określonego w tw. (9.1) i mierzalnego  $\mathfrak{J}$  na mocy tego twierdzenia; brzeg zaś zbioru mierzalnego  $\mathfrak{J}$  jest miary  $\mathfrak{J}$  zero na mocy tw. (4.6), str. 202.

PRZYKŁADY. 1. Jeżeli funkcja nieujemna  $f(x)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  na odcinku  $\langle a, b \rangle$ , to zbiór płaski  $D$ , określony nierównościami  $a \leq x \leq b$  i  $0 \leq y \leq f(x)$ , jest mierzalny i jego miara  $\mathfrak{J}$  (płaska) równa się  $\int_a^b f(x) dx$ . Wykres zaś funkcji  $f(x)$  ma (również względem płaszczyzny) miarę  $\mathfrak{J}$  zero.

2. Jeżeli funkcja  $f(x, y)$  jest nieujemna i całkowalna  $\mathfrak{R}$  w prostokącie  $\langle a_1, a_2; b_1, b_2 \rangle$ , to zbiór punktów, których współrzędne spełniają nierówności  $a_1 \leq x \leq b_1$ ,  $a_2 \leq y \leq b_2$  i  $0 \leq z \leq f(x, y)$ , jest mierzalny  $\mathfrak{J}$  i jego miara  $\mathfrak{J}$  (przestrzenna) równa się całce funkcji  $f(x, y)$  w tym prostokącie.

(9.3) Jeżeli funkcje  $f_1(x_1, \dots, x_n)$  i  $f_2(x_1, \dots, x_n)$  są całkowalne  $\mathfrak{R}$  w zbiorze  $E \subset \mathcal{E}^n$  mierzalnym  $\mathfrak{J}$  i jeżeli

$$(40) \quad f_1(x_1, \dots, x_n) \geq f_2(x_1, \dots, x_n) \quad \text{dla} \quad (x_1, \dots, x_n) \in E,$$

wówczas zbiór  $R \subset \mathcal{E}^{n+1}$  złożony z punktów o współrzędnych spełniających warunki

$$(x_1, \dots, x_n) \in E, \quad f_2(x_1, \dots, x_n) \leq x_{n+1} \leq f_1(x_1, \dots, x_n)$$

jest mierzalny  $\mathfrak{J}$  i

$$(41) \quad m(R) = \int_E [f_1(p) - f_2(p)] dp.$$

Dowód. Niech  $k$  będzie kresem dolnym funkcji  $f_2(p)$  w  $E$ . Zatem z założenia

$$(42) \quad f_1(p) - k \geq f_2(p) - k \geq 0 \quad \text{dla} \quad p \in E.$$

Oznaczmy kolejno przez  $D_1$ ,  $D_2$  i  $D$  zbiory punktów

$$q = (x_1, \dots, x_n, x_{n+1})$$

przestrzeni  $\mathcal{E}^n$ , dla których  $(x_1, \dots, x_n) \in E$  oraz  $0 \leq x_{n+1} \leq f_1(x_1, \dots, x_n) - k$ ,  
 $0 \leq x_{n+1} \leq f_2(x_1, \dots, x_n) - k$  i

$$(43) \quad f_2(x_1, \dots, x_n) - k \leq x_{n+1} \leq f_1(x_1, \dots, x_n) - k.$$

Ponieważ zbiór  $E$  jest mierzalny  $\mathfrak{J}$ , więc funkcja  $y = \text{const.}$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w  $E$ . Wobec tego funkcje  $f_1(p) - k$  i  $f_2(p) - k$  są całkowalne  $\mathfrak{R}$  w  $E$ ; na mocy tw. (9.1) zbiory  $D_1$  i  $D_2$  są więc mierzalne  $\mathfrak{J}$  i

$$(44) \quad m(D_1) = \int_E [f_1(p) - k] dp, \quad m(D_2) = \int_E [f_2(p) - k] dp.$$

Oznaczając przez  $W$  wykres funkcji  $y = f_2(p) - k$  w przestrzeni  $\mathcal{E}^{n+1}$ , mamy z (43)

$$(45) \quad D = (D_1 - D_2) + W.$$

Na mocy tw. (9.2) zbiór  $W$  jest mierzalny  $\mathfrak{J}$  i  $m(W) = 0$ . Zbiór  $D_1 - D_2$  jest mierzalny  $\mathfrak{J}$  jako różnica dwóch zbiorów mierzalnych  $\mathfrak{J}$ , a stąd wobec (45) również zbiór  $D$  jest mierzalny  $\mathfrak{J}$ .

Ponieważ  $D_2 \subset D_1$  i  $D_1 W = 0$ , więc na mocy (44) i (45)

$$(46) \quad m(D) = m(D_1 - D_2) + m(W) = m(D_1) - m(D_2) = \int_E [f_1(p) - f_2(p)] dp.$$

Łatwo zauważyć, że  $D$  przechodzi w  $R$  przez przesunięcie równoległe  $x'_1 = x_1, \dots, x'_n = x_n, x'_{n+1} = x_{n+1} + k$ . Zatem na mocy tw. (5.2), str. 46, zbiór  $R$  jest mierzalny  $\mathfrak{J}$  i  $m(R) = m(D)$ , skąd na mocy (46) wynika (41), c. b. d. d.

PRZYKŁADY. 1. Jeżeli funkcje  $f(x)$  i  $\varphi(x)$  są całkowalne  $\mathfrak{R}$  na odcinku  $\langle a, b \rangle$  i  $\varphi(x) \leq f(x)$  dla  $x \in \langle a, b \rangle$ , to zbiór płaski  $R$ , określony nierównościami  $a \leq x \leq b$  i  $\varphi(x) \leq y \leq f(x)$ , jest

mierzalny  $\mathfrak{J}$  i  $m(R) = \int_a^b [f(x) - \varphi(x)] dx$ .

2. Jeżeli funkcje  $f(x, y)$  i  $\varphi(x, y)$  są ciągłe w zbiorze  $E$  mierzalnym  $\mathfrak{J}$  i  $f(x, y) \geq \varphi(x, y)$  dla  $(x, y) \in E$ , to zbiór przestrzenny  $R$ , złożony z punktów  $(x, y, z)$ , dla których  $(x, y) \in E$  i  $\varphi(x, y) \leq z \leq f(x, y)$ , jest mierzalny  $\mathfrak{J}$  i

$$m(R) = \int_E \int [f(x, y) - \varphi(x, y)] dx dy.$$

3. Koło  $x^2 + y^2 \leq 1$  jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$  jako zbiór płaski  $R$  złożony z punktów  $(x, y)$  spełniających nierówności

$-1 \leq x \leq 1$  oraz  $-\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$ . Wynika to z zastosowania przykładu 1 dla  $a=-1$  i  $b=1$ .

Podobnie kula  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$  jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$ , jako złożona z punktów, które spełniają warunki  $(x, y) \in E$  oraz  $-\sqrt{1-x^2-y^2} \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}$ , gdzie  $E$  jest kołem  $x^2 + y^2 \leq 1$ .

**10. Całka w zbiorze jako całka iterowana.** Niech  $E$  będzie zbiorem ograniczonym w przestrzeni  $\mathcal{E}^n$ . Oznaczmy dla  $j=1, \dots, n-1$  rzut zbioru  $E$  na przestrzeń  $\mathcal{E}^j$  zmiennych  $x_1, \dots, x_j$  przez  $R'$ , a na przestrzeń  $\mathcal{E}^{n-j}$  zmiennych  $x_{j+1}, \dots, x_n$  — przez  $R''$ . Oznaczmy dalej dla każdego punktu  $(x_1, \dots, x_j) \in R'$  przez  $A'(x_1, \dots, x_j)$  zbiór tych wszystkich punktów  $(x_1, \dots, x_n)$  należących do  $E$ , których rzutem jest punkt  $p$ ; podobnie, dla każdego punktu  $q = (x_{j+1}, \dots, x_n)$  zbioru  $R''$  niechaj  $A''(x_{j+1}, \dots, x_n)$  oznacza największy podzbiór zbioru  $E$ , którego rzutem jest punkt  $q$ .

(10.1) Jeżeli funkcja  $f(x_1, \dots, x_n)$  jest całkowalna  $\mathfrak{R}$  w  $E$ , to funkcje

$$\bar{F}(x_1, \dots, x_j) = \int \dots \int_{A'(x_1, \dots, x_j)} f(x_1, \dots, x_n) dx_{j+1} \dots dx_n,$$

$$\bar{\Phi}(x_{j+1}, \dots, x_n) = \int \dots \int_{A''(x_{j+1}, \dots, x_n)} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_j,$$

$$\underline{F}(x_1, \dots, x_j) = \int \dots \int_{A'(x_1, \dots, x_j)} f(x_1, \dots, x_n) dx_{j+1} \dots dx_n,$$

$$\underline{\Phi}(x_{j+1}, \dots, x_n) = \int \dots \int_{A''(x_{j+1}, \dots, x_n)} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_j$$

są całkowalne odpowiednio w  $R'$  i  $R''$ , a ponadto

$$\begin{aligned} (47) \quad \int_E f(p) dp &= \int_{R'} \dots \int \left[ \int \dots \int_{A'(x_1, \dots, x_j)} f(x_1, \dots, x_n) dx_{j+1} \dots dx_n \right] dx_1 \dots dx_j = \\ &= \int_{R''} \dots \int \left[ \int \dots \int_{A''(x_{j+1}, \dots, x_n)} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_j \right] dx_{j+1} \dots dx_n. \end{aligned}$$

Dowód. Niech  $E \subset I = \langle a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n \rangle$ . Wówczas

$$R' \subset J' = \langle a_1, \dots, a_j; b_1, \dots, b_j \rangle \quad \text{i} \quad R'' \subset J'' = \langle a_{j+1}, \dots, a_n; b_{j+1}, \dots, b_n \rangle.$$

Dla przedłużenia  $f^*(p)$  funkcji  $f(p)$  według wzoru (31), str. 208, mamy

$$\begin{aligned}\int_I f^*(p) dp &= \int_E f(p) dp, \\ \int_{J'} \dots \int f^*(x_1, \dots, x_n) dx_{j+1} \dots dx_n &= \int_{A'(x_1, \dots, x_j)} \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_{j+1} \dots dx_n, \\ \int_{J'} \dots \int f^*(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_j &= \int_{A''(x_{j+1}, \dots, x_n)} \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_j,\end{aligned}$$

skąd otrzymujemy (47) na mocy tw. (10.1), str. 192.

*Uwaga.* Jeżeli funkcja  $f(x_1, \dots, x_n)$  jest całkowalna  $\Re$  w zbiorach  $A'$  i  $A''$ , tw. (10.1) pozostaje prawdziwe, gdy w nim całki górne i dolne zastąpić wprost jej całkami  $F(x)$  i  $\Phi(x)$ .

W szczególności jest tak zawsze, ilekroć zbiory  $E$ ,  $R'$  i  $R''$  są mierzalne  $\Im$ , a  $f$  jest funkcją ciągłą w  $E$ .

**PRZYKŁADY.** 1. Niech funkcje  $F(x)$  i  $\Phi(x)$  będą ciągłe na odcinku  $\langle a, b \rangle$  i spełniają dla  $a \leq x \leq b$  nierówność  $\Phi(x) \leq F(x)$ , a funkcja  $f(x, y)$  niechaj będzie ciągła w zbiorze płaskim  $E$ , określonym nierównościami  $a \leq x \leq b$  i  $\Phi(x) \leq y \leq F(x)$ . Wówczas

$$\int_E \int f(x, y) dx dy = \int_a^b \left[ \int_{\Phi(x)}^{F(x)} f(x, y) dy \right] dx.$$

Rzut bowiem  $R'$  zbioru  $E$  na oś  $x$ -ów jest odcinkiem  $\langle a, b \rangle$ , a  $A'(x)$  czyli zbiór punktów  $(x, y) \in E$ , których rzutem jest  $x$ , jest odcinkiem  $\langle \Phi(x), F(x) \rangle$ .

2. Jeżeli funkcja  $f(x, y, z)$  jest ciągła w kuli  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ , to

$$\begin{aligned}\int_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(x, y, z) dx dy dz &= \int \int \left\{ \int_{-V_{1-x^2-y^2}}^{V_{1-x^2-y^2}} f(x, y, z) dz \right\} dx dy = \\ &= \int_{-1}^1 \left[ \int_{-V_{1-x^2}}^{V_{1-x^2}} \left\{ \int_{-V_{1-x^2-y^2}}^{V_{1-x^2-y^2}} f(x, y, z) dz \right\} dy \right] dx.\end{aligned}$$

Kula jest bowiem zbiorem mierzalnym  $\Im$  (p. przykład 2, str. 202), rzut  $R'$  danej kuli na płaszczyznę  $xy$  jest kołem  $x^2 + y^2 \leq 1$ ,

a zbiór  $A'(x, y)$  (tj. zbiór punktów tej kuli, których rzutem jest punkt  $(x, y) \in R'$ ) jest odcinkiem  $\langle -\sqrt{1-x^2-y^2}, \sqrt{1-x^2-y^2} \rangle$ . Z tw. (10.1) dostajemy więc równość pierwszą.

Ponieważ  $R'$  jest zbiorem określonym nierównościami  $-1 \leq x \leq 1$ ,  $-\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$ , więc z przykładu 1 otrzymujemy równość drugą.

**11. Miara (objętość) kuli w  $\mathcal{E}^n$ .** Kulą (zamkniętą)  $\mathcal{K}_n(r)$  o środku  $p_0 = (\xi_1, \dots, \xi_n)$  i o promieniu  $r > 0$  przestrzeni  $\mathcal{E}^n$  nazywamy zbiór punktów  $p = (x_1, \dots, x_n)$ , dla których (p. str. 73)

$$(48) \quad \varrho(p, p_0) \leq r.$$

Współrzędne punktów kuli (zamkniętej) spełniają zatem wzór

$$(49) \quad (x_1 - \xi_1)^2 + \dots + (x_n - \xi_n)^2 - r^2 \leq 0.$$

Punkty kuli, dla których we wzorze (49) zachodzi równość, tworzą brzeg (powierzchnię) kuli w  $\mathcal{E}^n$ , pozostałe zaś punkty są jej punktami wewnętrznymi. Brzeg kuli  $\mathcal{K}_n(r)$  jest sumą wykresów geometrycznych w przestrzeni  $\mathcal{E}^n$  następujących dwóch funkcji:

$$\begin{aligned} x_n &= \xi_n + \sqrt{r^2 - (x_1 - \xi_1)^2 - \dots - (x_{n-1} - \xi_{n-1})^2}, \\ x_n &= \xi_n - \sqrt{r^2 - (x_1 - \xi_1)^2 - \dots - (x_{n-1} - \xi_{n-1})^2}, \end{aligned}$$

t.j. funkcji określonych w zbiorze  $\mathcal{K}_{n-1}(r)$  złożonym z punktów  $(x_1, \dots, x_{n-1})$  przestrzeni  $\mathcal{E}^{n-1}$ , których współrzędne spełniają nierówność

$$(50) \quad (x_1 - \xi_1)^2 + \dots + (x_{n-1} - \xi_{n-1})^2 - r^2 \leq 0,$$

i ciągłych w tym zbiorze.

Zbiór  $\mathcal{K}_{n-1}(r)$ , jak widać ze wzoru (50), jest kulą w  $\mathcal{E}^{n-1}$ . Z tw. (7.3), str. 188, wynika, że brzeg kuli jest zbiorem miary  $\mathfrak{L}$  zero. Zatem na mocy tw. (4.6), str. 202,

(11.1) *Kula jest zbiorem mierzalnym  $\mathfrak{J}$ .*

Przez przesunięcie równoległe  $x'_i = x_i + \xi_i$ , gdzie  $i = 1, \dots, n$ , kula (49) przechodzi w zbiór  $\mathcal{K}'_n$  określony nierównością

$$(51) \quad x_1^2 + \dots + x_n^2 - r^2 \leq 0.$$

Jest to kula o promieniu  $r$  i środku w punkcie  $O$ . Na mocy tw. (5.2), str. 204, kule (50) i (51) mają zatem równe miary  $\mathfrak{J}$ . A więc

(11.2) *Miara kuli w  $\mathcal{E}^n$  zależy tylko od promienia  $r$ .*

Oznaczmy przez  $v_n(r)$  miarę  $\mathfrak{J}$  kuli  $\mathcal{K}'_n$  w  $\mathcal{E}^n$ . Udowodnimy za pomocą indukcji, że

$$(11.3) \quad v_n(r) = \alpha_n r^n,$$

gdzie  $\alpha_n$  jest liczbą stałą zależną tylko od  $n$ .

Dowód. Twierdzenie zachodzi dla  $n=1$ , gdyż kula  $\mathcal{K}'_1(r)$  jest odcinkiem  $\langle -r, r \rangle$ ; zatem  $v_1(r) = 2r$  i  $\alpha_1 = 2$ .

Założmy więc prawdziwość twierdzenia dla  $n-1$ . Z tw. (7.1), str. 207, mamy

$$(52) \quad v_n(r) = \int_{\mathcal{K}'_n(r)} \dots \int 1 \, dx_1 \dots dx_n.$$

Przyjmując  $j=n-1$  w twierdzeniu (10.1), widzimy, że zbiór  $R''$ , czyli rzut kuli (51) na oś  $x_n$ , jest odcinkiem  $\langle -r, r \rangle$ ; zbiór zaś  $A''(x_n)$  jest kulą w przestrzeni  $\mathcal{E}^{n-1}$ , określoną nierównością

$$x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 - (r^2 - x_n^2) \leq 0,$$

a więc kulą  $\mathcal{K}'_{n-1}(\sqrt{r^2 - x_n^2})$ ; zatem

$$v_n(r) = \int_{-r}^r \left[ \int_{\mathcal{K}'_{n-1}(\sqrt{r^2 - x_n^2})} \dots \int 1 \, dx_1 \dots dx_{n-1} \right] dx_n.$$

Całka w [ ] równa się mierze kuli w  $\mathcal{E}^{n-1}$  o promieniu  $\sqrt{r^2 - x_n^2}$ . Na mocy założenia prawdziwości wzoru (11.3) dla  $n-1$  całka ta wynosi zatem  $\alpha_{n-1}(\sqrt{r^2 - x_n^2})^{n-1}$ , skąd

$$v_n(r) = \int_{-r}^r \alpha_{n-1} (\sqrt{r^2 - x_n^2})^{n-1} dx_n.$$

Podstawiając  $x_n = r \cos \varphi$ , otrzymujemy

$$v_n(r) = \alpha_{n-1} r^n \int_0^\pi \sin^n \varphi \, d\varphi = 2\alpha_{n-1} r^n \int_0^{\pi/2} \sin^n \varphi \, d\varphi.$$

Tym samym tw. (11.3) jest dowiedzione.

Udowodniliśmy zarazem, że  $v_n(r)$  jest postaci (11.3), gdzie

$$(53) \quad a_n = 2a_{n-1} \int_0^{\pi/2} \sin^n \varphi d\varphi = 2a_{n-1} I_n.$$

Udowodnimy teraz, że

$$(11.4) \quad v_{2n}(r) = \frac{\pi^n r^{2n}}{n!} \quad i \quad v_{2n+1}(r) = \frac{2^n \pi^n r^{2n+1}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \quad dla \quad n \geq 1.$$

Dowód. Obliczając całkę  $J_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n \varphi d\varphi$ , dostajemy<sup>1)</sup> dla  $n \geq 1$ :

$$(54) \quad I_1 = 1, \quad I_{2n} = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \frac{\pi}{2}, \quad I_{2n-1} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 2n+1}.$$

Podstawiając w (6)  $n-1$  zamiast  $n$ , dostajemy  $a_{n-1} = 2a_{n-2} I_{n-1}$ , skąd na mocy (6)  $a_n = 2^2 a_{n-2} I_n I_{n-1}$ , zatem:

$$a_{2n} = 2^2 a_{2n-2} I_{2n} I_{2n-1}, \quad a_{2n+1} = 2^2 a_{2n-1} I_{2n+1} I_{2n},$$

a więc na mocy (7)

$$a_{2n} = 2^2 a_{2n-2} \cdot \frac{1}{2n} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{n} a_{2n-2}, \quad a_{2n+1} = 2^2 a_{2n-1} \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2n+1} = \frac{2\pi}{2n+1} \cdot a_{2n-1}.$$

Ponieważ  $a_1 = 2$  i  $a_2 = \pi$ , otrzymujemy z powyższych wzorów redukcyjnych dla  $n \geq 1$

$$a_{2n} = \frac{\pi^n}{n!}, \quad a_{2n+1} = \frac{2^n \pi^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)},$$

skąd na mocy (11.3) wynika (11.4), c. b. d. d.

---

<sup>1)</sup> P. S. Banach, *Rachunek różniczkowy i całkowy*, tom II, str. 158, Książnica Atlas, Wrocław 1949 (przedruk wydania z 1931 r.).