

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 1. stopnja

Tom Gornik

Izrek o invarianci odprtih množic

Delo diplomskega seminarja

Mentor: izred. prof. dr. Jaka Smrekar

Ljubljana, 2020

KAZALO

1. Uvod	4
2. Simpleksi	5
3. Poincaré-Mirandov izrek	17
4. Razširitev funkcije	25
5. Izrek o invarianci odprtih množic	30
Slovar strokovnih izrazov	32
Literatura	32

Izrek o invarianci odprtih množic

POVZETEK

Zveznost in diskretnost sta v mnogih pogledih povsem nasprotujoča si pojma. Kljub temu se izkaže, da lahko s pomočjo kombinatorike na diskretnih množicah dokažemo veliko lastnosti zveznih funkcij. Glavna prednost takega načina dokazovanja je, da si je postopek dokaza (vsaj v primeru, ko dimenzija ni prevelika) lahko predstavljati in celo skicirati. Pozitivne strani se pokažejo predvsem pri dokazovanju izrekov o obstoju posebnih točk, kot sta negibna točka in ničla funkcije. Primer takega izreka je Poincaré-Mirandov izrek, ki je v tem delu dokazan s pomočjo kombinatorike na ogliščih triangulacije kocke in Spernerjeve leme. Dokazano je, da Poincaré-Mirandov izrek implicira izrek o invarianci odprtih množic. Na koncu je predstavljena enostavna a pomembna posledica izreka o invarianci odprtih množic, ki jo imenujemo izrek o invarianci dimenzije.

Domain invariance theorem

ABSTRACT

Continuity and discreteness are often seen as two opposing concepts, but we can use discrete combinatorics to prove many properties of continuous functions. The main benefit is that we can easily (at least when the dimension is not too large) imagine and also draw some pictures of proof. This works particularly well when we try to prove a theorem on the existence of special points of a function, for example, a fixed point or a zero of a function. One example of this sort of theorem is Poincaré-Miranda's theorem which is proved in this work by discrete combinatorics on vertices of a triangulation of a cube and Sperner's lemma. We can show that Poincaré-Miranda's theorem implies the domain invariance theorem. In the end, we derive a simple but important corollary, the dimension invariance theorem.

Math. Subj. Class. (2010): 52A20, 54F45, 54H25

Ključne besede: simpleks, Spernerjeva lema, Poincaré-Mirandov izrek, izrek o invarianci odprtih množic, izrek o invarianci dimenzij

Keywords: simplex, Sperner's lemma, Poincaré-Miranda's theorem, domain invariance theorem, dimension invariance theorem

1. UVOD


Koncept dimenzije prostora se zdi zelo naraven in intuitiven. V svojih zapisih je o dimenzijah govoril že Aristotel. A ko beremo njegova dela, hitro vidimo, da je bila njegova predstava o dimenzijah drugačna od današnje. Aristotel namreč pravi: „Premica ima magnitudo v eni smeri, ravnina v dveh smereh, geometrijska telesa pa v treh smereh in poleg teh treh magnitud ni nobene več, kajti te tri so vse” [5, str. 1, moj prevod]. Matematiki so dolgo živeli v prepričanju, da so lahko matematični objekti največ tridimenzionalni. Kasneje so se začele pojavljati potrebe po štiridimenzionalnih objektih, saj so bile na primer v mehaniki enačbe veliko lažje, če je eno dimenzijo predstavljal čas. Tako smo počasi prišli do razmišljanja, da obstajajo večdimenzionalni in celo neskončno dimenzionalni prostori. Problem se pojavi, ko želimo primerjati prostore različnih dimenzij. Intuicija nam pravi, da prostora različnih dimenzij ne moreta biti enaka. V topologiji rečemo, da ne moreta biti homeomorfna. Homeomorfizem je bijektivna zvezna preslikava f , katere inverzna preslikava f^{-1} je tudi zvezna. Če lahko prostor X z neko homeomorfno preslikavo preslikamo na prostor Y , pravimo, da sta prostora X in Y homeomorfna. Matematiki so že od nekdaj verjeli, da je dimenzija topološka invarianta, kar pomeni, da imata homeomorfna prostora enako dimenzijo. To trditev je bilo zelo težko dokazati ne samo zato, ker je dokaz zapleten, ampak tudi zato, ker ni bilo dobre definicije dimenzije prostora. Kaj sploh je dimenzija prostora? Velikokrat na dimenzijo gledamo kot na najmanjše število parametrov, ki so potrebni za opis nekega prostora. Ta definicija je mnogim matematikom dolgo časa zadoščala, obstajali pa so tudi tisti, ki so vanjo dvomili. Eden prvih, ki je izrazil svoje dvome, je bil nemški matematik Georg Cantor v pismu, ki ga je 5. 1. 1874 poslal Richardu Dedekindu, prav tako nemškemu matematiku [3, str. 201]. Čeprav so mnogi matematiki mislili, da je noro poskusiti vsako točko v ravnini izraziti zgolj z enim parametrom s premice, je Cantor to poskušal doseči in leta 1877 je dokazal, da obstaja bijektivna preslikava $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ [3, str. 203]. To pomeni, da za opis tudi večdimenzionalnih prostorov potrebujemo zgolj en parameter. Kljub presenetljivemu rezultatu pa obstoj take preslikave ni tako zelo ogrožal intuicije, saj je bila preslikava c močno nezvezna. Vedno bolj je postajalo očitno, da je potrebno poiskati dokaz, kar je neuspešno poskusilo kar nekaj matematikov. Potreba po dokazu se je še bolj pokazala, ko je leta 1890 italijanski matematik Giuseppe Peano predstavil krivulje, ki napolnijo cel prostor [9]. To pomeni, da lahko vsako točko v prostoru \mathbb{R}^n zvezno opišemo samo z enim parametrom $t \in \mathbb{R}$. Problem take preslikave je, da ni injektivna, tako da še vedno obstaja upanje, da je intuicija dobra. Potrebno jo je samo posodobiti do trditve, da je dimenzija najmanjše število parametrov, ki jih potrebujemo, da z zvezno injektivno preslikavo opišemo prostor. Ekvivalentno lahko trdimo, da v primeru dveh prostorov X in Y , ki sta različnih dimenzij, ne obstaja zvezna bijektivna preslikava $f : X \rightarrow Y$. To je prvi dokazal J. L. Brouwer leta 1910 [3, str. 208]. Za dokaz je uporabil nekatere topološke rezultate, npr. homotopijo, ki jih mnogi ljubiteljski matematiki in tudi študenti dodiplomskega študija matematike ne poznajo.

V tem delu bomo predstavili elementaren dokaz tega izreka, ki se izogne abstraktnjšim topološkim trditvam. V poglavju 2 bomo razvili potrebno besedišče in spoznali nekaj matematičnih objektov ter njihovih lastnosti, ki so ključni pri dokazih v naslednjih poglavjih. V razdelkih 3 in 4 uporabimo rezultate iz poglavja 2 in dokažemo dva ključna gradnika dokaza Brouwerjevega izreka. V poglavju 5 lahko

najdemo dokaz izreka o invarianci odprtih množic in njegove posledice, izreka o invarianci dimenzije. Vrstni red razdelkov je izbran tako, da ohrani nekaj matematične skrivnosti, na koncu pa se vse skupaj sestavi v celoto. Neučakan bralec lahko prebere najprej tudi poglavje 5 in se kasneje polno motiviran, z vedenjem zakaj in kako je snov uporabna, vrne na začetek ter naknadno zapolni vse vrzeli v dokazu.

2. SIMPLEKSI

V tem razdelku bomo spoznali simplekse in z njimi povezano Spernerjevo lemo. Na koncu bomo nekatere lastnosti simpleksov posplošili tudi na kocke. Poimenovanje za simpleks izvira iz latinske besede „simplex”, ki pomeni preprost oziroma enostaven, saj označuje eno najenostavnejših podmnožic prostora \mathbb{R}^n . Simpleks si lahko predstavljamo kot posplošitev pojma trikotnik, ki je dvodimenzionalen objekt, na ostale dimenzije. Tako v 0-dimenzionalnem prostoru simpleks označuje točko, enodimenzionalen simpleks predstavlja daljico, v dveh dimenzijah dobimo že znani trikotnik, v treh dimenzijah pa simpleks imenujemo tudi tetraeder. Na sliki 1 so nakazani simpleksi dimenzij 0, 1, 2 in 3 [10]. Preden podamo natančno definicijo simpleksa,



SLIKA 1. Nakazani so simpleksi v dimenzijah 0, 1, 2 in 3.

moramo spoznati afino neodvisne množice. Pri tem se bomo držali pravila, da bomo vektor od koordinatnega izhodišča do neke točke $x \in \mathbb{R}^n$ označili z enako oznako kot točko samo, le da bomo nad oznako narisali puščico. Takemu vektorju bomo rekli krajevni vektor točke x . Torej, krajevni vektor točke $x \in \mathbb{R}^n$ bomo označili z \vec{x} .

Definicija 2.1 ([10]). Množica točk $x_0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^n$ je *afino neodvisna*, če je množica vektorjev $\vec{x}_1 - \vec{x}_0, \vec{x}_2 - \vec{x}_0, \dots, \vec{x}_n - \vec{x}_0$ linearno neodvisna. V nasprotnem primeru je množica točk *afino odvisna*.

Opazimo lahko, da ima v tej definiciji prva točka, tj. x_0 , posebno vlogo. Ker ne govorimo o urejenih množicah in vrstni red elementov ni pomemben, se moramo prepričati, da definicija res karakterizira afino neodvisne množice in ni odvisna od izbire prve točke. Denimo, da je množica vektorjev $\vec{x}_1 - \vec{x}_0, \vec{x}_2 - \vec{x}_0, \dots, \vec{x}_n - \vec{x}_0$ linearno neodvisna. Potem je enakost $\sum_{i=1}^n \alpha_i (\vec{x}_i - \vec{x}_0) = 0$ izpolnjena natanko tedaj, ko so vsi koeficienti enaki 0, torej velja $\alpha_i = 0$ za vsak $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Recimo, da smo za prvi element izbrali neko drugo točko, na primer x_k . Radi bi videli, da je potem tudi enakost $\sum_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \beta_i (\vec{x}_i - \vec{x}_k) = 0$ izpolnjena samo v primeru, ko so vsi koeficienti v vsoti enaki 0. V to se prepričamo tako, da uporabimo znan matematični trik ter odštejemo in prištejemo isto vrednost. V tem primeru odštejemo in prištejemo \vec{x}_0 .

Računamo:

$$\begin{aligned}
\sum_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \beta_i (\vec{x}_i - \vec{x}_k) &= \sum_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \beta_i (\vec{x}_i - \vec{x}_0 + \vec{x}_0 - \vec{x}_k) \\
&= \sum_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \beta_i (\vec{x}_i - \vec{x}_0) + \sum_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \beta_i (\vec{x}_0 - \vec{x}_k) \\
&= \sum_{i=1}^n \gamma_i (\vec{x}_i - \vec{x}_0),
\end{aligned}$$


kjer koeficiente γ_i določimo na naslednji način:

$$\gamma_i = \begin{cases} -\sum_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \beta_i & , i = k, \\ \beta_i & , i \neq k. \end{cases}$$


Ker je množica vektorjev $\vec{x}_1 - \vec{x}_0, \vec{x}_2 - \vec{x}_0, \dots, \vec{x}_n - \vec{x}_0$ linearno neodvisna, morajo biti koeficienti $\gamma_i = 0$ za vsak $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Torej so tudi koeficienti $\beta_i = 0$ za vsak $i \in \{0, 1, \dots, k-1, k+1, \dots, n\}$. Pokazali smo linearno neodvisnost množice vektorjev $\vec{x}_0 - \vec{x}_k, \vec{x}_1 - \vec{x}_k, \dots, \vec{x}_{k-1} - \vec{x}_k, \vec{x}_{k+1} - \vec{x}_k, \dots, \vec{x}_n - \vec{x}_k$, zato je zgornja definicija dobra.

S pomočjo točk v prostoru lahko definiramo različne množice. Želeli si bomo take množice, ki imajo naslednjo lastnost.

Definicija 2.2. Množica $K \in \mathbb{R}^n$ je *konveksna*, če je za vsaki dve točki $x, y \in K$ tudi daljica določena z x in y : $\{\lambda \vec{x} + (1 - \lambda) \vec{y}; \lambda \in [0, 1]\}$ vsa vsebovana v K . Primer in protiprimer konveksne množice si lahko pogledamo na sliki 2.



(A) Množica A je konveksna, saj je vsaka daljica, ki povezuje poljubni točki iz A , cela vsebovana v A .




(B) Množica B ni konveksna, saj del daljice določene s točkama x in y , ki je pobarvan rdeče, ni vsebovan v B .

SLIKA 2. Slika prikazuje primer konveksne množice (levo) in množice, ki ni konveksna (desno).

Definicija 2.3. Presek vseh konveksnih množic, ki vsebujejo množico A , imenujemo *konveksna ogrinjača* množice A . Konveksno ogrinjačo množice A označimo s $\text{conv}(A)$.

Konveksno ogrinjačo točk x_0, x_1, \dots, x_n v prostoru \mathbb{R}^2 si lahko predstavljamo kot množico, ki jo omeji elastika, ko jo napnemo čez vse točke in nato spustimo. Prikaz konveksne ogrinjače si lahko pogledamo na sliki 3.

Trditev 2.4 ([8]). *Konveksna ogrinjača množice A je najmanjša konveksna množica, ki vsebuje množico A .*



SLIKA 3. Slika prikazuje, kako dobimo konveksno ogrinjačo točk s pomočjo elastike. Na levi strani napnemo elastiko, tako da zaobjame vse točke. Na desni strani pa je prikazano, kako izgleda elastika po tem, ko jo izpustimo in omeji konveksno ogrinjačo (sivo pobarvana množica) prikazanih točk [8].

Dokaz. Jasno je, da je množica A vsebovana v konveksni ogrinjači množice A . Prepičati se moramo, da je konveksna ogrinjača konveksna množica. Izberimo poljubni točki, ki pripadata konveksni ogrinjači. Potem ti dve točki pripadata vsaki konveksni množici, ki vsebuje množico A . Torej tudi daljica, ki povezuje ti dve točki, leži v vsaki konveksni množici, ki vsebuje množico A . Iz tega lahko sklepamo, da daljica, ki povezuje dve poljubni točki, cela leži v konveksni ogrinjači. To pomeni, da je konveksna ogrinjača konveksna množica. Ker je konveksna ogrinjača presek vseh konveksnih množic, ki vsebujejo A , je vsebovana v vsaki konveksni množici, ki vsebuje A . Zato je najmanjša konveksna množica, ki vsebuje množico A . \square

Iskanje konveksne množice kot preseka vseh konveksnih množic je zamudno. Prav tako je težko preveriti, ali je neka točka vsebovana v konveksni ogrinjači množice A . Spodnja trditev nam eksplicitno pove, katere točke so vsebovane v konveksni ogrinjači množice točk $A = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$.

Trditev 2.5 ([8]). *Za točke x_0, x_1, \dots, x_n v prostoru \mathbb{R}^n je konveksna ogrinjača $\text{conv}(\{x_0, x_1, \dots, x_n\})$ enaka množici:*

$$C = \left\{ \sum_{i=0}^n \lambda_i x_i; \text{ kjer so } \lambda_i \geq 0 \text{ za vsak } i \in \{0, 1, \dots, n\} \text{ in } \sum_{i=0}^n \lambda_i = 1 \right\}.$$

Trditev nam pove, da lahko krajevni vektor točke $x \in A = \text{conv}(\{x_0, \dots, x_n\})$ izrazimo kot vsoto $\vec{x} = \sum_{i=0}^n \lambda_i \vec{x}_i$, ki zadošča pogoju $\sum_{i=0}^n \lambda_i = 1$, kjer so vsi koeficienti λ_i nenegativna realna števila. Vsoto, ki zadošča zahtevanim pogojem, imenujemo *konveksna kombinacija* točk x_0, x_1, \dots, x_n .

Dokaz. Najprej se bomo prepričali, da vsaka konveksna množica, ki vsebuje množico A , vsebuje vsako konveksno kombinacijo točk iz množice A . To bomo dokazali s pomočjo popolne indukcije na število točk, ki nastopajo v konveksni kombinaciji. Če v konveksni kombinaciji nastopata zgolj dve točki, lastnost sledi iz definicije konveksne množice. Denimo, da vsaka konveksna množica, ki vsebuje množico A

vsebuje konveksno kombinacijo m -tih točk iz množice A . Zapišimo poljubno konveksno kombinacijo $m + 1$ točk iz A in se prepričajmo, da je vsebovana v vsaki konveksni množici, ki vsebuje A . Zapišimo:

$$\sum_{i=0}^{m+1} \lambda_i x_i = (\lambda_0 + \dots + \lambda_m) \sum_{i=0}^m \frac{\lambda_i}{\lambda_0 + \dots + \lambda_m} x_i + \lambda_{m+1} x_{m+1}.$$

Po indukcijski predpostavki točka $\sum_{i=0}^m \frac{\lambda_i}{\lambda_0 + \dots + \lambda_m} x_i$ pripada vsaki konveksni množici, ki vsebuje A . Zato je po definiciji konveksne množice tudi konveksna kombinacija točk x_0, x_1, \dots, x_{m+1} vsebovana v vsaki konveksni množici, ki vsebuje A . Sedaj lahko sklepamo, da je množica C vsebovana v preseku vseh konveksnih množic, ki vsebujejo množico A . Ker pa je množica C konveksna, vsebuje presek vseh konveksnih množic, ki vsebujejo množico A . Zato je množica C enaka konveksni ogrinjači množice A . \square

Simpleks definiramo kot poseben primer konveksne ogrinjače.

Definicija 2.6 ([8]). Naj bo $V = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}^n$ afino neodvisna množica točk v evklidskem prostoru \mathbb{R}^n . Konveksni ogrinjači S točk x_0, x_1, \dots, x_n iz množice V pravimo *n -dimenzionalni simpleks* ali *n -simpleks*. Točke x_i imenujemo *oglišča* simpleksa S . Ko želimo poudariti, katera oglišča določajo simpleks, lahko zapišemo tudi $S = \langle x_0, \dots, x_n \rangle$. Za vsako neprazno podmnožico $U = \{y_0, y_1, \dots, y_r\} \subset V$ lahko definiramo simpleks $L = \langle y_0, y_1, \dots, y_r \rangle$, ki ga imenujemo *lice simpleksa* S . Če je lice L $(n - 1)$ -simpleks, ga imenujemo *glavno lice* simpleksa S . Unijo vseh glavnih lic simpleksa S imenujemo *rob* simpleksa S . Množico točk simpleksa S , ki ne ležijo na robu simpleksa, imenujemo *notranjost* simpleksa S .

Krajevni vektor vsake točke $x \in S = \langle x_0, \dots, x_n \rangle$ lahko izrazimo s pomočjo oglišč kot vsoto:

$$(1) \quad \vec{x} = \sum_{i=0}^n \lambda_i \vec{x}_i,$$

ki zadošča pogoju $\sum_{i=0}^n \lambda_i = 1$, kjer so koeficienti λ_i nenegativna realna števila. Zakaj smo konveksni ogrinjači dodali pogoj o afini neodvisnosti točk, bomo utemeljili z naslednjim razmislekom. Najprej preoblikujemo izraz (1).

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \sum_{i=0}^n \lambda_i \vec{x}_i \\ &= \sum_{i=0}^n \lambda_i (\vec{x}_i - \vec{x}_0 + \vec{x}_0) \\ &= \sum_{i=0}^n \lambda_i \vec{x}_0 + \sum_{i=1}^n \lambda_i (\vec{x}_i - \vec{x}_0) \\ &= \vec{x}_0 + \sum_{i=1}^n \lambda_i (\vec{x}_i - \vec{x}_0). \end{aligned}$$

Torej lahko simpleks $S = \langle x_0, x_1, \dots, x_n \rangle$ zapišemo tudi v obliki:

$$S = \vec{x}_0 + \underbrace{\left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i (\vec{x}_i - \vec{x}_0); \lambda_i \geq 0 \text{ za vsak } i \in \{1, \dots, n\} \text{ in } \sum_{i=1}^n \lambda_i \leq 1 \right\}}_{\Delta}.$$

Ker so vektorji $\vec{x}_1 - \vec{x}_0, \vec{x}_2 - \vec{x}_0, \dots, \vec{x}_n - \vec{x}_0$ linearno neodvisni, je množica Δ , ki je določena z njimi, n -dimenzionalna podmnožica prostora \mathbb{R}^n . Simpleks S je enak množici Δ , premaknjeni za vektor \vec{x}_0 , zato je tudi simpleks S n -dimenzionalna množica. Če bi bile točke x_0, x_1, \dots, x_n afino odvisne, bi bili vektorji $\vec{x}_1 - \vec{x}_0, \vec{x}_2 - \vec{x}_0, \dots, \vec{x}_n - \vec{x}_0$ linearno odvisni in bi bila množica Δ največ $(n-1)$ -dimenzionalna. Tako z vsakim dodatnim ogliščem povečamo dimenzijo simpleksa. Števila λ_i v enačbi (1) so *baricentrične koordinate* točke x , kar zapišemo kot $x = (\lambda_0, \dots, \lambda_n)_b$. Koordinate vektorja \vec{x} so zvezne funkcije točke x , zato so tudi baricentrične koordinate točke x zvezno odvisne od položaja točke x . Preden nadaljujemo, se moramo prepričati, da so baricentrične koordinate dobro definirane.

Trditev 2.7. *Baricentrične koordinate točke $x \in \langle x_0, \dots, x_n \rangle$ so enolično določene.*

Dokaz. Recimo, da x izrazimo na dva načina kot $x = (\alpha_0, \dots, \alpha_n)_b = (\beta_0, \dots, \beta_n)_b$. Potem lahko zapišemo

$$\sum_{i=0}^n \alpha_i \vec{x}_i = \sum_{i=0}^n \beta_i \vec{x}_i.$$

Če enačbi odštejemo desno stran, dobimo

$$\sum_{i=0}^n \alpha_i \vec{x}_i - \sum_{i=0}^n \beta_i \vec{x}_i = 0,$$

kar preoblikujemo v enačbo

$$\sum_{i=0}^n (\alpha_i - \beta_i) \vec{x}_i = 0.$$

Uporabimo že znan trik ter odštejemo in prištejemo isto vrednost,

$$\sum_{i=0}^n (\alpha_i - \beta_i) \cdot (\vec{x}_i - \vec{x}_0 + \vec{x}_0) = 0.$$

Enačbo lahko zapišemo z dvema vsotama

$$\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) \cdot (\vec{x}_i - \vec{x}_0) + \sum_{i=0}^n (\alpha_i - \beta_i) \cdot \vec{x}_0 = 0,$$

kjer pri prvi vsoti parameter i začne teči pri 1, saj je pri vrednosti 0 tudi vrednost sumanda $(\alpha_0 - \beta_0) \cdot (\vec{x}_0 - \vec{x}_0)$ enaka 0. Druga vsota je enaka 0, saj velja:

$$\sum_{i=0}^n (\alpha_i - \beta_i) \cdot \vec{x}_0 = \vec{x}_0 \left(\sum_{i=0}^n \alpha_i - \sum_{i=0}^n \beta_i \right) = \vec{x}_0 (1 - 1) = 0.$$

Tako pridemo do enačbe

$$\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) \cdot (\vec{x}_i - \vec{x}_0) = 0.$$

Ker je množica vektorjev $\{\vec{x}_i - \vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n; i = 1, 2, \dots, n\}$ linearno neodvisna, morajo biti koeficienti $\alpha_i - \beta_i$ enaki 0 za vsak $i = 1, 2, \dots, n$. Zato velja $\alpha_i = \beta_i$ za vsak $i \in \{1, \dots, n\}$. Sedaj lahko iz enakosti

$$\sum_{i=0}^n \alpha_i = \sum_{i=0}^n \beta_i$$

in iz dejstva, da je koeficient α_i enak koeficientu β_i za vsak $i = 1, \dots, n$, sklepamo, da sta enaka tudi koeficienta α_0 in β_0 . \square

Pri dokazovanju različnih rezultatov s pomočjo simpleksov si večkrat pomagamo z delitvijo simpleksa na manjše simplekse. Da imamo čim več nadzora pri dokazovanju, si pomagamo s pojmom simplicialnega kompleksa.


Definicija 2.8. Množica simpleksov \mathcal{K} v evklidskem prostoru \mathbb{R}^n je *simplicialni kompleks*, če zadošča naslednjima pogojema:

- (1) Vsako lice L vsakega simpleksa $S \in \mathcal{K}$ je tudi vsebovano v \mathcal{K} .
- (2) Neprazen presek dveh simpleksov iz \mathcal{K} je lice obeh simpleksov.

Unijo vseh simpleksov iz simplicialnega kompleksa \mathcal{K} bomo označili s $|\mathcal{K}|$.

Iz simpleksa lahko konstruiramo simplicialni kompleks in na ta način dobimo posebno delitev simpleksa.

Definicija 2.9. Simplicialni kompleks \mathcal{T} je *triangulacija* simpleksa S , če je $|\mathcal{T}| = S$.



SLIKA 4. Slika prikazuje primer triangulacije (levo) in primer delitve, ki ni triangulacija (desno), saj presek osenčenih simpleksov ni lice obeh simpleksov.

Pri poljubnih delitvah simpleksa S nimamo nadzora nad tem, kako veliki simpleksi nastopajo v delitvi. Želeli bi si poiskati take delitve, ki vsebujejo zgolj simplekse, ki so manjši od vnaprej predpisane vrednosti $\varepsilon > 0$. Za mero, kako velik je simpleks, imamo več možnosti. Izbrali bomo diameter, ki ga definiramo na naslednji način.

Definicija 2.10. Največjo razdaljo med dvema točkama simpleksa S imenujemo *diameter* simpleksa S . Torej,

$$\text{diam}(S) = \max\{d(x, y); x, y \in S\}.$$

Simpleks S je kompaktna množica. Zvezna funkcija definirana na kompaktni množici zavzame maksimum, zato je diameter simpleksa S dobro definiran. Sedaj, ko imamo mero za velikost simpleksa, si pogledimo, kako lahko celoten prostor \mathbb{R}^n razdelimo na enako velikime simplekse. Izberimo naravno število k in pozitivno realno število a . Definiramo bazo \mathcal{B} prostora \mathbb{R}^n z baznimi vektorji $\vec{e}_i := (0, \dots, 0, \frac{a}{k}, 0, \dots, 0)$, pri katerih je edina neničelna koordinata na i -tem mestu enaka $\frac{a}{k}$. Definiramo množico $Z_k := \{j \cdot \frac{a}{k}; j \in \mathbb{Z}\}$ in označimo z Z_k^n kartezični produkt n kopij množice Z_k . Naj bo $P(n)$ množica permutaciji množice $\{1, \dots, n\}$. Množica, ki vsebuje vse simplekse $S = \langle z_0, z_1, \dots, z_n \rangle$, ki zadoščajo pogojem:

- Množica točk $\{z_0, z_1, \dots, z_n\}$ je podmnožica množice Z_k^n in
- obstaja taka permutacija $\pi \in P(n)$, da je

$$z_1 = z_0 + \vec{e}_{\pi(1)}, z_2 = z_1 + \vec{e}_{\pi(2)}, \dots, z_n = z_{n-1} + \vec{e}_{\pi(n)},$$

razdeli prostor \mathbb{R}^n na n -dimenzionalne simplekse. Če množici dodamo še vsa lica simpleksov iz te množice, dobimo k -to mrežno delitev prostora \mathbb{R}^n , ki jo označimo z $M_{\frac{a}{k}}^n$. Prepričajmo se, da množica $M_{\frac{a}{k}}^n$ zadošča pogoju definicije 2.8. Hitro vidimo, da izpolnjuje pogoj (1). Preveriti moramo še, da je neprazen presek dveh simpleksov iz $M_{\frac{a}{k}}^n$ lice obeh simpleksov. Ker je vsak simpleks iz $M_{\frac{a}{k}}^n$ lice nekega n -simpleksa iz $M_{\frac{a}{k}}^n$, je dovolj, če pokažemo, da je neprazen presek dveh n -simpleksov iz množice $M_{\frac{a}{k}}^n$ lice obeh simpleksov. Vsak n -simpleks $S = \langle z_0, \dots, z_n \rangle \in M_{\frac{a}{k}}^n$ je natančno določen s točko $z_0 = (z_{0,1}, z_{0,2}, \dots, z_{0,n})$ in permutacijo $\pi \in P(n)$. Če poznamo ta dva podatka, lahko n -simpleks S zapišemo tudi kot množico vseh točk $t = (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n$, ki zadoščajo pogoju:

$$\frac{a}{k} \geq t_{\pi(1)} - z_{0,\pi(1)} \geq t_{\pi(2)} - z_{0,\pi(2)} \geq \dots \geq t_{\pi(n)} - z_{0,\pi(n)} \geq 0.$$

Izberimo poljubni naravni števili $i, j < 0$. Brez izgube splošnosti lahko predpostavimo, da je $\pi(i) < \pi(j)$. Oglišča simpleksa so dobljena tako, da vedno povečamo eno koordinato, zato imajo $\pi(i)$ -to koordinato večjo ali enako od $\pi(j)$ -te koordinate. Ker simpleks dobimo kot afino kombinacijo oglišč, imajo tudi vse točke simpleksa $\pi(i)$ -to koordinato večjo ali enako od $\pi(j)$ -te koordinate. Za vsak par naravnih števil $1 \leq i, j \leq n$ lahko iz zgornjih pogojev razberemo neenakost $t_i - z_{0,i} \geq t_j - z_{0,j}$ ali $t_i - z_{0,i} \leq t_j - z_{0,j}$, ki nam pove, v katerem polprostoru, omejenem s hiperravnino $t_i - z_{0,i} = t_j - z_{0,j}$, leži n -simpleks S . Lica n -simpleksa S dobimo tako, da nekaj neenačbe spremenimo v enačbo. Naj bo $S \in M_{\frac{a}{k}}^n$ n -simpleks, ki zadošča pogoju

$$(2) \quad \frac{a}{k} \geq t_{\pi(1)} - z_{0,\pi(1)} \geq t_{\pi(2)} - z_{0,\pi(2)} \geq \dots \geq t_{\pi(n)} - z_{0,\pi(n)} \geq 0$$

in naj bo $R \in M_{\frac{a}{k}}^n$ n -simpleks, ki zadošča pogoju

$$(3) \quad \frac{a}{k} \geq t_{\rho(1)} - w_{0,\rho(1)} \geq t_{\rho(2)} - w_{0,\rho(2)} \geq \dots \geq t_{\rho(n)} - w_{0,\rho(n)} \geq 0.$$

Če točki z_0 in w_0 ležita na istem simpleksu in $M_{\frac{a}{k}}^n$, za vsako naravno število $l \leq n$ velja neenakost $|z_{0,\pi(l)} - w_{0,\rho(l)}| \leq \frac{a}{k}$. Tedaj lahko pogoje, katerim zadoščajo točke preseka $S \cap R = L$, zapišemo na naslednji način. Naj bo $E \subset \{1, 2, \dots, n\}$ množica tistih naravnih števil e , za katera je $z_{0,e} = w_{0,e}$. Za vsako naravno število $l \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus E$ pri pogojih (2) in (3) spremenimo neenačbo $1 \geq t_l - \min(z_{0,l}, w_{0,l})$ v enačbo $1 = t_l - \min(z_l, w_l)$ in neenačbo $t_l - \max\{z_l, w_l\} \geq 0$ v enačbo $t_l - \max\{z_l, w_l\} = 0$. Iz pogojev (2) in (3) lahko za vsak par naravnih števil $i, j \in E$

ugotovimo, v katerem polprostoru, omejenem s hiperravnino $t_i - z_{0,i} = t_j - z_{0,j}$ ležita n -simpleksa S in R . Kadar ležita v istem polprostoru, tudi presek L leži v tem podprostoru, zato presek L zadošča isti neenakosti. Če pa n -simpleksa S in R ležita v različnih polprostorih, leži presek L na hiperravnini $t_i - z_{0,i} = t_j - z_{0,j}$, zato moramo pri pogojih (2) in (3) ustrezno neenakost spremeniti v enakost. Ugotovimo, da presek L ustreza enakim pogojem kot simpleksa S in R , le da smo nekaj neenačaje spremenili v enačaje, zato je presek L lice simpleksov S in R . Če obstaja tako naravno število $l \leq n$, da je $|z_{0,l} - w_{0,l}| \geq \frac{2a}{k}$, je presek simpleksov S in R prazen.

Pokazali smo, da sta poljubna simpleksa ali disjunktna ali pa si delita lice. V naslednji trditvi bomo pokazali, da sta simpleksa S in R edina n -simpleksa, ki vsebujeta $(n-1)$ -simpleks L , če je presek L n -simpleksov S in R glavno lice obeh simpleksov.

Trditev 2.11. Če je $S = \langle z_0, z_1, \dots, z_n \rangle$ simpleks iz k -te mrežne delitve prostora \mathbb{R}^n , potem za vsako oglišče z_i simpleksa S obstaja natanko en tak simpleks $T = S[i]$ iz k -te mrežne delitve, da je


$$S \cap T = \langle z_0, \dots, z_{i-1}, z_{i+1}, \dots, z_n \rangle.$$

Dokaz. Vemo, da obstaja taka permutacija $\pi \in P(n)$, da za oglišča simpleksa $S = \langle z_0, z_1, \dots, z_n \rangle$ veljajo naslednje enakosti:

$$(4) \quad z_1 = z_0 + \vec{e}_{\pi(1)}, z_2 = z_1 + \vec{e}_{\pi(2)}, \dots, z_n = z_{n-1} + \vec{e}_{\pi(n)}.$$

Naj bo i -ti sosed $S[i]$ simpleksa S definiran na naslednji način:

- (1) Če je $0 < i < n$, je $S[i] = \langle z_0, \dots, z_{i-1}, w_i, z_{i+1}, \dots, z_n \rangle$, kjer je $w_i = z_{i-1} + (z_{i+1} - z_i) = z_{i-1} + \vec{e}_{\pi(i+1)}$.
- (2) Če je $i = 0$, je $S[i] = \langle z_1, \dots, z_n, w_0 \rangle$, kjer je $w_0 = z_n + (z_1 - z_0) = z_n + \vec{e}_{\pi(1)}$.
- (3) Če je $i = n$, je $S[i] = \langle w_n, z_0, \dots, z_{n-1} \rangle$, kjer je $w_n = z_0 + (z_{n-1} - z_n) = z_0 - \vec{e}_{\pi(n)}$.



SLIKA 5. Na sliki vidimo del mrežne delitve prostora \mathbb{R}^2 in prikaz sosedov simpleksa S .

Prepričajmo se, da je definicija i -tega sosedu dobra.

Pokazati moramo, da je simpleks $S[i]$ vsebovan v k -ti mrežni delitvi prostora \mathbb{R}^n za vsak $i = 0, \dots, n$. Hitro lahko vidimo, da so za vsako število $i = 0, \dots, n$ oglišča simpleksa $S[i]$ vsebovana v množici Z_k^n . Poiščimo permutacijo, s pomočjo katere lahko oglišča simpleksa $S[i]$ zapišemo kot v enačbi (4). Definirajmo permutacijo $\tau(i) \in P(n)$:

- (1) Če je $0 < i < n$, je permutacija τ transpozicija, ki med seboj zamenja i -ti in $(i + 1)$ -i element, ostale pa pusti pri miru.
- (2) Če je $i = 0$, je permutacija τ cikel, ki vse elemente premakne za eno mesto nazaj, prvi element pa postavi na konec.
- (3) Če je $i = n$, je permutacija τ cikel, ki vse elemente premakne za eno mesto naprej, zadnji element pa postavi na začetek.

Iskana permutacija je potem $\rho = \pi \circ \tau$. Prepričajmo se, da je $S[i]$ edina izbira za ustreznega sosedu. Brez izgube splošnosti lahko predpostavimo, da je $z_0 = 0$. Opazimo, da enačba (4) za simpleks $S \in M_{\frac{a}{k}}^n$ podaja končno zaporedje točk z začetnim členom $(0, \dots, 0)$ in končnim členom $(\frac{a}{k}, \dots, \frac{a}{k})$. Vsak naslednji člen dobimo iz predhodnega tako, da eno koordinato povečamo za 1. V našem primeru to pomeni, da eno koordinato spremenimo iz 0 v $\frac{a}{k}$. Katero koordinato spremenimo, določa predpis (4). To zaporedje je urejeno, saj se koordinate povečujejo, člena pa sta lahko sosednja, kadar se razlikujeta v eni sami koordinati. Če odstranimo začetno točko tega zaporedja, dobimo zaporedje z $n - 1$ členi. Dopolnimo ga lahko samo na dva načina. Člen, ki smo ga odvzeli, lahko dodamo na začetek ali pa dodamo člen na konec zaporedja tako, da zadnjemu členu povečamo koordinato, ki se v krajšem zaporedju nikoli ne spremeni. V prvem primeru zaporedje ustreza simpleksu S , v drugem pa simpleksu $S[0]$. Člena ne moremo vriniti v sredino krajšega zaporedja, saj se potem sosednji členi ne bi razlikovali v natanko eni koordinati. Podobno lahko postopamo v primeru, ko odvezemo zadnji element zaporedja. Recimo, da smo odvzeli i -ti člen zaporedja. Potem se $(i - 1)$ -i člen in $(i + 1)$ -i člen razlikujeta v dveh koordinatah. Označimo ti dve koordinati s p in r . Da dopolnimo zaporedje, moramo dodati en člen na i -to mesto. To lahko storimo tako, da dodamo člen, ki se v vseh koordinatah ujema z $(i + 1)$ -im členom, le na p -ti ali na r -ti koordinati se ujema z $(i - 1)$ -im členom. V enem primeru dobimo zaporedje, s katerim smo začeli, v drugem pa zaporedje, ki ustreza simpleksu $S[i]$. Torej je $S[i]$ res edini sosed simpleksa S , ki ustreza lastnosti:

$$S \cap S[i] = \langle z_0, \dots, z_{i-1}, z_{i+1}, \dots, z_n \rangle.$$

□

S pomočjo delitve prostora \mathbb{R}^n lahko definiramo triangulacijo simpleksov. Definiramo k -to mrežno triangulacijo simpleksa $S = \langle x_0, x_1, \dots, x_n \rangle \in M_{\frac{a}{k}}^n$ kot simplicialni kompleks, ki vsebuje vse simplekse iz mrežne delitve $M_{\frac{a}{k}}^n$ prostora \mathbb{R}^n , ki so vsebovani v simpleksu S . Naj bo $R = \langle y_0, y_1, \dots, y_n \rangle$ poljuben n -simpleks v prostoru \mathbb{R}^n . Definirajmo homeomorfizem $h : S \rightarrow R$ s predpisom

$$h \left(\sum_{i=0}^n t_i x_i \right) = \sum_{i=0}^n t_i y_i,$$

kjer za vsak $i = 0, 1, \dots, n$ realna števila t_i zadoščajo pogojem $t_i \geq 0$ in $\sum_{i=0}^n t_i = 1$. S preslikavo h prenesemo triangulacijo simpleksa S na simpleks R . Taki triangulaciji

rečemo k -ta mrežna delitev simpleksa R . Za oznako k -te mrežne delitve n -simpleksa bomo uporabljali kar M_k^n , saj število a na to delitev nima vpliva.

Radi bi videli, da se s povečevanjem števila k simpleksi v k -ti mrežni zmanjšujejo. Pokažimo, da je diameter simpleksa $S = \langle v_0, v_1, \dots, v_n \rangle$ enak dolžini najdaljše stranice. Izračunao dolžino med točkama $x, y \in S$:

$$d(x, y) = \|\vec{x} - \vec{y}\|.$$

Krajevni vektor točke y lahko zapišemo s pomočjo oglišč simpleksa:

$$\|\vec{x} - \sum_{i=0}^n t_i \vec{v}_i\|,$$

kar lahko preoblikujemo in ocenimo:

$$\left\| \sum_{i=0}^n t_i (\vec{x} - \vec{v}_i) \right\| \leq \sum_{i=0}^n t_i \|\vec{x} - \vec{v}_i\| \leq \sum_{i=0}^n t_i \max_{j=0, \dots, n} (\|\vec{x} - \vec{v}_j\|) = \max_{j=0, \dots, n} (\|\vec{x} - \vec{v}_j\|).$$

Ugotovili smo, da je razdalja največja, ko je y oglišče simpleksa S . Zaradi simetričnosti razdalje mora biti za maksimizacijo razdalje tudi x oglišče simpleksa. Ker so dolžine stranic simpleksa R iz k -te mrežne delitve simpleksa S za faktor k manjše od stranic simpleksa S , velja $\text{diam}(R) = \frac{1}{k} \cdot \text{diam}(S)$.

Pri obravnavi triangulacij simpleksov lahko počnemo veliko stvari. Ena taka, ki bi se jo lahko spomnil celo otrok v vrtcu, je, da bi simplekse iz triangulacije pobarvali. Tako lahko dobimo zanimive slike. Mi bomo obravnavali lastnosti, ki jih opazimo pri barvanju oglišč določene triangulacije.

Definicija 2.12 ([1, str. 9, definicija 1]). Naj bo podan n -simpleks $S \in \mathbb{R}^n$ s triangulacijo \mathcal{T} . Označimo množico oglišč triangulacije \mathcal{T} z V . Preslikavo $b : V \rightarrow \{0, 1, \dots, n\}$ imenujemo *barvanje triangulacije* \mathcal{T} . Za oglišče $v \in V$ pravimo številu $b(v)$ *barva* ali *oznaka* oglišča v .


Barve navadno označujemo s številkami, saj bi pri velikem številu različnih barv nastala zmeda in bi se nekatere barve težko ločilo med seboj. Kadar v triangulaciji nastopa majhno število barv, so slike lepše, če jih ponazorimo s praviimi barvami. Če določimo pravila, s katerimi barvami lahko pobarvamo določena oglišča, lahko dobimo zanimive lastnosti. Primer takega pravila in njegove lastnosti je opazoval in opisal Emanuel Sperner, po katerem se imenuje eno od pravil za barvanje triangulacije simpleksa.

Definicija 2.13 ([1, str. 9, definicija 2]). Pravimo, da je barvanje triangulacije \mathcal{T} n -simpleksa S *Spernerjevo*, če so na ogliščih n -simpleksa S zastopane vse barve iz množice $\{0, 1, \dots, n\}$ in je vsako oglišče triangulacije \mathcal{T} , ki pripada licu L n -simpleksa S , pobarvano enako kot eno od oglišč lica L .

Za n -simpleks, ki ima oglišča pobarvana z vsemi barvami iz množice $\{0, 1, \dots, n\}$, pravimo, da je *popolno pobarvan*. Naslednji izrek izpostavi zanimivo lastnost takega barvanja.

Lema 2.14 (Spernerjeva lema [1, str. 10, izrek 4]). Vsaka mrežna delitev n -simpleksa s Spernerjevim barvanjem vsebuje liho število popolno pobarvanih n -simpleksov.

Dokaz. Naj bo S n -simpleks in naj bo M_k^n k -ta mrežna delitev. Lemo bomo dokazovali z indukcijo na dimenzijo n simpleksa S .



SLIKA 6. Vidimo Spernerjevo barvanje šeste mrežne delitve simpleksa S s tremi popolno pobarvanimi trikotniki, ki smo jih zaradi preglednosti osenčili. Zaradi lepše predstave smo barve namesto s številčnimi vrednostmi ponazorili s praviimi barvami [6, str. 4, slika 1.4].

Baza indukcije ($n = 0$): V tem primeru lema očitno drži, saj je 0-simpleks točka. Pri Spernerjevem barvanju točke imamo samo eno možnost in tako dobimo en popolno pobarvan 0-simpleks.

Indukcijska predpostavka ($n - 1$): Predpostavimo, da lema drži v dimenziji ($n - 1$). Torej v vsaki mrežni delitvi ($n - 1$)-simpleksa s Spernerjevim barvanjem najdemo liho število ($n - 1$)-simpleksov, ki so popolno pobarvani.

Indukcijski korak ($(n - 1) \implies n$): Poskusimo dokazati pravilnost izjave tudi v dimenziji n . Izberimo k -to mrežno delitev M_k^n n -simpleksa S . Naj bodo oglišča delitve M_k^n pobarvana s Spernerjevim barvanjem. Po indukcijski predpostavki vemo, da je število r popolno pobarvanih ($n - 1$)-simpleksov na robu simpleksa S liho. Označimo število vseh popolno pobarvanih n -simpleksov iz M_k^n s p . Pokazali bomo, da velja $p \equiv r \pmod{2}$. Definirajmo funkcijo α , ki za vsak n -simpleks pove, koliko popolno pobarvanih ($n - 1$) simpleksov vsebuje. Vsak popolno pobarvan n -simpleks iz triangulacije M_k^n simpleksa S vsebuje natanko en popolno pobarvan ($n - 1$)-simpleks, medtem ko ostali simpleksi lahko vsebujejo dva ali nobenega. Če n -simpleks vsebuje oglišča, pobarvana z vsemi barvami $0, \dots, n - 1$, kjer se ena barva ponovi dvakrat, tak simpleks vsebuje dva popolno pobarvana ($n - 1$)-simpleksa. Ostali n -simpleksi ne vsebujejo nobenega popolno pobarvanega ($n - 1$)-simpleksa. Iz zgornjega lahko

sklepamo, da je

$$p \equiv \sum_{\substack{R \in M_k^n \\ R \text{ je } n\text{-simplex}}} \alpha(R) \pmod{2}.$$

Pri štetju popolno pobarvanih $(n - 1)$ -simpleksov smo vsakega iz notranjosti simpleksa S šteli dvakrat, tiste z roba S pa samo enkrat. Zato velja tudi

$$r \equiv \sum_{\substack{R \in M_k^n \\ R \text{ je } n\text{-simplex}}} \alpha(R) \pmod{2}.$$

Torej velja kongruenca $p \equiv r \pmod{2}$, zato je p liho število. \square

Opomba 2.15. Ko v dokazu govorimo o popolno pobarvanih simpleksih, se nam lahko porodi vprašanje, kako bi pri pravih barvah vedeli, kateri $(n - 1)$ -simpleks je popolno pobarvan. V tem primeru, bi morali iz množice barv z $n + 1$ elementi izbrati množico barv z n elementi. Tedaj je simpleks popolno pobarvan natanko tedaj, ko ima oglišča pobarvana z vsemi barvami iz izbrane množice.

Posledica izreka 2.14 je, da vsaka mrežna delitev simpleksa S s Spernerjevim barvanjem vsebuje vsaj en popolno pobarvan simpleks R . Ker sta simpleksa S in R oba popolno pobarvana, si lahko predstavljamo, da se nekatere lastnosti prenesejo iz S na R . To dejstvo lahko uporabimo pri dokazovanju nekaterih trditev in tudi za nas bo odigralo pomembno vlogo pri dokazu izreka 3.2.

Poleg simpleksov obravnavamo tudi kocke. Z njimi si bomo pomagali pri dokazovanju nekaterih topoloških rezultatov.

Definicija 2.16. Naj bo \mathbb{I} interval v \mathbb{R}^n . Potem je n -dimenzionalna kocka oziroma n -kocka definirana kot množica $C := \mathbb{I}^n$.

Tako kot simpleksi so tudi kocke omejene z lici.

Definicija 2.17. Kocka $C = [-a, a]^n$ je omejena z lici. Za vsako naravno število $i < n$ definiramo nasprotni i -lici kot množici $C_i^- = \{x \in C | x_i = -a\}$ in $C_i^+ = \{x \in C | x_i = a\}$, kjer je x_i i -ta koordinata točke x . Rob kocke je unija vseh lic.

Lastnosti, ki smo jih obravnavali pri simpleksih, bomo posplošili na kocke. Nekatere lastnosti izgledajo skoraj enako za simplekse in za kocke, vendar videli bomo, da moramo biti pri posploševanju previdni, saj lahko pride do sprememb ravno tam, kjer jih ne pričakujemo. Poglejmo si, kako definiramo delitev kocke.

Definicija 2.18. Za poljubno pozitivno realno število a in naravni števili n in k naj bo $M_{\frac{a}{k}}^n$ k -ta mrežna delitev prostora \mathbb{R}^n . Mrežna delitev kocke $C = [-a, a]^n$ je tak simplicialni kompleks, ki vsebuje vse n simplekse, ki so vsebovani v delitvi $M_{\frac{a}{k}}^n$ in v kocki C . Ker iz kocke razberemo, katero število a nastopa v mrežni delitvi, označimo k -to mrežno delitev kocke z oznako M_k^n .

Tako kot pri simpleksih lahko tudi pri kockah barvamo oglišča triangulacije.

Definicija 2.19. Naj bo podana n -kocka $C \in \mathbb{R}^n$ s triangulacijo \mathcal{T} . Označimo množico vseh oglišč triangulacije \mathcal{T} z V . Barvanje triangulacije \mathcal{T} je preslikava $b : V \rightarrow \{0, 1, \dots, n\}$.

V naslednjem poglavju bomo spoznali Poincaré-Mirandov izrek in definirali barvanje kocke, ki nam pomaga pri njegovem dokazu.


3. POINCARÉ-MIRANDOV IZREK

Sedaj se bomo posvetili ničlam preslikav, tj. takim točkam, ki jih neka preslikava $f : \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ slika v nič. Iskali bomo torej odgovor na vprašanje: Kakšni pogoji nam zagotavljajo obstoj take točke c , za katero je $f(c) = (0, 0, \dots, 0)$? Zaradi krajšega zapisa bomo točko $(0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$, ko ne bo dvomov o dimenziji, označevali z oznako 0. V primeru funkcije $f : \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ nam odgovor na vprašanje ponudi Bolzanov izrek o srednji vrednosti.

Izrek 3.1 (Bolzanov izrek o srednji vrednosti). *Izberimo poljubno pozitivno realno število a in definirajmo interval $\mathbb{I} := [-a, a]$. Za zvezno funkcijo $f : \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$, za katero velja $f(-a) \leq 0 \leq f(a)$, obstaja točka $c \in [-a, a]$, da je $f(c) = 0$.*

Intuitivno izrek pove, da ne moremo povezati točke s spodnje polravnine s točko z zgornje polravnine, ne da bi pri tem sekali abscisno os, kar se lepo vidi s slike 7. Izrek nam ne pove, kako lahko iskano točko najdemo, nam pa samo iz vrednosti funkcije na robu pove, kdaj lahko z gotovostjo trdimo, da ima funkcija ničlo. Ključno vlogo pa ima seveda zveznost funkcije.

Dokaz izreka 3.1. Če je $f(-a) = 0$ ali pa je $f(a) = 0$, smo tako točko že našli. V nasprotnem predpostavimo, da ne obstaja tako število $c \in \mathbb{I}$, za katerega je vrednost funkcije $f(c) = 0$. Definiramo množici $A := f^{-1}(-\infty, 0)$ in $B := f^{-1}(0, \infty)$. Množici sta disjunktni, saj sta prasliki disjunktnih množic. Zaradi zveznosti funkcije f sta množici tudi odprti. Ker je $-a \in A$ in $a \in B$, sta množici A in B neprazni. Unija množic A in B je enaka intervalu \mathbb{I} , zato množici A in B razdelita interval \mathbb{I} na dve disjunktni množici, kar pa je protislovje, saj vemo, da je interval povezana množica. Torej je bila naša predpostavka, da ne obstaja tak c , da je $f(c) = 0$, napačna. \square



SLIKA 7. Slika prikazuje dogajanje, ki ga opisuje izrek 3.1

Zgornji rezultat bi si želeli posplošiti na večje dimenzije. Večdimenzionalna posplošitev funkcije je preslikava, intervala pa n -kocka. Ostane le še vprašanje, kako bi posplošili pogoje, da bi imela preslikava podobno lastnost kot zgoraj. Razmislimo, kako bi posplošili izrek na zvezno preslikavo $f : \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Najprej lahko preslikavo zapišemo s pomočjo komponentnih funkcij $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$. Da lažje ugotovimo, kakšne pogoje bi izbrali, najprej obravnavamo preprost primer. Kakšne pogoje bi postavili, če bi bila vsaka komponenta f_i odvisna samo od ene koordinate točke x , npr. x_i ? Potem lahko vsako komponento f_i zapišemo kot $f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = g_i(x_i)$,

kjer so g_i funkcije iz intervala \mathbb{I} v prostor \mathbb{R} . V tem primeru za vsako funkcijo g_i uporabimo enake zahteve kot v izreku 3.1, kar za funkcije f_i porodi naslednji pogoj:

$$(5) \quad f_i(x_1, \dots, x_{i-1}, -a, x_{i+1}, \dots, x_n) \leq 0 \leq f_i(x_1, \dots, x_{i-1}, a, x_{i+1}, \dots, x_n).$$


Izrek 3.1 za vsako funkcijo $g_i : \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ zagotavlja obstoj take točke $c_i \in \mathbb{I}$, da je $g_i(c_i) = 0$. To pomeni, da je

$$f(c_1, \dots, c_n) = (f_1(c_1, \dots, c_n), \dots, f_n(c_1, \dots, c_n)) = (g_1(c_1), \dots, g_n(c_n)) = 0.$$

Izrek 3.2 pokaže, da pogoj (5) zadošča tudi v primeru poljubno zapletene zvezne preslikave $f : \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Preden pa navedemo izrek, zapišimo pogoj (5) na način, ki bolj spodbudi geometrijsko predstavo, saj stvari lažje razumemo in si jih zapomnimo, če si jih znamo čim bolj slikovito predstavljati. Stranske ploskve ali lica kocke \mathbb{I}^n označimo z $\mathbb{I}_i^- = \{x \in \mathbb{I}^n | x_i = -a\}$ in $\mathbb{I}_i^+ = \{x \in \mathbb{I}^n | x_i = a\}$. Za preslikavo $f = (f_1, f_2, \dots, f_n) : \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ lahko pogoj (5) zapišemo na naslednji način:

$$(6) \quad f_i(\mathbb{I}_i^-) \subset (-\infty, 0] \text{ in } f_i(\mathbb{I}_i^+) \subset [0, \infty), \text{ za vsak } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Izrek 3.2 (Poincaré-Mirandov izrek [4]). *Naj bo $f = (f_1, f_2, \dots, f_n) : \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ taka zvezna preslikava iz kocke v evklidski prostor \mathbb{R}^n , ki ustreza pogoju (6). Potem obstaja taka točka $c \in \mathbb{I}^n$, da je vrednost preslikave f v točki c enaka 0.*



SLIKA 8. Na sliki lahko vidimo, kako smo označili posamezno lice kocke. Na levi je kocka \mathbb{I} , na sredini kocka \mathbb{I}^2 , na desni pa je prikazana kocka \mathbb{I}^3 [1, slika 1.2].


Dokaz. Za vsako število $i \in \{1, \dots, n\}$ definiramo množici $H_i^- := f_i^{-1}(-\infty, 0]$ in $H_i^+ := f_i^{-1}[0, \infty)$. Najprej bomo pokazali, da je za dokaz izreka dovolj, če za vsako naravno število $k \in \mathbb{N}$ poiščemo n -simpleks S_k iz k -te mrežne delitve kocke M_k^n z lastnostjo

$$(7) \quad S_k \cap H_i^- \neq \emptyset \neq S_k \cap H_i^+, \text{ za vsak } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Kasneje bomo pokazali, da taki simpleksi res obstajajo.

Pokažimo torej, da obstoj takih simpleksov res zaključí dokaz. Recimo, da ima za vsak $k \in \mathbb{N}$ n -simpleks $S_k \in M_k^n$ lastnost (7). V vsakem simpleksu S_k si lahko izberemo točko x_k in tako dobimo neskončno zaporedje $(x_k)_{k=1}^\infty$. Ker zaporedje leži v kompaktnem prostoru \mathbb{I}^n , obstaja konvergentno podzaporedje $(x_{k_j})_{j=1}^\infty$ z limito $c \in \mathbb{I}^n$. Izberimo si neki $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Zaradi lastnosti (7) lahko za vsak $j \in \mathbb{N}$ poiščemo točki $z_j \in S_{k_j} \cap H_i^-$ in $w_j \in S_{k_j} \cap H_i^+$. Ker velja $\lim_{j \rightarrow \infty} \text{diam}(S_{k_j}) = 0$, je limita $\lim_{j \rightarrow \infty} z_j = \lim_{j \rightarrow \infty} w_j = \lim_{j \rightarrow \infty} x_{k_j} = c$ (slika 9). Funkcija f je zvezna, zato je tudi zaporedje $f_i(z_j)$ konvergentno z limito $f_i(c)$. Členi tega zaporedja so vsi manjši ali enaki nič, saj leži zaporedje v množici H_i^- , zato je tudi $f_i(c) \leq 0$. Podobno lahko

sklepamo, da je zaporedje $f_i(w_j)$ konvergentno z limito $f_i(c)$. Ker so vsi členi $f_i(w_j)$ nenegativni, je tudi limita $f_i(c) \geq 0$. Ugotovili smo, da je $0 \leq f_i(c) \leq 0$, torej je $f_i(c) = 0$. Razmislek velja za vsak $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, zato velja $f(c) = 0$. Dokazati



SLIKA 9. Na sliki modre točke predstavljajo točke iz množice H_i^+ , rdeče pa točke iz množice H_i^- . Ko se simpleksi zmanjšujejo, sta točki vedno bližje, zato imata zaporedji teh točk isto limito.

moramo še, da taki simpleksi S_k res obstajajo. Tudi to bomo dokazovali v dveh delih. Najprej bomo definirali barvanje φ , nato pa bomo v prvem delu pokazali, da imajo popolno pobarvani simpleksi lastnost (7). Kasneje bomo pokazali, da vsaka triangulacija M_k^n , ki ima oglišča pobarvana z barvanjem φ , vsebuje vsaj en popolno pobarvan simpleks S . Omenjeno barvanje φ triangulacije n -kocke \mathbb{I}^n z množico oglišč V definiramo na naslednji način:

$$\varphi : V \rightarrow \{0, 1, \dots, n\},$$

$$\varphi(x) = \max \left\{ j : x \in \bigcap_{i=0}^j F_i^+ \right\}.$$

Tu je $F_0^+ = \mathbb{I}^n$, $F_i^+ = H_i^+ \setminus \mathbb{I}_i^-$.

Trdimo, da ima pri tem barvanju popolno pobarvan simpleks S lastnost (7). Za vsak $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ in za vsaki taki točki x in y iz \mathbb{I}^n , za kateri je $\varphi(x) = i - 1$ in $\varphi(y) = i$, lahko sklepamo, da je $x \in H_i^-$ in $y \in H_i^+$. Res, denimo, da $x \notin H_i^-$. Potem $x \in F_i^+ = H_i^+ \setminus \mathbb{I}_i^-$, kar pa pomeni, da je $\varphi(x) \geq i$. To je protislovje, torej res velja $x \in H_i^-$. Podobno lahko sklepamo, da če $y \notin H_i^+$, potem tudi $y \notin F_i^+$, kar pomeni, da je $\varphi(y) < i$. Spet protislovje s tem, da je $\varphi(y) = i$, torej je tudi $y \in H_i^+$. Ker ima popolno pobarvan simpleks vsako oglišče pobarvano s svojo barvo, so na ogliščih zastopane vse barve iz množice $\{0, 1, \dots, n\}$, zato ima tak simpleks res lastnost (7). Obstoj popolno pobarvanega simpleksa S v triangulaciji bomo dokazali tako, da se bomo prepričali, da je število p popolno pobarvanih simpleksov, vsebovanih v triangulaciji n -kocke \mathbb{I}^n , liho. Dokazovali bomo z indukcijo na dimenzijo kocke \mathbb{I}^n .

Baza indukcije ($n = 0$): Triangulacija 0-kocke \mathbb{I}^n vsebuje zgolj točko 0, ki je z barvanjem φ pobarvana z barvo 0 in tako predstavlja popolno pobarvan simpleks.

Indukcijska predpostavka ($n - 1$): Barvanje φ pobarva poljubne triangulacije n -dimenzionalne kocke. V primeru $(n - 1)$ -dimenzionalne kocke lahko barvanje φ razumemo tako, da poljubno triangulacijo \mathcal{T}_k kocke \mathbb{I}^{n-1} pobarvamo z barvanjem

φ tako, da je vsako oglišče $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{I}^{n-1}$ enako pobarvano kot oglišče $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, -a) \in \mathbb{I}^n$. Predpostavimo, da vsaka triangulacija \mathcal{T}_k kocke \mathbb{I}^{n-1} , kjer oglišča pobarvamo s preslikavo φ , vsebuje liho število $(n-1)$ -simpleksov, ki so popolno pobarvani.

Indukcijski korak $((n-1) \implies n)$: Prepričajmo se, da poljubna triangulacija \mathcal{T}_k n -kocke \mathbb{I}^n vsebuje liho mnogo popolno pobarvanih n -simpleksov. Iz definicije barvanja φ lahko ugotovimo dve lastnosti. Če oglišče x leži na licu \mathbb{I}_i^- , potem je $\varphi(x) < i$, če pa x leži na licu \mathbb{I}_i^+ , potem je $\varphi(x) \neq i-1$. Iz teh dveh lastnosti sklepamo, da je lice simpleksa, ki leži na robu kocke \mathbb{I}^n , lahko popolno pobarvano samo v primeru, ko leži na licu \mathbb{I}_n^- . Po indukcijski predpostavki je število r takih lic liho. Definirajmo funkcijo α , ki za vsak n -simpleks pove, koliko popolno pobarvanih $(n-1)$ -simpleksov vsebuje. Vsak popolno pobarvan n -simpleks iz triangulacije M_k^n kocke \mathbb{I}^n vsebuje natanko en popolno pobarvan $(n-1)$ -simpleks, medtem ko ostali simpleksi lahko vsebujejo dva ali nobenega. Če n -simpleks vsebuje oglišča, pobarvana z vsemi barvami $0, \dots, n-1$, kjer se ena barva ponovi dvakrat, tak simpleks vsebuje dva popolno pobarvana simpleksa. Ostali simpleksi ne vsebujejo popolno pobarvanih $(n-1)$ -simpleksov. Iz zgornjega lahko sklepamo, da je

$$p \equiv \sum_{\substack{R \in M_k^n \\ R \text{ je } n\text{-simplex}}} \alpha(R) \pmod{2}.$$

Pri štetju popolno pobarvanih $(n-1)$ -simpleksov smo vsakega iz notranjosti simpleksa S šteli dvakrat, tiste z roba S pa samo enkrat. Zato velja tudi


$$r \equiv \sum_{\substack{R \in M_k^n \\ R \text{ je } n\text{-simplex}}} \alpha(R) \pmod{2}.$$

Torej velja kongruenca $p \equiv r \pmod{2}$, zato je p lih. \square

Zgornji dokaz zelo spominja na dokaz Spernerjeve leme, a tu obravnavamo kocke. Dobimo idejo, da bi Spernerjevo lemo posplošili na kocke. Želimo poiskati tako pravilo za barvanje triangulacije kocke, da bo vsaka triangulacija kocke vsebovala vsaj en popolno pobarvan simpleks. Ker si želimo popolno pobarvan simpleks, nam ni potrebno vsakega oglišča kocke pobarvati s svojo barvo, saj je za n -kocko dovolj že $n+1$ barv. Podobno kot pri simpleksih bomo rekli, da je n -kocka popolno pobarvana, če na ogliščih nastopajo vse barve iz množice $0, 1, \dots, n$. Pravilo za Spernerjevo barvanje simpleksa lahko posplošimo na n -kocko na naslednji način. Definirajmo naivno pravilo za barvanje triangulacije \mathcal{T} kocke $C = \mathbb{I}^n$:

- (1) Na ogliščih kocke C so uporabljene vse barve iz množice $\{0, 1, \dots, n\}$,
- (2) vsako oglišče triangulacije \mathcal{T} z lica L je enako pobarvano kot eno izmed oglišč lica L .

S primerom na sliki 10 pokažimo, da barvanje, ki zadošča naivnemu pravilu, nima zelene lastnosti. Naivno pravilo lahko dopolnimo tako, da bo vsaka triangulacija n -simpleksa, pobarvana po tem pravilu, vsebovala popolno pobarvan n -simpleks. Če pogledamo dokaz izreka 2.14, vidimo, da je ključno dejstvo, da je na robu liho število popolno pobarvanih simpleksov. Na sliki pa temu ni tako. Popolno pobarvani 1-simpleksi so tisti, ki so pobarvani z modro in rdečo. Simpleks S na robu vsebuje 2 popolno pobarvana 1-simpleksa. Če naivnemu barvanju dodamo pogoj, ki nam za vsako triangulacijo n -kocke zagotavlja liho število popolno pobarvanih $(n-1)$ -simpleksov na robu, dobimo Spernerjevo barvanje za kocke.



SLIKA 10. Triangulacija n -kocke C , pobarvana po naivnem pravilu, ne vsebuje popolno pobarvanega n -simpleksa. Zaradi lepše slike smo barvo 0 prikazali z modro, barvo 1 z rdečo, 2 pa z zeleno.

PRVA VERZIJA

Definicija 3.3. Naj bo podana triangulacija \mathcal{T} kocke C . Z V označimo množico oglišč triangulacije \mathcal{T} . Spernerjevo barvanje triangulacije n -kocke C je preslikava $b : V \rightarrow \{0, 1, \dots, n\}$, pri kateri so izpolnjeni trije pogoji:

- (1) Na ogliščih kocke C so uporabljene vse barve iz množice $\{0, 1, \dots, n\}$,
- (2) vsako oglišče triangulacije \mathcal{T} z lica L je enako pobarvano kot eno izmed oglišč lica L ,
- (3) kocka C vsebuje liho mnogo glavnih lic, ki so pobarvana s Spernerjevim barvanjem.

Točka (2) predstavlja enak robni pogoj kot pri definiciji spernerjeve leme za simplekse. Definicija Spernerjevega barvanja za kocke je precej bolj komplicirana kot definicija Spernerjevega barvanja za simplekse, saj je definicija definirana rekurzivno. Pri pogoju (3) namreč vidimo, da za Spernerjevo barvanje kocke C potrebujemo Spernerjevo barvanje njegovih lic. Pokazali bomo, da vsaka triangulacija n -kocke, pobarvana s Spernerjevim barvanjem, vsebuje vsaj en popolno pobarvan n -simpleks.

Lema 3.4 (Spernerjeva lema za kocke). *Naj bo triangulacija \mathcal{T} n -kocke C pobarvana s Spernerjevim barvanjem. Število popolno pobarvanih n -simpleksov v triangulaciji \mathcal{T} označimo s p , število glavnih lic pobarvanih s Spernerjevim barvanjem pa z l . Potem velja $p \equiv l \pmod{2}$.*

Dokaz. Naj bo C n -kocka in naj bo \mathcal{T} njena triangulacija. Lemo bomo dokazovali z indukcijo na dimenzijo n kocke C .

Baza indukcije ($n = 0$): Če je $n = 0$, lema očitno drži, saj je 0-kocka točka. Pri Spernerjevem barvanju točke imamo samo eno možnost in tako dobimo eno popolno pobarvan 0-kocko, ki je tudi popolno pobarvan simpleks. Točka nič je tudi edino glavno lice 0-kocke.

Indukcijska predpostavka ($n - 1$): Predpostavimo, da lema drži v dimenziji $(n - 1)$. Število popolno pobarvanih $(n - 1)$ -simpleksov v triangulaciji $(n - 1)$ -kocke je enako številu glavnih lic pobarvanih s Spernerjevim barvanjem modulo 2.

Indukcijski korak $((n - 1) \implies n)$: Pravilnost izjave želimo dokazati tudi v dimenziji n . Za poljubno triangulacijo \mathcal{T} n -kocke C naj bodo oglišča triangulacije \mathcal{T} pobarvana s Spernerjevim barvanjem. Označimo število vseh popolno pobarvanih n -simpleksov iz \mathcal{T} s p , število popolno pobarvanih $(n - 1)$ -simpleksov, ki ležijo na robu kocke C pa z r . Definirajmo funkcijo α , ki vsakemu n -simpleksu priredi število popolno pobarvanih $(n - 1)$ -simpleksov, ki so vsebovani na robu tega simpleksa. Vsak popolno pobarvan n -simpleks vsebuje natanko en popolno pobarvan $(n - 1)$ -simpleks, medtem ko ostali simpleksi lahko vsebujejo dva ali pa nobenega. Če n -simpleks vsebuje oglišča, pobarvana z vsemi barvami $0, 1, \dots, n - 1$, kjer se ena barva ponovi dvakrat, tak simpleks vsebuje dva popolno pobarvana simpleksa. Ostali simpleksi pa zagotovo ne vsebujejo popolno pobarvanih $(n - 1)$ -simpleksov, saj niti ne vsebujejo vseh barv iz množice $\{0, 1, \dots, n - 1\}$. Iz zgornjega lahko sklepamo, da je

$$(8) \quad p \equiv \sum_{\substack{R \in \mathcal{T} \\ R \text{ je } n\text{-simplex}}} \alpha(R) \pmod{2}.$$

Pri štetju popolno pobarvanih $(n - 1)$ -simpleksov smo vsakega iz notranjosti C šteli dvakrat, tiste z roba C pa samo enkrat. Torej velja kongruenca:

$$(9) \quad r \equiv \sum_{\substack{R \in \mathcal{T} \\ R \text{ je } n\text{-simplex}}} \alpha(R) \pmod{2}.$$

Iz enačbe (8) in enačbe (9) sledi, da je $p \equiv r \pmod{2}$. Na glavnih licih, ki so pobarvana s Spernerjevim barvanjem, po indukcijski predpostavki leži liho število $(n - 1)$ -simpleksov. Vsa glavna lica izpolnjujejo pogoj 2 v definiciji 3.3. Če glavno lice L ni pobarvano s spernerjevim barvanjem ne izpolnjuje pogoja 1 ali 3. Glavno lice L , ki ne izpolnjuje pogoja 1 ne vsebuje nobenega popolno pobarvanega $(n - 1)$ -simpleksa, saj na ogliščih ne nastopajo barve, ki bi omogočile popolno pobarvan $(n - 1)$ -simpleks. Če pa glavno lice L ne ustreza pogoju 3, potem lice L vsebuje sodo mnogo glavnih lic pobarvanih s Spernerjevim barvanjem in zato po indukcijski predpostavki sodo mnogo popolno pobarvanih $(n - 1)$ -simpleksov. Ugotovili smo, da je $r \equiv l \pmod{2}$, kar pomeni, da je tudi $p \equiv l \pmod{2}$. \square

DRUGA VERZIJA

Definicija 3.5. Naj bo podana triangulacija \mathcal{T} kocke C . Z V označimo množico oglišč triangulacije \mathcal{T} . Spernerjevo barvanje triangulacije n -kocke C je preslikava $b : V \rightarrow \{0, 1, \dots, n\}$, pri kateri so izpolnjeni trije pogoji:

- (1) Na ogliščih kocke C so uporabljene vse barve iz množice $\{0, 1, \dots, n\}$,
- (2) vsako oglišče triangulacije \mathcal{T} z lica L je enako pobarvano kot eno izmed oglišč lica L ,
- (3) kocka C vsebuje natanko eno glavno lice pobarvano s Spernerjevim barvanjem.

Lema 3.6 (Spernerjeva lema za kocke). *V vsakem Spernerjevem barvanju triangulacije n -kocke je liho mnogo popolno pobarvanih n -simpleksov.*

Dokaz. Naj bo C n -kocka in naj bo \mathcal{T} njegoa triangulacija. Lemo bomo dokazovali z indukcijo na dimenzijo n kocke C .

Baza indukcije ($n = 1$): Če je $n = 0$, lema očitno drži, saj je 0-kocka točka. Pri Spernerjevem barvanju točke imamo samo eno možnost in tako dobimo eno popolno pobarvano 0-kocko, ki je tudi popolno pobarvan simpleks.

Indukcijska predpostavka ($n - 1$): Predpostavimo, da lema drži v dimenziji $(n - 1)$. Torej v vsaki triangulaciji $(n - 1)$ -kocke s Spernerjevim barvanjem najdemo liho število $(n - 1)$ -simpleksov, ki so popolno pobarvani.

Indukcijski korak ($(n - 1) \implies n$): Pravilnost izjave želimo dokazati tudi v dimenziji n . Za poljubno triangulacijo \mathcal{T} n -kocke C naj bodo oglišča triangulacije \mathcal{T} pobarvana s Spernerjevim barvanjem. Označimo število vseh popolno pobarvanih n -simpleksov iz \mathcal{T} s p , število popolno pobarvanih $(n - 1)$ -simpleksov, ki ležijo na robu kocke C pa z r . Definirajmo funkcijo α , ki vsakemu n -simpleksu R priredi število popolno pobarvanih $(n - 1)$ -simpleksov, ki so vsebovani v R . Vsak popolno pobarvan n -simpleks vsebuje natanko en popolno pobarvan $(n - 1)$ -simpleks, medtem ko ostali simpleksi lahko vsebujejo dva ali pa nobenega. Če n -simpleks vsebuje oglišča, pobarvana z vsemi barvami $0, 1, \dots, n - 1$, kjer se ena barva ponovi dvakrat, tak simpleks vsebuje dva popolno pobarvana simpleksa. Ostali simpleksi pa zagotovo ne vsebujejo popolno pobarvanih $(n - 1)$ -simpleksov, saj niti ne vsebujejo vseh barv iz množice $\{0, 1, \dots, n - 1\}$. Iz zgornjega lahko sklepamo, da je

$$(10) \quad p \equiv \sum_{\substack{R \in \mathcal{T} \\ R \text{ je } n\text{-simplex}}} \alpha(R) \pmod{2}.$$


Pri štetju popolno pobarvanih $(n - 1)$ -simpleksov smo vsakega iz notranjosti C šteli dvakrat, tiste z roba C pa samo enkrat. Torej velja kongruenca:

$$(11) \quad r \equiv \sum_{\substack{R \in \mathcal{T} \\ R \text{ je } n\text{-simplex}}} \alpha(R) \pmod{2}.$$

Iz enačbe (8) in enačbe (9) sledi, da je $p \equiv r \pmod{2}$. Ker je kocka pobarvana s Spernerjevim barvanjem, ima eno popolno pobarvano glavno lice, ki zaradi indukcijske predpostavke vsebujejo liho število popolno pobarvanih $(n - 1)$ -simpleksov. Ker na drugih licih ni popolno pobarvanih $(n - 1)$ -simpleksov, je število r liho. Zato je tudi p liho število. \square

Sedaj pokažimo, da je barvanje φ Spernerjevo barvanje za kocke.

Dokaz. Pokažimo najprej, da je n -kocka \mathbb{I}^n pri barvanju z barvanjem φ pobarvana popolno. Pokazati moramo, da smo pri barvanju njenih oglišč uporabili vse barve iz množice $\{0, 1, \dots, n\}$ in da vsebuje liho število popolno pobarvanih glavnih lic. Za boljšo predstavo dokaza si lahko na sliki 11 pogledamo, kako izgleda barvanje oglišč v dimenzijah 0, 1, 2 in 3. Dokazovali bomo z indukcijo na n .



SLIKA 11. Skrajno levo je ena točka (0-kocka), ki je z barvanjem φ pobarvana z 0. Malo bolj proti desni lahko vidimo, kako barvanje φ označi oglišča 1-kocke, naslednja je z φ pobarvana 2-kocka, skrajno desno pa je pobarvana 3-kocka.

Baza indukcije ($n = 0$): Če je $n = 0$, opazujemo eno točko, označeno z 0, kar je popolno pobarvana 0-kocka.

Indukcijska predpostavka ($n - 1$): Predpostavimo, da je $(n - 1)$ -kocka popolno pobarvana.

Indukcijski korak ($(n - 1) \implies n$): Dokažimo pravilnost izjave tudi v dimenziji n . Lice I_n^- je enako pobarvano kot $(n - 1)$ -kocka, saj za njuni oglišči veljata enake vsebovanosti v množicah F_i^+ . Po indukcijski predpostavki je lice I_n^- popolno pobarvano, zato vsebuje vse barve iz množice $\{0, 1, \dots, n - 1\}$. Oglišče $(a, a, \dots, a) \in \mathbb{R}^n$ je označeno z barvo n , saj je vsebovano v vseh množicah F_i^+ za $i = 1, 2, \dots, n$. To pomeni, da je n -kocka označena z vsemi oznakami iz množice $\{0, 1, \dots, n\}$. Prepričati se moramo le še, da ima liho število popolno pobarvanih glavnih lic. Trdimo, da je lice I_n^- edino popolno pobarvano lice kocke \mathbb{I}^n . Poglejmo najprej, če je lahko katero od lic I_i^+ popolno pobarvano. Za vsak $x \in I_i^+$ velja, da je $\varphi(x) \neq i - 1$, zato lice I_i^+ ne more vsebovati oglišč z vsemi barvami $\{0, 1, \dots, n - 1\}$. Poskusimo poiskati popolno pobarvano lice med lici I_i^- . Za vsako točko $x \in I_i^-$ velja $\varphi(x) < i$. Če želimo, da lice I_i^- vsebuje vse barve iz množice $\{0, 1, \dots, n - 1\}$, mora biti $i = n$. Torej je lice I_n^- res edino popolno pobarvano glavno lice kocke \mathbb{I}^n .

Prepričati se moramo samo še, da so vsa oglišča z nekega lica kocke \mathbb{I}^n pobarvana enako kot neko oglišče, ki to lice določa. Vemo, da lahko vsako lice L dobimo kot presek pravih lic. Zaradi lažjega zapisa definiramo znak \star , za katerega je $I_i^\star = \mathbb{I}^n$ za vsak $i = 1, 2, \dots, n$. S pomočjo nove oznake lahko vsako lice L kocke \mathbb{I}^n zapišemo kot

$$L = I_1^{\varepsilon_1} \cap I_2^{\varepsilon_2} \cap \dots \cap I_n^{\varepsilon_n},$$

kjer je $\varepsilon_i \in \{\star, -, +\}$ za vsak $i = 1, 2, \dots, n$. Naj bo $x \in L$ in naj bo $\varphi(x) = l$ za neki $l \in \{0, 1, \dots, n\}$. Vemo, da je $\varepsilon_j \neq -$ za $j \leq l$ in $\varepsilon_{l+1} \neq +$. Poglejmo si oglišče

$$y = I_1^{\rho_1} \cap I_2^{\rho_2} \cap \dots \cap I_n^{\rho_n},$$

kjer je

$$\rho_i = \begin{cases} \varepsilon_i & , \varepsilon_i \in \{+, -\}, \\ + & , (\varepsilon_i = \star) \wedge (i < l), \\ - & , (\varepsilon_i = \star) \wedge (i > l). \end{cases}$$

Lahko se prepričamo, da je $y \in L$ in $\varphi(y) = l$, kar pomeni, da smo našli oglišče na licu L , ki je enako pobarvano kot točka x . Ker smo to storili za poljubno točko, je vsaka točka z roba kocke \mathbb{I}^n pobarvana enako kot eno od oglišč, ki določajo lice, na katerem leži točka x . Torej je φ res Spernerjevo barvanje. \square

Leta 1940 je K. Miranda dokazal, da je izrek 3.2 ekvivalenten znanemu Brouwerjevemu izreku o negibni točki, ki pravi naslednje:

Izrek 3.7 (Brouwerjev izrek o negibni točki [4]). *Denimo, da je dana kocka $C = [-1, 1]^n$ in zvezna preslikava $f : C \rightarrow C$, potem obstaja točka $c \in C$, da je $f(c) = c$.*

Izkaže se, da si pri dokazovanju nekaterih matematičnih trditev lažje pomagamo z izrekom 3.2 kot z izrekom 3.7. Poglejmo si, kako s pomočjo izreka 3.2 dokažemo izrek o negibni točki.

Dokaz izreka 3.7. Naj bo $C = [-1, 1]^n$ kocka v evklidskem prostoru \mathbb{R}^n in naj bo $f : C \rightarrow C$ poljubna zvezna preslikava iz kocke nazaj vase. Definiramo funkcijo $g : C \rightarrow \mathbb{R}^n$ s predpisom $g(x) = x - f(x)$. Funkcija g je zvezna in zadošča pogojem izreka 3.2. Res, za vsak $x \in \mathbb{I}_i^-$ velja, da je $x_i = -1$ in $f_i(x) \geq -1$, zato je

$$g_i(x) = x_i - f_i(x) \leq -1 - (-1) = 0.$$

Podobno lahko razmislimo, da je za vsak $x \in \mathbb{I}_i^+$ vrednost funkcije $g_i \geq 0$. Zato po izreku 3.2 obstaja taka točka $c \in C$, da je $g(c) = 0$, kar pomeni, da je $f(c) = c$. \square

Enostavnost dokaza izreka 3.7 pokaže, kako močno orodje za dokazovanje topoloških trditev je izrek 3.2.

4. RAZŠIRITEV FUNKCIJE


Včasih se nam zgodi, da je podana funkcija definirana samo na nekem majhnem območju, želeli pa bi si, da bi bila domena funkcije večja. Poglejmo si poljubno množico $A \in \mathbb{R}^n$ in neko funkcijo $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Denimo, da je U taka množica, da je $A \subset U$. Funkciji $F : U \rightarrow \mathbb{R}$, za katero je $F(x) = f(x)$ za vsak $x \in A$, pravimo *razširitev funkcije f* na množico U . Če funkcijo $f : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ razširimo brez omejitev, se informacija o funkciji f na množici A popolnoma izgubi. Da se ohrani vsaj del informacije, bomo gledali zgolj zvezne funkcije f in zvezne razširitve F . Pri tem se ponudi vprašanje, ali lahko vsako zvezno funkcijo razširimo. S primerom pokažemo, da temu ni tako.

Primer 4.1. Funkcijo $f : (-2, 0) \cup (0, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ definiramo s predpisom

$$f(x) = \begin{cases} -1 & , x \in (-2, 0) \\ 1 & , x \in (0, 2). \end{cases}$$

Funkcija f je zvezna na $(-2, 0) \cup (0, 2)$, ne moremo pa je zvezno razširiti na \mathbb{R} , saj razširitev v točki $x = 0$ ne bi bila zvezna. \diamond

Izkaže se, da je za obstoj razširitve zvezne funkcije $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dovolj, če je množica A kompaktna.



SLIKA 12. Prikazan je graf zvezne funkcije, ki je ne moremo zvezno razširiti na \mathbb{R} .

Lema 4.2 (Razširitev zvezne funkcije). *Naj bo A kompaktna podmnožica evklidskega prostora \mathbb{R}^n in naj bo dana zvezna funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Potem obstaja taka zvezna funkcija $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, da za vsak $x \in A$, velja $F(x) = f(x)$.*

Dokaz. Včasih je pri dokazu obstoja neke stvari najlažje, če to stvar poiščemo in jo vsem pokažemo. Tako bomo tudi mi napisali predpis funkcije F , ki zvezno razširi funkcijo f . Seveda bi se lahko pri dokazu oprli na Tietzejev razširitveni izrek, a je to delo zasnovano tako, da se poskuša izogniti uporabi abstraktnejših topoloških izrekov. Denimo torej, da je množica A kompaktna in funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna. Brez izgube splošnosti lahko predpostavimo, da je funkcija f pozitivna. Vemo, da je zvezna funkcija na kompaktni množici omejena, torej lahko prištejemo dovolj veliko število C , da je funkcija $f + C$ pozitivna. Zveznost funkcije f pa je ekvivalentna zveznosti funkcije $f + C$. Razširitveno funkcijo $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ lahko definiramo s predpisom [2, str. 257, vaja 4.1.F]:

$$F(x) = \begin{cases} \inf \left\{ f(a) + \frac{d(x,a)}{d(x,A)} - 1; a \in A \right\} & , x \in A^c \\ f(x) & , x \in A. \end{cases}$$

Iz predpisa funkcije je jasno, da je za vsak $x \in A$, $F(x) = f(x)$. Ugotoviti moramo le še, ali je funkcija F res zvezna na \mathbb{R}^n . Dokazovali bomo v dveh delih. Najprej bomo dokazali zveznost funkcije F na A^c , potem pa še na A . Dokažimo, da je funkcija F zvezna v točki $x_0 \in A^c$. Izberimo poljubno majhno pozitivno realno število $\varepsilon \in (0, 1)$. Potem obstaja tako pozitivno realno število $r > 0$, da je zaprta krogla s polmerom r vsebovana v A^c , torej $B(x_0, r) \subset A^c$. Definiramo funkcijo $D_a(x) := \frac{d(x,a)}{d(x,A)}$. Prepričajmo se, da obstaja tako pozitivno realno število δ , da je $|D_a(x_0) - D_a(x)| < \varepsilon$ za vsak $x \in B(x_0, \delta)$ in vsak $a \in A$. Ocenimo navzgor:

$$\begin{aligned} D_a(x_0) - D_a(x) &= \frac{d(x_0, a)}{d(x_0, A)} - \frac{d(x, a)}{d(x, A)} \\ &= \frac{d(x_0, a)d(x, A) - d(x, a)d(x_0, A)}{d(x_0, A)d(x, A)} \\ &\leq \frac{d(x_0, a)(d(x_0, A) + \delta) - (d(x_0, a) - \delta)d(x_0, A)}{d(x_0, A)(d(x_0, A) - \delta)} \\ &= \frac{\delta(d(x_0, a) + d(x_0, A))}{d(x_0, A)(d(x_0, A) - \delta)} \end{aligned}$$

Ker želimo, da je $\frac{\delta(d(x_0,a)+d(x_0,A))}{d(x_0,A)(d(x_0,A)-\delta)} \leq \varepsilon$, lahko izračunamo $\delta \leq \frac{\varepsilon(d(x_0,A))^2}{d(x_0,a)+d(x_0,A)(1+\varepsilon)}$. Ocenimo navzdol:

$$\begin{aligned} D_a(x_0) - D_a(x) &= \frac{d(x_0,a)}{d(x_0,A)} - \frac{d(x,a)}{d(x,A)} \\ &= \frac{d(x_0,a)d(x,A) - d(x,a)d(x_0,A)}{d(x_0,A)d(x,A)} \\ &\geq \frac{d(x_0,a)(d(x_0,A) - \delta) - (d(x_0,a) + \delta)d(x_0,A)}{d(x_0,A)(d(x_0,A) + \delta)} \\ &= \frac{-\delta(d(x_0,a) + d(x_0,A))}{d(x_0,A)(d(x_0,A) + \delta)} \end{aligned}$$

Ker želimo, da je $\frac{\delta(d(x_0,a)+d(x_0,A))}{d(x_0,A)(d(x_0,A)-\delta)} \geq -\varepsilon$, dobimo neenačbo $\delta \leq \frac{\varepsilon(d(x_0,A))^2}{d(x_0,a)+d(x_0,A)(1-\varepsilon)}$. Opazimo, da je ocena navzgor strožja. Ker je funkcija $\delta(a) = \frac{\varepsilon d(x_0,A)}{d(x_0,A)(1+\varepsilon)+d(x_0,a)}$ definirana na kompaktni množici, doseže svoj minimum. Ker je funkcija $\delta(a)$ na množici A strogo pozitivna, je tudi minimum večji od 0. Zato obstaja pozitivno realno število δ , ki je manjše od $\delta(a)$ za vsako število $a \in A$.

Denimo, da je infimum $F(x_0)$ dosežen pri a_0 , torej je $F(x_0) = f(a_0) + D_{a_0}(x_0) - 1$, infimum $F(x)$ pa pri a_1 , torej je $F(x) = f(a_1) + D_{a_1}(x) - 1$. Naredimo naslednje ocene:


$$\begin{aligned} F(x) &= F(x) - F(x_0) + F(x_0) \\ &= \inf \{f(a) + D_a(x) - 1; a \in A\} - F(x_0) + F(x_0) \\ &\leq (f(a_0) + D_{a_0}(x) - 1) - (f(a_0) + D_{a_0}(x_0) - 1) + F(x_0) \\ &= (D_{a_0}(x) - D_{a_0}(x_0)) + F(x_0) \\ &\leq \varepsilon + F(x_0), \\ &\implies F(x_0) - F(x) \geq -\varepsilon. \end{aligned}$$

Podobno ocenimo:

$$\begin{aligned} F(x_0) &= F(x_0) - F(x) + F(x) \\ &= \inf \{f(a) + D_a(x_0) - 1; a \in A\} - F(x) + F(x) \\ &\leq (f(a_1) + D_{a_1}(x_0) - 1) - (f(a_1) + D_{a_1}(x) - 1) + F(x) \\ &= (D_{a_1}(x_0) - D_{a_1}(x)) + F(x) \\ &\leq \varepsilon + F(x), \\ &\implies F(x_0) - F(x) \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Iz zgornjih ocen ugotovimo, da je $|F(x_0) - F(x)| \leq \varepsilon$, kar zagotavlja zveznost funkcije F na A^c .

Da bi preverili zveznost F tudi na množici A , izberemo $x_0 \in A$ in $\varepsilon > 0$. Ker je funkcija f zvezna na A , obstaja tak $\delta > 0$, da je $|f(x_0) - f(x)| < \varepsilon$ za vsak $x \in A$, za katerega velja $d(x_0, x) < \delta$. Zaradi lažjega ocenjevanja naredimo naslednje premisleke. Ker je funkcija f definirana na kompaktni množici, obstaja realno število M , da je $f(a) \leq M$ za vsak $a \in A$. Določimo tak $\mu > 0$, pri katerem je funkcija $D_a(x) \geq M + 1$ za vse $a \in A \setminus B(x_0, \delta)$ in vse $x \in B(x_0, \mu)$. Naj bo $a \in B(x_0, \delta)^c$, potem je $D_a(x)|_{B(x_0, \mu)} = \frac{d(x,a)}{d(x,A)} \geq \frac{\delta - \mu}{\mu}$. Torej moramo določiti $\mu > 0$, da bo veljala neenačba $\frac{\delta - \mu}{\mu} > M + 1$. Izračunamo $\mu < \frac{\delta}{M+2}$. Sedaj imamo dve možnosti. Če je



SLIKA 13. Pri dokazovanju zveznosti funkcije F v točki x_0 želimo poiskati tako pozitivno realno število μ , da se vrednosti funkcije F za vsako točko $x \in B(x_0, \mu)$ od vrednosti funkcije $F(x_0)$ razlikujejo največ za vnaprej predpisani ε .

$x \in A \cap B(x_0, \mu)$, potem je $|f(x_0) - f(x)| < \varepsilon$. Če pa je $x \in A^c \cap B(x_0, \mu)$, vemo, da obstajata točki $b \in \partial A$, za katero je $d(x, b) = d(x, A)$, in $c \in A$ z lastnostjo $F(x) = f(c) + D_c(x) - 1$. Iz izbire števila μ je jasno, da ležita točki $b, c \in B(x_0, \delta)$ (slika 13). Lahko naredimo naslednji oceni. Najprej upoštevamo definicijo funkcije F in izbrano točko b :

$$F(x) = \inf_{a \in A} \{f(a) + D_a(x) - 1\} \leq f(b) \leq f(x_0) + \varepsilon = F(x_0) + \varepsilon,$$

pri drugi oceni pa si pomagamo s točko c :

$$F(x) = f(c) + D_c(x) - 1 \geq f(c) \geq f(x_0) - \varepsilon = F(x_0) - \varepsilon.$$

Ugotovimo, da je $|F(x_0) - F(x)| \leq \varepsilon$, kar zaključimo dokaz. \square

Lemo 4.2 enostavno posplošimo tudi na preslikave, ki slikajo v večrazsežni evklidski prostor.

Posledica 4.3. Naj bo A kompaktna podmnožica evklidskega prostora \mathbb{R}^n in naj bo $f : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ zvezna preslikava. Potem obstaja zvezna preslikava $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, da je za vsak $x \in A$, $F(x) = f(x)$.

Dokaz. Vemo, da zvezna preslikava $f : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ določa komponentne funkcije $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$. Vse komponentne funkcije $f_i : A \rightarrow \mathbb{R}$ zadoščajo pogojem leme 4.2, zato jih lahko razširimo do funkcij $F_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Če definiramo preslikavo $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ s predpisom $F(x) = (F_1(x), F_2(x), \dots, F_n(x))$, dobimo zvezno razširitev preslikave f . \square

Sedaj znamo razširiti zvezno preslikavo iz kompaktne množice na cel prostor \mathbb{R}^n . Včasih pa si poleg spremembe definicijskega območja želimo imeti nekaj vpliva tudi na zalogo vrednosti preslikave. Želeli bi si, da se zaloga vrednosti pri razširitvi čim manj spremeni. Naivno bi lahko želeli, da ta ostane celo enaka, a to ni vedno mogoče, kar pokaže primer 4.4.

Primer 4.4. Poglejmo si identično preslikavo $f : \partial \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{I}^n \setminus \{0\}$. Po izreku 3.2 ne obstaja zvezna razširitev $F : \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{I}^n \setminus \{0\}$, saj mora obstajati $x \in \mathbb{I}^n$, da je $F(x) = 0$. \diamond

V posebnih primerih obstaja taka razširitev preslikave, ki se izogne določeni točki. Brez izgube splošnosti bomo pokazali, da obstajajo pogoji, ki nam zagotavljajo zvezno razširitev preslikave, ki nobenega elementa definicijskega območja ne slika

v 0. Preden navedemo pogoje, pa si pogledimo pomembno lastnost preslikav, ki je ključna pri dokazu.

Trditev 4.5 ([7]). *Zvezna funkcija, definirana na kompaktni množici, je enakomerno zvezna.*

Dokaz. Predpostavimo, da je $K \in \mathbb{R}^n$ kompaktna množica in $f : K \rightarrow \mathbb{R}^n$ zvezna preslikava. Pokazati želimo, da za vsako še tako majhno število $\varepsilon > 0$ obstaja tako realno število $\delta > 0$, da za vsaki točki $x, y \in K$, za kateri je $d(x, y) < \delta$, velja $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$. Ker je f zvezna funkcija za vsako točko $z \in K$ obstaja tako pozitivno realno število δ_z , da je $f(B(z, \delta_z)) \subset B(f(z), \frac{\varepsilon}{4})$. Družina množic $\mathcal{U} = \{B(z, \delta_z); z \in K\}$ tvori odprto pokritje prostora K . Zaradi kompaktnosti K lahko izberemo končno poddružino $\mathcal{A} = \{(B(x_1, \delta_{x_1}), \dots, B(x_n, \delta_{x_n}))\}$, ki je še vedno pokritje množice K . Definiramo število $\delta = \min_i \delta_{x_i}$. Za poljubni števili $x, y \in K$, ki sta med seboj oddaljeni manj kot δ , imamo dve možnosti. Če obstaja taka krogla $B(x_i, \delta)$, da je $x, y \in B(x_i, \delta)$, potem sta $f(x), f(y) \in B(f(x_i), \frac{\varepsilon}{4})$ in je $d(f(x), f(y)) < \frac{\varepsilon}{2}$. V nasprotnem primeru obstajata krogli $B(x_i, \delta)$ in $B(x_j, \delta)$ z nepraznim presekom, za kateri velja $x \in B(x_i, \delta)$ in $y \in B(x_j, \delta)$. V tem primeru je $f(x) \in B(f(x_i), \frac{\varepsilon}{4})$ in $f(y) \in B(f(x_j), \frac{\varepsilon}{4})$, kjer je $B(f(x_i), \frac{\varepsilon}{4}) \cap B(f(x_j), \frac{\varepsilon}{4}) \neq \emptyset$. Zato zagotovo velja $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$, torej je funkcija res enakomerno zvezna. \square

Poglejmo sedaj, kakšne pogoje potrebujemo, da lahko funkcijo razširimo tako, da se izognemo ničli.

Lema 4.6 (razširitev, ki se izogne ničli [4, str. 133, Proof of Lemma]). *Naj bo X kompaktna podmnožica evklidskega prostora \mathbb{R}^n in naj bo $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Potem za vsak $\varepsilon > 0$ in za vsako kompaktno množico s prazno notranjostjo $Y \subset \mathbb{R}^n$ obstaja zvezna preslikava $F : X \cup Y \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, da velja: $\|F(x) - f(x)\| < \varepsilon$ za vsak $x \in X$*

Dokaz. Izberimo realno število $\varepsilon > 0$. Naj bosta X in Y taki množici kot v lemi 4.6. Ker je množica $X \cup Y \subset \mathbb{R}^n$ omejena, obstaja realno število $a > 0$, da je unija množic $X \cup Y$ vsebovana v kocki $\mathbb{I}^n = [-a, a]^n$. Po lemi 4.2 lahko vsako zvezno preslikavo $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ razširimo do zvezne preslikave $g : \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Izberemo tako realno število $\delta \in (0, \frac{\varepsilon}{2})$, da je $f(X) \cap B(0, 2\delta) = \emptyset$. Ker je funkcija g zvezna in definirana na kompaktni množici \mathbb{I}^n , je po trditvi 4.5 enakomerno zvezna. Zato obstaja realno število μ , da za vsako množico A , katere diameter $\text{diam}(A)$ je manjši od μ , velja $\text{diam}(g(A)) < \frac{\delta}{2}$. Naj bo $k \in \mathbb{N}$ dovolj veliko naravno število, da za vsak simpleks S iz k -te mrežne delitve $\mathcal{T}_k = M_k^n$ kocke \mathbb{I}^n velja $\text{diam}(S) < \mu$. Če označimo množico oglišč v delitvi \mathcal{T}_k z V , nam preslikava $g|_V : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ enolično določa zvezno preslikavo $h : \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, ki vsako točko $x \in S = \langle z_0, z_1, \dots, z_n \rangle \in \mathcal{T}_k$ z baricentričnimi koordinatami $x = (t_0, t_1, \dots, t_n)_b$ slika v

$$h(x) = \sum_{i=0}^n t_i g(z_i).$$

Zaradi izbire triangulacije \mathcal{T}_k je za vsak simpleks $S = \langle z_1, z_2, \dots, z_n \rangle \in \mathcal{T}_k$ diameter $\text{diam}(S)$ manjši od μ , torej zaradi enakomerne zveznosti funkcije g velja $\text{diam}(g(S)) < \frac{\delta}{2}$. Torej obstaja krogla B s premerom δ , ki vsebuje množico $g(S)$. Funkcijo h smo konstruirali tako, da je množica $h(S)$ konveksna ogrinjača točk $g(z_0), g(z_1), \dots, g(z_n)$. Ker je krogla B konveksna množica, ki vsebuje točke $g(z_0), g(z_1), \dots, g(z_n)$, vsebuje tudi njihovo konveksno ogrinjačo $h(S)$. Sklep sledi iz dejstva, da je konveksna ogrinjača danih točk najmanjša konveksna množica, ki

vsebuje dane točke. Iz tega ugotovimo, da je $\|g(x) - h(x)\| < \delta$ za vsak $x \in \mathbb{I}^n$. Ker je funkcija g razširitev funkcije f , sklepamo, da velja $\|f(x) - h(x)\| < \delta$ za vsak $x \in X$.

Sedaj opazujmo množico točk $\{g(z_0), g(z_1), \dots, g(z_n)\}$. Če je to afino odvisna množica, potem je množica $h(S)$ določena z n med seboj odvisnimi vektorji, torej leži v nekem $(n - 1)$ -dimenzionalnem podprostoru prostora \mathbb{R}^n in ima kot taka prazno notranjost. Če pa je množica afino neodvisna, je množica $S \cap Y$ kompaktna množica s prazno notranjostjo, saj je presek množice Y , ki je kompaktna s prazno notranjostjo, in množice S , ki je kompaktna. Zaradi zveznosti funkcije h je tudi $h(S \cap Y)$ kompaktna množica s prazno notranjostjo. Res, zvezne funkcije ohranjajo kompaktnost. Denimo, da je notranjost množice $h(S \cap Y)$ neprazna. Potem obstaja neka odprta množica $V \subset \mathbb{R}^n$, ki je cela vsebovana v $h(S \cap Y)$. Ker je funkcija h zvezna, je njena inverzna preslikava h^{-1} odprta, zato je tudi množica $h^{-1}(V)$ odprta v prostoru \mathbb{R}^n . To pa ni mogoče, saj je množica $h^{-1}(V)$ vsebovana v množici $S \cap Y$, ki ima prazno notranjost, zato ima tudi množica $h^{-1}(V)$ prazno notranjost. Iz teh razmislekov ugotovimo, da je množica $h(Y) = \bigcup_{S \in \mathcal{T}_k} h(S \cap Y)$ kompaktna množica

s prazno notranjostjo, saj jo dobimo s končno unijo kompaktnih množic s prazno notranjostjo. Ker je $f(X) \cap B(0, 2\delta) = \emptyset$ in ker je $\|f(x) - h(x)\| < \delta$ za vsak $x \in X$, je $h(X) \cap B(0, \delta) = \emptyset$. Jasno je, da lahko izberemo točko $d \in B(0, \delta) \setminus h(X \cup Y)$.

Definiramo preslikavo $F : X \cup Y \rightarrow \mathbb{R}^n$ s predpisom $F(x) = h(x) - d$. Opazimo, da je $\|F(x) - f(x)\| \leq \|h(x) - f(x)\| + \|d\| < 2\delta < \varepsilon$ za vsak $x \in X$. Velja tudi $F(z) \neq 0$ za vsak $z \in X \cup Y$, saj bi enakost $F(z) = 0$ implicirala enakost $h(z) = d$, kar pa nasprotuje predpostavki, da je $d \notin h(X \cup Y)$. Preslikava F je res iskana razširitev. \square


5. IZREK O INVARIANCI ODPRTIH MNOŽIC

V prejšnjih poglavjih smo si pripravili vse potrebno za dokaz izreka o invarianci odprtih množic, zato se bomo brez ovinkarjenja lotili dokaza. Nato bomo dokazali še posledico izreka o invarianci odprtih množic, ki jo imenujemo izrek o invarianci dimenzij. Pri tem bomo sledili viru [4].

Izrek 5.1 (Izrek o invarianci odprtih množic). *Naj bo $U \subset \mathbb{R}^n$ odprta podmnožica evklidskega prostora \mathbb{R}^n in naj bo $h : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ zvezna injektivna preslikava. Potem je tudi slika $h(U)$ odprta množica v \mathbb{R}^n .*

Dokaz. Naj bodo izpolnjene predpostavke izreka. Obravnavamo množico U , ki je odprta podmnožica v \mathbb{R}^n , in zvezno injektivno preslikavo $h : U \rightarrow \mathbb{R}^n$. Izrek bo dokazan, če pokažemo, da je za vsak element u iz množice U točka $h(u)$ notranja točka za množico $h(U)$. Ker je \mathbb{R}^n homogen prostor, take pa so tudi vse njegove odprte podmnožice, lahko predpostavimo, da je $u = 0$ in pokažemo, da je $h(0)$ notranja točka za $h(U)$. Izberimo tako pozitivno realno število $a > 0$, za katero je $\mathbb{I}^n \subset U$. Za dokaz izreka je dovolj pokazati vsebovanost $b := h(0) \in \text{Int}(h(\mathbb{I}^n))$. Od tu naprej bomo dokazovali s protislovjem. Privzeli bomo, da je $b \in \partial h(\mathbb{I}^n)$, in konstruirali funkcijo $f : \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, tako da bo f zadoščala pogojem izreka 3.2. To pa bo protislovje, saj mora taka funkcija po izreku 3.2 vsaj eno točko slikati v 0. Na poti do protislovja si bomo seveda pomagali tudi z lemmami, ki smo jih spoznali in dokazali v prejšnjih poglavjih. Predpostavimo torej, da je $b \in \partial(\mathbb{I}^n)$. Ker je \mathbb{I}^n kompaktna podmnožica \mathbb{R}^n in je \mathbb{R}^n hausdorffov prostor, je funkcija $h|_{\mathbb{I}^n} : \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ homeomorfizem. Zato obstaja tako pozitivno realno število $\delta > 0$, za katerega je

$h^{-1}(B(b, 2\delta)) \subset \text{Int}(\mathbb{I}^n)$. Ker je $b \in \partial h(\mathbb{I}^n)$, je lahko poiščemo točko $c \in B(b, \delta) \setminus h(\mathbb{I}^n)$. Enostavno se je prepričati, da je $b \in B(c, \delta)$ in $h^{-1}(B(c, \delta)) \subset \text{Int}(\mathbb{I}^n)$.



SLIKA 14. Skica dokaza izreka 5.1.

Označimo $X := h(\mathbb{I}^n) \setminus B(c, \delta)$ in $Y := \partial B(c, \delta)$. Definiramo zvezno preslikavo $l : h(\mathbb{I}^n) \cup Y \rightarrow X \cup Y$ s predpisom:

$$l(x) = \begin{cases} c + \frac{x-c}{\|x-c\|} \cdot \delta & , x \in h(\mathbb{I}^n) \cap B(c, \delta) \\ x & , x \in X. \end{cases}$$

S pomočjo leme 4.6 lahko preslikavo $h^{-1}|_X : X \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ razširimo do zvezne preslikave $g : X \cup Y \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, za katero za vsak $x \in X$ velja $\|g(x) - h^{-1}(x)\| < a$. Sedaj lahko definiramo preslikavo $f = (f_1, f_2, \dots, f_n) : \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ kot kompozitum $f := g \circ l \circ h$. Ker ta funkcija slika iz \mathbb{I}^n in ne zavzame ničle, je za protislovje dovolj, če se prepričamo, da funkcija ustreza pogojem izreka 3.2. Vzemimo $t \in \mathbb{I}_i^-$. Velja $l(h(t)) = h(t)$, saj je $h(t) \in X$. Za normo vektorja $f(t) - t$ lahko naredimo naslednje ocene:

$$\|f(t) - t\| = \|g(l(h(t))) - h^{-1}(h(t))\| = \|g(h(t)) - h^{-1}(h(t))\| < a.$$

Ker je $t_i = -a$, je $|f_i(t) - t_i| = |f_i(t) - (-a)| \leq |f(t) - t| < a$, je $f_i(t) < 0$. Podobno lahko tudi v primeru, ko je $t_i \in \mathbb{I}_i^+$, sklepamo, da je $f_i(t) > 0$. Ugotovili smo, da je $f_i(\mathbb{I}_i^-) < 0$ in $f_i(\mathbb{I}_i^+) > 0$, zato bi po predpostavkah izreka 3.2 moral obstajati $x \in \mathbb{I}^n$, ki se s f slika v 0. To je protislovje, saj je f preslikava, ki slika v prostor $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, torej je $b \in \text{Int}(h(\mathbb{I}^n))$ in je $h(U)$ odprta podmnožica v \mathbb{R}^n . \square

S pomočjo izreka 5.1 lahko enostavno izpolnimo obljubo iz uvoda in dokažemo izrek o invarianci dimenzij, ki razreši vsaj nekatere nejasnosti, ki se nanašajo na pojem dimenzije.

Posledica 5.2 (Izrek o invarianci dimenzije). *Naj bosta m in n naravni števili. evklidska prostora \mathbb{R}^m in \mathbb{R}^n sta homeomorfna, če in samo če je $m = n$.*

Dokaz. Denimo, da sta za neki dve naravni števili m in n evklidska prostora \mathbb{R}^m in \mathbb{R}^n homeomorfna. Torej obstaja zvezna bijektivna preslikava $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ z zveznim inverzom $f^{-1} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$. Dokazovali bomo s protislovjem. Predpostavimo, da je $m \neq n$. Brez izgube splošnosti lahko predpostavimo, da je $m < n$. Označimo z i vložitev, torej preslikavo iz prostora \mathbb{R}^m v \mathbb{R}^n , ki je definirana s predpisom $i(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$. Tedaj je preslikava $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definirana kot kompozitum $h := i \circ f$ zvezna injektivna preslikava, zato je po izreku 5.1 odprta. Toda slika prostora \mathbb{R}^n , ki je odprta podmnožica same sebe, s funkcijo h je množica

$$\{(x_1, x_2, \dots, x_m, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n; \text{ kjer so } x_i \in \mathbb{R} \text{ za vsak } i \in \{1, \dots, m\}\},$$

ki pa je zaprta podmnožica prostora \mathbb{R}^n . Torej mora biti res $m = n$. \square

SLOVAR STROKOVNIH IZRAZOV

continuous zvezen

uniformly continuous enakomerno zvezen

coloring barvanje

convex konveksen

convex hull konveksna ogrinjača

compact kompakten – Metrični prostor je kompakten, če vsako odprto pokritje prostora vsebuje končno podpokritje. Podmnožica evklidskega prostora je kompaktna natanko tedaj, ko je omejena in zaprta.

cover pokritje

cube kocka

dimension dimenzija

extension razširitev

face lice

homeomorphism homeomorfizem – Preslikava je homeomorfizem, če je zvezna in ima zvezen inverz.

homeomorphic homeomorfen – Prostor X je homeomorfen prostoru Y , če obstaja homeomorfizem $f : X \rightarrow Y$.

sequence zaporedje

simplex simpleks

triangulation triangulacija

vertex oglišče

LITERATURA

- [1] C. T. Ahlbach, *A discrete approach to Poincare-Miranda theorem*, magistrsko delo, Department of mathematics, Harvey Mudd College, 2013.
- [2] R. Engelking, *General topology*, Sigma series in pure mathematics **6**, Heldermann Verlag, Berlin, 1989.
- [3] F. Q. Gouvêa, *Was cantor surprised?*, amer. math. monthly **118** (2011) 198–209, doi: 10.4169/Amer.math.monthly.118.03.198, dostopno tudi na https://www.maa.org/sites/default/files/pdf/pubs/AMM-March11_Cantor.pdf.
- [4] W. Kulpa, *Poincare and domain invariance theorem*, Acta univ. carolin. math. phys. **39**(1) (1998) 127–136, dostopno tudi na https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/702050/ActaCarolinae_039-1998-1_10.pdf.

- [5] H. P. Manning, *Geometry of four dimensions*, Macmillan, New York, 1914, dostopno tudi na <https://archive.org/details/geometryoffourdi033495mbp/page/n3/mode/2up>.
- [6] U. Schäfer, *From Sperner's lemma to differential equations in Banach spaces : An introduction to fixed point theorems and their applications*, Karlsruher Institut für Technologie, 2014, doi: 10.5445/KSP/1000042944, dostopno tudi na <https://d-nb.info/106449790X/34>.
- [7] *Continuous mapping on a compact metric space is uniformly continuous*, [ogled 26. 4. 2020], dostopno na <https://math.stackexchange.com/questions/110573/continuous-mapping-on-a-compact-metric-space-is-uniformly-continuous>.
- [8] *Convex hull*, [ogled 22. 4. 2020], dostopno na https://en.wikipedia.org/wiki/Convex_hull.
- [9] *Peano curve*, [ogled 14. 5. 2020], dostopno na https://en.wikipedia.org/wiki/Peano_curve.
- [10] *Simplex*, [ogled 22. 4. 2020], dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Simplex>.