

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 2. stopnja

Tom Gornik  
**Izrek Šarkovskega**

Magistrsko delo

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Vavpetič

Ljubljana, 2023

## KAZALO

1. Uvod	4
2. Definicije in formulacija izreka	4
2.1. Izrek Šarkovskega	5
3. Intervali, relacija pokritja in cikli	8
4. Primeri	11
5. Štefanovo zaporedje	15
6. Konstrukcija Štefanovega zaporedja	18
7. Dokaz izreka Šarkovskega	21
8. Dokaz realizacijskega izrek Šarkovskega	22
9. Posplošitve izreka	26
10. Prostor Šarkovskega	31
11. Linearni kontinuum je prostor Šarkovskega	37

Izrek Šarkovskega

POVZETEK

Sharkovsky theorem

ABSTRACT

Math. Subj. Class. (2010):

Ključne besede:

Keywords:

## 1. UVOD


Napišite kratek zgodovinski in matematični uvod. Pojasnite motivacijo za problem, kje nastopa, kje vse je bil obravnavan. Na koncu opišite tudi organizacijo dela – kaj je v katerem razdelku.

## 2. DEFINICIJE IN FORMULACIJA IZREKA

Naj bo  $I \subseteq \mathbb{R}$  povezana podmnožica realnih števil. Takim množicam bomo rekli intervali. Interval ne rabi biti zaprt ali omejen in lahko v nekaterih primerih predstavlja kar celotno množico realnih števil. Naj bo  $f : I \rightarrow I$  zvezna funkcija, ki slika interval  $I$  nazaj vase. Za naravno število  $n$  bomo s  $f^n$  označevali kompozitum:

$$f^n = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ ponovitev } f},$$

kjer  $f^0$  predstavlja identično funkcijo. Lahko si izberemo neko točko  $x_0$  iz intervala  $I$  in s pomočjo iteracij funkcije  $f$  definiramo zaporedje s splošnim členom  $x_n = f^n(x_0)$ . Točke v tem zaporedju lahko ponazorimo v koordinatnem sistemu tako, da začnemo na abscisni osi pri točki  $x_0$ . Potujemo navpično do grafa funkcije  $f$  in se premaknemo v vodoravni smeri do simetrale lihih kvadrantov. Ta točka ima obe koordinati enaki  $x_1$ . Sedaj se zopet premaknemo navpično do grafa funkcije  $f$  in nato vodoravno do simetrale lihih kvadrantov. Pridemo do točke, ki ima obe koordinati enaki  $x_2$ . Postopek (skiciran je na sliki 1) lahko nadaljujemo v neskončnost. V primeru na sliki 1 vidimo, da se točka  $x_3$  slika v točko  $x_0$ . To pomeni, da ima zaporedje samo 4 različne člene, ki se ponavljajo.



SLIKA 1. Slika prikazuje, iteracije funkcije  $f$  na točki  $x_0$ .

V takem sistemu, pravimo mu tudi **dinamični sistem**,

~~V takem dinamičnem sistemu~~ ena iteracija funkcije predstavlja en diskreten korak v času, točka  $x_0 \in I$  pa začetni položaj točke v sistemu. Množici, ki vsebuje vse člene zaporedja  $(x_n)_{n=0}^{\infty}$  bomo rekli *f-orbita točke  $x_0$*  ali samo orbita točke  $x_0$ . Z matematičnimi simboli jo lahko zapišemo tako:

$$\{\mathcal{O} := f^m(x_0); m \in \mathbb{N}\}.$$

Preučevali bomo take točke  $x_0 \in I$ , ki se po nekaj iteracijah s funkcijo  $f$  slikajo nazaj vase. Takim točkam rečemo *periodične točke*. *Perioda točke  $x_0$*  je najmanjše tako naravno število  $m$ , za katero je  $f^m(x_0) = x_0$ . Ekvivalentno lahko sklepamo, da je orbita periodične točke  $x_0$  končna množica, število različnih elementov v orbiti pa

je enako periodi točke  $x_0$ . Predvsem, ko želimo poudariti, da govorimo o periodični točki  $x_0$ , bomo  $f$ -orbito točke  $x_0$  imenovali tudi cikel točke  $x_0$ . Cikel dolžine  $m$  bomo krajše zapisali  $m$ -cikel. *Negibna točka* (včasih ji rečemo tudi fiksna točka) je periodična točka s periodo 1, torej taka točka  $x_0$ , za katero je  $f(x_0) = x_0$ . Če obstaja periodična točka s periodo  $n$ , rečemo tudi, da ima funkcija  $f$  periodo  $n$ .

Pri danem dinamičnem sistemu se lahko vprašamo, katere periode lahko ima funkcija. Šarkovski si je postavil prav to vprašanje in prišel do ureditve množice naravnih števil, ki pove, katere periode lahko ima funkcija.

**2.1. Izrek Šarkovskega.** Izrek šarkovskega opiše periode poljubne zvezne funkcije tako, da uredi naravna števila z relacijo delne urejenosti, ki jo bomo spoznali v nadaljevanju.

**Definicija 2.1.** Naj bo  $M$  množica. Relacija  $(M, \leq)$  definirana na množici  $M$  je relacija delne urejenosti, če veljajo naslednje lastnosti:

- refleksivnost:  $\forall a \in M : a \leq a$ ,
- antisimetričnost:  $\forall a, b \in M : a \leq b \text{ in } b \leq a \Rightarrow a = b$ ,
- tranzitivnost:  $\forall a, b, c \in M : a \leq b \text{ in } b \leq c \Rightarrow a \leq c$ .

Relacija  $(M, \leq)$  je linearna urejenost, če je relacija delne urejenosti, ki je sovisna. To pomeni, da sta vsaka dva elementa v relaciji  $\leq$ . Natančneje: za vsaka elementa  $a, b \in M$  velja  $a \leq b$  ali  $b \leq a$ . Stroga linearna urejenost je relacija  $(M, <)$ , ki je tranzitivna, sovisna in irefleksivna. Irefleksivnot pomeni, da ne obstaja element  $a \in M$ , za katerega je  $a < a$ .

**Definicija 2.2.** Množico naravnih števil lahko uredimo na naslednji način:

$$3 \triangleright 5 \triangleright 7 \triangleright \dots \triangleright 2 \cdot 3 \triangleright 2 \cdot 5 \triangleright 2 \cdot 7 \triangleright \dots \triangleright 2^2 \cdot 3 \triangleright 2^2 \cdot 5 \triangleright 2^2 \cdot 7 \triangleright \dots \triangleright 2^3 \triangleright 2^2 \triangleright 2 \triangleright 1.$$

Ureditev, imenujemo jo ureditev Šarkovskega, določa relacijo  $(\mathbb{N}, \triangleright)$ , ki ji pravimo relacija Šarkovskega. Naravni števili  $m$  in  $n$  sta v relaciji  $m \triangleright n$  (ali  $n \triangleleft m$ ) natanko tedaj, ko  $m$  leži levo od  $n$  ali je  $m = n$ . Opazimo, da je ureditev sestavljena tako, da najprej po vrsti naštejemo liha števila večja od 1, nato dodamo ta števila po vrsti pomnožena z 2. Sledijo liha števila večja od 1 pomnožena z  $2^2$  itn. Na koncu so zapisane potence števila 2 v padajočem vrstnem redu. Zaradi vrstnega reda števil pomislimo, da lahko vsako naravno število zapišemo kot produkt potence števila 2 in nekega lihega števila. To pomeni, da lahko poljubni naravni števili  $m$  in  $n$  zapišemo na naslednji način:

$$(1) \quad m = 2^k(2m_1 + 1) \text{ in } n = 2^l(2n_1 + 1),$$

kjer so števila  $m_1, n_1, k, l \in \mathbb{N}_0$ . Števili sta v relaciji  $m \triangleright n$ , če je izpolnjen en od naslednjih pogojev:

- (R1)  $k < l$  in  $m_1 \neq 0$  in  $n_1 \neq 0$  ali
- (R2)  $k = l$  in  $0 < m_1 \leq n_1$  ali
- (R3)  $k \geq l$  in  $m_1 = n_1 = 0$  ali
- (R4)  $m_1 > 0$  in  $n_1 = 0$ .

**Trditev 2.3.** Relacija  $(\mathbb{N}, \triangleright)$ , ki smo jo definirali, je relacija linearne urejenosti.

*Dokaz.* Za dokaz potrebujemo tri poljubna naravna števila, ki jih zapišemo na zgoraj opisan način:

- $m = 2^k(2m_1 + 1)$ ,
- $n = 2^l(2n_1 + 1)$  in
- $s = 2^h(2s_1 + 1)$ .

Dokazati moramo refleksivnost, antisimetričnost, tranzitivnost in sovisnost relacije. Refleksivnost: če je število  $m$  potenca števila 2, točka (R3) zagotavlja, da je  $m \triangleright m$ . Če število  $m$  ni potenca števila 2, pa relacija  $m \triangleright m$  sledi iz točke (R2).

Antisimetričnost: denimo, da za števili  $m$  in  $n$  veljata relaciji  $m \triangleright n$  in  $n \triangleright m$ . Pogoja (R1) in (R4) za relacijo  $m \triangleright n$  sta v protislovju z vsemi pogoji relacije  $n \triangleright m$ . Edina možnost, ki zadosti vsem potrebnim pogojem relacij je  $k = l$  in  $m_1 = n_1$ . Torej je  $m = n$ .

Tranzitivnost: obravnavamo števila  $m$ ,  $n$  in  $s$ , ki zadoščajo relacijam  $m \triangleright n$  in  $n \triangleright s$ . Radi bi videli, ali sta števili  $m$  in  $s$  v relaciji  $m \triangleright s$ . Ker imamo 4 pogoje za relacijo  $m \triangleright n$  in 4 pogoje za relacijo  $n \triangleright s$ , moramo obravnavati 16 možnih kombinacij. Vse kombinacije pogojev za relacije so zapisane v tabeli 1. V drugem stolpcu so zapisani pogoji, ki jih dobimo iz relacije  $m \triangleright n$ , v tretjem stolpcu so pogoji, ki jih preberemo iz relacije  $n \triangleright s$ . V četrtem stolpcu je zapisan pogoj, ki sledi iz pogojev v drugem in tretjem stolpcu. Opazimo, da v devetih primerih pogoja ne moreta biti izpolnjena istočasno, zato pridemo do protislovja. V ostalih primerih, pa dobimo enega od pogojev za relacijo  $m \triangleright s$ , zato sta števili  $m$  in  $s$  v relaciji  $m \triangleright s$ .

	$m \triangleright n$	$n \triangleright s$	$\Rightarrow$
1	$k < l$ in $m_1, n_1 \neq 0$	$l < h$ in $n_1, s_1 \neq 0$	$k < h$ in $m_1, s_1 \neq 0$
2	$k < l$ in $m_1, n_1 \neq 0$	$l = h$ in $0 < n_1 \leq s_1$	$k < h$ in $m_1, s_1 \neq 0$
3	$k < l$ in $m_1, n_1 \neq 0$	$l \geq h$ in $n_1 = s_1 = 0$	protislovje
4	$k < l$ in $m_1, n_1 \neq 0$	$n_1 = 0, s_1 > 0$	$m_1 = 0, s_1 > 0$
5	$k = l$ in $0 < m_1 \leq n_1$	$l < h$ in $n_1, s_1 \neq 0$	protislovje
6	$k = l$ in $0 < m_1 \leq n_1$	$l = h$ in $0 < n_1, s_1$	$k = h$ in $0 < m_1 \leq s_1$
7	$k = l$ in $0 < m_1 \leq n_1$	$l \geq h$ in $n_1 = s_1 = 0$	protislovje
8	$k = l$ in $0 < m_1 \leq n_1$	$k < l$ in $n_1 = 0, s_1 > 0$	$m_1 = 0, s_1 > 0$
9	$k \geq l$ in $m_1 = n_1 = 0$	$l < h$ in $n_1, s_1 \neq 0$	protislovje
10	$k \geq l$ in $m_1 = n_1 = 0$	$l = h$ in $0 < n_1, s_1$	protislovje
11	$k \geq l$ in $m_1 = n_1 = 0$	$l \geq h$ in $n_1 = s_1 = 0$	$k \geq h$ in $m_1 = s_1 = 0$
12	$k \geq l$ in $m_1 = n_1 = 0$	$k < l$ in $n_1 = 0, s_1 > 0$	protislovje
12	$m_1 = 0, n_1 > 0$	$l < h$ in $n_1, s_1 \neq 0$	protislovje
14	$m_1 = 0, n_1 > 0$	$l = h$ in $0 < n_1, s_1$	protislovje
15	$m_1 = 0, n_1 > 0$	$l \geq h$ in $n_1 = s_1 = 0$	$m_1 = 0, s_1 > 0$
16	$m_1 = 0, n_1 > 0$	$k < l$ in $n_1 = 0, s_1 > 0$	protislovje

TABELA 1. ~~Vseh 16 možnosti.~~

Vseh 16 možnosti, ki jim lahko zadoščajo naravna števila  $m, n$  in  $s$ .

Sovisnost: prepričati se moramo, da za vsaki dve naravni števili  $m, n$  velja  $m \triangleright n$  ali  $n \triangleright m$ . Torej velja en od pogojev:

- (i)  $k < l$  in  $m_1 \neq 0$  in  $n_1 \neq 0$  ali
- (ii)  $k = l$  in  $0 < m_1 \leq n_1$  ali
- (iii)  $k \geq l$  in  $m_1 = n_1 = 0$  ali
- (iv)  $m_1 > 0$  in  $n_1 = 0$

ali

- (v)  $l < k$  in  $m_1 \neq 0$  in  $n_1 \neq 0$  ali

- (vi)  $l = k$  in  $0 < n_1 \leq m_1$  ali
- (vii)  $l \geq k$  in  $m_1 = n_1 = 0$  ali
- (viii)  $n_1 > 0$  in  $m_1 = 0$ .

$$\forall m \neq 0 \text{ in } \forall n \neq 0$$

Denimo, da števili  $m$  in  $n$  nista v relaciji. Iz (iv) in (viii) ugotovimo, da mora biti  $m_1 = n_1 = 0$  ali  $m_1, n_1 \neq 0$ . Ker števili ne ustrezata pogoju (iii) niti pogoju (vii) ugotovimo, da morata biti števili  $m_1$  in  $n_1$  različni od 0. Iz pogojev (i) in (v) sklepamo, da mora biti  $k = l$ . Sedaj pa števili zagotovo zadoščata enemu od pogojev (ii) ali (vi). To je preotislavje s predpostavko, da števili  $m$  in  $n$  nista v relaciji. Torej res za vsaki dve naravni števili  $m, n$  velja relacija  $m \triangleright n$  ali relacija  $n \triangleright m$ .  $\square$

Relacija  $\triangleright$  ima še eno zanimivo in za dokaz izreka Šarkovskega zelo pomembno lastnost.

**Trditev 2.4.** Števili  $m$  in  $n$  sta v relaciji  $m \triangleright n$  natanko tedaj, ko velja relacija  $2m \triangleright 2n$ . Zapisano z matematičnimi simboli:

$$\text{za } \forall m, n \in \mathbb{N} : m \triangleright n \Leftrightarrow 2m \triangleright 2n.$$

*Dokaz.* Zapišimo števili  $m$  in  $n$  kot produkt potence števila 2 in nekega lihega števila:

$$m = 2^k(2m_1 + 1) \text{ in } n = 2^l(2n_1 + 1).$$

Če števili pomnožimo z 2, dobimo:

$$2m = 2^{k+1}(2m_1 + 1) \text{ in } 2n = 2^{l+1}(2n_1 + 1).$$

Sedaj lahko preverimo, da so pogoji za relacijo  $m \triangleright n$  in relacijo  $2m \triangleright 2n$  ekvivalentni. To je očitno takoj, ko opazimo, da se števili  $m_1$  in  $n_1$  nista spremenili. Neenačbi  $k < l$  in  $k + 1 < l + 1$  pa sta ekvivalentni. Podobno ugotovimo za neenačbi  $k \geq l$  in  $k + 1 \geq l + 1$  ter enačbi  $k = l$  in  $k + 1 = l + 1$ .  $\square$

Sedaj smo definirali vse potrebne pojme in spoznali tudi ureditev Šarkovskega. Čas je, da si pogledamo, na kakšen način ureditev Šarkovskega določa periode funkcije.

**slovenski prevod imena**

**Izrek 2.5** (The Sharkovsky forcing theorem). Če ima zvezna funkcija  $f : I \rightarrow I$  točko periode  $m$  in velja  $m \triangleright l$ , potem obstaja tudi točka periode  $l$ .

Izrek pove, da je množica period zvezne funkcije na intervalu  $I$  rep ureditve Šarkovskega. Rep ureditve Šarkovskega je taka množica  $\mathcal{T} \subseteq \mathbb{N}$ , za katero je  $m \triangleright n$  za vsaki naravni števili  $m \notin \mathcal{T}$  in  $n \in \mathcal{T}$ . Obstajajo trije različni tipi repov: Za neko naravno število  $m$  je rep množica  $\{n \in \mathbb{N}; m \triangleright n\}$ , množica  $\{\dots, 16, 8, 4, 2, 1\}$  vseh potenc števila 2 in  $\emptyset$ .

Naslednji izrek je neke vrste obrat zgornjega izreka.

**slovenski prevod imena**


**Izrek 2.6** (The Sharkovsky realization theorem). Za vsak rep  $\mathcal{T}$  v zaporedju Šarkovskega obstaja taka zvezna funkcija  $f$ , katere množica period je enaka  $\mathcal{T}$ .

Izrek Šarkovskega je unija izreka 2.5 in izreka 2.6. Podmnožica naravnih števil je množica period zvezne funkcije  $f : I \rightarrow I$ , če in samo če je množica rep ureditve Šarkovskega. Nasledja poglavja so namenjena pripravi in dokazu izreka 2.5, v poglavju 8 pa je predstavljen dokaz izreka 2.6.

### 3. INTERVALI, RELACIJA POKRITJA IN CIKLI

Vsi dokazi izreka Šarkovskega so si podobni po tem, da so elementarni. Ne glede na to, kako zvito se lotimo dokaza, je ključnega pomena lastnost zveznih funkcij, ki ob določenih predpostavkah zagotavlja obstoj ničle funkcije. To je izrek o vmesni vrednosti.

**Izrek 3.1** (izrek o vmesni vrednosti). *Funkcija  $f$ , ki je zvezna na intervalu  $[a, b]$  in je na krajiščih intervala različno predznačena, torej velja neenačba  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , ima vsaj v eni točki tega intervala vrednost 0.*



SLIKA 2. Zvezna funkcija, ki je definirana na intervalu in je na krajših intervala različno predznačena ima vsaj eno ničlo.

*Dokaz.* Naj bo funkcija  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  zvezna in naj bo  $f(a) \cdot f(b) < 0$ . Brez izgube splošnosti lahko predpostavimo, da je  $f(a) < 0 < f(b)$ . Ničlo funkcije  $f$  bomo iskali s pomočjo deljenja intervalov oziroma z bisekcijo. Izračunamo razpolovišče  $p_0 = \frac{a+b}{2}$  intervala  $[a, b]$ . Če je  $f(p_0) = 0$ , smo ničlo že našli, sicer razmišljamo tako: če je  $f(p_0) > 0$ , označimo  $[a_1, b_1] = [a, p_0]$ , sicer označimo  $[a_1, b_1] = [p_0, b]$ . Nato izračunamo razpolovišče  $p_1$  intervala  $[a_1, b_1]$ . Če je  $f(p_1) = 0$  postopek ustavimo, saj smo ničlo našli, v nasprotnem primeru pogledamo predznak  $f(p_1)$ . Če je  $f(p_1) > 0$ , označimo  $[a_2, b_2] = [a_1, p_1]$ , drugače označimo  $[a_2, b_2] = [p_1, b_1]$ . Postopek nadaljujemo dokler ne najdemo ničle  $p_i$  funkcije  $f$ . Če ničle ne najdemo, dobimo neskončno zaporedje vloženih intervalov

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots$$

Lahko se prepričamo, da je  $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$  in  $f(a_n) < 0 < f(b_n)$  za vsak  $n \in \mathbb{N}$ . Števila  $a_n$  tvorijo naraščajoče zaporedje, števila  $b_n$  pa padajoče zaporedje. Limiti  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  in  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$  sta enaki, saj je  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$ . Označimo  $c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ . Točka  $c$  je večja od vseh členov zaporedja  $(a_n)_{n=1}^\infty$  in manjša od vseh členov zaporedja  $(b_n)_{n=1}^\infty$ , zato je za vsak  $n \in \mathbb{N}$  vsebovana v intervalu  $[a_n, b_n]$ . Torej velja:  $\bigcap_{n=1}^\infty [a_n, b_n] = \{c\}$ . Ker je funkcija zvezna, je  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) = f(c)$  in  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right) = f(c)$ . Za vsako naravno število  $n$



velja  $f(a_n) < 0$ , zato je  $f(c) \leq 0$ . Podobno je  $f(b_n) > 0$  za vsako naravno število  $n$ , iz česar sklepamo, da je  $f(c) \geq 0$ . Torej je  $f(c) = 0$ , kar zaključni dokaz.  $\square$

**Posledica 3.2.** Naj bo  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  zvezna funkcija. Za vsako točko  $y$ , ki leži med točkama  $f(a)$  in  $f(b)$ , obstaja točka  $c \in (a, b)$ , za katero je vrednost funkcije  $f(c)$  enaka  $y$ .

*Dokaz.* Definiramo zvezno funkcijo  $g(x) = f(x) - y$ . Ker točka  $y$  leži med točkama  $f(a)$  in  $f(b)$ , je funkcija  $g$  na krajišjih intervala  $[a, b]$  različno predznačena. Po izreku 3.1 obstaja točka  $c$ , za katero je  $g(c) = 0$ . To pomeni, da je  $f(c) = y$ .  $\square$

Posledica pove, da zvezna funkcija na intervalu  $[a, b]$  zavzame vse vrednosti med  $f(a)$  in  $f(b)$ . V resnici pove še več. Naj bosta  $[a, b]$  in  $[c, d]$  intervala v realnih številih in  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  zvezna funkcija. Če obstajata taki točki  $a_1, b_1 \in [a, b]$ , za kateri velja  $f(a_1) \leq c$  in  $f(b_1) \geq d$ , potem interval  $[c, d]$  leži v sliki  $f([a, b])$ . To je res, saj funkcija  $f$  na intervalu  $[a_1, b_1]$  zavzame vse vrednosti med  $f(a_1)$  in  $f(b_1)$ . Torej,  $[c, d] \subseteq f([a_1, b_1]) \subseteq f([a, b])$ .

**Definicija 3.3.** Naj bosta  $I, J \subseteq \mathbb{R}$  in naj bo  $f : I \rightarrow J$  zvezna funkcija. Pravimo, da interval  $I$   $f$ -pokrije interval  $J$ , če je  $J \subseteq f(I)$ . Relacijo zapišemo kot  $I \xrightarrow{f} J$ . Kadar je jasno, katero funkcijo imamo v mislih, lahko rečemo samo, da interval  $I$  pokrije interval  $J$ . V tem primeru, lahko nadpis, ki označi katero funkcijo imamo v mislih izpustimo in pišemo samo  $I \rightarrow J$ . Če velja  $f(I) = J$ , zapišemo  $I \rightarrowtail J$ .

S pomočjo izreka o vmesni vrednosti in poznavanja, kako se intervali slikajo s funkcijo  $f$ , lahko izvemo, ali obstajajo periodične točke. Kako potrdimo obstoj periodičnih točk, nam povejo naslednje leme.


**Lema 3.4.** Če velja  $[a, b] \xrightarrow{f} [a, b]$ , potem ima funkcija  $f$  negibno točko na intervalu  $[a, b]$ .

*Dokaz.* Interval  $[a, b]$  je podmnožica slike  $f([a, b])$ , zato obstajata taki točki  $a_1, b_1 \in [a, b]$ , da je  $f(a_1) = a$  in  $f(b_1) = b$ . Če je  $a_1 = a$  ali  $b_1 = b$ , smo negibno točko že našli. Če je  $a_1 \neq a$  in  $b_1 \neq b$ , definiramo funkcijo  $g(x) = f(x) - x$ . Prepričajmo se, da je vrednost funkcije  $g$  v točki  $a_1$  negativna, v točki  $b_1$  pa pozitivna. Računamo:  $g(a_1) = f(a_1) - a_1 = a - a_1 < 0$ . Podobno je  $g(b_1) = f(b_1) - b_1 = b - b_1 > 0$ . Zvezna funkcija  $g$  je na krajišjih intervala  $[a, b]$  različno predznačena. Po izreku 3.1 obstaja točka  $c \in [a, b]$ , pri kateri je  $g(c) = 0$ , torej je  $f(c) = c$ .  $\square$

Pri iteracijah funkcije lahko opazujemo, kako se premika točka. To smo počeli na sliki 1. Poglejmo, kako se s  $f$  slikajo celi intervali. Lahko se zgodi, da nek interval  $I_0$  pokrije interval  $I_1$ , interval  $I_1$  pa pokrije interval  $I_2$  itn. Na ta način dobimo zaporedje relacij pokritja npr.  $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow \dots$ . Enako kot pri periodičnih točkah lahko pri zaporedju relacij pokritja po nekaj korakih zopet pridemo do prvotnega intervala. Dobimo naslednje zaporedje relacij pokritja:  $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_n \rightarrow I_0$ . Če je začetni interval enak končnemu intervalu, zaporedju intervalov in pripadajočim relacijam pokritja pravimo *zanka intervalov* ali samo *zanka*. Od tu naprej bo, razen če ne povemo drugače, interval predstavljal zaprto, omejeno in povezano podmnožico realnih števil.

**Lema 3.5.** Naj bosta  $I, J$  zaprti intervala v realnih številih in naj bo  $f : I \rightarrow J$  zvezna funkcija. Če je  $J \subseteq f(I)$ , obstaja zaprt interval  $K \subseteq I$ , za katerega je  $f(K) = J$ .

*Dokaz.* Interval  $K$  poiščemo tako, da iz preseka funkcije  $f$  s pravokotnikom  $I \times J$  izberemo povezan del grafa, ki povezuje spodnji in zgornji del pravokotnika. Funkcija z izbiro dela grafa je prikazana na sliki 3. Tak del zagotovo obstaja, saj je  $J \subseteq f(I)$ . Projekcijo tega dela na interval  $I$  označimo s  $K$ .  $\square$



SLIKA 3. Slika prikazuje, kako poiščemo interval  $K$ .

**Lema 3.6.** Če za intervale  $I_0, I_1, \dots, I_{n-1}$  veljajo naslednje relacije pokritosti:  $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$ , potem obstaja taka točka  $c \in I_0$ , za katero je  $f^i(x) \in I_i$  za  $0 \leq i < n$  in  $f^n(c) = c$ . Pravimo, da točka  $c$  sledi zanki  $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$ .

*Dokaz.* S pomočjo leme 3.5 in relacije pokritja  $I_{n-1} \rightarrow I_0$  sklepamo, da obstaja tak interval  $K_{n-1} \subseteq I_{n-1}$ , da je  $K_{n-1} \rightarrow I_0$ . Velja relacija pokritosti  $I_{n-2} \rightarrow K_{n-1}$ , zato obstaja tak interval  $K_{n-2} \subseteq I_{n-2}$ , da je izpolnjena relacija  $K_{n-2} \rightarrow K_{n-1}$ . S postopkom nadaljujemo in dobimo naslednje relacije:

$$K_0 \rightarrow K_1 \rightarrow \dots \rightarrow K_{n-1} \rightarrow I_0.$$

Za vsako točko  $x \in K_0$  in za vsak  $i \in [0, n)$  velja  $f^i(x) \in K_i \subseteq I_i$  in  $f^n(x) \in I_0$ . Ker je  $K_0 \subseteq I_0 = f^n(K_0)$ , lahko s pomočjo leme 3.4 sklepamo, da ima  $f^n$  negibno točko  $c$  na intervalu  $K_0$ . Točka  $c$  sledi zanki  $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$ .  $\square$

Pri dokazovanju izreka bomo dokazali obstoj zank različnih dolžin. Želeli bi si, da je perioda točke, ki sledi zanki, enaka dolžini zanke.

**Definicija 3.7.** Zanka intervalov  $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$  je elementarna, če ima vsaka točka, ki sledi zanki, periodo  $n$ .

**Posledica 3.8.** Vsaka elementarna zanka intervalov  $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$  vsebuje točko  $x_0$ , ki sledi zanki in ima periodo  $n$ .

Zaradi zgornje posledice bi bilo dobro, če bi poznali kakšen kriterij za prepoznavanje elementarnih zank. Najlažji kriterij je število intervalov v zanki. Če nastopa samo en interval, dobimo zanko  $I_0 \rightarrow I_0$ . Z uporabo leme 3.4 ugotovimo, da je zanka elementarna. Naslednja lema poda še en kriterij za prepoznavanje elementarnih zank:

**Lema 3.9.** Zanka intervalov  $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$  je elementarna, če in le če ne sledi nobena robna točka intervala  $I_0$  in je notranjost intervala  $\text{int}(I_0)$  disjunktna z intervali  $I_1, I_2, \dots, I_{n-1}$ . Torej,  $\text{int}(I_0) \cap \bigcup_{i=1}^{n-1} I_i = \emptyset$ .

*Dokaz.* Točka  $x_0$ , ki sledi zanki, ne more biti robna točka intervala  $I_0$ . Torej je  $x_0 \in \text{int}(I_0)$ . Za vsak  $i = 1, \dots, n-1$  je  $x_0 \neq f^i(x_0)$ , saj je  $f^i(x_0) \in I_i$ , notranjost intervala  $I_0$  pa je disjunktna z intervalom  $I_i$ . Ker točka  $x_0$  sledi zanki, je  $f^n(x_0) = x_0$ . Točka  $x_0$  ima periodo  $n$ .  $\square$

Poglejmo si dva primera, ki pokažeta, da nobene predpostavke v lemi 3.9 ne moremo izpustiti.

**Primer 3.10.** Obravnavajmo zvezno funkcijo  $f(x) = -\sqrt[3]{x}$  in 2-zanko intervalov  $[0, \frac{1}{2}] \hookrightarrow [-\frac{1}{2}, 0]$ . Samo ena točka sledi tej zanki, to je točka 0. Perioda točke 0 ni enaka enaki dolžini zanke, saj je točka 0 negibna točka in je njena perioda enaka 1.  $\diamond$

**Primer 3.11.** Funkcija  $f(x) = x^2$  tvori 2-zanko  $[\frac{1}{4}, \frac{9}{4}] \hookrightarrow [\frac{1}{2}, 4]$ . Tej zanki sledi zgolj točka 1, ki je negibna točka, torej je njena perioda različna od dolžine zanke.  $\diamond$

Zanka v primeru 3.10 ni elementarna, saj ji sledi robna točka začetnega intervala. V primeru 3.11 pa zanka ni elementarna, saj točka 1 leži v preseku notranjosti prvega intervala in drugega intervala.

**Definicija 3.12.** Naj bo  $\mathcal{O}$  cikel funkcije  $f$ . Zaprt in omejen interval, katerega krajišči pripadata ciklu  $\mathcal{O}$  imenujemo  $\mathcal{O}$ -interval.

V nadaljevanju bomo zgornje leme uporabili na  $\mathcal{O}$ -intervalih. Tako bomo poenostavili obravnavo periodičnih točk funkcije  $f$ , saj bomo uporabili samo informacije, ki jih lahko pridobimo iz delovanja funkcije  $f$  na ciklu  $\mathcal{O}$ . Zato bodo naši sklepi veljali za vse zvezne funkcije s ciklom  $\mathcal{O}$ . Relaciji pokritja  $I \rightarrow J$  rečemo  $\mathcal{O}$ -vsiljena, če interval  $J$  leži v  $\mathcal{O}$ -intervalu  $M$ , katerega krajišči sta skrajno leva in skrajno desna točka množice  $f(I \cap \mathcal{O})$ . Ker je funkcija  $f$  zvezna, lahko s pomočjo izreka 3.1 ugotovimo, da je množica  $f(I)$  interval. Velja  $J \subseteq M \subseteq f(I)$ . V nadaljevanju dela bodo vse relacije pokritja  $\mathcal{O}$ -vsiljene. Zanka intervalov  $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$ , v kateri vsaka puščica predstavlja  $\mathcal{O}$ -vsiljeno relacijo pokritja, se imenuje  $\mathcal{O}$ -vsiljena zanka  $\mathcal{O}$ -intervalov.

~~Vse relacije pokritja, o katerih bomo govorili od sedaj naprej in jih bomo označevali s simbolom ' $\succ$ ' bodo  $\mathcal{O}$ -vsiljene.~~


#### 4. PRIMERI

V tem poglavju si bomo zaradi lažjega razumevanja pogledali nekaj posebnih primerov. Najprej si bomo pogledali najbolj znan poseben primer izreka Šarkovskega. V naslednjih dveh primerih bomo postopek iz prvega primera razširili na daljše cikle. V zadnjem primeru bomo nakazali, kako lahko iz periodičnih točk funkcije  $f^2$  ugotovimo, katere periode ima funkcija  $f$ , kar igra pomembno vlogo pri dokazu izreka 2.5.

**Primer 4.1** (3-cikel). Prepričajmo se, da perioda 3 implicira obstoj vseh ostalih period. Točka lahko tvori 3-cikel na dva različna načina, ki sta v resnici zrcalna podoba drug drugega. Slika 4 prikazuje oba primera. Črtkane puščice nakazujejo, kam se s funkcijo  $f$  slikajo točke. Velja:

$$x_1 = f(x_0), x_2 = f(x_1) \text{ in } x_0 = f(x_2).$$

V obeh primerih smo z  $I_1$  označili  $\mathcal{O}$ -interval s krajišči  $x_0$  in  $x_1$ , z  $I_0$  pa  $\mathcal{O}$ -interval s krajišči  $x_0$  in  $x_2$ . Krajišči intervala  $I_1$  se slikata v skrajno levo in skrajno desno točko cikla, zato imamo  $\mathcal{O}$ -vsiljeni pokritji  $I_1 \rightarrow I_1$  in  $I_1 \rightarrow I_0$ . Krajišči intervala  $I_0$  se




SLIKA 4. Zrcalna podoba ciklov.

slikata v krajišči intervala  $I_1$ , zato je tudi pokritje  $I_0 \rightarrow I_1$   $\mathcal{O}$ -vsiljeno. Ugotovljena pokritja lahko strnemo v diagram  $\mathcal{C} \ni I_1 \rightleftharpoons I_0$ . Iz relacije pokritosti  $I_1 \rightarrow I_1$  in leme 3.4 sklepamo, da interval  $I_1$  vsebuje negibno točko. Krajišči intervala  $I_0$  ne morejo slediti zanki  $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow I_0$ , saj sta periodični točki s periodo 3. Točke, ki sledijo zanki, pa imajo periodo 1 ali 2. Ker je notranjost intervala  $I_0$  disjunktna z intervalom  $I_1$ , lahko s pomočjo leme 3.9 sklepamo, da je zanka elementarna. Torej lahko v intervalu  $I_0$  poiščemo točko s periodo 2. Za dokaz obstoja točke s periodo  $l \geq 4$  si pogledjmo zanko

$$(2) \quad I_0 \rightarrow \overbrace{I_1 \rightarrow I_1 \rightarrow \cdots \rightarrow I_1}^{l-1 \text{ ponovitev intervala } I_0} \rightarrow I_0.$$

V tej zanki nastopajo vsaj 3 kopije intervala  $I_1$ , v katerem ležita samo dve točki  $\mathcal{O}$ -intervala. Ker imajo točke iz cikla  $\mathcal{O}$  periodo 3, v intervalu  $I_1$  ne morejo ležati trije zaporedni členi iz cikla  $\mathcal{O}$ , torej tudi tri zaporedne iteracije funkcije  $f$  na krajiščih intervala  $I_0$  ne morejo ležati v intervalu  $I_1$ . To pomeni, da krajišči intervala  $I_0$  ne moreta slediti zanki. Že prej smo ugotovili, da je notranjost intervala  $I_0$  disjunktna z intervalom  $I_1$ , zato je zanka (2) elementarna zanka dolžine  $l$ . Elementarna  $l$ -zanka vsebuje točko periode  $l$ , torej ima funkcija  $f$  periodo  $l$  za vsak  $l \geq 4$ . Pokazali smo, da je vsako naravno število perioda funkcije  $f$ .  $\diamond$

**Primer 4.2** (7-cikel). Sedaj bomo obravnavali 7-cikel  $\mathcal{O}$  in  $\mathcal{O}$ -intervale prikazane na sliki 5. Podobno kot pri prejšnjem primeru označimo točke  $x_i = f^i(x_0)$  ter intervale




SLIKA 5. Primer 7-cikla.

$I_1 = [x_0, x_1]$ ,  $I_2 = [x_1, x_2]$  in tako naprej kot prikazuje slika 5. Za ~~to~~ <sup>tako</sup> izbiro intervalov dobimo naslednje  $\mathcal{O}$ -vsiljene relacije pokritosti:

- (1)  $I_1 \rightarrow I_1$
- (2)  $I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow I_3 \rightarrow I_4 \rightarrow I_5 \rightarrow I_0$  vejice in pike
- (3)  $I_0 \rightarrow I_1$ ,  $I_0 \rightarrow I_3$  in  $I_0 \rightarrow I_5$

Zgornje relacije pokritosti lahko prikažemo z grafom, ki ga prikazuje slika 6. Iz grafa preberemo naslednje zanke.

- (1)  $I_1 \rightarrow I_1$  vejice in pike




SLIKA 6. diagram

- (2)  $I_0 \rightarrow I_5 \rightarrow I_1$
- (3)  $I_0 \rightarrow I_3 \rightarrow I_4 \rightarrow I_5 \rightarrow I_0$
- (4)  $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow I_3 \rightarrow I_4 \rightarrow I_5 \rightarrow I_0$
- (5)  $I_0 \rightarrow \underbrace{I_1 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_1}_{r \text{ ponovitev intervala } I_1} \rightarrow I_2 \rightarrow I_3 \rightarrow I_4 \rightarrow I_5 \rightarrow I_0$ , kjer je  $r \geq 3$ .

Zanka  $I_1 \rightarrow I_1$  je elementarna, saj je elementarna vsaka zanka dolžine 1. Pri ostalih zankah lahko najprej ugotovimo, da za vsak  $j \in \{1, 2, \dots, 5\}$  velja  $\text{int}(I_0) \cap I_j = \emptyset$ . Pri zankah (2), (3) in (4) nobena robna točka intervala  $I_0$  ne more slediti zanki, saj je perioda robnih točk 7, perioda točk, ki sledijo zankam (2), (3) in (4) pa je manjša ali enaka 6. S tem so izpolnjeni pogoji leme 3.9 in so zanke elementarne. V teh zankah lahko poiščemo točke s periodami 2, 4, ali 6. Podobno kot v primeru 4.1 ugotovimo, da nobene tri zaporedne iteracije funkcije  $f$  na točkah cikla  $\mathcal{O}$  ne ležijo v intervalu  $I_1$ , zato v tem intervalu tudi ne morejo ležati tri zaporedne iteracije funkcije  $f$  na robnih točkah intervala  $I_0$ . To pomeni, da krajišči intervala  $I_0$  ne sledita zanki (5). S tem razmislekem so izpolnjeni pogoji leme 3.9, zato je zanka (5) elementarna. Za dolžino zanke (5) lahko izberemo katerokoli naravno število večje od 7. Torej lahko na podlagi prisotnosti 7-cikla na sliki 5 sklepamo, da so prisotne vse periode  $l$ , za katere je  $l \triangleleft 7$   $\diamond$

**Primer 4.3** (9-cikel). Predpostavimo, da ima funkcija  $f$  9-cikel  $\mathcal{O}$ , ki je prikazan na sliki 7. Določili smo šest  $\mathcal{O}$ -intervalov  $I_0, I_1, \dots, I_5$ , za katere velja, da je notranjost



SLIKA 7. Primer 9-cikla.

intervala  $I_0$  disjunktna z ostalimi intervali. Torej za  $j = 1, 2, \dots, 5$  velja enakost:  $\text{int}(I_0) \cap I_j = \emptyset$ . Za tako izbrane intervale dobimo enake relacije pokritja kot v

---

~~3 kol~~ je  
vejica




## Primer 0 ailele

vejica

pa





SLIKA 9. Primer 6-cikla.

$I_1 \xrightarrow{f^2} I_0$  in  $I_0 \xrightarrow{f^2} I_1$  za intervala  $I_0$  in  $I_1$ , ki sta prikazana na sliki 9. Enako kot prej lahko zaključimo, da ima funkcija  $f^2$  elementarne zanke vseh dolžin in zato je vsako naravno število  $l \in \mathbb{N}$  perioda funkcije  $f^2$ . Za funkcijo  $f$  določimo še dva intervala. Interval  $I'_0$  naj bo najkrajši  $\mathcal{O}$ -interval, ki vsebuje točke iz množice  $f(I_0 \cup \mathcal{O})$ , interval  $I'_1$  pa naj bo najkrajši  $\mathcal{O}$ -interval, ki vsebuje točke iz množice  $f(I_1 \cup \mathcal{O})$ . Sedaj bomo prikazali rekurzivno metodo, ki jo bomo uporabili kasneje v dokazu izreka Šarkovskega. Pokazali bomo, kako lahko s pomočjo elementarne  $k$ -zanke za funkcijo  $f^2$  poiščemo elementarno  $2k$ -zanko za funkcijo  $f$ . V primeru, ki ga obravnavamo, bo to pomenilo, da je vsako sodo naravno število perioda funkcije  $f$ . Poglejmo si elementarno  $k$ -zanko za funkcijo  $f^2$ , v kateri nastopajo relacije pokritja  $I_1 \xrightarrow{f^2} I_1$ ,  $I_1 \xrightarrow{f^2} I_0$  in  $I_0 \xrightarrow{f^2} I_1$ . Vsak zapis  $I_1 \xrightarrow{f^2}$  v zanki lahko zamenjamo z  $I_1 \xrightarrow{f} I'_1 \xrightarrow{f}$ , vsak zapis  $I_0 \xrightarrow{f^2}$  pa z  $I_0 \xrightarrow{f} I'_0 \xrightarrow{f}$ . S to spremembo dobimo  $2k$ -zanko za funkcijo  $f$ , ki ni samo dvakrat ponovljena  $k$ -zanka. Prepričajmo se, da je  $2k$ -zanka elementarna. Denimo, da točka  $p$  sledi  $2k$ -zanki za funkcijo  $f$ . Pokazati moramo, da ima periodo  $2k$  za funkcijo  $f$ . Opazimo, da točka  $p$  sledi prvotni  $k$ -zanki za funkcijo  $f^2$  in ima zato periodo  $k$  za funkcijo  $f^2$ . Po drugi strani pa iteracije točke  $p$  s funkcijo  $f$  ležijo alternirajoče enkrat na levi in enkrat na desni strani srednjega intervala, saj  $2k$ -zanka za  $f$  alternira med intervali s črtico in intervali brez črtice. Zato je orbita točke  $p$  sestavljena iz  $2k$  različnih točk. Na desni strani srednjega intervala leži  $k$  sodih iteracij, na levi strani pa leži  $k$  lihih iteracij. To pomeni, da je perioda točke  $p$  za  $f$  enaka  $2k$ . Ker smo dolžino začetne elementarne  $k$ -zanke izbrali poljubno, smo pokazali, da je vsako sodo število perioda za  $f$ . Ker interval  $[x_0, x_1]$  s funkcijo  $f$  pokrije samega sebe, pa obstaja negibna točka. Torej ima  $f$  tudi periodo 1.  $\diamond$

## 5. ŠTEFANOVO ZAPOREDJE

V tem poglavju bomo podali definicijo Štefanovega zaporedja točk. Pokazali bomo, da te točke določajo intervale, s pomočjo katerih lahko zapišemo relacije pokritja in ustrezne zanke, ki zagotavljajo obstoj periodičnih točk. Če  $f$ -orbita vsebuje samo eno točko, je ta točka fiksna točka funkcije  $f$ . Perioda te točke je 1, kar je zadnji člen ureditve Šarkovskega in pri tej orbiti nimamo kaj dokazovati. Zato bomo obravnavali samo orbite oziroma cikle, ki vsebujejo vsaj dve točki. Naj bo  $m \geq 2$  in  $\mathcal{O}$   $m$ -cikel zvezne funkcije  $f$ . Preden definiramo Štefanovo zaporedje, moramo spoznati nekaj pojmov.

pregledal do tukaj: 25. 8. 2023

**Definicija 5.1.** Naj bo  $p$  najbolj desna točka  $m$ -cikla  $\mathcal{O}$ , za katero je  $f(p) > p$  in  $q \in \mathcal{O}$  prva točka desno od  $p$ . Center  $c$  cikla  $\mathcal{O}$  definiramo kot  $c = \frac{p+q}{2}$ . Za vsako točko  $x \in \mathcal{O}$  označimo množico točk iz cikla  $\mathcal{O}$ , ki ležijo v zaprtem intervalu omejenem z  $x$  in  $c$  z  $\mathcal{O}_x$ . Natančneje,  $\mathcal{O}_x = \mathcal{O} \cap [x, p]$ , če je  $x \leq p$  in  $\mathcal{O}_x = \mathcal{O} \cap [q, x]$ ,



velja  $x < c < f(x)$  ali  $f(x) < c < x$ .

če je  $x \geq q$ . Pravimo, da točka  $x \in \mathcal{O}$  med točkama  $p$  in  $q$  leži med točkama  $x$  in  $f(x)$ .

Poglejmo si definicijo Štefanovega zaporedja.

**Definicija 5.2.** Iz  $m$ -cikla  $\mathcal{O}$  izbrane točke  $x_0, x_1, \dots, x_n$  tvorijo Štefanovo zaporedje, če je:

- (Š1)  $\{x_0, x_1\} = \{p, q\}$ ,
- (Š2) točke  $x_0, x_1, \dots, x_n$  ležijo alternirajoče na levi oziroma desni strani točke  $c$ ,
- (Š3) zaporedji  $\{x_{2j}\}_{j=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$  in  $\{x_{2j+1}\}_{j=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$  sta strogo monotoni in se oddaljujejo od točke  $c$ ,
- (Š4) če je  $0 \leq j \leq n-1$ , potem  $x_j$  menja strani in  $x_{j+1} \in \mathcal{O}_{f(x_j)}$ ,
- (Š5) točka  $x_n$  ne menja strani.

**Opomba 5.3.** Štefanovo zaporedje dobimo tako, da iz množice  $m$  točk, ki tvorijo  $\mathcal{O}$ -cikel izberemo  $n+1$  točk, ki zadoščajo zgornjim pogojem. Pogoj  $x_{j+1} \in \mathcal{O}_{f(x_j)}$  v (Š4) pomeni, da je točka  $x_{j+1}$  bližje centru kot slika  $f(x_j)$  točke  $x_j$ . Velja ena od neenakosti:  $c < x_{j+1} \leq f(x_j)$  ali  $f(x_j) \leq x_{j+1} < c$ . Pogoja (Š2) in (Š3) zagotavljata, da so točke  $x_0, x_1, \dots, x_n$  paroma različne. Če sledimo točkam na način, ki je opisan v primeru 4.3, dobimo spiralo, zato za točke, ki ustrezajo pogojema (Š2) in (Š3) rečemo, da se spiralno oddaljujejo od centra  $c$ . Ker lahko pri izbiri točk iz cikla  $\mathcal{O}$  kakšno točko izpustimo, je število  $n+1$  izbranih točk manjše ali enako številu vseh točk v  $\mathcal{O}$ -ciklu. Velja torej neenakost  $n+1 \leq m$ . Če se vrnemo na primere iz prejšnjega poglavja, lahko vidimo, da v primerih 4.1, 4.2 in 4.4 Štefanovo zaporedje sestavljajo vse točke  $\mathcal{O}$ -cikla. V primeru 4.3 pa dve točki  $\mathcal{O}$ -cikla ne nastopata v Štefanovem zaporedju.

**Trditev 5.4.** Predpostavimo, da  $m$ -cikel  $\mathcal{O}$  vsebuje Štefanovo zaporedje. Če je  $l \leq m$ , potem funkcija  $f$  vsebuje  $\mathcal{O}$ -vsiljeno elementarno  $l$ -zanko  $\mathcal{O}$ -intervalov in posledično tudi periodično točko s periodo  $l$ .

Pri danem Štefanovem zaporedju  $x_0, x_1, \dots, x_n$  definiramo intervale  $I_0, I_1, \dots, I_{n-1}$  na nasledni način: Za  $1 \leq j < n$ , najkrajši  $\mathcal{O}$ -interval, ki vsebuje točke  $x_0, x_1$  in  $x_j$ , označimo z  $I_j$ , medtem ko z  $I_0$  označimo  $\mathcal{O}$ -interval s krajišči  $x_{n-2}$  in  $x_n$ . Iz lastnosti (Š2) lahko sklepamo, da je  $\text{int}(I_0) \cap I_j = \emptyset$  za vsak  $j \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ .

**Trditev 5.5.** Za intervale izbrane na zgoraj opisan način veljajo naslednje relacije pokritja:


- (1)  $I_1 \rightarrow I_1$  in  $I_0 \rightarrow I_1$ ,
- (2)  $I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$ ,
- (3)  $I_0 \rightarrow I_{n-1}, I_{n-3}, I_{n-5} \dots$

Zaradi boljše predstave ponazorimo relacije pokritja na sliki 10.

**Dokaz trditve 5.5.** Dokazovali bomo vsako točko posebej.

Pri dokazu točke (1) bomo dokazali še močnejšo trditev, ki nam bo v pomoč tudi pri dokazu druge točke. Pokazali bomo, da za vsak  $j = 0, 1, \dots, n-1$  velja relacija pokritja  $I_j \rightarrow I_1$ . Za dokaz je dovolj, če se prepričamo, da za vsak  $j = 0, 1, \dots, n-1$  množica  $f(I_j)$  vsebuje točki  $x_0$  in  $x_1$ . To je res, saj posledica 3.2 zagotavlja, da so v množici  $f(I_j)$  vsebovane tudi vse točke iz intervala  $(x_0, x_1)$ . V primeru intervala  $I_0 = [x_n, x_{n-2}]$  ugotovimo, da obe krajišči  $I_0$  ležita na isti strani točke  $c$ . Lastnost





SLIKA 10. Relacije pokritja v trditvi 5.5 lahko prikažemo z grafom.

(Š4) pove, da krajišče  $x_{n-2}$  menja strani, medtem ko lastnost (Š5) pravi, da točka  $x_n$  ne menja strani, zato točki  $f(x_n)$  in  $f(x_{n-2})$  ležita na nasprotnih straneh točke  $c$ . V primeru intervala  $I_j$  za  $j = 1, 2, \dots, n-1$  iz lastnosti (Š2) izvemo, da krajišči intervala  $I_j$  ležita na nasprotnih straneh točke  $c$ . Lastnost (Š4) pove, da obe krajišči menjata strani. Torej za vsak  $j = 0, 1, \dots, n-1$  interval  $f(I_j)$  vsebuje točke cikla  $\mathcal{O}$ , ki ležijo na obeh straneh centra  $c$ . Zagotovo vsebuje točki  $x_0$  in  $x_1$  in zato tudi interval  $I_1$ .

Naj bo  $j$  tako naravno število, za katerega velja  $1 \leq j \leq n-1$ . Želimo pokazati, da množica  $f(I_j)$  vsebuje interval  $I_{j+1}$ . Vemo že, da interval  $f(I_j)$  vsebuje točki  $x_0$  in  $x_1$ . Za dokaz točke (2) moramo pokazati samo še vsebovanost točke  $x_{j+1}$  v množici  $f(I_j)$ . Podobno kot prej posledica 3.2 zagotavlja, da je v množici  $f(I_j)$  vsebovan celoten interval  $I_{j+1}$ . V množici  $f(I_j)$  so vsebovane točke  $x_0, x_1$  in  $f(x_j)$ , zato je v tej množici vsebovana tudi množica točk  $\mathcal{O}_{f(x_j)}$ . Iz lastnosti (Š3) ugotovimo točka  $x_{j+1}$  leži v množici  $\mathcal{O}_{f(x_j)}$ , zato velja  $x_{j+1} \in \mathcal{O}_{f(x_j)} \subseteq f(I_j)$ . Torej je interval  $I_{j+1}$  res vsebovan v množici  $f(I_j)$ .

Za dokaz točke (3) moramo pokazati, da je za vsako liho število  $1 \leq l \leq n$  interval  $I_{n-l}$  vsebovan v množici  $f(I_0)$ . Ker že vemo, da  $f(I_0)$  vsebuje točki  $x_0$  in  $x_1$ , preostane za dokazati še, da vsebuje točko  $x_{n-l}$ . Zaradi lastnosti (Š2) leži točka na drugi strani točke  $c$  kot točki  $x_{n-2}$  in  $x_n$ . Iz lastnosti (Š3) sklepamo, da je točka  $x_{n-1}$  bolj oddaljena od točke  $c$ , kot točka  $x_{n-l}$  za liho število  $3 \leq l \leq n$  interval  $I_{n-l}$ , zato vsak interval, ki vsebuje točke  $x_0, x_1$  in  $x_{n-1}$ , vsebuje tudi vse točke  $x_{n-l}$ . Pokazati moramo samo še, da množica  $f(I_0)$  vsebuje točko  $x_{n-1}$ . Pri lastnosti (Š4) namesto  $j$  pišemo  $n-2$  in dobimo vsebovanost  $x_{n-1} \in \mathcal{O}_{f(x_{n-2})}$ . Interval  $f(I_n)$  vsebuje točke  $x_0, x_1$  in  $f(x_j)$ , kar zaključí dokaz trditve 5.5.  $\square$

za vsako naravno število  $l$ , za katero velja  $l < m$ .

**Dokaz trditve 5.4.** Naj veljajo predpostavke v trditvi 5.4. Radi bi pokazali, da ima funkcija  $f$  za vsako naravno število  $l < m$  točko periode  $l$ . Dokaz bomo razdelili na tri dele. Najprej bomo dokazali izrek za liha števila manjša od  $m$ , potem za soda števila manjša od  $m$  in na koncu še za vsa števila večja od  $m$ . Pri dokazu si bomo pomagali z naslednjimi zankami, ki jih preberamo s slike 10:

1. kaj pa d/le?

- (Z1)  $I_1 \rightarrow I_1$ ,  
 (Z2)  $I_0 \rightarrow I_{n-(l-1)} \rightarrow I_{n-(l-2)} \rightarrow \cdots \rightarrow I_{n-2} \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$  za sodo število  $l \leq n$ ,  
 (Z3)  $I_0 \rightarrow \underbrace{I_1 \rightarrow I_1 \rightarrow \cdots \rightarrow I_1}_{l-n+1 \text{ ponovitev intervala } I_1} \rightarrow I_2 \rightarrow \cdots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_0$  za  $l \geq n$ .

Edino liho število  $l$  manjše od  $m$ , za katerega lahko velja  $l \triangleleft m$  je število 1. Za  $l = 1$  uporabimo zanko (Z1), ki je zanka dolžine 1 in zato elementarna. Torej obstaja točka periode 1 v intervalu  $I_1$ .

Naravno število  $1 < l \leq m$  je lahko v relaciji  $l \triangleleft m$  samo, če je sodo. Za vsako sodo število  $l \leq n$  uporabimo zanko (Z2). Iz konstrukcije intervalov  $I_0, I_1, \dots, I_n$  vemo, da je notranjost intervala  $I_0$  disjunktna z intervali  $I_{n-(l-1)}, I_{n-(l-2)}, \dots, I_{n-2}, I_{n-1}$ . Krajišči intervala  $I_0$  imata periodo  $m$  in zato ne moreta slediti zanki (Z2), katere dolžina je manjša od  $m$ . Z uporabo leme 3.9 ugotovimo, da je zanka (Z2) elementarna, zato obstaja točka iz  $I_0$ , ki ima periodo  $l$ .

V primeru, ko je  $l > n$ , si pomagamo z  $l$ -zanko (Z3). Če je  $l = m$ , potem lahko izberemo poljubno točko iz cikla  $\mathcal{O}$ , saj imajo vse točke iz cikla  $\mathcal{O}$  periodo  $m$ . Predpostavimo, da je  $l \neq m$ . Podobno kot v prejšnjem primeru je notranjost intervala  $I_0$  disjunktna z intervali  $I_1, I_2, \dots, I_{n-1}$ . Pri dokazu, da krajišči intervala  $I_0$  ne sledita zanki (Z3), bomo obravnavali dva primera. Če velja  $n < l < m$ , potem krajišči intervala ne moreta slediti zanki (Z3), saj je njena dolžina manjša od  $m$ , periodo krajišč intervala  $I_0$  pa je  $m$ . Če je  $l > m$  si pogledamo, koliko ponovitev intervala  $I_1$  nastopa v zanki (Z3). Število  $l$  je večje od števila  $m$ . Iz opombe 5.3 lahko preberemo, da je število  $m$  večje od števila  $n + 1$  in naredimo naslednje ocene:

$$l - n + 1 > m - n + 1 \geq n + 1 - n + 1 = 2.$$

Število ponovitev intervala  $I_1$  je večje od 2, kar pomeni, da se v zanki (Z3) interval  $I_1$  pojavi vsaj trikrat. Ker za nobeno točko iz cikla  $\mathcal{O}$  v intervalu  $I_1$  ne ležijo tri zaporedne iteracije, tudi krajišča intervala  $I_0$  ne morejo slediti zanki (Z3). S pomočjo leme 3.9 sklepamo, da je zanka (Z3) elementarna, kar zagotavlja obstoj točke iz intervala  $I_0$ , ki ima periodo  $l$ .  $\square$

Pri pozornem spremljanju dokaza opazimo, da smo dokazali močnejšo trditev.

**Trditev 5.6.** Če  $m$ -cikel  $\mathcal{O}$  vsebuje Štefanovo zaporedje dolžine  $n < m - 1$ , potem ima obstaja periodična točka s periodo 1 (sledi iz zanke (Z1)), točka s sodo periodo  $l \leq n$  (sledi iz zanke (Z2)) in točka s periodo  $l \geq n$  (sledi iz zanke (Z3)).

S pomočjo trditve 5.6 lahko dokažemo tudi obstoj nekaterih periodo  $l$ , kjer je  $l \triangleright m$ . Ekstremen primer dobimo, če je točka  $q$  največja točka intervala  $\mathcal{O}$  in točka  $f(q)$  najmanjša točka intervala  $\mathcal{O}$ . V tem imamo cikel oblike:  $\bullet \cdots \bullet \cdots \bullet$ . Tri prikazane točke tvorijo Štefanovo zaporedje s tremi točkami, torej je  $n = 2$ . Zaporedje zagotavlja obstoj periode 3 in zato obstoj vseh period.

## 6. KONSTRUKCIJA ŠTEFANOVEGA ZAPOREDJA

V tem poglavju bomo pokazali, da lahko v vsakem ciklu, ki vsebuje vsaj dve točki poiščemo Štefanovo zaporedje, razen če vsaka točka v ciklu menja stran. Dokaz bomo izvedli tako, da bomo konstruirali zaporedje in na koncu preverili, da gre za Štefanovo zaporedje.

**Trditev 6.1.** Cikel, ki vsebuje vsaj dve točki, vsebuje Štefanovo zaporedje, če vsaj ena točka ne menja strani.



**Lema 6.2.** Če obstaja taka točka  $x \in \mathcal{S}$ , za katero je  $\sigma^2(x) \in \mathcal{O}_x$ , potem vse točke cikla  $\mathcal{O}$  menjajo stran.

*Dokaz.* Denimo, da je za neko točko  $x \in \mathcal{O}$  točka  $\sigma^2(x)$  dobro definirana in da je vsebovana v množici  $\mathcal{O}_x$ . Potem so dobro definirane vse točke  $x, y := \sigma(x)$  in  $z := \sigma(y) = \sigma^2(x)$ . Da lahko izračunamo  $\sigma(x)$  ali  $\sigma(y)$ , morata točki  $x$  in  $y$  ležati v množici  $\mathcal{S}$ . Točka  $y = \sigma(x)$  je izračunana po pravilu (1) v definiciji preslikave  $\sigma$ , iz česar lahko sklepamo, da velja vsebovanost:

$$f(\mathcal{O}_{f(x)}) \subseteq \mathcal{O}_{f(\sigma(x))} = \mathcal{O}_{f(y)}.$$

Točka  $x$  je vsebovana v množici  $\mathcal{M}$ , zato vse točke iz množice  $\mathcal{O}_x$  menjajo strani. To pomeni, da točka  $z = \sigma(y) \in \mathcal{O}$  menja strani in je izračunana po pravilu (1) v definiciji preslikave  $\sigma$ . Torej tudi točka  $z$  leži v množici  $\mathcal{S}$  in velja vsebovanost:

$$f(\mathcal{O}_{f(y)}) \subseteq \mathcal{O}_{f(\sigma(y))} = \mathcal{O}_{f(z)}.$$

Iz dejstva, da točka  $x$  pripada množici  $\mathcal{S}$ , sklepamo, da se  $x$  s funkcijo  $f$  slika dlje od centra  $c$  kot katera koli druga točka iz množice  $\mathcal{O}_x$ . Točka  $z = \sigma^2(x)$  pripada množici  $\mathcal{O}_x$ , zato točka  $f(z)$  leži bližje centru kot točka  $f(x)$ , kar lahko zapišemo tudi tako:

$$\mathcal{O}_{f(z)} \subseteq \mathcal{O}_{f(x)}.$$

Ugotovili smo, da je slika množice  $\mathcal{O}_{f(x)}$  vsebovana v množici  $\mathcal{O}_{f(y)}$  in da je slika množice  $\mathcal{O}_{f(y)}$  vsebovana v množici  $\mathcal{O}_{f(x)}$ . Ker točki  $x$  in  $y$  ležita na nasprotnih straneh točke  $c$  in ker obe točki menjata strani, tudi točki  $f(x)$  in  $f(y)$  ležita na nasprotnih straneh točke  $c$ . Sklepamo lahko, da sta množici  $\mathcal{O}_{f(x)}$  in  $\mathcal{O}_{f(y)}$  disjunktni in ležita na nasprotnih straneh točke  $c$ . To pomeni, da vse točke iz množice  $\mathcal{O}_{f(x)} \cup \mathcal{O}_{f(y)}$  menjajo strani. Množica  $\mathcal{O}_{f(x)} \cup \mathcal{O}_{f(y)}$  je podmnožica cikla  $\mathcal{O}$ , ki se s funkcijo  $f$  slika nazaj vase. Edina podmnožica cikla  $\mathcal{O}$ , ki se s  $f$  slika nazaj vase, je množica  $\mathcal{O}$ , zato je cikel  $\mathcal{O}$  enak uniji  $\mathcal{O}_{f(x)} \cup \mathcal{O}_{f(y)}$ . To pomeni, da vsaka točka iz cikla  $\mathcal{O}$  menja strani.  $\square$

Za dokončanje dokaza predpostavimo, da obstaja točka iz cikla  $\mathcal{O}$ , ki ne menja strani. Pokažimo, da potem obstaja Štefanovo zaporedje. Če za implikacijo v lemi 6.2 uporabimo pravilo kontrapozicije, dobimo naslednjo izjavo: Če obstaja točka iz cikla  $\mathcal{O}$ , ki ne menja strani, potem ne obstaja točka  $x$ , za katero velja  $\sigma^2(x) \in \mathcal{O}_x$ . To pomeni, da ne moreta biti hkrati izpolnjeni enakosti  $\sigma(p) = q$  in  $\sigma(q) = p$ . Lahko izberemo taki točki  $x_0$  in  $x_1$ , da je  $\{x_0, x_1\} = \{p, q\}$  in  $x_2 := \sigma(x_1) \neq x_0$ . Dokler je  $x_i$  vsebovan v množici  $\mathcal{S}$ , dobimo naslednji člen s predpisom  $x_{i+1} = \sigma(x_i)$ .

Za dokončanje dokaza se moramo prepričati, da tako definirano zaporedje ustreza vsem petim pogojem iz definicije 5.2. Zaradi izbire točk  $\{x_0, x_1\} = \{p, q\}$  zaporedje ustreza pogoju (Š1). Točki  $x_0$  in  $x_1$  ležita na nasprotnih straneh točke  $c$ , ostale točke pa ležijo alternirajoče na levi oziroma desni strani točke  $c$ , saj zaporedni točki  $x_i$  in  $x_{i+1} = \sigma(x_i)$  ležita na nasprotnih straneh. S tem je izpolnjen pogoj (Š2). Za dokaz pogoja (Š3) se moramo prepričati, da se točke v zaporedju spiralno oddaljujejo od centra  $c$ . Začetne točke so bile izbrane tako, da točka  $x_2$  ne leži v množici  $\mathcal{O}_{x_0}$ . Lema 6.2 pokaže, da lahko podoben sklep naredimo tudi za ostale člene zaporedja, velja namreč  $x_{i+2} = \sigma^2(x_i) \notin \mathcal{O}_{x_i}$ . To pa pomeni, da število  $x_{i+2}$  leži bolj stran od točke  $c$  kot število  $x_i$ . Iz tega med drugim sledi, da so členi zaporedja paroma različni. Ker pa ležijo členi zaporedja v končni množici  $\mathcal{O}$ , obstaja končni člen tega zaporedja. Označimo ga z  $x_n$ . Glede na definicijo zaporedja za vsako naravno število  $j < n$  točka  $x_j$  menja stran in velja  $x_{j+1} = \sigma(x_j) \in \mathcal{O}_{f(x)}$ . S tem je izpolnjen tudi

pogoj (Š4). Za izpolnitev pogoja (Š5) se moramo prepričati, da zadnji člen  $x_n$  ne menja strani. Število  $x_n = \sigma(x_{n-1})$  smo dobili s predpisom (2) v definiciji funkcije  $\sigma$ . Če točko  $x_n$  določimo s pomočjo predpisa (1), potem  $x_n$  leži v množici  $\mathcal{S}$ . Točka  $x_n$  menja strani in se slika dlje od točke  $c$  kot katera koli druga točka iz množice  $\mathcal{O}_x$ . Lahko izberemo točko  $x_{n+1} = \sigma(x_n)$  in točka  $x_n$  ni zadnja točka zaporedja, kar je protislovje s predpostavko, da je  $x_n$  zadnja točka zaporedja. Točko  $x_n$  smo zato dobili iz predpisa (2), kar pomeni, da  $x_n$  ne menja strani. S tem je izpolnjena tudi zadnja zahteva (Š5) in je zaporedje  $x_i$  res Štefanovo zaporedje.  $\square$

V lemi 6.2 smo ugotovili, da za naravno število  $m \geq 2$  vsak  $m$ -cikel  $\mathcal{O}$ , ki vsebuje vsaj eno točko, ki ne menja strani, vsebuje Štefanovo zaporedje. V trditvi 5.4 pa smo se prepričali da cikli, ki vsebujejo Štefanovo zaporedje implicirajo obstoj elementarnih  $\mathcal{O}$ -vsiljenih  $l$ -zank za vsak  $l \triangleleft m$ . Dobimo naslednjo trditev:

**Trditev 6.3.** *Naj bo  $m$  naravno število večje od 2. Če  $m$ -cikel vsebuje točko, ki ne menja strani, potem za vsako naravno število  $l$ , za katero velja  $l \triangleleft m$  obstaja elementarna  $\mathcal{O}$ -vsiljena  $l$ -zanka  $\mathcal{O}$ -intervalov in zato tudi točka s periodo  $l$ .*

## 7. DOKAZ IZREKA ŠARKOVskega

V tem poglavju bomo dokazali glavni del izreka Šarkovskega. Vemo že, da izrek velja, če obstaja točka cikla, ki ne menja strani. V primeru, da vse točke menjajo strani, bomo podobno kot v primeru 4.4 cikel razdelili na levo in desno polovico. Vsaka polovica tvori cikel za funkcijo  $f^2$ . Informacijo o ciklih funkcije  $f^2$  bomo nato prenesli na cikle funkcije  $f$ .

**Trditev 7.1.** *Naj bosta  $m$  in  $l$  naravni števili v relaciji  $m \triangleright l$  in naj bo  $\mathcal{O}$   $m$ -cikel. Potem obstaja  $\mathcal{O}$ -vsiljena elementarna  $l$ -zanka  $\mathcal{O}$ -intervalov in posledično točka s periodo  $l$ .*

*Dokaz.* Izrek bomo dokazali s pomočjo indukcije na število  $m$ .

Če je  $m = 1$ , je trditev avtomatično izpolnjena, saj je 1 zadnji člen zaporedja Šarkovskega in edino število  $l$ , za katerega velja  $l \triangleleft 1$  je 1.

Predpostavimo, da izrek velja za vse cikle, katerih dolžina je krajša od  $m$ . Radi bi dokazali, da velja tudi za poljuben  $m$ -cikel  $\mathcal{O}$ . Če obstaja točka iz cikla  $\mathcal{O}$ , ki ne menja strani, potem je po trditvi 6.3 resična tudi trditev 7.1. V nasprotnem primeru vse točke cikla  $\mathcal{O}$  menjajo strani. Označimo najmanjšo točko cikla  $\mathcal{O}$  z  $L$  in največjo točko cikla  $\mathcal{O}$  z  $R$ . Množica  $\mathcal{O}_L$  vsebuje vse točke iz cikla  $\mathcal{O}$ , ki ležijo levo od centra  $c$ , množica  $\mathcal{O}_R$  pa vsebuje vse točke, ki ležijo desno od centra  $c$ . Ker vse točke iz cikla  $\mathcal{O}$  menjajo strani, funkcija  $f$  slika množico  $\mathcal{O}_L$  v množico  $\mathcal{O}_R$  in obratno. Funkcija  $f|_{\mathcal{O}_L}$  je bijekcija iz množice  $\mathcal{O}_L$  v množico  $\mathcal{O}_R$  in funkcija  $f|_{\mathcal{O}_R}$  je bijekcija iz množice  $\mathcal{O}_R$  v množico  $\mathcal{O}_L$ . Ugotovimo, da množici  $\mathcal{O}_L$  in  $\mathcal{O}_R$  vsebujeta enako število točk, zato je število  $m$  sodo in obstaja naravno število  $n$ , za katerega je  $m = 2n$ . Ker je  $m$  sodo število, je lahko neko naravno število  $l$  v relaciji  $l \triangleleft m$  samo, če je  $l = 1$  ali pa je  $l$  sodo število. V drugem primeru obstaja tako naravno število  $k$ , za katerega je  $l = 2k$ . Iz zgornjega razmisleka in iz trditve 2.4 sledi, da je neko naravno število  $l$  v relaciji  $l \triangleleft m$  natanko tedaj, ko je  $l = 1$  ali pa je  $l = 2k$  in je število  $k$  v relaciji  $k \triangleleft n$ . To pomeni, da moramo pokazati, da ima  $f$  elementarno 1-zanko in elementarno  $\mathcal{O}$ -vsiljeno  $2k$ -zanko  $\mathcal{O}$ -intervalov za vsako naravno število  $k$  za katerega velja relacija  $k \triangleleft n$ . Elementarno 1-zanko dobimo s pomočjo intervala  $[p, q]$ . Točka  $p$  je največja točka množice  $\mathcal{O}_L$  in točka  $q$  je

$n$   
 $i=0$

tukaj lahko  
napišem nekaj več.  
koliko členov ima  
štefanovo  
zaporedje? ali je to  
pomembno?

najmanjša točka množice  $\mathcal{O}_R$ . Ker točka  $f(p)$  leži v množici  $\mathcal{O}_R$  in točka  $f(q)$  leži v množici  $\mathcal{O}_L$  dobimo elementarno 1-zanko  $[p, q] \rightarrow [p, q]$ . Pri dokazovanju obstoja  $2k$ -zanke za vsako naravno število  $k$ , ki ustreza relaciji  $k \triangleleft n$ , si bomo pomagali z induksijsko predpostavko. Opazimo, da sta množici  $\mathcal{O}_L$  in  $\mathcal{O}_R$  cikla dolžine  $n$  za funkcijo  $f^2$ . Ker je dolžina obeh ciklov manjša od  $m$ , lahko uporabimo induksijsko predpostavko. Če induksijsko predpostavko uporabimo na ciklu  $\mathcal{O}_R$ , ugotovimo, da za vsako naravno število  $k$ , za katerega je  $k \triangleleft n$ , obstaja elementarna  $\mathcal{O}_R$ -vsiljena  $k$ -zanka  $\mathcal{O}_R$  intervalov za funkcijo  $f^2$ . Pokazati moramo, da te zanke zagotavljajo obstoj elementarnih  $l$ -zank za funkcijo  $f$ . Poglejmo si poljubno elementarno  $k$ -zanko  $\mathcal{O}_R$  intervalov za funkcijo  $f^2$ :

Zapišimo

$$(3) \quad I_0 \xrightarrow{f^2} I_1 \xrightarrow{f^2} I_2 \xrightarrow{f^2} \dots \xrightarrow{f^2} I_{k-1} \xrightarrow{f^2} I_0.$$

Za vsako naravno število  $0 \leq i < k$  označimo najkrajši zaprti interval, ki vsebuje množico  $f(I_i \cap \mathcal{O}) \subseteq \mathcal{O}_L$ , z  $I'_i$ . Intervali  $I'_i$  so  $\mathcal{O}$ -intervali za katere veljajo relacije pokritja  $I_i \xrightarrow{f} I'_i$ . Če interval  $I_0$  označimo z  $I_k$  lahko naradimo naslednji razmislek. Za vsako naravno število  $0 \leq i < k$  lahko zapišemo  $\mathcal{O}_R$ -vsiljene relacije pokritja  $I_i \xrightarrow{f^2} I_{i+1}$ , zato obstajata taki točki  $a_i, b_i \in I_i \cap \mathcal{O}_R$ , da interval  $I_{i+1}$  leži v intervalu omejenim s točkama  $f^2(a_i)$  in  $f^2(b_i)$ . Točki  $a'_i := f(a_i)$  in  $b'_i := f(b_i)$  ležita v množici  $I'_i \cap \mathcal{O}$  in zaprt interval omejen s točkama  $f(a'_i) = f^2(a_i)$  in  $f(b'_i) = f^2(b_i)$  vsebuje interval  $I_{i+1}$ . Dobili smo  $\mathcal{O}$  vsiljeno relacijo pokritja  $I'_i \xrightarrow{f} I_{i+1}$ . S pomočjo zgornjih relacij pokritja lahko zapišemo naslednjo  $\mathcal{O}$ -vsiljeno  $l$ -zanko:

$$(4) \quad I_0 \xrightarrow{f} I'_0 \xrightarrow{f} I_1 \xrightarrow{f} I'_1 \xrightarrow{f} \dots \xrightarrow{f} I_{k-1} \xrightarrow{f} I'_{k-1} \xrightarrow{f} I_0$$

Prepričajmo se, da je zanka (4) elementarna. Naj bo točka  $x$  periodična točka za funkcijo  $f$ , ki sledi zanki (4). Točka  $x$  je periodična točka za funkcijo  $f^2$ , ki sledi zanki (3). Torej, točka  $x$  ima periodo  $k$  za funkcijo  $f^2$ , kar pomeni, da  $k$  točk  $f$ -orbite leži v množici  $\mathcal{O}_R$ . Ker intervali v zanki (4) ležijo izmenično na levi oziroma desni strani točke  $c$ , tudi iteracije točke  $x$  ležijo izmenično na levi oziroma desni strani točke  $c$ . To pomeni, da  $k$  točk, ki predstavljajo lihe iteracije točke  $x$  ležijo v množici  $\mathcal{O}_L$ . Zato orbita točke  $x$  vsebuje  $2k = l$  različnih točk in je tudi periodo točke  $x$  za funkcijo  $f$  enaka  $l$ . Sklepamo, da je zanka (4) elementarna, kar zaključimo dokaz.  $\square$

## 8. DOKAZ REALIZACIJSKEGA IZREK ŠARKOVskega

Daljši in bolj zapleten del dokaza izreka Šarkovskega je za nami. Sedaj moramo dokazati še drugi del, ki pravi:

**Izrek 8.1.** Vsak rep  $\mathcal{T}$  ureditve Šarkovskega je množica period za neko zvezno funkcijo  $f$ , ki slika interval nazaj vase.

*Dokaz.* Izrek bomo dokazali tako, da bomo za vsak rep  $\mathcal{T}$  poiskali funkcijo, katere množica period je enaka repu  $\mathcal{T}$ . Pri iskanju primerne funkcije si bomo pomagali z družino odrezanih šotorskih funkcij:

$$T_h : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$$


$$T_h : x \mapsto \min \left( h, 1 - 2 \left| x - \frac{1}{2} \right| \right)$$



Ekvivalentno in mogoče lažje predstavljivo lahko predpis funkcije  $T_h$  zapišemo na naslednji način:

$$T_h(x) = \min(2x, 2 - 2x, h).$$

Točke, ki imajo za funkcijo  $T_h$  periodo  $n$ , so negibne točke za funkcijo  $T_h^n$ , zato si ~~lahko~~ zaradi lažje predstave na sliki 13 ogledamo funkcije  $T_{0,85}$ ,  $T_{0,85}^2$ ,  $T_{0,85}^3$  in  $T_{0,85}^4$ .



SLIKA 13. Funkcije  $T_{0,85}$ ,  $T_{0,85}^2$ ,  $T_{0,85}^3$  in  $T_{0,85}^4$  in njihova presečišča s simetralo lihih kvadrantov.

v nadaljevanju dokaza bo zelo pomembna...

S slike razberemo


ugotovimo

Pri dokazu bo zelo pomembna funkcija  $T_1$ . Na sliki 14 so prikazane prve štiri iteracije funkcije  $T_1$ . Iz slike preberemo, da ima funkcija  $T_1$  dve presečišči s simetralo lihih kvadrantov in zato tudi dve negibni točki. Funkcija  $T_1^2$  ima 4 negibne točke, funkcija  $T_1^3$  jih ima 8, funkcija  $T_1^4$  pa 16. Opazimo, da funkcija  $T_1^n$  seka simetralo lihih kvadrantov natanko  $2^n$ -krat in ima prav toliko negibnih točk. Funkcija  $T_1$  pa ima po tem razmisleku največ  $2^n$  točk s periodo  $n$ .

Za dokaz izreka bomo najprej pokazali, da obstaja funkcija, ki ima samo periodo 1. To je funkcija  $T_0$ . Za vsak  $x \in [0, 1]$  je vrednost funkcije  $T_0$  enaka 0, zato je 0 tudi edina periodična točka za to funkcijo. Točka 0 je negibna točka, zato je njena perioda enaka 1.

Obravnavajmo funkcijo  $T_1$ . Dokazali bomo, da je vsako naravno število  $n$  perioda funkcije  $T_1$ . To najlažje dokažemo tako, da poiščemo cikel dolžine 3 in s pomočjo izreka 2.5 sklepamo, da ima funkcija  $T_1$  vse periode. Vsaka točka ki ima za funkcijo  $T_1$  periodo 3 je negibna točka funkcije  $T_1^3$ , zato si pogledjmo negibne točke funkcije  $T_1^3$ . Iz grafa razberemo, da ima funkcija  $T_1^3$  osem negibnih točk. Izračunamo lahko, da sta točki 0 in  $\frac{2}{3}$  sta negibni točki funkcije  $T_1$ , točke  $\frac{2}{7}$ ,  $\frac{4}{7}$  in  $\frac{6}{7}$  tvorijo 3-cikel. Prav tako tvorijo 3-cikel točke  $\frac{2}{9}$ ,  $\frac{4}{9}$  in  $\frac{8}{9}$ . S pomočjo izreka 2.5 ugotovimo, da funkcija  $T_1$  vsebuje točke vseh period, saj vsebuje točko periode 3.

Funkciji  $T_1$  in  $T_h$  sta vsaj na nekem delu intervala  $[0, 1]$  enaki, zato pričakujemo, da obstajajo cikli, ki so skupni obema funkcijama. O tem govori naslednja lema:



SLIKA 14. Funkcije  $T_1, T_1^2, T_1^3, T_1^4$  in njihova presečišča s simetralo lihih kvadrantov.

**Lema 8.2.** Za funkciji  $T_1, T_h$  in njune cikle veljata naslednji dve trditvi:

- (1) Če je  $\mathcal{O} \subseteq [0, h]$  cikel za funkcijo  $T_1$ , je tudi cikel za funkcijo  $T_h$ .
- (2) Če je  $\mathcal{O} \subseteq [0, h)$  cikel za funkcijo  $T_h$ , je cikel tudi za funkcijo  $T_1$ .

*Dokaz.* Funkciji  $T_1$  in  $T_h$  se razlikujeta samo v tistih točkah  $x$ , za katere je  $T_1(x) > h$ . V vseh ostalih točkah, sta funkciji enaki. Privzemimo, da je  $\mathcal{O} \subseteq [0, h]$  cikel za funkcijo  $T_1$ . Ker je cikel  $\mathcal{O}$  vsebovan v intervalu  $[0, h]$ , za vsako točko  $x \in \mathcal{O}$  velja  $T_1(x) \leq h$ . Torej velja  $T_1(x) = T_h(x)$ , kar pomeni, da je  $\mathcal{O}$  tudi cikel za funkcijo  $T_h$ . Dokazali smo trditve (1)

Za dokaz trditve (2) prespravimo, da je  $\mathcal{O} \subseteq [0, h)$  cikel za funkcijo  $T_h$ . Torej je za vsako točko  $x$  iz cikla  $\mathcal{O}$  slika  $T_h(x)$  manjša od  $h$ . Velja, da je tudi vrednost  $T_1(x)$  manjša od  $h$ . To pomeni, da sta vrednosti funkcij  $T_1$  in  $T_h$  v  $x$  enaki. Ker to velja za vsako točko cikla  $\mathcal{O}$ , je  $\mathcal{O}$  tudi cikel za funkcijo  $T_1$ .  $\square$

V trditvi (2) polodprtega intervala  $[0, h)$  ne moremo zamenjati z zaprtim intervalom  $[0, h]$ , saj ne moremo narediti sklepa, da iz neenakosti  $T_h(x) \leq h$  sledi neenakost  $T_1(x) \leq h$ . Za primer si lahko pogledamo funkcijo  $T_{\frac{1}{2}}$ , ki ima negibno točko  $\frac{1}{2}$  na intervalu  $[0, \frac{1}{2}]$ , vendar to ni negibna točka funkcije  $T_1$ . Ključna ideja tega dokaza je, da definiramo funkcijo  $h(\cdot)$ :

$$h : \mathbb{N} \rightarrow [0, 1], h(m) := \min\{\max \mathcal{O} : \mathcal{O} \text{ je } m\text{-cikel funkcije } T_1\}$$

Prepričati se moramo, da je definicija dobra. Očitno je, da maksimum  $m$ -cikla obstaja. Pokazati moramo še, da obstaja tudi minimum. Funkcija  $T_1^n$  seka simetralo lihih kvadratov  $2^n$ -krat, kar pomeni, da ima funkcija  $T_1^n$  natanko  $2^n$  negibnih točk, funkcija  $T_1$  pa ima  $2^n$  periodičnih točk. Ker je nabor točk končen, minimum obstaja.

Zvitost dokaza se skriva v tem, da pri funkciji  $T_{h(m)}$  število  $h(m)$  igra tri vloge. Pojavi se kot parameter, ki določi funkcijo iz družine funkcij. Predstavlja maksimum



brez vejice

funkcije  $T_{h(m)}$  in največjo točko neke orbite za funkcijo  $T_{h(m)}$ . Pokazali bomo, da funkcija  $h(m)$  razvrsti naravna števila na interval  $[0, 1]$  natančno v obratnem vrstnem redu kot vreditev Šarkovskega. Funkcija  $h(\cdot)$  ima naslednje lastnosti:

- (a) funkcija  $T_h$  vsebuje  $l$ -cikel  $\mathcal{O} \subseteq [0, h)$ , če in samo če je  $h(l) < h$ ,
- (b) orbita točke  $h(m)$  je  $m$ -cikel za funkcijo  $T_{h(m)}$ ,
- (c) vsi ostali cikli za funkcijo  $T_{h(m)}$  ležijo v intervalu  $[0, h(m))$ .

pregledal do tukaj: 26. 8. 2023

Lastnost (a) je očitna iz definicije funkcije  $h(\cdot)$ .

Za dokaz lastnosti (b) opazimo, da je točka  $h(m)$  največja točka  $m$ -cikla  $\mathcal{O}$  za funkcijo  $T_1$ , zato cikel  $\mathcal{O}$  leži v intervalu  $[0, h(m)]$ . Po trditvi (1) iz leme 8.2 je  $\mathcal{O}$  cikel za funkcijo  $T_{h(m)}$ .

Ker je  $h(m)$  maksimum funkcije  $T_{h(m)}$  in vsi ostali cikli funkcije  $T_{h(m)}$  ležijo v intervalu  $[0, h)$ . Pokazali smo lastnost (c).

S pomočjo lastnosti (a), (b), (c) in izreka 2.5 lahko dokažemo naslednjo lemo, s pomočjo katere zaključimo dokaz realizacijskega izreka Šarkovskega.

**Lema 8.3.** Za poljubni naravni števili  $m$  in  $n$  velja ekvivalenca:

$$n \triangleleft m \iff h(n) < h(m).$$

*Dokaz.* Najprej pokažimo implikacijo v desno. Denimo, da sta števili  $m$  in  $l$  v relaciji  $l \triangleleft m$ . Zaradi lastnosti (b) ima funkcija  $T_h(m)$   $m$ -cikel. Izrek 2.5 zagotavlja, da ima funkcija  $T_{h(m)}$  tudi cikel dolžine  $l$ . Iz lastnosti (c) ugotovimo, da ta cikel leži v intervalu  $[0, h(m))$ . Na koncu upoštevamo še lastnost (a) in se prepričamo, da je  $h(l) < h(m)$ .

Pri dokazu implikacije v levo stran uporabimo pravilo kontrapozicije in dokazujemo izjavo:  $m \triangleleft l \iff h(m) < h(l)$ . Zaradi simetričnosti števil  $l$  in  $m$  je ta izjava ekvivalentna prejšnji.  $\square$

Poglejmo, katere periode ima funkcija  $T_{h(m)}$ . Iz definicije funkcije  $h(m)$  sledi, da je  $m$  perioda za funkcijo  $T_{h(m)}$ . Radi bi videli, da ima funkcija  $T_{h(m)}$  periodo  $l$  natanko tedaj, ko velja  $l \triangleleft m$ . Naj bo  $l$  naravno število, za katerega velja relacija  $l \triangleleft m$ . Lema 8.3 pravi, da velja neenakost  $h(l) < h(m)$ . Iz lastnosti (a) sklepamo, da funkcija  $T_{h(m)}$  vsebuje  $l$ -cikel. Sedaj predpostavimo, da funkcija  $T_{h(m)}$  vsebuje  $l$  cikel. Iz lastnosti (a) sklepamo, da je  $h(l) < h(m)$ . Lema zagotavlja, da v tem primeru število  $l$  zadošča relaciji  $l \triangleleft m$ . Torej je množica period za funkcijo  $T_{h(m)}$  res množica  $\{n \in \mathbb{N} : n \triangleleft m\}$ .

Poisskati moramo še zvezno funkcijo ki ima za množico period množico vseh potenc števila 2. Definiramo  $h(2^\infty) := \sup_k h(2^k)$ . Za vsako naravno število  $k$  velja  $h(2^k) < h(2^\infty)$ . Zaradi lastnosti (a) funkcija  $T_{h(2^\infty)}$  vsebuje  $2^k$ -cikel, za vsak  $k \in \mathbb{N}$ . Denimo, da funkcija  $T_{h(2^\infty)}$  vsebuje nek  $m$  cikel, kjer število  $m$  ni potenca števila 2. Zaradi izreka 2.5 funkcija  $T_{h(2^\infty)}$  vsebuje tudi  $2m$ -cikel. Ker sta  $m$ -cikel in  $2m$ -cikel disjunktna, lastnost (c) zagotavlja, da vsaj en od teh dveh ciklov leži v intervalu  $[0, h(2^\infty))$ . Recimo, da je to  $m$ -cikel. Potem obstaja tako naravno število  $l$ , da velja  $h(m) < h(2^l)$ . S pomočjo leme 8.3 ugotovimo, da velja  $m \triangleleft 2^l$ , torej je število  $m$  potenca števila 2. To je protislovje. Če bi predpostavili, da  $2m$ -cikel leži v intervalu  $[0, h(2^\infty))$ , bi prišli do sklepa, da je število  $2m$  potenca števila 2, kar pa tudi vodi v protislovje. Funkcija  $T_{h(2^\infty)}$  res vsebuje samo cikle, katerih dolžina je potenca števila 2.

Za konec pokažimo, da obstaja funkcija, ki nima periodičnih točk. Za primer lahko vzamemo translacijo  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  s predpisom  $f(x) = x + a$ , kjer je  $a$  katerokoli neničelno realno število.  $\square$

v nadaljevanju moram  
prejšnje speljati dokaz  
bolj nazorno nakazati,  
kaj dokazujem v katero  
smo smer.

disjunktna

l ali n?

lema 8.3

cikel

## 9. POSPLOŠITVE IZREKA

Po zaključenem dokazu si lahko postavimo vprašanje, kako se spremenijo posledice izreka, če spremenimo njegove predpostavke. Glede na to, kako spremenimo predpostavke, lahko pridemo do različnih posplošitev izreka. V primeru izreka Šarkovskega že obstaja več posplošitev. Nekatere obravnavajo izrek za nezvezne funkcije, ki ustrezajo določenim pogojem, druge pa preučujejo zvezne funkcije, ki so namesto na intervalu definirane na drugih prostorih. V tem primeru se lahko vprašamo, kakšna ureditev naravnih števil, če ta obstaja, opiše prisotnost periodičnih točk zvezne funkcije  $f : X \rightarrow X$ , ki slika nek topološki prostor  $X$  nazaj vase. Natančneje, iščemo relacijo  $\triangleleft_X$  z lastnostjo: če je  $m$  perioda za zvezno funkcijo  $f : X \rightarrow X$ , potem je vsako naravno število  $l$ , za katero je  $l \triangleleft_X m$ , tudi perioda za funkcijo  $f$ . V tem poglavju si bomo najprej pogledali, kakšne periodične točke lahko ima zvezna funkcija definirana na dveh disjunktih intervalih, nato pa bomo obravnavali prisotnost periodičnih točk za zvezne funkcije na krožnici.

Na začetku si pogledjmo, kaj lahko povemo o periodah funkcije, ki je definirana na dveh disjunktih intervalih.

**Primer 9.1.** Naj bo prostor  $X$  unija dveh disjunktih intervalov  $X = I_1 \cup I_2$ , kjer sta  $I_1$  in  $I_2$  disjunktne intervale v množici  $\mathbb{R}$ . Funkcija  $g : X \rightarrow X$  podana s predpisom  $g(x) = -x$  je zvezna funkcija. Vsaka točka iz prostora  $X$  ima periodo 2, funkcija pa nima fiksne točke. Vseeno lahko poiščemo relacijo  $\triangleleft_X$ , ki opiše katere periode ima lahko funkcija. Pri poljubni funkciji  $f : X \rightarrow X$  imamo štiri možnosti. Če je  $f(I_1) \subseteq I_1$  in  $f(I_2) \subseteq I_2$  lahko za funkciji  $f|_{I_1}$  in  $f|_{I_2}$  uporabimo izrek Šarkovskega in ugotovimo, da je relacija  $\triangleleft_X$  enaka relaciji Šarkovskega. V primeru, ko je  $f(I_1) \subseteq I_2$  in  $f(I_2) \subseteq I_1$  lahko periodične točke ležijo samo v intervalu  $I_1$ . Za funkcijo  $f|_{I_1}$  uporabimo izrek Šarkovskega in ugotovimo, da je relacija  $\triangleleft_X$  enaka relaciji Šarkovskega. Podoben sklep lahko naredimo tudi v primeru, ko je  $f(I_1) \subseteq I_2$  in  $f(I_2) \subseteq I_2$ . Drugače je v primeru  $f(I_1) \subseteq I_2$  in  $f(I_2) \subseteq I_1$ . V tem primeru se točke iz intervala  $I_1$  s funkcijo  $f$  slikajo v interval  $I_2$  in obratno. Zato ima vsaka periodična točka sodo periodo. Naj bo  $x \in X$  točka periode  $2m$  za funkcijo  $f$ . Brez izgube splošnosti lahko sklepamo, da točka  $x$  pripada intervalu  $I_1$ . Potem ima točka  $x$  periodo  $m$  za funkcijo  $f^2|_{I_1} : I_1 \rightarrow I_1$ . Ker je  $I_1$  prostor Šarkovskega in je  $f^2$  zvezna funkcija, lahko uporabimo izrek Šarkovskega in ugotovimo, da za vsako naravno število  $l$ , za katerega velja  $l \triangleleft m$ , obstaja točka  $y \in I_1$  s periodo  $l$  za funkcijo  $f^2$ . Točka  $y$  ima periodo  $2l$  za funkcijo  $f$ , saj je orbita točke  $y$  sestavljena iz  $l$  različnih točk v intervalu  $I_1$  (sode iteracije) in  $l$  različnih točk iz intervala  $I_2$  (lihe iteracije). Ugotovili smo naslednje: Če ima zvezna funkcija  $f : X \rightarrow X$  liho periodo  $m$ , potem ima zagotovo tudi vse periode  $l$ , kjer je  $l \triangleleft m$ . Če pa je perioda  $m$  soda, potem ima funkcija vse periode  $l \neq 1$ , za katere je  $l \triangleleft m$ . Dobimo relacijo  $\triangleright_X$ :

$$3 \triangleright_X 5 \triangleright_X 7 \triangleright_X \cdots \triangleright_X 2 \cdot 3 \triangleright_X 2 \cdot 5 \triangleright_X 2 \cdot 7 \triangleright_X \cdots \triangleright_X 2^2 \cdot 3 \triangleright_X 2^2 \cdot 5 \triangleright_X 2^2 \cdot 7 \triangleright_X \cdots \triangleright_X 2^3 \triangleright_X 2^2 \triangleright_X 2,$$

$$3 \triangleright_X 5 \triangleright_X 7 \triangleright_X 9 \triangleright_X \cdots \triangleright_X 1.$$

◇

**Primer 9.2.** Krožnica  $S^1 = \{(\cos(\varphi), \sin(\varphi)), \varphi \in [0, 1)\}$ . Hitro se lahko prepričamo, da obstajajo funkcije, ki imajo samo eno periodo. To so rotacije okoli

koordinatnega izhodišča. Definiramo družino funkcij:

$$R_n : S^1 \rightarrow S^1$$

$$R_n : (\cos(\varphi), \sin(\varphi)) \mapsto (\cos(\varphi + \frac{2\pi}{n}), \sin(\varphi + \frac{2\pi}{n})).$$

Vse točke krožnice  $S^1$  so periodične točke za funkcijo  $R_n$  in vse imajo periodo  $n$ . Zato iz obstoja periodične točke za zvezno funkcijo  $f : S^1 \rightarrow S^1$  ne moremo sklepati na obstoj drugih period za to funkcijo.  $\diamond$

Primer 9.2 pokaže, da s predpostavko splošne zvezne funkcije ne dobimo željenega rezultata. Če želimo ~~podobne posledice izreka~~ kot v primeru izreka Šarkovskega, moramo dodati še kakšen pogoj. V nadaljevanju bomo formulirali in dokazali izrek podoben izreku Šarkovskega, ki obravnava periode zveznih funkcij na krožnici  $S^1$ , ki imajo vsaj eno negibno točko.

priti do podobnega rezultata

**Izrek 9.3.** Naj bo  $f : S^1 \rightarrow S^1$  zvezna funkcija. Predpostavimo, da ima funkcija  $f$  negibno točko in da je neko liho naravno število  $n$  tudi perioda funkcije  $f$ . Potem je vsako naravno število  $m > n$  tudi perioda za funkcijo  $f$ .

Zaradi lažjega dokazovanja, si pogledjmo naslednjo definicijo:

**Definicija 9.4.** Naj bosta  $a \in S^1$  in  $b \in S^1$  različni točki na krožnici. Z zapisi  $[a, b]$ ,  $(a, b)$ ,  $[a, b)$ ,  $[a, b)$  označimo zaprt, odprt, pol odprt in pol zaprt interval, ki predstavljajo množice točk na krožnici od točke  $a$  do točke  $b$  v nasprotni smeri urinega kazalca.

V tem poglavju bomo z zapisi... označevali

Kaj je pravi podinterval

Relacijo pokritja intervalov bomo definirali malo drugače, kot v poglavju ~~ref(intervali)~~

**Definicija 9.5.** Naj bosta  $I, J \subset S^1$  prava zaprta podintervala krožnice  $S^1$  in naj bo  $f : I \rightarrow J$  zvezna preslikava. Pravimo, da interval  $I$   $f$ -pokrije interval  $J$ , če obstaja tak interval  $K \subseteq I$ , za katerega velja  $f(K) = J$ . Relacijo zapišemo kot  $I \xrightarrow{f} J$ . Kadar je jasno, katero funkcijo imamo v mislih, lahko rečemo samo, da interval  $I$  pokrije interval  $J$ . V tem primeru, lahko nadpis, ki označi katero funkcijo imamo v mislih izpustimo in pišemo samo  $I \rightarrow J$ .

presledek

Preden se lotimo dokazovanja izreka bomo dokazali leme, ki so pomembne pri dokazu izreka in spoznali kakšno definicijo, ki nam olajša zapis pri dokazovanju.

**Lema 9.6.** Naj bo  $I = [a, b]$  zaprt interval na krožnici  $S^1$  in naj bo  $f : S^1 \rightarrow S^1$  zvezna preslikava. Predpostavimo, da je  $f(a) = c$  in  $f(b) = d$ . Potem velja  $I \rightarrow [c, d]$  ali  $I \rightarrow [d, c]$ .

*Dokaz.* Naj bo  $A = \{x \in I; f(x) = c\}$ . Ker je funkcija  $f$  zvezna, je preslika  $f^{-1}(c) = A$  zaprta podmnožica kompaktne množice  $I$ , zato je tudi množica  $A$  kompaktna. Obstaja točka  $v \in A$ , za katero je  $(v, b] \cap A = \emptyset$ . Naj bo  $B = \{x \in I; f(x) = d\}$ . Zaradi podobnega razmisleka, kot pri množici  $A$  obstaja točka  $w \in B$ , za katero je  $[v, w) \cap B = \emptyset$ . Velja  $f(v) = c$ ,  $f(w) = d$  in  $f(x) \notin \{c, d\}$  za vsak  $x \in (v, w)$ . Zaradi zveznosti funkcije  $f$  velja ena od enakosti  $f([v, w]) = [c, d]$  ali  $f([v, w]) = [d, c]$ , zato velja ena od relacij  $I \rightarrow [c, d]$  ali  $I \rightarrow [d, c]$ .  $\square$

**Lema 9.7.** Naj bo  $f : S^1 \rightarrow S^1$  zvezna preslikava in naj bosta  $I$  in  $J$  zaprta intervala na  $S^1$ , za katera velja  $I \rightarrow J$ . Če je  $L \subseteq J$  zaprt interval, potem velja  $I \rightarrow L$ .

*Dokaz.* Za intervala  $I$  in  $J$  velja relacija  $I \rightarrow J$ , zato obstaja interval  $K \subset I$ , za katerega je  $f(K) = J$ . Naj bo  $L = [c, d]$ . Obstajata točki  $a, b \in K$  za kateri veljata enakosti  $f(a) = c$  in  $f(b) = d$ . Označimo s  $K_1$  tisti interval s krajiščima  $a$  in  $b$ , ki leži v intervalu  $K$ . Zaradi leme 9.6 velja  $K_1 \rightarrow [c, d]$  ali  $K_1 \rightarrow [d, c]$ . Zaradi enakosti  $f(K) = J$  in ker je  $K_1$  podinterval intervala  $K$ , ne more veljati  $K \rightarrow [d, c]$ , zato velja  $K \rightarrow [c, d]$ . Ker je  $K_1 \subseteq K \subseteq I$ , velja  $I \rightarrow [c, d]$ .  $\square$

**Lema 9.8.** Naj bo  $f : S^1 \rightarrow S^1$  zvezna preslikava in  $I$  zaprt interval na krožnici  $S^1$ . Če velja relacija  $I \rightarrow I$ , potem ima funkcija  $f$  negibno točko na intervalu  $I$ .

*Dokaz.* Zaradi relacije  $I \rightarrow I$  obstaja zaprt interval  $K \subseteq I$ , za katerega velja  $f(K) = I$ . Obstajata taki točki  $v, w \in K$ , da sta  $f(v)$  in  $f(w)$  krajišči intervala  $I$ .  $\square$

**Lema 9.9.** Naj bo  $f : S^1 \rightarrow S^1$  zvezna preslikava in naj bojo  $M_1, M_2, \dots, M_n$  zaprti intervali na krožnici  $S^1$ , za katere veljajo relacije pokritja

$$M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow \dots \rightarrow M_n \rightarrow M_1.$$

Potem obstaja točka  $z \in M_1$ , za katero je  $f^i(z) \in M_{i+1}$  za  $i = 1, \dots, n-1$  in  $f^n(z) = z$ . S pomočjo leme 9.8 sklepamo, da obstaja negibna točka  $z \in M_1$  za funkcijo  $f^n$ . Veljajo tudi osebnoosti  $z \in M_1, f(z) \in M_2, \dots, f^{n-1}(z) \in M_n$ , kar zaključuje dokaz.

*Dokaz.* Velja relacija  $M_n \rightarrow M_1$ , zato obstaja interval  $J_n \subseteq M_n$ , za katerega je  $f(J_n) = M_1$ . Podobno obstajajo tudi taki intervali  $J_1, \dots, J_{n-1}$ , da za vsak  $k = 1, \dots, n-1$  velja  $f_k \subseteq M_k$  in  $f(J_k) = J_{k+1}$ . Sledi, da je  $f^n(J_1) = M_1$ . S pomočjo dokaza leme 9.8 lahko sklepamo, da ima  $f^n$  negibno točko  $z \in J$ . Očitno velja  $z \in M_1, f(z) \in M_2, \dots, f^{n-1}(z) \in M_n$ .  $\square$

**Definicija 9.10.** Naj bo  $f : S^1 \rightarrow S^1$  zvezna funkcija in  $P = \{p_1, p_1, \dots, p_n\}$  orbita funkcije  $f$  s periodo  $n$ . Pravimo, da je orbita  $P$  urejena, če za vsak  $k = 1, \dots, n-1$  velja enakost  $P \cap (p_k, p_{k+1}) \neq \emptyset$  in  $P \cap (p_n, p_1) = \emptyset$ . V tem primeru definiramo  $n$  intervalov določenih s  $P$ :

$$I_1 = [p_1, p_2], I_2 = [p_2, p_3], \dots, I_{n-1} = [p_{n-1}, p_n], I_n = [p_n, p_1].$$

**Lema 9.11.** Naj bo  $f : S^1 \rightarrow S^1$  zvezna preslikava. S  $P = \{p_1, \dots, p_n\}$  označimo  $f$ -orbito z liho periodo  $n \geq 3$ . Predpostavimo, da je  $P$  urejena in da so  $I_1, \dots, I_n$  označimo intervale določene s  $P$ . Denimo, da obstajata taki števili  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ , za kateri ne obstaja naravno število  $k \in \{1, \dots, n\}$ , kjer je  $k \neq i$ , za katerega velja  $I_k \rightarrow I_i$  in ne obstaja tako naravno število  $l \in \{1, \dots, n\}$ , kjer je  $l \neq j$ , za katerega velja  $I_l \rightarrow I_j$ . Potem je  $i = j$ .

*Dokaz.* Naj bo  $\square$

**Lema 9.12.** Predpostavimo, da ima zvezna funkcija  $f : S^1 \rightarrow S^1$  periodično orbito  $P = \{p_1, \dots, p_n\}$  z liho periodo  $n \geq 3$ . Denimo, da je  $P$  urejena in da so  $I_1, \dots, I_n$  intervali določeni s  $P$ . Naj ima funkcija  $f$  negibno točko  $e$ . Potem ima  $f$  negibno točko  $z$ , za katero obstaja interval  $I_i$  določen s  $P$ .

z lastnostjo: Če je  $I_k$  interval določen z orbito  $P$ , ki vsebuje točko  $z$ , potem obstaja naravno število  $j \in \{1, \dots, n\}$ , kjer je  $j \neq k$ , za katero velja  $I_j \rightarrow I_k$ .

*Dokaz.* Po predpostavkah leme ima funkcija  $f$  negibno točko  $e$ . Brez izgube splošnosti lahko sklepamo, da je  $e \in I_n$ . Prav tako lahko predpostavimo, da relacija pokritja  $I_j \rightarrow I_n$  ne velja za nobeno število  $j = 1, \dots, n-1$ . V nasprotnem primeru izberemo  $z = e$ , kar zaključuje dokaz. Naj bo  $m$  najmanjše naravno število, za katerega iz enakosti  $f(p_m) = p_r$  sledi neenakost  $r < m$ . Za število  $m$  velja sistem neenakosti



Predpostavimo, da sta  $s_j$  in  $s_k$  različni naravni števili. Izberemo točko  $v_v$  iz notranjosti intervala  $I_j$  in izberemo točko  $w_w$  iz notranjosti intervala  $I_k$ . Točki  $v_v$  in  $w_w$  sta različni. S pomočjo točk  $v_v$  in  $w_w$  razdelimo cikel  $SP$  na dve disjunktni množici. Naj bo  $A = P \setminus (v, w)$  in  $B = P \setminus (w, v)$ . Množici  $A$  in  $B$  sta neprazni in disjunktni. Njuna unija je enaka množici  $SP$ .

Trdimo: če je za neko število  $x$  iz množice  $A$  tudi točka  $f(x)$  vsebovana v množici  $A$ , potem je celotna slika množice  $A$  s funkcijo  $f$  vsebovana v množici  $A$ . Res, saj v nasprotnem primeru obstajata dve sosednji točki  $x, y \in A$ , za kateri velja  $f(x) \in A$  in  $f(y) \notin A$ . V tem primeru lahko s pomočjo leme~\ref{lem:1} in leme~\ref{lem:2} sklepamo, da najkrajši interval določen s točkama  $x$  in  $y$  pokrije interval  $I_j$  ali interval  $I_k$ , kar je v nasprotju s predpostavkami leme~\ref{lem:5}. Slika množice  $A$  ne more biti v celoti vsebovana v množici  $A$ , saj je množica  $SP$  cikel za funkcijo  $f$ . Sklepamo, da je slika množice  $A$  s funkcijo  $f$  v celoti vsebovana v množici  $B$ . S podobnim sklepom ugotovimo, da je slika množice  $B$  s funkcijo  $f$  v celoti vsebovana v množici  $A$ . Ker funkcija  $f$  slika množico  $SP$  nazaj v množico  $SP$ , velja  $f(A) = B$  in  $f(B) = A$ . Funkcija  $f$  je bijekcija med točkama  $A$  in  $B$ , zato imata množici enako število elementov. Ker je unija množic  $A$  in  $B$  enaka ciklu  $SP$ , presek množic  $A$  in  $B$  pa je prazen, ima  $f$ -orbita  $SP$  sodo število elementov. To pa je v protislovju s predpostavko, da je v  $f$ -orbiti liho število elementov.



$2 \leq m \leq n$ , ki ga lahko preoblikujemo tako, da vsem členom odštejemo 1 in dobimo sistem neenakosti  $1 \leq m-1 \leq n-1$ , iz česar sklepamo, da  $m-1 \neq n$ . Denimo, da je  $f(p_m) = p_r$  in  $f(p_{m-1}) = p_q$ . Potem je  $I_{m-1} \subseteq (p_r, p_q)$  in  $I_n \subseteq (p_q, p_r)$ . S pomočjo leme 9.6 in leme 9.7 sklepamo, da velja relacija  $I_{m-1} \rightarrow I_n$  ali  $I_{m-1} \rightarrow I_{m-1}$ . Toda, na začetku dokaza smo predpostavili, da relacija  $I_j \rightarrow I_n$  ne velja za vsa naravna števila  $j < n$ , zato velja relacija  $I_{m-1} \rightarrow I_{m-1}$ . S pomočjo leme 9.8 sklepamo, da ima funkcija  $f$  negibno točko  $z$  na intervalu  $I_{m-1}$ . Ker za nobeno naravno število  $j = 1, \dots, n$  ne velja relacija  $I_j \rightarrow I_n$  iz leme 9.11 sledi, da obstaja  $j \in \{1, \dots, n\}$ ,  $j \neq m-1$ , za katerega velja relacija  $I_j \rightarrow I_{m-1}$ .

velja

brez veljice

to

nobeno

n-1 možnosti???

pregledal do tukaj: 27. 8. 2023

□

**Lema 9.13.** Naj bo  $f : S^1 \rightarrow S^1$  zvezna preslikava in naj bo  $P$  periodična orbita funkcije  $f$  s periodo  $m \geq 3$ . Denimo, da za nek  $k \in \{2, \dots, n\}$  množica zaprtih intervalov  $\{M_1, \dots, M_k\}$  izpolnjuje naslednje pogoje:

- (1) za vsak  $j \in \{1, \dots, k\}$  notranjost intervala  $M_j$  ne vsebuje nobene točke iz  $P$ ,
- (2) če je  $i \neq j$ , potem imata intervala  $M_i$  in  $M_j$  disjunktni notranjosti,
- (3) za  $j \in \{2, \dots, k\}$  so krajišča intervala  $M_j$  vsebovana v  $P$ ,
- (4) Če je  $b$  krajišče intervala  $M_1$ , potem je  $b \in P$  ali  $b$  je negibna točka funkcije  $f$ ,
- (5) za vsak  $j \in \{1, \dots, k-1\}$  velja relacija  $M_j \rightarrow M_{j+1}$ ,
- (6) veljata relaciji  $M_1 \rightarrow M_1$  in  $M_k \rightarrow M_1$ .

Potem je vsako naravno število  $n > k$  perioda funkcije  $f$ .

**Dokaz.** Recimo, da je  $n > k$ . Predpostavimo lahko, da je  $n \neq m$ , saj ima po predpostavkah leme funkcija  $f$  točko periode  $m$ . Označimo intervale  $L_1 = M_1, L_2 = M_1, \dots, L_{n-k} = M_1, L_{n-k+1} = M_1, L_{n-k+2} = M_2, L_{n-k+3} = M_3, \dots, L_{n-k+k} = L_n = M_k$ . Če uporabimo lemo 9.9 na intervalih  $L_1, \dots, L_n$  ugotovimo, da obstaja negibna točka  $z$  za funkcijo  $f^n$ , za katero velja  $z \in L_1, f(z) \in L_2, \dots, f^{n-1}(z) \in L_n$ . Točka  $z$  leži v intervalu  $M_1$ , točka  $f^{n-k+1}(z)$  pa v intervalu  $M_2$  iz česar lahko s pomočjo pogoja 2 in pogoja 3 iz predpostavk leme sklepamo, da  $z$  ni negibna točka funkcije  $f$ .

presledek

Trdimo tudi, da točka  $z$  ne pripada ciklu  $P$ . Predpostavimo najprej, da je  $n \geq k+2$ . Potem je  $L_1 = L_2 = L_3 = M_1$ . Torej, točke  $z, f(z)$  in  $f^2(z)$  ležijo v intervalu  $M_1$ . Ker je  $P$  cikel dolžine  $m \geq 3$ , lahko s pomočjo pogoja 1 sklepamo, da točka  $z$  ne pripada orbiti  $P$ . Sedaj predpostavimo, da je  $n < k+2$ . Potem je  $n < m+2$ . Ker je  $n \neq m$  in  $m \geq 3$ , število  $n$  ni večkratnik števila  $m$ . Iz enakosti  $f^n(z) = z$  sledi, da točka  $z$  ne pripada ciklu  $P$ .

Ugotovili smo, da točka  $z$  ni negibna točka funkcije  $f$  in tudi ne pripada ciklu  $P$ , zato lahko s pomočjo pogoja 4 iz predpostavk leme sklepamo, da  $z$  leži v notranjosti intervala  $M_1$ . Ker točka  $f^n(z) = z$  ne pripada ciklu  $P$ , za vsako naravno število  $r < n$  tudi točka  $f^r(z)$  ne pripada ciklu  $P$ . Trdimo lahko tudi, da  $f^r(z)$  ni negibna točka funkcije  $f$ . Zaradi pogojev 3 in 4 za vsako naravno število  $r < n$  velja, da  $f^r(z)$  ni krajišče nobenega intervala  $M_1, \dots, M_k$ . S pomočjo te ugotovitve, pogoja 2 in dejstva, da je  $z \in M_1, f(z) \in M_1, f^2(z) \in M_1, \dots, f^{n-k}(z) \in M_1, f^{n-k+1}(z) \in M_2, \dots, f^{n-1}(z) \in M_k$ , lahko sklepamo, da je točka  $z$  periodična točka funkcije  $f$  s periodo  $n$ .

□

Dokažimo izrek:

Dokaz. Po predpostavki izreka obstaja  $f$ -orbita  $P = \{p_1, \dots, p_n\}$  s periodo  $n$ . Brez izgube splošnosti lahko predpostavimo, da je orbita  $P$  urejena in so  $I_1, \dots, I_n$  intervali določeni s  $P$ . Po predpostavkah izreka ima funkcija negibno točko  $e$ . Predpostavimo ~~lahko~~, da točka  $e$  leži v intervalu  $I_n$ . Po lemi 9.12 lahko predpostavimo, da obstaja tako naravno število  $j \in \{1, \dots, n-1\}$ , za katerega velja  $I_j \rightarrow I_n$ . Označimo  $f(p_1) = p_s$  in  $f(p_n) = p_t$ . Imamo dve možnosti.

Prva možnost: Velja  $[e, p_1] \rightarrow [e, p_s]$  ali velja  $[p_n, e] \rightarrow [p_t, e]$ . Ker lahko v obeh primerih dokaz izpeljemo na enak način, predpostavimo, da velja  $[e, p_1] \rightarrow [e, p_s]$ . S pomočjo leme 9.7 sklepamo, da velja  $[e, p_1] \rightarrow [e, p_1]$  in za vsak  $j \in \{1, \dots, s-1\}$  velja  $[e, p_1] \rightarrow I_j$ . Recimo, da za neko število  $j \in \{q, \dots, s-1\}$  velja  $I_j \rightarrow I_n$ . Potem so izpolnjene predpostavke leme 9.13 za  $k = 2$ ,  $M_1 = [e, p_1]$  in  $M_2 = I_j$ . Lema 9.13 zagotavlja obstoj vseh period  $m > 2$ .

Torej, lahko predpostavimo, da za ~~vsako število~~  $j \in \{1, \dots, s-1\}$  ne velja  $I_j \rightarrow I_n$ . Ker za neko število  $j \in \{1, \dots, n-1\}$  velja  $I_j \rightarrow I_n$ , je  $s-1 < n-1$ . Torej, velja  $s < n$ .

Obstaja naravno število  $r \in \{2, \dots, s\}$ , za katerega vrednost funkcije  $f(p_r)$  ne leži v množici  $\{p_1, \dots, p_s\}$ . Brez izgube splošnosti lahko predpostavimo, da je  $r$  najmanjše število s to lastnostjo. Velja  $f(p_{r-1}) \in \{p_1, \dots, p_s\}$ . Označimo  $f(p_r) = p_q$ . Ker ne velja  $I_{r-1} \rightarrow I_n$ , lahko s pomočjo leme 9.6 in leme 9.7 sklepamo, da velja  $I_{r-1} \rightarrow [f(p_{r-1}), p_q]$ . Torej, za vsako naravno število  $j \in \{s, \dots, q-1\}$  velja  $I_{r-1} \rightarrow I_j$ .

Glede na definicijo točke  $p_q$  opazimo, da je  $s \leq q-1$ . Denimo, da obstaja pozitivno naravno število  $j \in \{s, \dots, q-1\}$ , za katero velja  $I_j \rightarrow I_n$ . Potem so izpolnjene predpostavke leme 9.13 za  $k = 3$ ,  $M_1 = [e, p_1]$ ,  $M_2 = I_{r-1}$  in  $M_3 = I_j$ , kar zagotavlja obstoj vseh period  $m > 3$ .

Postopek opisan v zadnjih treh odstavkih ponavljamo in po največ  $n$  korakih, z upoštevanjem dejstva, da za neko naravno število  $j = 1, \dots, n-1$  velja  $I_j \rightarrow I_n$ , sčasoma konstruiramo množico intervalov  $\{M_1, M_2, \dots, M_k\}$ , kjer je  $k \leq n$ , za katero so izpolnjene predpostavke leme 9.13. To pa zagotavlja obstoj vseh period  $m > k$  za funkcijo  $f$ .

Druga možnost: Ne velja  $[e, p_1] \rightarrow [e, p_s]$  in ne velja  $[p_n, e] \rightarrow [p_t, e]$ . S pomočjo leme 9.6 se prepričamo, da velja  $[e, p_1] \rightarrow [p_s, e]$  in velja  $[p_n, e] \rightarrow [e, p_t]$ . Trdimo, da velja  $I_n = [p_n, p_1] \rightarrow I_n$ . Ker velja  $[e, p_1] \rightarrow [p_s, e]$  in je  $p_n \in [p_s, e]$ , obstaja taka točka  $a \in (e, p_1]$ , za katero je  $f(a) = p_n$ , vendar za vsak  $x \in (e, a)$  velja  $f(x) \neq p_n$ . Opazimo, da je  $f(e) = e$  in  $f(a) = p_n$ , zato velja  $[e, a] \rightarrow [e, p_n]$  ali  $[e, a] \rightarrow [p_n, e]$ . Vemo že, da ne velja  $[e, p_1] \rightarrow [e, p_s]$ , zato tudi ne velja  $[e, a] \rightarrow [e, p_s]$ . S pomočjo leme 9.7 sklepamo, da ne velja  $[e, a] \rightarrow [e, p_n]$ , torej velja  $[e, a] \rightarrow [p_n, e]$ . Zapišemo lahko  $[p_n, e] \subseteq f([e, a])$ .

Denimo, da obstaja neka točka  $z \in [e, a]$ , za katero velja  $f(z) \notin [p_n, p_1]$ . Ker  $f(z) \notin [p_n, p_1]$  in  $f(e) \in [p_n, p_1]$ , zaradi zveznosti obstaja točka  $q \in (e, a)$ , za katero je  $f(q) = p_1$  ali  $f(q) = p_n$ . Ker je  $q \in (e, a)$ , mora biti  $f(q) \neq p_n$ , saj smo tako definirali točko  $a$ . Torej velja  $f(q) = p_1$ . Iz definicije točke  $a$  sledi, da je  $f([e, a])$  zaprt interval na krožnici  $S^1$ , ki je pravi podinterval krožnice  $S^1$ . Eno krajišče intervala  $f([e, a])$  je točka  $p_n$ . Točki  $e$  in  $p_1$  sta tudi vsebovani v intervalu  $f([e, a])$ , zato lahko s pomočjo leme ~~??~~ sklepamo, da velja  $[p_n, p_1] \subseteq f([e, a])$  ali  $[e, p_n] \subseteq f([e, a])$ . Če velja  $[e, p_n] \subseteq f([e, a])$ , podobno kot pri dokazu leme 9.7 z uporabo dejstva, da velja  $f([e, a]) \neq S^1$ , sklepamo, da velja  $[e, a] \rightarrow [e, p_n]$ . To s pomočjo leme 9.7 zagotavlja relacijo  $[e, a] \rightarrow [e, p_s]$ . Torej tudi relacijo  $[e, p_1] \rightarrow [e, p_s]$ , kar je protislovje. Zato je interval  $[p_n, p_1]$  vsebovan v intervalu  $f([e, a])$ . Ker je  $f([e, a]) \neq S^1$ , sklepamo,

da velja  $[e, a] \rightarrow [p_n, p_1]$ . Velja tudi  $[p_n, p_1] \rightarrow [p_n, p_1]$ . Trditev smo dokazali v primeru, ko obstaja točka  $z \in (e, a)$ , za katero velja  $f(z) \notin [p_n, p_1]$ . Sedaj lahko predpostavimo, da je  $f([e, a]) \subseteq [p_n, p_1]$ .

Ker velja  $[p_n, e] \rightarrow [e, p_t]$ , obstaja točka  $b \in [p_n, e]$ , za katero je  $f(b) = p_1$  in za vsak  $x \in (b, e)$  velja  $f(x) \neq p_1$ . Z enakim argumentom, kot smo pokazali, da je  $[p_n, e] \subseteq f([e, a])$  utemeljimo, da je  $[e, p_1] \subseteq f([b, e])$ . Na enak način kot smo utemeljili predpostavko, da je  $f([e, a]) \subseteq [p_n, p_1]$ , lahko utemeljimo predpostavko, da je  $f([b, e]) \subseteq [p_n, p_1]$ .

Torej velja  $f([b, a]) = [p_n, p_1]$ . Ker je  $[b, a] \subseteq [p_n, p_1]$ , je res izpolnjena relacija pokritja  $[p_n, p_1] \rightarrow [p_n, p_1]$ .

Iz relacije  $[e, p_1] \rightarrow [p_s, e]$  lahko sklepamo, da velja relacija  $[p_n, p_1] \rightarrow [p_s, e]$ . Enako lahko iz relacije  $[p_n, e] \rightarrow [e, p_t]$  sklepamo, da je izpolnjena relacija  $[p_n, p_1] \rightarrow [e, p_t]$ . Lema 9.7 zagotavlja, da za vsako naravno število  $j \in \{1, \dots, t-1\} \cup \{s, \dots, n-1\}$  velja  $[p_n, p_1] \rightarrow I_j$ .

Predpostavimo, da obstaja naravno število  $j \in \{1, \dots, t-1\} \cup \{s, \dots, n-1\}$ , za katerega velja  $I_j \rightarrow I_n$ . Potem je izrek dokazan, saj so izpolnjene predpostavke leme 9.13 za  $k = 2, M_1 = I_n$  in  $M_2 = I_j$ . Torej, predpostavimo, da za ~~vsako~~ naravno število  $j \in \{1, \dots, t-1\} \cup \{s, \dots, n-1\}$  ne velja relacija  $I_j \rightarrow I_n$ . Ker za nek  $j \in 1, \dots, n-1$  velja  $I_j \rightarrow I_n$  je število  $t$  strogo manjše od števila  $s$ .

Prepričajmo se, da ne moreta biti istočasno izpolnjena pogoja  $f(\{p_1, \dots, p_t\}) \subseteq \{p_s, \dots, p_n\}$  in  $f(\{p_s, \dots, p_n\}) \subseteq \{p_1, \dots, p_t\}$ . V nasprotnem primeru je množica  $P = \{p_1, \dots, p_t, p_s, \dots, p_n\}$  orbita točke  $p_1$ . Toda orbita točke  $p_1$  je enaka  $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ . To pomeni, da je  $t = s - 1$  in imata množici  $\{p_1, \dots, p_t\}$  in  $\{p_s, \dots, p_n\}$  enako število elementov. To pa bi pomenilo, da ima množica  $P$  sodo število elementov, kar je v nasprotju s predpostavko, da ima orbita  $P$  liho periodo. Brez izgube splošnosti lahko predpostavimo, da množica  $f(\{p_1, \dots, p_t\})$  ni podmnožica množice  $\{p_s, \dots, p_n\}$ .

Naj bo  $w$  najmanjše pozitivno število, za katero je  $f(p_w) \notin \{p_s, \dots, p_n\}$ . Potem je  $2 \leq w \leq t$  in velja  $I_{w-1} \rightarrow [f(p_{w-1}), f(p_w)]$  ali  $I_{w-1} \rightarrow [f(p_w), f(p_{w-1})]$ . Recimo, da velja  $I_{w-1} \rightarrow [f(p_{w-1}), f(p_w)]$ . Potem velja tudi  $I_{w-1} \rightarrow I_n$ , kar je v protislovju s predpostavko. Velja torej  $I_{w-1} \rightarrow [f(p_w), f(p_{w-1})]$ , iz česar lahko sklepamo, da velja tudi  $I_{w-1} \rightarrow [f(p_w), p_s]$ . Označimo  $f(p_w)$  s  $p_v$ . Potem je število  $v$  manjše ali enako  $s - 1$  in za vsako naravno število  $j \in \{v, \dots, s-1\}$  velja  $I_{w-1} \rightarrow I_j$ .

Denimo, da obstaja tako naravno število  $j \in \{v, \dots, s-1\}$ , za katero velja  $I_j \rightarrow I_n$ . Potem so izpolnjene predpostavke leme 9.13 za  $k = 3, M_1 = I_n, M_2 = I_{w-1}$  in  $M_3 = I_j$ , kar zagotavlja, da veljajo posledice izreka.

Postopek opisan v zadnjih štirih odstavkih ponavljamo in po največ  $n$  korakih, z upoštevanjem dejstva, da za neko naravno število  $j = 1, \dots, n-1$  velja  $I_j \rightarrow I_n$ , sčasoma konstruiramo množico zaprtih intervalov  $\{M_1, M_2, \dots, M_k\}$ , kjer je  $k \leq n$ , za katero so izpolnjene predpostavke leme 9.13. To pa zagotavlja obstoj vseh period  $m > k$  za funkcijo  $f$ , kar zaključí dokaz.  $\square$

## 10. PROSTOR ŠARKOVskega

V prejšnjem poglavju smo obravnavali periode zveznih funkcij definiranih na dveh disjunktnih intervalih in na krožnici. Ko smo obravnavali periode poljubne funkcije  $f$  definirane na prostoru  $X = I_1 \cup I_2$ , smo prišli do relacije  $\triangleright_X$ , ki določa prisotnost period za funkcijo  $f : X \rightarrow X$ . Torej, če je  $m$  perioda za zvezno funkcijo  $f : X \rightarrow X$ , potem je vsako naravno število  $l$ , za katero je  $l \triangleleft_X m$ , tudi perioda za funkcijo  $f$ . V



tem poglavju bomo obravnavali prostore, pri katerih je relacija, ki določa prisotnost period funkcije enaka relaciji Šarkovskega, ki smo jo spoznali v definiciji 2.2. Če je relacija  $\triangleright_X$  enaka relaciji Šarkovskega, pravimo, da je prostor  $X$  *prostor Šarkovskega*. V tem poglavju, bomo spoznali nekaj prostorov Šarkovskega in tudi nekaj prostorov, ki to niso. S primeri in protiprimeri bomo poskušali ugotoviti katere topološke lastnosti imajo prostori Šarkovskega. Preden začnemo s preučevanjem različnih prostorov Šarkovskega se prepričajmo, da je lastnost biti prostor Šarkovskega tudi topološka lastnost.

**Trditev 10.1.** *Lastnost biti prostor Šarkovskega je topološka lastnost. To pomeni, če je  $X$  prostor Šarkovskega in je prostor  $Y$  homeomorfen prostoru  $X$ , potem je tudi  $Y$  prostor Šarkovskega.*

*Dokaz.* Naj bo prostor  $X$  prostor Šarkovskega in naj bo prostor  $Y$  homeomorfen prostoru  $X$ . Naj bo  $h : X \rightarrow Y$  homeomorfizem med prostoroma  $X$  in  $Y$ . Funkciji  $f : Y \rightarrow Y$  in  $g = h^{-1} \circ f \circ h : X \rightarrow X$  imata enake periode, zato je  $Y$  tudi prostor Šarkovskega.  $\square$

Iz prejšnjih poglavji je razvidno, da so tipični predstavniki prostorov Šarkovskega množica realnih števil in intervali v realnih številih. V poglavju 9 smo spoznali dva prostora, ki nista prostora Šarkovskega. Največ časa smo namenili krožnici, ki ni prostor Šarkovskega, saj imajo na primer pri rotaciji za  $120^\circ$  vse točke periodo 3, drugih period pa ta rotacija nima. S podobnim sklepanjem lahko za nekatere prostore hitro preverimo, da niso prostori Šarkovskega. To naredimo tako, da poiščemo kakšno os  $n$ -kratne rotacijske simetrije, kjer je  $n$  naravno število večje od 2. Pri takih primerih lahko hitro ugotovimo, da ima rotacija za kot  $\varphi = \frac{360^\circ}{n}$ , za  $n > 2$ , točke periode  $n$  in morda tudi točke periode 1, nima pa točk periode 2. Zaradi tega taki prostori ne morejo biti prostori Šarkovskega. Primeri takih prostorov so npr. sfera, krogla, torus ...

Na začetku poglavja 9 smo enostavno pokazali, da disjunktna unija dveh intervalov ni prostor Šarkovskega. Z zelo podobno idejo lahko pokažemo, da je vsak prostor Šarkovskega povezan.

**Trditev 10.2.** *Prostor Šarkovskega je povezan.*

*Dokaz.* Naj bo prostor  $X$  disjunktna unija nepraznih prostorov  $A$  in  $B$  in naj bosta  $a \in A$  in  $b \in B$  poljubni točki tega prostora. Definiramo funkcijo  $f : X \rightarrow X$  s predpisom:

$$f(x) = \begin{cases} a, & \text{če } x \in B \\ b, & \text{če } x \in A. \end{cases}$$

Funkcija  $f$  ima samo dve periodični točki. To sta točki  $a$  in  $b$ . Obe pa imata periodo 2. Ker nobena točka prostora  $X$  ni fiksna točka za funkcijo  $f$ , prostor  $X$  ni prostor Šarkovskega.  $\square$

Pokazali smo, da je vsak prostor Šarkovskega povezan prostor. V nadaljevanju bomo ponovili kakšni prostori so s potmi povezani, lokalno povezani in lokalno s potmi povezani. S primeri se bomo prepričali, da obstajajo prostori Šarkovskega, ki imajo te lastnosti, in tudi prostori Šarkovskega, ki teh lastnosti nimajo.

**Definicija 10.3.** Topološki prostor  $X$  je *s potmi povezan*, če za poljubni točki  $a, b \in X$  obstaja zvezna preslikava  $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ , za katero je  $\gamma(0) = a$  in  $\gamma(1) = b$ . Preslikavi  $\gamma$  rečemo tudi pot med točkama  $a$  in  $b$ .

Primeri s potmi povezanih prostorov so intervali v realnih številih, krožnica, disk v  $\mathbb{R}^2 \dots$

**Trditev 10.4.** *Lastnost biti s potmi povezan je strožji pogoj, kot biti povezan. To pomeni, da je vsak s potmi povezan prostor tudi povezan.*


*Dokaz.* Naj bo  $X$  s potmi povezan prostor. Dokazovali bomo s protislovjem. Denimo, da prostor  $X$  ni povezan. Potem obstajata neprazni odprti množici  $U, V \subseteq X$ , za kateri veljata naslednji lastnosti:

- (1)  $U \cup V = X$  in
- (2)  $U \cap V \neq \emptyset$ .

Množici  $U$  in  $V$  sta neprazni, zato si lahko izberemo točki  $a \in U$  in  $b \in V$ . Prostor  $X$  je s potmi povezan, kar pomeni, da obstaja pot  $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ , za katero je  $\gamma(0) = a$  in  $\gamma(1) = b$ . Sedaj bomo obravnavali množici  $\gamma^{-1}(U)$  in  $\gamma^{-1}(V)$ . Množici sta disjunktni podmnožici intervala  $[0, 1]$ , njuna unija pa je enaka intervalu  $[0, 1]$ . Obe množici sta odprti v  $[0, 1]$ , saj je pot  $\gamma$  zvezna funkcija. Ker je 0 element množice  $\gamma^{-1}(U)$  in 1 element množice  $\gamma^{-1}(V)$ , tvorita ti dve množici separacijo povezane množice  $[0, 1]$ , kar je protislovje. Torej je prostor  $X$  povezan.  $\square$

Implikacija v drugo smer ne drži. Torej, če je nek topološki prostor  $X$  povezan, ne moremo sklepati, da je tudi s potmi povezan. Poglejmo si primer povezanega prostora, ki pa ni s potmi povezan.

**Definicija 10.5.** Naj bo  $C$  graf funkcije  $\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$  na intervalu  $x \in (0, 1]$  in naj bo  $A$  daljica  $\{0\} \times [-1, 1]$ . Varšavski lok je prostor  $X = C \cup A$ .



SLIKA 15. ~~Relacije pokritja v trditvi 5.5 lahko prikažemo z grafom.~~  
Varšavski lok.

Komponenta  $A$  je homeomorfna zaprtemu intervalu  $[-1, 1]$ , komponenta  $C$  pa je homeomorfna polodprtemu intervalu  $(0, 1]$ . Denimo, da lahko množico  $X$  zapišemo kot unija dveh nepraznih odprtih množic  $U$  in  $V$ . Ker je množica  $C$  povezana, celotna leži v eni množici, denimo, da leži v množici  $V$ . Pokažimo, da v vsaki okolici točke  $x = (0, 0) \in A$  ležijo tudi točke iz množice  $C$  in zato tudi iz množice  $V$ . Naj bo  $\delta$  poljubno majhno pozitivno število in množica  $\delta$  okolica točke  $x$  v prostoru  $X$ . Za naravno število  $k > \frac{1}{\pi\delta}$  točka  $(\frac{1}{k\pi}, 0)$  leži v množici  $C$  in v množici  $\delta$ , kar pomeni, da točka  $(0, 0)$  leži v množici  $V$ . Ker je množica  $A$  povezana množica, cela leži v množici  $V$ . Ugotovili smo, da celoten prostor  $X$  leži v množici  $V$ , zato je povezan prostor.

Pokažimo, da Varšavski lok ni s potmi povezan. Predpostavimo, da obstaja pot  $p$  med točkama  $(0, 0) \in A$  in  $(1, 0) \in C$ , za katero velja  $x(p(0)) = 0$  in  $x(p(1)) = 1$ . Naj bo  $x : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  projekcija na os  $x$ . Funkcija  $x$  je zvezna. Pot med točkama  $(0, 0)$

$$\begin{aligned} p(0) &= (0, 0) \\ p(1) &= (1, 0) \end{aligned}$$

in  $(1, 0)$  se začne na množici  $A$  in mora v neki točki „skočiti“ na množico  $C$ , ki je del Varšavskega loka s pozitivno koordinato  $x$ . ~~Lahko~~ definiramo natančen čas, ko se to zgodi kot število  $t_0$ :


$$t_0 := \inf\{t \in [0, 1] : x(p(t)) > 0\}.$$

Za vsako število  $t < t_0$  je  $x(p(t)) = 0$ . Zaradi zveznosti funkcije  $x \circ p$  v točki  $t_0$  velja enakost  $x(p(t_0)) = \lim_{t \uparrow t_0} x(p(t)) = 0$ . Zaradi zveznosti funkcije  $p$  lahko izberemo tako pozitivno realno število  $\delta$ , za katerega velja:

$$t_0 \leq t < t_0 + \delta \Rightarrow \|p(t) - p(t_0)\| < \frac{1}{2}.$$

Obstaja točka  $t_1 \in (t_0, t_0 + \delta)$ , za katero je  $a := x(p(t_1)) > 0$ . Ker je množica  $[t_0, t_1]$  povezana, je tudi njena slika  $x(p([t_0, t_1]))$  zvezno funkcijo  $x \circ p$  povezana in vsebuje  $0 = x(p(t_0))$  in  $a = x(p(t_1))$ . Vsaka povezana podmnožica množice realnih števil  $\mathbb{R}$  je interval, zato velja:

$$[0, a] \subseteq x(p([t_0, t_1])).$$



SLIKA 16. Relacije pokritja v trditvi 5.5 lahko prikažemo z grafom.

S slike lahko razberemo, da je to v protislovju z zveznostjo funkcije  $x \circ p$ , saj graf funkcije  $\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$  sega izven rdečega kroga s središčem v  $p(t_0)$ . Zato  $x$ -vrednosti točk na množici  $X$ , ki ležijo znotraj kroga, ne vsebujejo vseh vrednosti iz intervala  $[0, a]$ . Pretvorimo vizualno razlago v matematični dokaz.

Za  $k > \frac{2+a}{4a}$  ležita števili  $\frac{2}{4k+1}$  in  $\frac{2}{4k-1}$  v intervalu  $[0, a]$ . Ti dve števili predstavljata  $x$ -koordinati točk  $p(t')$  in  $p(t'')$  za neki števili  $t', t'' \in [t_0, t_0 + \delta)$ . Velja  $p(t') = (\frac{2}{4k+1}, 1)$  in  $p(t'') = (\frac{2}{4k-1}, -1)$ . Zaradi izbire števil  $t'$  in  $t''$  iz intervala  $[t_0, t_0 + \delta)$  in zaradi zveznosti funkcije  $p$ , velja  $\|p(t') - p(t_0)\| < \frac{1}{2}$  in  $\|p(t'') - p(t_0)\| < \frac{1}{2}$  iz česar sledi, da je  $\|p(t') - p(t'')\| < 1$ . Po drugi strani pa velja  $\|p(t') - p(t'')\| = \sqrt{\left(\frac{2}{4k+1} - \frac{2}{4k-1}\right)^2 + (1 - (-1))^2} \geq \sqrt{(1 - (-1))^2} = 2$ , kar je protislovje. Varšavski lok res ni s potmi povezan prostor.


**Definicija 10.6.** Prostor  $X$  je lokalno povezan prostor, če za vsako točko  $x \in X$  in vsako odprto množico  $U \subseteq X$ , ki vsebuje točko  $x$ , obstaja taka odprta povezana množica  $V \subseteq X$ , da je  $x \in V \subseteq U$ . Prostoru, ki ni lokalno povezan pravimo lokalno nepovezan prostor.

poglejmo si nekaj primerov:

**Primer 10.7.** Odprti disk v  $\mathbb{R}^2$  je povezan in lokalno povezan prostor. Prav tako so intervali v realnih številih lokalno povezani prostori.  $\diamond$

**Primer 10.8.** Poglejmo si nepovezan prostor, sestavljen iz treh komponent za povezanost kot prikazuje slika. Prostor je lokalno povezan, saj za vsako točko  $x \in X$  in vsako njeno odprto okolico  $U \subseteq X$  obstaja taka povezana okolica  $V$ , da je  $x \in V \subseteq U$ .  $\diamond$


Slika je že spremenjena



SLIKA 17. ~~Relacije pokritja v trditvi 5.5 lahko prikažemo z grafom.~~

~~Za vsako točko  $x \in X$  in vsako okolico  $U \subseteq X$  točke  $x$  obstaja odprta povezana množica  $V \subseteq U$ , za katero velja  $x \in V \subseteq U$ .~~

Obstajajo pa tudi prostori, ki so povezani, vendar so lokalno nepovezani. Perpričajmo se, da temu pogoju ustreza Varšavski lok. Slika 18 prikazuje na desni strani Varšavski lok, na levi strani pa je povečana okolica točke  $(0, 0)$ . Opazimo, da je vsaka okolica točke  $(0, 0)$  nepovezana, saj vsebuje nepovezane navpične črte, hi jih lahko vidimo v povečani okolici na sliki 18.



SLIKA 18. ~~Relacije pokritja v trditvi 5.5 lahko prikažemo z grafom.~~

~~Vsaka okolica točke  $(0, 0)$  je nepovezana.~~

**Definicija 10.9.** Prostor  $X$  je lokalno s potmi povezan prostor, če za vsako točko  $x \in X$  in vsako odprto množico  $U$  ki vsebuje  $x$ , obstaja odprta in s potmi povezana okolica, ki vsebuje  $x$  in je vsebovana v množici  $U$ .

Primer prostora, ki je lokalno s potmi povezan, je množica realnih števil ali interval v množici realnih števil. Primer prostora, ki ni lokalno s potmi povezan, pa je Varšavski lok. Slika 18 pokaže, da je vsaka okolica točke  $(0, 0)$  nepovezana, saj vsebuje nepovezane navpične črte.

Varšavski lok je primer prostora, ki ni s potmi povezan in ni lokalno povezan, a je kljub temu prostor Šarkovskega.

**Trditev 10.10.** Varšavski lok je prostor Šarkovskega.

**Dokaz.** Varšavski lok zapišimo kot  $X = C \cup A$ , kjer je  $A = \{0\} \times [-1, 1]$  in  $C$  krivulja  $\{(x, \sin(\frac{\pi}{x})) , x \in [0, 1]\}$ . Naj bo  $x \in X$  točka s periodo  $n$  in naj bo  $m$  tako naravno število, da velja relacija  $m \triangleleft n$ . Pokazali bomo, da obstaja točka  $y$  s periodo  $m$ . Ker je funkcija  $f$  zvezna, se ne more zgoditi, da  $f(A) \subseteq C$  in  $f(C) \subseteq A$ . V tem primeru bi bila množica  $f(C)$  kompaktna množica, ki nima skupne točke z množico  $C$ . Ker ima prostor  $\mathbb{R}$  lastnost  $T_4$ , obstajata disjunktni odprti množici,  $U$  in  $V$ , za kateri velja  $f(A) \subseteq U$ ,  $f(C) \subseteq V$ , kar predstavlja separacijo prostora  $f(X)$ , kar pa ni mogoče, saj je prostor  $X$  povezan. Množica  $f(X)$  je slika povezanega prostora z zvezno funkcijo in je tudi povezana. Če je  $f(A) \subseteq C$ , potem je zaradi zveznosti funkcije  $f$  tudi  $f(C) \subseteq C$ . Ker je  $X$  kompaktna množica in je slika kompaktne množice z zvezno preslikavo kompaktna, je množica  $f(X)$  kompaktna povezana podmnožica množice  $C$ . Množica  $C$  je homeomorfna intervalu, zato je tudi  $f(X)$  homeomorfna intervalu, kar pomeni, da je tudi  $f(X)$  prostor Šarkovskega. Zato obstaja točka  $y$  s periodo  $m$ . Če je  $f(C) \subseteq A$ , potem je tudi  $f(A) \subseteq A$  in vsaka periodična točka funkcije  $f$  leži v  $A$ . Zopet je množica  $f(X)$  povezana kompaktna podmnožica homeomorfna intervalu. Torej obstaja točka  $y$  s periodo  $m$ . Dokazati moramo še primer, ko je  $f(A) \not\subseteq A$  in  $f(C) \subseteq C$ . Ker sta prostora  $A$  in  $C$  homeomorfna intervalu, sta prostora Šarkovskega, kar pomeni, da zagotovo obstaja točka  $y \in X$ , ki leži v isti komponenti za povezanost s potmi kot točka  $x$  s periodo  $m$ .  $\square$

Pokazali smo že, da Varšavski lok ni s potmi povezan prostor. V dokazu smo se prepričali, da ne obstaja pot, ki bi povezovala prostora  $A$  in  $C$ . Če dodamo pot, ki poveže ta dva prostora, dobimo nov prostor, ki je s potmi povezan.

**Definicija 10.11.** Varšavska krožnica je topološki prostor, ki ga lahko definiramo na naslednji način:

$$S_W = \left\{ \left( x, \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) \right) ; 0 < x \leq 1 \right\} \cup \{(0, y) ; -1 \leq y \leq 1\} \cup C,$$

kjer je  $C$  zvezna krivulja, ki povezuje točki  $(0, -1)$  in  $(1, 0)$  in ne seka preostalega dela Varšavske krožnice. Množico lahko parametriziramo na naslednji način:


$$p(t) = \begin{cases} (t, \sin(\frac{\pi}{t})), & \text{če } t \in (0, 1) \\ (\cos(\frac{3\pi t}{2} - \frac{\pi}{2}) + 1, \sin(\frac{3\pi t}{2} - \frac{\pi}{2}) - 1), & \text{če } t \in [1, 2] \\ (0, 2t - 5), & \text{če } t \in (2, 3]. \end{cases}$$

Varšavska krožnica je povezan in s potmi povezan prostor, vendar ni lokalno povezan prostor. Prepričajmo se, da je Varšavska krožnica prostor Šarkovskega.

**Trditev 10.12.** Varšavska krožnica je prostor Šarkovskega.

**Dokaz.** Varšavsko krožnico lahko parametriziramo z zvezno bijektivno preslikavo  $p : I \rightarrow X$ . Naj bo  $f : X \rightarrow X$  zvezna funkcija. Ker je funkcija  $p$  bijektivna, je funkcija  $\hat{f} = p^{-1} \circ f \circ p : I \rightarrow I$  dobro definirana. Trdimo, da je funkcija  $\hat{f}$  zvezna. Ker je funkcija  $p$  bijekcija, imata funkciji  $f$  in  $\hat{f}$  enake periode. Ker je interval  $I$  prostor Šarkovskega, je tudi  $X$  prostor Šarkovskega.

Prepričati se moramo samo še, da je funkcija  $\hat{f}$  res zvezna. Naj bo  $t \in I$  poljubna točka intervala  $I$  in naj bo  $U \in I$  odprta okolica točke  $\hat{f}(t) = (p^{-1} \circ f \circ p)(t)$ . Množico robnih točk okolice  $U$  označimo z  $A$ . Velja  $|A| \leq 2$ . Ker ima  $X$  lastnost  $T_2$ , so točke zaprte množice in zato je množica  $X - p(A)$  odprta podmnožica prostora  $X$ , ki vsebuje točko  $(f \circ p)(t)$ . Povezano komponento množice  $(f \circ p)^{-1}(X - p(A))$ , ki vsebuje



SLIKA 19. Slika prikazuje primer varšavske krožnice določene s predpisom  $p$  iz definicije.

točko  $t$  označimo z  $W$ . Množica  $(f \circ p)^{-1}(X - p(A))$  je odprta podmnožica intervala  $I$ , saj je prasluka odprte množice z zvezno funkcijo  $(f \circ p)$ . Ker je interval  $I$  lokalno s potmi povezan, so komponente za povezanost s potmi odprte množice. Množica  $W$  je zato odprta. Sedaj obravnavajmo množico  $(p \circ \hat{f})(W) = (f \circ p)(W) \subseteq X - p(A)$ .


Ker je množica  $W$  povezana s potmi, je množica  $(p \circ \hat{f})(W)$  vsebovana v tisti komponenti za povezanost s potmi množice  $X - p(A)$ , ki vsebuje  $(f \circ p)(t)$ . Označimo to komponento za povezanost s potmi s  $Z$ .

Pokažimo, da je komponenta  $Z$  kar enaka  $p(U)$ . To je res, saj je množica  $p(U)$  povezana s potmi in je zato cela vsebovana v množici  $Z$ . Trdimo, da komponenta za povezanost s potmi ne more vsebovati nobene druge točke. Naj bo  $x$  točka iz množice  $X - p(A)$ , ki ne leži v množici  $p(U)$ . Potem točka  $p^{-1}(x)$  ne leži v intervalu  $U$ . Definiramo pot  $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$  med točkama  $x$  in  $(f \circ p)(t)$  s predpisom  $\gamma(z) = p((\hat{f}(t) - p^{-1}(x)) \cdot z + p^{-1}(x))$ . Ker v prostoru  $X$  med poljubnima točkama obstaja samo ena pot, je pot  $\gamma$  edina pot v množici  $X$  med točkama  $x$  in  $p(t)$ . Vendar, ker točka  $x$  ne leži v množici  $U$ , točka  $\hat{f}(t)$  pa leži v množici  $U$ , množica  $\{(\hat{f}(t) - p^{-1}(x)) \cdot z + p^{-1}(x), z \in [0, 1]\}$  vsebuje točko iz množice  $A$ . To pomeni, da pot  $\gamma$  seka množico  $p(A)$  in ne leži cela v množici  $X - p(A)$ . Sklepamo, da ne obstaja pot v množici  $X - p(A)$  od točke  $x$  do točke  $(f \circ p)(t)$ , zato točki  $x$  in  $(f \circ p)(t)$  ne ležita v isti komponenti za povezanost s potmi. Velja  $(p \circ f)(W) \subseteq p(U)$ , kar implicira vsebovanost  $\hat{f}(W) = (p^{-1} \circ f \circ p)(W) \subseteq (p^{-1} \circ p)(U) = U$ . Za poljubno točko  $t$  in poljubno odprto okolico  $U$  točke  $\hat{f}(t)$  smo našli odprto okolico  $W$  točke  $t$ , za katero velja  $\hat{f}(W) \subseteq U$ , kar dokazuje zveznost funkcije  $\hat{f}$ .  $\square$

## 11. LINEARNI KONTINUUM JE PROSTOR ŠARKOVskega

V tem poglavju bomo obravnavali topologijo porojemo z linearno ureditvijo. Spoznali bomo družino topoloških prostorov, ki jih imenujemo linearni kontinuum. Gre za neke vrste posplošitev premice realnih števil. Glavni cilj tega poglavja pa bo dokazati, da je linearni kontinuum prostor Šarkovskega.

Naj bo množica  $X$  urejena z linearno relacijo  $\leq$ . Za dana elementa  $a, b \in X$ , za katera velja neenakost  $a < b$ , lahko definiramo štiri podmnožice prostora  $X$ , ki jih



SLIKA 20. Slika prikazuje primer varšavske krožnice določene s predpisom  $p$  iz definicije.

imenujemo intervali s krajišči  $a$  in  $b$ . To so:

$$(a, b) = \{x \in X : a < x < b\}$$

$$(a, b] = \{x \in X : a < x \leq b\}$$

$$[a, b) = \{x \in X : a \leq x < b\}$$

$$[a, b] = \{x \in X : a \leq x \leq b\}$$

**Opomba 11.1.** Interval  $(a, b)$  imenujemo odprti interval, intervalu  $(a, b]$  rečemo pol odprti interval, interval  $[a, b)$  je pol zaprti interval, interval  $[a, b]$  pa je zaprti interval.

**Definicija 11.2.** Naj bo  $X$  množica z vsaj dvema elementoma urejena z relacijo  $\leq$  in naj bo  $\mathcal{B}$  družina množic, ki vsebuje intervale naslednjih tipov:

- (1) Vsi odprti intervali  $(a, b) \in \mathcal{B}$ .
- (2) Vsi intervali  $[a_0, b) \in \mathcal{B}$ , kjer je  $a_0$  najmanjši element (če obstaja) množice  $X$ .
- (3) Vsi intervali  $(a, b_0] \in \mathcal{B}$ , kjer je  $b_0$  največji element (če obstaja) množice  $X$ .

Družina množic  $\mathcal{B}$  je baza za topologijo na množici  $X$  porojena z ureditvijo  $\leq$ .

**Opomba 11.3.** Če množica  $X$  nima najmanjšega elementa, potem baza  $\mathcal{B}$  ne vsebuje intervalov tipa 2 in če množica  $X$  nima največjega elementa, potem baza  $\mathcal{B}$  ne vsebuje intervalov tipa 3.

Prepričati se moramo, da zgoraj opisana družina množic  $\mathcal{B}$  res predstavlja bazo topologije na množici  $X$  urejeni z linearno relacijo  $\leq$ . Družina podmnožic prostora  $X$  je baza topologije na prostoru  $X$ , če sta izpolnjeni naslednji lastnosti:



- (b1) Množice iz družine  $\mathcal{B}$  pokrijejo celoten prostor  $X$ . Torej, vsaka točka  $x \in X$  je vsebovana v neki množici  $B_1 \in \mathcal{B}$ .
- (b2) Za vsaki množici  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$  in vsako točko  $x \in B_1 \cap B_2$  obstaja množica  $B_3 \in \mathcal{B}$ , za katero velja  $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$ .

Preverimo najprej pogoj (b1). ~~Najprej~~ moramo preveriti, da je vsaka točka množice  $X$  vsebovana v nekem intervalu iz družine  $\mathcal{B}$ . Če je točka  $x$  enaka  $a_0$ , potem velja  $x \in [a_0, a)$  za neko točko  $a \in X$ . Podobno lahko sklepamo v primeru, ko je  $x = b_0$ . Če je  $x \neq a_0$  in  $x \neq b_0$ , potem zagotovo obstajata točki  $a, b \in X$ , za kateri velja  $a < x < b$ . Tedaj je točka  $x$  vsebovana v intervalu  $(a, b)$ .

Naj bosta  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$  poljubni bazni množici z nepraznim presekom in naj bo  $x \in B_1 \cap B_2$  poljubna točka iz preseka. Obravnavati moramo več možnosti.

Recimo, da sta obe množici  $B_1, B_2$  tipa 2, potem obstajata števili  $b_1, b_2 \in X$ , za kateri je  $B_1 = [a_0, b_1)$  in  $B_2 = [a_0, b_2)$ . Velja  $x \in [a_0, \min\{b_1, b_2\}) \subseteq B_1 \cap B_2$ . Podobno lahko sklepamo, ko sta obe množici  $B_1, B_2$  tipa 3.

Če je ena množica tipa 2, ena množica pa tipa 3, lahko zapišemo množici z intervali  $B_1 = [a_0, b_1)$  in  $B_2 = (a_2, b_0]$ . Predpostavimo, da je presek teh dveh množic neprazen in da je  $x \in B_1 \cap B_2$ . Potem je izpolnjena neenakost  $a_2 < b_1$ , zato velja  $x \in (a_2, b_1) \subseteq B_1 \cap B_2$ .

B\_2

Predpostavimo, da je ena množica tipa 1, ena množica pa je tipa 2. Množici zapišemo s pomočjo intervalov  $B_1 = (a_1, b_1)$ ,  $B_2 = [a_0, b_2)$ . Denimo, da imata množici  $B_1$  in  $B_2$  neprazen presek. Potem velja  $a_1 < b_2$ . Za vsako število  $x$  iz preseka  $B_1 \cap B_2$  velja  $x \in (a_1, \min\{b_1, b_2\}) \subseteq B_1 \cap B_2$ . Podoben razmislek deluje tudi v primeru, če je druga množica tipa 3.

Na koncu obravnavamo primer, ko sta obe množici tipa 1. Zapišimo ju z intervali:  $B_1 = (a_1, b_1)$ ,  $B_2 = (a_2, b_2)$ . Za vsako število  $x \in B_1 \cap B_2$  velja  $x \in (\max\{a_1, a_2\}, \min\{b_1, b_2\}) \subseteq B_1 \cap B_2$ . Dokazali smo, da družina množic  $\mathcal{B}$  res predstavlja bazo topologije na prostoru  $X$ .

**Definicija 11.4.** Množici  $S$  z vsaj dvema elementoma, ki je urejena z linearno relacijo  $\leq$  in opremljena s topologijo, ki jo porodi linearna relacija, pravimo *linearni kontinuum*, če ustreza naslednjima dvema lastnostma:

neprazna

- (1) Vsaka navzgor omejena podmnožica  $A \subseteq S$  ima najmanjšo zgornjo mejo v  $S$ ,
- (2) za vsaki dve števili  $x, y \in S$ , za kateri velja  $x < y$ , obstaja število  $z \in S$ , za katerega je  $x < z < y$ .

Tipičen primer linearnega kontinuuma je množica realnih števil urejena s standardno relacijo  $\leq$ . Prav tako je vsak interval v realnih številih linearni kontinuum. Poglejmo si še en primer.

**Primer 11.5.** Na prostoru  $[0, 1] \times [0, 1]$  lahko definiramo linearno relacijo  $\preceq$ . Točki  $(x, y)$  in  $(a, b)$  sta v relaciji  $(x, y) \preceq (a, b)$  natanko tedaj, ko velja  $x < a$  ali velja  $x = a$  in  $y \leq b$ . S simboli lahko zapišemo:


$$(x, y) \preceq (a, b) \Leftrightarrow (x < a) \vee (x = a \wedge y \leq b).$$

Relacijo  $\preceq$  imenujemo *leksikografska ureditev*. Prostor  $[0, 1] \times [0, 1]$  skupaj z leksikografsko ureditvijo je linearni kontinuum.

Prepričajmo se, da je izpolnjena lastnost 1. Naj bo preslikava  $\pi : I \times I \rightarrow I$  s predpisom  $\pi((x, y)) = x$  pravokotna projekcija na os  $x$ . Preslikava  $\pi$  je zvezna in surjektivna. Naj bo  $A$  neprazna in navzgor omejena podmnožica množice  $I \times I$ .

s topologijo, ki jo porodi leksikografska ureditev





$$a < c \Rightarrow (a, b) \preceq (c, d)$$

$$a = c \wedge b \leq d \Rightarrow (a, b) \preceq (c, d)$$

SLIKA 21. Relacije pokritja v trditvi 5.5 lahko prikažemo z grafom.

Množica  $\pi(A)$  je navzgor omejena podmnožica intervala  $I$ . Ker ima množica  $I$  lastnost 1, obstaja najmanjša zgornja meja  $b$  množice  $\pi(A)$ . Če točka  $b$  pripada množici  $\pi(A)$ , potem množica  $b \times I$  seka množico  $A$  v neki točki  $(b, c)$ . Ker je množica  $b \times I$  ekvivalentna množici  $I$ , ima lastnost 1, zato obstaja najmanjša zgornja meja  $(b, c')$  za množico  $(b \times I) \cap A$ . Ta točka je tudi najmanjša zgornja meja množice  $A$ . V primeru, ko točka  $b$  ne leži v množici  $\pi(A)$ , je najmanjša zgornja meja množice  $A$  točka  $(b, 0)$ . Res, če je za neki števili  $d < b$  in  $e \in I$  točka  $(d, e)$  najmanjša zgornja meja množice  $A$ , potem je  $d$  manjša zgornja meja množice  $\pi(A)$  kot  $b$ , kar je protislovje s tem, da je  $b$  najmanjša zgornja meja množice  $\pi(A)$ . Prostor  $I \times I$  ima tudi lastnost 2. Naj bosta  $(x, y)$  in  $(a, b)$  dve točki v prostoru  $I \times I$ , ki ustrezata relaciji  $(x, y) \preceq (a, b)$ . Če je  $x < a$ , potem obstaja število  $u$ , za katerega velja  $x < u < a$ . Sedaj lahko zapišemo relacijo  $(x, y) \preceq (u, 0) \preceq (a, b)$ . V primeru, ko je  $x = a$  in  $y < b$ , obstaja število  $v$ , ki izpolnjuje pogoj  $y < v < b$ . Sedaj je izpolnjena relacija  $(x, y) \preceq (x, v) \preceq (a, b)$ .  $\diamond$

**Trditev 11.6.** *Linearno urejena množica  $X$  s topologijo porojeno z linearno relacijo  $\leq$  je linearni kontinuum natanko tedaj, ko je povezana.*

*Dokaz.* Predpostavimo, da je prostor  $X$  opremljen s topologijo porojeno z linearno relacijo  $\leq$ . Denimo, da  $X$  ni linearni kontinuum. Potem ne zadošča pogoju 1 ali ne zadošča pogoju 2. Recimo, da ne množica  $X$  ne zadošča pogoju 1. Naj bo  $A$  neprazna podmnožica množice  $X$ , ki je navzgor omejena s točko  $b$ , vendar nima najmanjše zgornje meje. Naj bo  $U$  množica vseh zgornjih mej množice  $A$ . Če točka  $x$  leži v množici  $U$ , potem točka  $x$  ni najmanjša zgornja meja množice  $A$ , zato obstaja  $z \in X$ , za katerega je  $z < x$  in  $z$  je tudi zgornja meja množice  $A$ . Množica  $\{y \in X; y > z\}$  je odprta neprazna, saj vsebuje točko  $x$ . Vsak njen element je večji od točke  $z$  in je tako zgornja meja množice  $A$ . Torej, množica  $\{y \in X; y > z\}$  je odprta podmnožica množice  $U$ , ki vsebuje točko  $x$ . Ugotovili smo, da je množica  $U$  odprta podmnožica prostora  $X$ . Množica  $U$  je neprazna, saj vsebuje točko  $b$ .

Naj bo  $w$  poljubna točka iz množice  $X \setminus U$ . Potem  $w$  zagotovo ni zgornja meja množice  $A$ , zato obstaja točka  $a \in A$ , za katero je  $w < a$ . Množica  $\{y \in X; y < a\}$  je odprta in ne vsebuje nobene zgornje meje množice  $A$ , zato je vsebovana v množici  $X \setminus U$ . Sklepamo, množica  $X \setminus U$  vsebuje odprto okolico točke  $w$  in je zato odprta množica.

Ker sta množici  $U$  in  $X \setminus U$  obe neprazni in odprti, tvorita separacijo prostora  $X$ .

Recimo, da prostor  $X$  ne ustreza pogoju 2. To pomeni, da obstajata elementa  $a$  in  $b$  v prostoru  $X$ , za katere velja  $a < b$ , vendar ne obstaja točka  $c \in X$ , za katero je izpolnjena neenakost  $a < c < b$ . Definiramo množici  $U := \{x \in X, x < b\}$  in  $V := \{x \in X; x > a\}$ . Ker med točko  $a$  in točko  $b$  ne leži nobena točka iz  $X$ , sta množici  $U$  in  $V$  disjunktni. Ker je relacija  $<$  relacija linearne urejenosti, za vsaki točki  $x$  in  $y$  velja  $x < y$  ali  $y < x$ . Za poljubno točko  $x \in X$  lahko velja  $x < a$ ,  $a < x$  ali  $x = a$ . Če je  $x < a$ , zaradi tranzitivnosti sklepamo, da je  $x < b$ , kar pomeni, da je točka  $x$  vsebovana v množici  $U$ . Če je  $x = a$ , velja  $x = a < b$ , zato točka  $x$  pripada množici  $U$ . Kadar je  $a < x$ , točka  $x$  pripada množici  $V$ . Prepričali smo se, da je  $U \cup V = X$ . Množici  $U$  in  $V$  sta neprazni, saj prva vsebuje točko  $a$ , druga pa vsebuje točko  $b$ . Množici sta tudi odprti in tvorita particijo množice  $X$ . Prepričali smo se, da je množica  $X$  nepovezana. Torej, če je prostor  $X$  povezan, je linearni kontinuum.

Predpostavimo, da je  $X$  nepovezana množica z lastnostjo 1. Naj bosta množici  $U$  in  $V$  neprazni odprti množici, ki tvorita particijo prostora  $X$ . Naj bo  $a$  točka iz množice  $V$  in naj obstaja taka točka  $b \in U$ , ki ustreza relaciji  $b < a$ . Če taka točka ne obstaja, zamenjamo imeni za množici  $U$  in  $V$ . Množica  $Z = \{x \in U, x < a\}$  je odprta množica, saj jo dobimo kot presek odprte množice  $U$  in odprte množice  $\{x \in X, x < a\}$ . Množica  $Z$  je neprazna, saj vsebuje točko  $b$ . Ker je množica  $Z$  navzgor omejena, ima najmanjšo zgornjo mejo  $z$ .

Predpostavimo, da je točka  $z$  vsebovana v množici  $U$ . Množica  $U$  je odprta, zato obstaja interval v  $U$ , ki vsebuje točko  $z$ . Interval ne more vsebovati točke  $a$ , zato mora biti oblike  $\{x \in X, x < j\}$  ali  $\{x \in X, k < x < j\}$  za neko število  $j$  in morda  $k$ . V obeh primerih velja  $z < j < a$ . Naj bo  $W := \{x \in X, z < x < j\}$  množica vseh točk iz  $X$ , ki ležijo med točkama  $z$  in  $j$ . Če je  $x \in W$ , potem je  $x$  iz množice  $U$  in velja  $x < a$ , kar pomeni, da je  $x$  element množice  $Z$ . To je v protislovju s predpostavko, da je  $z$  zgornja meja množice  $Z$ . Množica  $W$  je prazna množica, zato med točkama  $j$  in  $z$  ne leži nobena točka iz  $X$ . Množica  $X$  ne izpolnjuje pogoja 2 in zato ni linearni kontinuum.  $\square$

Trditev, da je linearni kontinuum prostor Šarkovskega, bomo dokazali tako, da bomo sledili dokazu, ki smo ga zapisali za realna števila in izreke, leme, trditve in definicije iz dokaza za realna števila prilagodili linearnemu kontinuumu. Najprej bomo obravnavali posplošitve v poglavju 3. Zapišimo in dokažimo posplošitev izreka o vmesni vrednosti za linearni kontinuum.

**Izrek 11.7** (izrek o vmesni vrednosti za linearni kontinuum). *Naj bo  $f : X \rightarrow Y$  zvezna funkcija, kjer je  $X$  povezan prostor in  $Y$  urejen prostor s topologijo urejenih množic. Če sta  $a$  in  $b$  dve točki v prostoru  $X$  in je  $r$  točka v prostoru  $Y$ , ki leži med točkama  $f(a)$  in  $f(b)$ , potem obstaja točka  $c \in X$ , za katero velja  $f(c) = r$ .*

*Dokaz.* Privzemimo predpostavke izreka. Množici  $A = f(X) \cap (-\infty, r)$  in  $B = f(X) \cap (r, \infty)$  sta disjunktni in neprazni, saj ena množica vsebuje točko  $f(a)$ , druga pa točko  $f(b)$ . Obe sta odprti v  $f(X)$  saj smo ju dobili kot presek odprtega intervala z množico  $f(X)$ . Če ne obstaja taka točka  $c \in X$ , da je  $f(c) = r$ , potem je  $f(X)$  unija množic  $A$  in  $B$ . Na ta način smo dobili separacijo množice  $f(X)$ , kar pa je protislovje, saj je slika povezane množice z zvezno preslikavo povezana.  $\square$

Sedaj dokažimo posplošitev leme 3.5

**Lema 11.8.** Naj bo  $L$  linearni kontinuum s topologijo urejenih množic. Naj bosta  $I$  in  $J$  zaprti intervala v  $L$  in  $f : L \rightarrow L$  zvezna funkcija. Če je  $J \subseteq f(I)$ , obstaja zaprt interval  $K \subseteq I$ , za katerega je  $f(K) = J$ .

*Dokaz.* Izberemo taki točki  $p, q \in I$ , da velja  $p < q$  in  $J = [f(p), f(q)]$  ali  $J = [f(q), f(p)]$ . Definiramo točko  $r \in [p, q]$ :

$$r := \sup\{x \in [p, q] : f(x) = f(p)\}.$$

Trdimo, da je  $f(r) = f(p)$ . V nasprotnem primeru obstaja odprta množica  $V$ , ki vsebuje točko  $f(r)$  in ne vsebuje točke  $f(p)$ . To je res, ker je prostor  $L$  Hausdorffov. Zaradi zveznosti funkcije  $f$  obstaja taka odprta okolica  $U$  točke  $r$ , da je  $f(U) \subseteq V$ . Ker je  $L$  linearni kontinuum obstaja taka točka  $p \leq r' < r$ , za katero je interval  $[r', r]$  vsebovan v množici  $U$ . Torej je  $f([r', r]) \subseteq V$ , kar pomeni, da  $f(p) \notin f([r', r])$ . To pa je protislovje z definicijo točke  $r$  kot supremum množice. Sedaj definiramo točko  $s \in (r, q]$ :

$$s := \inf\{x \in [r, q] : f(x) = f(q)\}.$$

Enako kot prej se prepričamo, da je  $f(s) = f(q)$ . Zapišimo  $Q = [r, s]$  in pokažimo, da je  $f(Q) = J$ . Izrek o vmesni vrednosti zagotavlja, da je interval  $J$  vsebovan v množici  $f([r, s])$ . Velja tudi  $f([r, s]) \subseteq J$ , saj v nasprotnem primeru obstaja  $r < x < s$ , za katerega velja  $f(x) \notin J$ . Če je  $f(x) < f(p) < f(q)$  ali  $f(q) < f(p) < f(x)$ , potem po izreku o vmesni vrednosti obstaja tak  $x'$ , da velja  $r < x < x' < s$  in  $f(p) = f(x')$ . to pa je protislovje z definicijo točke  $r$  kot supremum. Če je  $f(x) < f(q) < f(p)$  ali  $f(p) < f(q) < f(x)$ , to privede do protislovja z definicijo točke  $s$  kot infimum. To pomeni, da res velja  $J = f(Q)$ .  $\square$

Tudi lemo ?? moramo prilagoditi za linearni kontinuum.

**Lema 11.9.** Naj bo  $L$  linearni kontinuum v topologiji urejenih množic. Naj bosta  $I$  zaprt interval v  $L$  in  $f : L \rightarrow L$  zvezna funkcija. Če je  $I \subseteq f(I)$ , potem ima  $f$  negibno točko  $x \in I$ .

*Dokaz.* S pomočjo leme 11.8 ugotovimo, da obstaja zaprt interval  $Q \subseteq I$ , za katerega je  $f(Q) = I$ . Pokazali bomo, da ima funkcija  $f$  negibno točko v intervalu  $Q$ . Predpostavimo, da funkcija  $f$  na intervalu  $Q$  nima negibne točke. Potem lahko zapišemo  $Q = A \cup B$ , kjer je:

$$A = \{x \in L : x < f(x)\},$$

$$B = \{x \in L : x > f(x)\}.$$

Trdimo, da je množica  $A$  odprta. Za vsako točko  $x \in A$  lahko izberemo točko  $z \in (x, f(x))$  in odprto okolico  $U \subseteq (-\infty, z)$  točke  $x$ , za katero velja  $f(U) \subseteq (z, \infty)$ . Ker je množica  $U$  podmnožica množice  $A$ , je točka  $x$  notranja točka množice  $A$ . Množica  $A$  je odprta. Podobno lahko dokažemo, da je množica  $B$  odprta. Množici  $Q \cap A$  in  $Q \cap B$  sta odprti podmnožici množice  $Q$  za kateri velja  $Q = (Q \cap A) \cup (Q \cap B)$ . Radi bi videli, da sta množici  $Q \cap A$  in  $Q \cap B$  neprazni. Zapišimo  $I = [c, d]$ . Ker je  $f(Q) = I$ , obstaja  $x' \in Q$ , za katerega je  $f(x') = d$ . Ker  $f$  nima fiksne točke na  $Q$ , je  $x' \neq d$ . Interval  $Q$  je pomnožica intervala  $I$ , zato velja  $x' < f(x') = d$ , kar pomeni, da je  $x' \in Q \cap A$ . Analogno poiščemo točko  $x'' \in Q - \{c\}$  z lastnostjo:  $f(x'') = c$  in  $x'' \in Q \cap B$ . Torej, množici  $Q \cap A$  in  $Q \cap B$  tvorita separacijo povezanega prostora  $Q$ , kar je protislovje. Funkcija  $f$  ima negibno točko v intervalu  $Q$ .  $\square$

Preostanek poglavja velja tudi za intervale v linearnem kontinuumu.

V poglavju 5 moramo razložiti besedišče, da je primerno za linearni kontinuum. Naj bo  $L$  linearni kontinuum s topologijo, ki jo poraja linearna relacija  $\leq$ . Za točki  $x$  in  $y$  iz linearnega kontinuuma  $L$  rečemo, da  $x$  leži levo od  $y$  natanko tedaj, ko velja  $x < y$ . Ekvivalentno rečemo, da  $x$  leži desno od  $y$ , če velja  $y < x$ . Ker je  $L$  linearni kontinuum, za vsaki točki  $x, y \in L$  obstaja točka  $z$ , ki izpolnjuje pogoj  $x < z < y$ . Tako lahko za center cikla  $\mathcal{O}$  v linearnem kontinuumu izberemo poljubno točko  $c \in L$ , ki izpolnjuje pogoj  $p < c < q$ . Pri definiciji 5.2, kjer smo definirali Štefanovo zaporedje moramo pojasniti točko (Š3). Kaj pomeni, da sta zaporedji  $\{x_{2j}\}_{j=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$  in  $\{x_{2j+1}\}_{j=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$  strogo monotoni in se oddaljujeta od točke  $c$ ? Povedati želimo, da vsak naslednji člen zaporedja, ki leži levo od točke  $c$ , leži levo od prejšnjega člena. Vsak naslednji člen zaporedja, ki leži desno od točke  $c$  pa leži desno od prejšnjega člena. Preostanek poglavja 5 in poglavji 6 in 7 veljajo tudi za funkcije in intervale definirane na linearnem kontinuumu, zato je linearni kontinuum tudi prostor Šarkovskega.