

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 2. stopnja

Tom Gornik  
**Izrek Šarkovskega**

Magistrsko delo

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Vavpetič

Ljubljana, 2023

KAZALO

# **Izrek Šarkovskega**

POVZETEK

## **Sharkovsky theorem**

ABSTRACT

**Math. Subj. Class. (2010):**

**Ključne besede:**

**Keywords:** V tem poglavju si bomo zaradi lažjega razumevanja pogledali nekaj

posebnih primerov. Najprej si bomo pogledali najbolj znan poseben primer izreka Šarkovskega, ki obravnava funkcije s periodo 3. V naslednjih dveh primerih bomo postopek iz prvega primera razširili na daljše cikle. V zadnjem primeru bomo nakazali, kako lahko iz periodičnih točk funkcije  $f^2$  ugotovimo, katere periode ima funkcija  $f$ , kar igra pomembno vlogo pri dokazu izreka ??.

**Primer 0.1** (3-cikel). Prepričajmo se, da perioda 3 implicira obstoj vseh ostalih period. Točka lahko tvori 3-cikel na dva različna načina, ki sta v resnici zrcalna podoba drug drugega. Slika 1 prikazuje oba primera. Črtkane puščice nakazujejo,



SLIKA 1. Zrcalna podoba ciklov.

kam se s funkcijo  $f$  slikajo točke. Velja:

$$x_1 = f(x_0), x_2 = f(x_1) \text{ in } x_0 = f(x_2).$$

V obeh primerih smo z  $I_1$  označili  $\mathcal{O}$ -interval s krajišči  $x_0$  in  $x_1$ , z  $I_0$  pa  $\mathcal{O}$ -interval s krajišči  $x_0$  in  $x_2$ . Krajišči intervala  $I_1$  se slikata v skrajno levo in skrajno desno točko cikla, zato imamo  $\mathcal{O}$ -vsiljeni pokritji  $I_1 \rightarrow I_1$  in  $I_1 \rightarrow I_0$ . Krajišči intervala  $I_0$  se slikata v krajišči intervala  $I_1$ , zato je tudi pokritje  $I_0 \rightarrow I_1$   $\mathcal{O}$ -vsiljeno. Ugotovljena pokritja lahko strnemo v diagram  $\hookrightarrow I_1 \rightleftharpoons I_0$ . Iz relacije pokritosti  $I_1 \rightarrow I_1$  in leme ?? sklepamo, da interval  $I_1$  vsebuje negibno točko. Krajišči intervala  $I_0$  ne morejo slediti zanki  $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow I_0$ , saj sta periodični točki s periodo 3. Točke, ki sledijo zanki, pa imajo periodo 1 ali 2. Ker je notranjost intervala  $I_0$  disjunktna z intervalom  $I_1$ , lahko s pomočjo leme ?? sklepamo, da je zanka elementarna. Torej lahko v intervalu  $I_0$  poiščemo točko s periodo 2. Za dokaz obstoja točke s periodo  $l \geq 4$  si pogledjmo zanko


$$(1) \quad I_0 \rightarrow \overbrace{I_1 \rightarrow I_1 \rightarrow \cdots \rightarrow I_1}^{l-1 \text{ ponovitev intervala } I_0} \rightarrow I_0.$$

V tej zanki nastopajo vsaj 3 kopije intervala  $I_1$ , v katerem ležita samo dve točki  $\mathcal{O}$ -intervala. Ker imajo točke iz cikla  $\mathcal{O}$  periodo 3, v intervalu  $I_1$  ne morejo ležati trije zaporedni členi iz cikla  $\mathcal{O}$ , torej tudi tri zaporedne iteracije funkcije  $f$  na krajiščih intervala  $I_0$  ne morejo ležati v intervalu  $I_1$ . To pomeni, da krajišči intervala  $I_0$  ne moreta slediti zanki. Že prej smo ugotovili, da je notranjost intervala  $I_0$  disjunktna z intervalom  $I_1$ , zato je zanka (1) elementarna zanka dolžine  $l$ . Elementarna  $l$ -zanka vsebuje točko periode  $l$ , torej ima funkcija  $f$  periodo  $l$  za vsak  $l \geq 4$ . Pokazali smo, da je vsako naravno število perioda funkcije  $f$ .  $\diamond$


**Primer 0.2** (7-cikel). Sedaj bomo obravnavali 7-cikel  $\mathcal{O}$  in  $\mathcal{O}$ -intervale prikazane na sliki 2. Podobno kot pri prejšnjem primeru označimo točke  $x_i = f^i(x_0)$  ter intervale  $I_1 = [x_0, x_1]$ ,  $I_2 = [x_1, x_2]$  in tako naprej kot prikazuje slika 2. Za tako izbiro intervalov dobimo naslednje  $\mathcal{O}$ -vsiljene relacije pokritosti:

- (1)  $I_1 \rightarrow I_1$ ,
- (2)  $I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow I_3 \rightarrow I_4 \rightarrow I_5 \rightarrow I_0$ ,
- (3)  $I_0 \rightarrow I_1$ ,  $I_0 \rightarrow I_3$  in  $I_0 \rightarrow I_5$ .

Zgornje relacije pokritosti lahko prikažemo z grafom, ki ga prikazuje slika 3. Iz grafa preberemo naslednje zanke.



SLIKA 2. Primer 7-cikla.




SLIKA 3. diagram

- (1)  $I_1 \rightarrow I_1$ ,
- (2)  $I_0 \rightarrow I_5 \rightarrow I_1$ ,
- (3)  $I_0 \rightarrow I_3 \rightarrow I_4 \rightarrow I_5 \rightarrow I_0$ ,
- (4)  $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow I_3 \rightarrow I_4 \rightarrow I_5 \rightarrow I_0$ ,
- (5)  $I_0 \rightarrow \underbrace{I_1 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_1}_{r \text{ ponovitev intervala } I_1} \rightarrow I_2 \rightarrow I_3 \rightarrow I_4 \rightarrow I_5 \rightarrow I_0$ , kjer je  $r \geq 3$ .

Zanka  $I_1 \rightarrow I_1$  je elementarna, saj je elementarna vsaka zanka dolžine 1. Pri ostalih zankah lahko najprej ugotovimo, da za vsak  $j \in \{1, 2, \dots, 5\}$  velja  $\text{int}(I_0) \cap I_j = \emptyset$ . Pri zankah (2), (3) in (4) nobena robna točka intervala  $I_0$  ne more slediti zanki, saj je perioda robnih točk 7, perioda točk, ki sledijo zankam (2), (3) in (4) pa je manjša ali enaka 6. S tem so izpolnjeni pogoji leme ?? in so zanke elementarne. V teh zankah lahko poiščemo točke s periodami 2, 4, ali 6. Podobno kot v primeru 0.1 ugotovimo, da nobene tri zaporedne iteracije funkcije  $f$  na točkah cikla  $\mathcal{O}$  ne ležijo v intervalu  $I_1$ , zato v tem intervalu tudi ne morejo ležati tri zaporedne iteracije funkcije  $f$  na robnih točkah intervala  $I_0$ . To pomeni, da krajišči intervala  $I_0$  ne sledita zanki (5). S tem razmislekom so izpolnjeni pogoji leme ??, zato je zanka (5) elementarna. Za dolžino zanke (5) lahko izberemo katerokoli naravno število večje od 7. Torej lahko na podlagi prisotnosti 7-cikla na sliki 2 sklepamo, da so prisotne vse periode  $l$ , za katere je  $l \triangleleft 7$   $\diamond$


**Primer 0.3** (9-cikel). Predpostavimo, da ima funkcija  $f$  9-cikel  $\mathcal{O}$ , ki je prikazan na sliki 4. Določili smo šest  $\mathcal{O}$ -intervalov  $I_0, I_1, \dots, I_5$ , za katere velja, da je notranjost intervala  $I_0$  disjunktna z ostalimi intervali. Torej za  $j = 1, 2, \dots, 5$  velja enakost:  $\text{int}(I_0) \cap I_j = \emptyset$ . Za tako izbrane intervale dobimo enake relacije pokritja kot v



SLIKA 4. Primer 9-cikla.

primeru 0.1 in lahko s pomočjo enakih sklepov ugotovimo prisotnost enakih elementarnih zank in posledično periodičnih točk s periodami 1, 2, 4, 6 in vse periode večje od 7.

Zaporedje števil  $x_0, x_1, \dots, x_6$  smo določili tako, da se spiralno oddaljujejo od centra  $c := \frac{x_0 + x_1}{2}$ , kar je prikazano na sliki 5. S tako izbiro točk v zaporedju ne nastopajo vse točke cikla  $\mathcal{O}$  in tudi ne velja enakost  $f(x_i) = x_{i+1}$  za vsak  $i = 1, 2, \dots, 5$ , kot je to veljalo v primeru 0.2.



SLIKA 5. Izbira točk  $x_0, \dots, x_6$ , ki se spiralno oddaljujejo od centra  $c$ .


V poglavju ?? je predstavljen algoritem za izbiro zaporedja točk  $x_0, x_1, \dots, x_6$ . Glavna ideja algoritma je, da za naslednji člen zaporedja ne izberemo vedno sliko prejšnjega člena na način:  $x_{i+1} = f(x_i)$ , vendar včasih izberemo točko, ki je bližje centru  $c$ . Točko  $x_{i+1}$ , ki je bližje centra  $c$  kot točka  $f(x_i)$ , izberemo, če je slika  $f(x_{i+1})$  bolj oddaljena od centra kot točka  $f(f(x_i))$ . Postopka izbire naslednje točke na sliki ?? in na sliki 5 sta podobna. V obeh primerih se pomikamo navpično do grafa funkcije in nato vodoravno do simetrale lihih kvadrantov. Sprememba se zgodi na sliki 5, ko lahko izberemo še neizbrano točko tako, da se v vodoravni smeri pomaknemo proti centru  $c$  in v navpični smeri stran od centra  $c$ . To se na sliki 5

zgodi dvakrat in je prikazano s krivimi puščicami. Postopek se ustavi, ko pridemo do točke  $x_j$ , katere slika  $f(x_j)$  je na isti strani centra  $c$  kot točka sama. V primeru na sliki 5 je to točka  $x_6$ .

V poglavju ?? si bomo natančno pogledali kakšne lastnosti mora imeti zaporedje točk  $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ , ki predstavlja krajišča intervalov  $I_0, I_1, \dots, I_{n-1}$ . Izvedeli bomo tudi, kako taka izbira točk in intervalov zagotavlja obstoj elementarnih zank. V poglavju ?? se bomo naučili, kako iz točk cikla izberemo zaporedje, ki ima željene lastnosti.

◇

**Primer 0.4** (6-cikel). Obravnavali bomo 6-cikel, ki je na sliki 6. Bistveno pri tem



SLIKA 6. Primer 6-cikla.

primeru je, da se tri točke na levi strani slikajo v tri točke na desni in obratno. Torej, tri točke na desni tvorijo 3-cikel  $\bullet \dashrightarrow \bullet \dashrightarrow \bullet$  za funkcijo  $f^2$ . Podobno kot v primeru 0.1 lahko določimo intervala  $I_0$  in  $I_1$  ter opazujemo relacije pokritja  $I_1 \xrightarrow{f^2} I_1$ ,  $I_1 \xrightarrow{f^2} I_0$  in  $I_0 \xrightarrow{f^2} I_1$  za intervala  $I_0$  in  $I_1$ , ki sta prikazana na sliki 6. Enako kot prej lahko zaključimo, da ima funkcija  $f^2$  elementarne zanke vseh dolžin in zato je vsako naravno število  $l \in \mathbb{N}$  perioda funkcije  $f^2$ . Za funkcijo  $f$  določimo še dva intervala. Interval  $I'_0$  naj bo najkrajši  $\mathcal{O}$ -interval, ki vsebuje točke iz množice  $f(I_0 \cup \mathcal{O})$ , interval  $I'_1$  pa naj bo najkrajši  $\mathcal{O}$ -interval, ki vsebuje točke iz množice  $f(I_1 \cup \mathcal{O})$ . Sedaj bomo prikazali rekurzivno metodo, ki jo bomo uporabili kasneje v dokazu izreka Šarkovskega. Pokazali bomo, kako lahko s pomočjo elementarne  $k$ -zanke za funkcijo  $f^2$  poiščemo elementarno  $2k$ -zanko za funkcijo  $f$ . V primeru, ki ga obravnavamo, bo to pomenilo, da je vsako sodo naravno število perioda funkcije  $f$ . Poglejmo si elementarno  $k$ -zanko za funkcijo  $f^2$ , v kateri nastopajo relacije pokritja  $I_1 \xrightarrow{f^2} I_1$ ,  $I_1 \xrightarrow{f^2} I_0$  in  $I_0 \xrightarrow{f^2} I_1$ . Vsak zapis  $I_1 \xrightarrow{f^2}$  v zanki lahko zamenjamo z  $I_1 \xrightarrow{f} I'_1 \xrightarrow{f}$ , vsak zapis  $I_0 \xrightarrow{f^2}$  pa z  $I_0 \xrightarrow{f} I'_0 \xrightarrow{f}$ . S to spremembo dobimo  $2k$ -zanko za funkcijo  $f$ , ki ni samo dvakrat ponovljena  $k$ -zanka. Prepričajmo se, da je  $2k$ -zanka elementarna. Denimo, da točka  $p$  sledi  $2k$ -zanki za funkcijo  $f$ . Pokazati moramo, da ima periodo  $2k$  za funkcijo  $f$ . Opazimo, da točka  $p$  sledi prvotni  $k$ -zanki za funkcijo  $f^2$  in ima zato periodo  $k$  za funkcijo  $f^2$ . Po drugi strani pa iteracije točke  $p$  s funkcijo  $f$  ležijo alternirajoče enkrat na levi in enkrat na desni strani srednjega intervala, saj  $2k$ -zanka za  $f$  alternira med intervali s črtico in intervali brez črtice. Zato je orbita točke  $p$  sestavljena iz  $2k$  različnih točk. Na desni strani srednjega intervala leži  $k$  sodih iteracij, na levi strani pa leži  $k$  lihih iteracij. To pomeni, da je perioda točke  $p$  za  $f$  enaka  $2k$ . Ker smo dolžino začetne elementarne  $k$ -zanke izbrali poljubno, smo pokazali, da je vsako sodo število perioda za  $f$ . Ker interval  $[x_0, x_1]$  s funkcijo  $f$  pokrije samega sebe, pa obstaja negibna točka. Torej ima  $f$  tudi periodo 1. ◇