

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA**EXAME - Época de Recurso**

Justifique devidamente todas as respostas.

Grupo I

1. (Cotação: 1+1) Considere $z_1 = 3e^{i3\pi/4}$ e $z_2 = -1 + \sqrt{3}i$:

- (a) Determine $z_1^4 + z_2$ e indique o resultado na forma algébrica.
(b) Determine, em \mathbb{C} , o conjunto solução da equação $z^3 = z_1$.

2. (Cotação: 1+1+1+1,5) Considere as seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } C = [c_{ij}]_{5 \times 5}, \text{ tal que } |C| = \frac{1}{9}.$$

Calcule, se possível:

- (a) $AB - B$; (c) O determinante da matriz $-C^{-1}$;
(b) O determinante da matriz $3C$; (d) A matriz adjunta de A e a inversa A^{-1} ;

3. (Cotação: 2 + 1,5) Considere o sistema de equações lineares, que depende do parâmetro $a \in \mathbb{R}$,

$$S : \begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - y + a^2z = a \\ 2y + 2az = -2 \end{cases}$$

- (a) A partir da matriz ampliada do sistema, classifique S em função do parâmetro a .
(b) Determine o conjunto solução do sistema S , quando $a = 1$.

Grupo II

4. (Cotação: 1,5 + 1,5) Considere os pontos $A = (1, 2, -1)$ e $B = (2, 0, 1)$ e os vetores $v = (1, -1, 2)$ e $u = (2, 1, -1)$ de \mathbb{R}^3 .

- (a) Identifique o lugar geométrico dos pontos $P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, tais que $\overrightarrow{AP} \bullet (u \times v) = 0$ (o produto misto é igual a zero).
(b) Determine uma equação cartesiana da reta r que contém os pontos A e B .

5. (Cotação: 1,5 + 1,5) Considere o conjunto $A = \{(1, 0, 3), (1, 1, -1), (2, 1, 2)\}$ e o subespaço vetorial $S = \{(x, y, z) : x + y - z = 0 \wedge x + 2z = 0\}$ de \mathbb{R}^3 .

- (a) Determine o subespaço gerado por A , $\langle A \rangle$, e indique a sua dimensão.
- (b) Indique uma base e a dimensão S .

6. (Cotação: 1+ 1,5 + 1,5) Considere as aplicações lineares

$$f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad g: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \longrightarrow (2x - y + z, -4x + 2y - 2z) \quad (x, y) \longrightarrow (-x + 2y, 3x + 4y)$$

e as bases $A = \{(1, 0, -1), (0, -1, 1), (1, 1, 0)\}$ de \mathbb{R}^3 e $B = \{(1, 2), (0, -1)\}$ de \mathbb{R}^2

- (a) Determine o núcleo de f e indique a sua dimensão.
- (b) Calcule a matriz $[f]_B^A$ que representa f quando considerada a base A em \mathbb{R}^3 e a base B em \mathbb{R}^2 .
- (c) Determine os valores próprios de g . Justifique se g é diagonalizável e, caso afirmativo, indique uma matriz diagonal semelhante à matriz que representa g quando considerada a base canónica.

Formulário:

- $tg\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}; \quad tg\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1; \quad tg\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}.$
- $cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}.$
- $sen\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}; \quad sen\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad sen\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$
- As raízes índice n de um número complexo $z = |z| e^{i\theta}$ são dadas pela fórmula:

$$\sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\theta + 2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$