Pharmasco®

CITOLAB® pH

ШВИДКА ДОПОМОГА ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ЗБУДНИКІВ ВАГІНАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ У ЖІНОК З АВВ

Діагностичні тест-смужки для вимірювання кислотності (pH) вагінальних виділень.

Призначення:

Визначення рівня pH піхви з метою оцінки стану вагінальної мікрофлори.

Використовується для **допомоги в діагностиці** станів, пов’язаних із порушенням кислотно-лужного балансу, таких як **бактеріальний вагіноз, кандидоз, трихомоніаз чи аеробний вагініт.**

Моніторинг ефективності лікування вагінальних інфекцій.

Розповсюдженість основних причин АВВ в різних популяціях є високою:

- близько **70% жінок** мають протягом життя **епізод вульвовагінального кандидозу (ВВК)**[1], що потребує лікування.
- глобальна розповсюдженість **бактеріального вагінозу (БВ)** складає **від 23% до 29%** (зокрема в Європі і Центральній Азії – 23%)[2]
- глобальна розповсюдженість трихомоніазу – 5,3%

1. *J. Yano et al., "Current patient perspectives of vulvovaginal candidiasis: Incidence, symptoms, management and post-treatment outcomes," BMC Womens. Health, vol. 19, no. 1, pp. 1–9, 2019, doi: 10.1186/s12905-019-0748-8.*
2. *K. Peebles, J. Velloza, J. E. Balkus, R. S. McClelland, and R. V. Barnabas, "High Global Burden and Costs of Bacterial Vaginosis: A Systematic Review and Meta-Analysis," Sex. Transm. Dis., vol. 46, no. 5, pp. 304–311, May 2019, doi: 10.1097/OLQ.0000000000000972.*

Багатоцентрове дослідження проведене в Україні за участю 45 295 пацієнток зі скаргами на АВВ показало наступний розподіл основних причин[1]:



CITOLAB® pH

допоможе в діагностиці збудників вагінальних інфекцій у жінок з АВВ.

Тепер визначити pH вагінальних виділень **просто!**

- CITOLAB™ pH
  - pH >4,4
    - **БВ**
      - мікроскопія з використанням критеріїв Хей-Айсон
    - **Трихомоніаз**
      - молекулярна діагностика (ПЛР)
  - pH 4,0-4,4
    - **Вульвовагінальний кандидоз**
      - мікроскопія
  - pH≥ 6
    - **Аеробний вагініт**
      - мікроскопія з використанням критеріїв Хей-Айсон

https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_15_2264smd-avv.pdf

Інтерпретація результату CITOLAB® pH

Якщо колір тестової зони жовто-помаранчевий, pH вагінального середовища знаходиться в межах норми (між 4,0 і 4.4).



Якщо колір тестової зони знаходиться у діапазоні зелених і синіх кольорів, це означає, що вагінальне середовище не є достатньо кислим і не відповідає нормі (pH≥4,7).

Аномальні вагінальні виділення: стандарти діагностики та лікування.

15.12.2022 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Аномальні вагінальні виділення»

СТАНДАРТИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

АНОМАЛЬНІ ВАГІНАЛЬНІ ВИДІЛЕННЯ

https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_15_2264smd-avv.pdf

Стандарти медичної допомоги «Аномальні вагінальні виділення»

Всі жінки з АВВ підлягають **клініко-лабораторному обстеженню**

Діагноз АВВ є синдромним, базується на **клінічних симптомах і ознаках**

Діагностика причин АВВ має бути **клініко-лабораторною**

pH-метрія вагінальних виділень - швидкий доступний метод об’єктивізації порушення нормального піхвового біоценозу

Доступні діагностичні тест-смужки для вимірювання кислотності (pH) вагінального середовища (**CITOLAB® pH**)

https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_15_2264smd-avv.pdf

CITOLAB® pH

Для професійного використання, а також для самоконтролю

Форма випуску: 1 шт. та 25 шт.

Біоматеріал: вагінальний секрет

Швидко: результат через 20 сек.

Просто: без додаткового оснащення

Максимальний термін зберігання: після відкриття 6 місяців

Бажано мати в косметичці кожній Жінці!

Доступна комплектація - 1 тест-смужка

Допоможе швидко оцінити стан вагінального середовища після проведеного лікування навіть вдома

Вагінальний pH тест CITOLAB™ pH — інтимне здоров’я під контролем!



ДВ № 75 від 15.02.2023.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Pharmasco®

Actim® PROM – допомагає забезпечити своєчасну діагностику ПРПО

ПРПО - передчасний розрив плідних оболонок

Актуальність ПРПО

Частота ПРПО:
до 20% всіх вагітностей

ПРПО поєднується з 18-20% перинатальної смертності

ДВ № 75 від 15.02.2023.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Pharmasco®

ДВ № 75 від 15.02.2023.
САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Актуальність ПРПО

Ускладнення при ПРПО:

- **обвиття пуповини ↑ в 5 раз**
- **гіпоксія плоду ↑ в 7 раз**
- **розриви ↑ в 2 раза**

Особливості :

РАПТОВЕ ВИНИКНЕННЯ

Pharmasco®

ACTIM® PROM:
ПРИНЦИП ТЕСТУ

Визначає протеїн-1, зв’язуючий інсуліноподібний фактор росту (ПСІФР-1)

ПСІФР-1 – виробляється децидуальними клітинами

ПСІФР-1 міститься в амніотичній рідині

При розриві навколоплідних оболонок ПСІФР-1 потрапляє в піхву, де його можна визначити тестом ACTIM® PROM

ACTIM® PROM

- **Пороговий рівень** – 25 мкг/л
- **Біоматеріал**: вагінальний секрет
- **Результат**: через 5 хв.

	ACTIM® PROM
Чутливість	86-100%
Специфічність	74-100%

NB!

ACTIM® PROM – НЕВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ КРОВІ НЕ ВПЛИВАЄ НА РЕЗУЛЬТАТ*!

Наявність у зразках домішок сечі, сперми, лубрикантів, антимікробних вагінальних препаратів не впливає на результати тестування!

Якщо підтікання навколоплідних вод припинилося більше 12 годин до забору зразка – тест може показати негативний результат

*Коректні результати у пацієнток з кровотечею доведено в клінічних випробуваннях:
Rutanen et al. 1996, Kubota et al. 1998, Guibourdenche et al. 1999, Erdemoglu and Mungan 2004, Novikova et al. 2007

ACTIM® PROM: ПЕРЕВАГИ!

- **Висока точність діагностики ПРПО (в т. ч. МІКРОРОЗРИВІВ)**
- **Швидкий результат (5 хв.)**
- **Просто (не потребує додаткового обладнання)**
- **Можливість аргументувати лікувальну тактику ведення вагітної**
- **Можливість попередити негативні наслідки ПРПО для жінки та дитини**



ДВ № 75 від 15.02.2023.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Pharmasco®

ACTIM® PROM

Запорука точного діагнозу в екстреній ситуації!

Pharmasco®