Pharmasco®
ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

Швидкий тест для діагностики хелікобактерної інфекції

CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР

CITO TEST® Хелікобактер — це можливість **швидко підтвердити або виключити** інфекцію Helicobacter pylori прямо **в кабінеті** або **вдома.**

Pharmasco®
ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР – дозволяє отримати результат **на прийомі** або **вдома** вже за **10 хвилин**.

CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР - неінвазивний і не спричиняє дискомфорту **(не потрібно «ковтати зонд»).**



CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР – використовується як для **діагностики** хелікобактерної інфекції, так і для **контролю** проведеного лікування.

CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР – має високу точність до визначення антигенів H. Pylori - **99%.**

Методи виявлення хелікобактерної інфекції.
ПЕРЕВАГИ CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР

Каловий антигенний тест (CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР)	13С-сечовинний дихальний тест	Серологічне дослідження
• **Зручний для первинної та повторної діагностики — виявляє антиген H.Pylori.** • **Має високу точність.** • **Проводиться без допомоги медичного фахівця та спеціального обладнання.**	• **Висока вартість** • Для проходження тесту доводиться звертатися в спеціалізовані клініки.	• Проводиться лише в лабораторних умовах, результати не одразу. • **Не визначає активну інфекцію,** а лише факт контакту з H. pylori. • Хибнопозитивні результати можливі після перенесеної інфекції — антитіла залишаються в крові навіть після успішного лікування.

«О.М. Радченко. Континуум хелікобактерної інфекції: 25 років визначення та вивчення. Чи все вирішено// Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія.-2011/-№3(42).»

Pharmasco®
ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

Відповідність міжнародним клінічним рекомендаціям

Тест базується на положеннях **Maastricht VI/Florence Consensus Report**, які є золотим стандартом у веденні пацієнтів з диспепсією.

Рекомендація А1: у пацієнтів віком до 50 років без тривожних симптомів рекомендовано **неінвазивне тестування на H. pylori.**

Згідно КЛІНІЧНОЇ НАСТАНОВИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ДОКАЗАХ, 2023 р.

Тестування та лікування *H. pylori* рекомендовані для пацієнтів з високим ризиком, які вже **перебувають на тривалому лікуванні аспірином.**

Тестування на *H. pylori* та лікування доцільно **для пацієнтів, які тільки починають довгострокову терапію НПЗЗ.**

Рівень доказовості А1.

CITO TEST® H. Pylori Ag для пацієнтів, які почали приймати НПВС терапію

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are also well-established risk factors for the development of uncomplicated and complicated gastric ulcers. **Evidence suggests the use of NSAIDs, especially in patients with *H. pylori* infection can cause the chance of gastric and duodenal ulcers. On the other hand, coprescription of NSAIDs with proton-pump inhibitors (PPIs) reduces gastroduodenal lesions. NSAID-naive users benefit from testing for *H. pylori* infection and, if positive, *H. pylori* eradication therapy is recommended prior to the initiation of NSAID**

According to data from randomized intervention trials, naive NSAID users certainly benefit from testing for *H pylori* infection and, if positive, *H pylori* eradication therapy prior to the initiation of NSAID. A similar strategy is also suggested for naive aspirin users, although the efficacy of such an approach has not been evaluated yet

Докази свідчать, що прийом НПВС терапії у пацієнтів, які є носіями H. Pylori може призвести до виразки шлунку або дванадцятипалої кишки, тому пацієнтам, які починають прийом НПВС терапії варто пройти тест на хелікобакторну інфекцію і якщо тест буде позитивним перед прийомом НПВС засобів потрібно провести ерадикаційну терапію.

1. Self-medication with analgesics and Helicobacter pylori infection. Int J High Risk Behav Addict. 2015 June; 4(2): e26155.
2. Papatheodoridis GV, Archimandritis AJ. Role of Helicobacter pylori eradication in aspirin or non-steroidal anti-inflammatory drug users. World J Gastroenterol. 2005;11(25):3811–6.
3. Boltin D, Niv Y. Pharmacological and alimentary alteration of the gastric barrier. *Best Pract Res Clin Gastroenterol.* 2014;28(6):981–94.

Які переваги Ви отримаєте з CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР ?

- Швидке рішення в умовах обмеженого доступу до лабораторій;
- Можливість призначити тест пацієнту для самостійного використання;
- Пацієнт отримує відповідь тут і зараз. Це знижує тривожність, підвищує довіру до Вас і мотивує до лікування.

Чутливість — понад **99,9%**

Специфічність — **99,0%**

Pharmasco®
ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ