



CITO TEST[®] STREP A

ШВИДКА ДОПОМОГА В ПОСТАНОВЦІ
ТОЧНОГО ДІАГНОЗУ

**ШВИДКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ
СТРЕПТОКОКОВОЇ АНГІНИ
CITO TEST[®] STREP A**

Комплектист: тест-касети – 1 шт., екстракційний реагент 1 – 1 шт., екстракційний реагент 2 – 1 шт., флакончик – 1 шт., флакончик-світлий – 1 шт., флакончик-стерильний* – 1 шт., зонтичок* – 1 шт., інструкція – 1 шт.
Назва виробу може відрізнятися, дивіться маркування флакончиків.
CITO TEST – зареєстрована торговельна марка компанії «Фармаско».

ДЛЯ ОБГРУНТОВАНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ ПРИ ГОСТРОМУ БОЛЮ В ГОРЛІ

**ШВИДКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ
СТРЕПТОКОКОВОЇ АНГІНИ
CITO TEST[®] STREP A**

ФАРМАСКО
www.pharmasco.com

Місце встановлення пробірки

Pharmasco[®]
ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

- ✓ При болю в горлі
- ✓ По мазку із зіву
- ✓ Виявляє збудника ангіни, скарлатини

ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

4 820 235 150 591

ЕТІОЛОГІЯ


До **20-30%** тонзилофарингітів
зумовлено *Streptococcus pyogenes*.

У ДІТЕЙ




**β-гемолітичний
стрептокок групи А**

У ДОРОСЛИХ



РІЗНА ЕТІОЛОГІЯ – РІЗНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ!

**β- ГЕМОЛІТИЧНИЙ
СТРЕПТОКОК ГРУПИ А**



АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ!

ВІРУСИ, ГРИБКИ



**НВ! АНТИБІОТИКИ НЕ
ПОТРІБНІ!**

ДОЛЯ ПАЦІЄНТА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ШВИДКОСТІ ТА ОБГРУНТОВАНOSTІ РІШЕННЯ ЛІКАРЯ

70% пацієнтів – АБ-терапія
20-30% - стрептококовий тонзиліт
NB! АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ!

Несвоєчасне призначення антибіотика
при стрептококовій ангіні **доведено**
призводить до тяжких ранніх та пізніх
ускладнень!



РАННІ УСКЛАДНЕННЯ СТРЕПТОКОКОВОЇ АНГІНИ



Отит



Синусит



Мастоїдит




Лімфаденіт




Паратонзиллярний абсцес



Пневмонія



Менінгіт




Сепсис




Інфекційно-токсичний шок

ПІЗНІ УСКЛАДНЕННЯ СТРЕПТОКОКОВОЇ АНГІНИ



Ревматична лихоманка



Гломерулонефрит



PANDAS

- Близько 60% хворих з ревматичною лихоманкою із часом мають хронічну ревматичну хворобу серця, із найбільшою частотою формування клапанних уражень серця.

ДІАГНОСТИКА ТОНЗИЛОФАРИНГІТУ

Одним з методів виявлення стрептококу групи А є **експрес-діагностика**. Швидкі тести протягом **5 хвилин** виявляють наявність стрептокока групи А!



Швидкий тест для виявлення стрептококу групи А

CITO TEST® STREP A



Призначений для якісного виявлення антигенів стрептококу групи А у мазках із зіву з метою діагностики стрептококових тонзиліту та фарингіту, скарлатини.

Призначений для самоконтролю.

- ШВИДКО
- ТОЧНО
- ДОКАЗОВО

Переваги використання CITO TEST® STREP A



Кому рекомендувати **CITO TEST® STREP A** ?

Споживачі, які звертаються в аптеку з проханням порекомендувати їм щось від болю в горлі.

Споживачі, які купують препарати для місцевого лікування болю в горлі.

Споживачі, які просять продати антибіотик без рецепту.



CITO TEST[®] STREP A

ШВИДКА ДОПОМОГА В ПОСТАНОВЦІ
ТОЧНОГО ДІАГНОЗУ!

**ШВИДКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ
СТРЕПТОКОКОВОЇ АНГІНИ
CITO TEST[®] STREP A**

Комплектист: тест-касети – 1 шт., екстракційний реагент 1 – 1 шт., екстракційний реагент 2 – 1 шт., флакончик – 1 шт., флакончик-побітка – 1 шт., флакончик-стерильний – 1 шт., баночка – 1 шт., інструкція – 1 шт.
Назва виробу: «CITO TEST[®] STREP A»
CITO TEST[®] – зареєстрована торгова марка компанії «Фармаско»
ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

ДЛЯ ОБГРУНТОВАНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ ПРИ ГОСТРОМУ БОЛЮ В ГОРЛІ

**ШВИДКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ
СТРЕПТОКОКОВОЇ АНГІНИ
CITO TEST[®] STREP A**

ФАРМАСКО
www.pharmasco.com

Місце встановлення: пробірні

Pharmasco[®]
ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

- ✓ При болю в горлі
- ✓ По мазку із зіву
- ✓ Виявляє збудника ангіни, скарлатини

ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

4 820 235 50591