



Ивидкий тест для діагностики хелікобактерної інфекції

CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР — зручне рішення для швидкої діагностики H.pylori.

CITO TEST® XEЛІКОБАКТЕР





- Печія
- Відрижка
- Біль та дискомфорт у шлунку
- Відчуття переповнення після їжі



Maastricht VI/Florence consensus report (Management of Helocibacter pylori infection)

ДІАГНОСТИКА

- У молодих пацієнтів з диспепсією (віком до 50 років) без специфічного ризику і тривожних симптомів рекомендується неінвазивне тестування на інфекцію Н. руlori (A1)
- Тест на антиген Н.руlori в калі СІТО ТЕЅТ® ХЕЛІКОБАКТЕР є переважною стратегією діагностики інфекції як для первинної діагностики так і для контролю ерадикації





ПЕПТИЧНА ВИРАЗКА ШЛУНКУ ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ. КЛІНІЧНА НАСТАНОВА, ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ, 2023 р.

- Тестування та лікування *H*. *pylori* рекомендовані для пацієнтів **з високим ризиком, які вже** перебувають на тривалому лікуванні аспірином.
- Тестування на *H. pylori* та лікування доцільно **для** пацієнтів, які тільки починають довгострокову терапію НПЗЗ.
- Рівень доказовості А1.





ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

harma co

Методи виявлення хелікобактерної інфекції

Каловий антигенний TECT

- Зручний для первинної та повторної діагностики виявляє антиген H.Pylori.
- Має високу точність.
- Проводиться без ДОПОМОГИ медичного фахівця та спеціального обладнання.

13С-сечовинний дихальний тест

- Висока вартість
- Для проходження TECTY доводиться звертатися в спеціалізовані клініки.

Серологічне дослідження

- Проводиться лише в лабораторних умовах, результати не одразу.
- Маастрихтський консенсус V не рекомендує швидкі серологічні тести для повторної перевірки виявляють не

ЛИШе реальну, «О.М. Радченко. Континуум хелікобактерної інфекції: 25 років визначення та вивчення. Чи все вирішено// Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія.-2011/₁№3(42).» але 1

- ✓ Висока діагностична точність
- ✓ Неінвазивність
- ✓ Безпечність для всіх категорій пацієнтів

- Відносно висока вартість
- Потреба у високотехнологічному обладнанні
- Хибнонегативні результати під час терапії (ІПП, АБ, ВС)









CITO TEST® XEЛІКОБАКТЕР — має високу чутливість та специфічність визначення антигенів H. pylori **99%**.

CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР - неінвазивний і не спричиняє

дискомфорту

CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР – дозволяє отримати результат вже за 15 хвилин.

Швидкий тест для діагностики хелікобактерної інфекції

CITO TEST® XEЛІКОБАКТЕР

зручне рішення для швидкої діагностики, яке переважає складність ФГДС та вартість дихального уреазного тесту.



