

**ДЛЯ ШВИДКОЇ
ДІАГНОСТИКИ
ПРИДБАЙ СІТОЛАВ К**



Реклама медичного виробу. Перед застосуванням медичного виробу обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією всередині. ДВ №15 від 22.02.2023

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

СІТОЛАВ К

ПЕРШИЙ КРОК ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ АЦЕТОНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ

*Діагностичні тест-смужки для раннього
напівкількісного визначення кетонів у сечі*

- *точне визначення кетонів (ацетону) в сечі*
- *контроль в домашніх умовах – легко і швидко*

РЕЗУЛЬТАТ всього за **60 секунд**

Дозволяє *одразу приймати рішення щодо лікування, регідратації чи госпіталізації*

Чітка кольорова шкала

Дозволяє *легко інтерпретувати результат та знижує ймовірність неправильного трактування, особливо при великій кількості пацієнтів.*

ПОРОГОВИЙ РІВЕНЬ - 0,5 ммоль/л

Допоможе виявити ацетонемічний синдром *ще до появи специфічного запаху з рота, що дає змогу запобігти розвитку кризи.*

Термін зберігання 180 діб після відкриття контейнеру

Надійний та точний результат тесту впродовж всього терміну придатності. Зменшує ризик клінічних помилок, особливо у випадках, коли рішення потрібно приймати швидко.

50, 25 та 5 тест-смужок в упаковці

Пацієнт може обрати оптимальний варіант *без зайвих витрат.*



CITOLAB™ K №50

CITOLAB™ K №50 — це оптимальне рішення для пацієнтів **з хронічною ацетонемією**, які потребують частого та регулярного контролю.

- довготривалий моніторинг (термін придатності після відкриття 180 днів) - впевненість в точності результату.
- Зручно використовувати вдома — батьки мають інструмент під рукою у будь-який момент.



NEW

CITOLAB™ K

CITOLAB™ K №5

Зручно мати під рукою вдома або брати з собою в подорож. Ідеальний варіант для батьків, які зіштовхнулися з підвищенням ацетону в сечі вперше.

CITOLAB™ K №25

Оптимальний запас для контролю ацетонемічного синдрому, який може повторюватися епізодично. Завжди зручно мати тести під рукою для своєчасної перевірки.

**ДЛЯ ШВИДКОЇ
ДІАГНОСТИКИ
ПРИДБАЙ СІТОЛАВ К**



Реклама медичного виробу. Перед застосуванням медичного виробу обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією всередині. ДВ №15 від 22.02.2023

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Чому варто призначати СІТОЛАВ К?

- Можливість **самостійно** контролювати стан дитини вдома.
- **50 тест-смужок, 25 тест-смужок та 5 тест-смужок** — дозволяє **адаптувати рекомендацію** — від одноразового тестування до тривалого моніторингу.
- Точність **0,5 ммоль/л** забезпечує впевненість у діагнозі та дозволяє своєчасно призначити ефективне лікування **навіть на відстані**

СІТОЛАВ К — це контроль
АЦЕТОНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ

PharmaSCO
ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

CITO TEST® ROTA

Pharmasco®
ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

Швидкий тест для якісного виявлення антигенів ротавірусів у зразках фекалій.

Своєчасна діагностика дозволяє швидко розпочати лікування та запобігти поширенню інфекції



Ротавірусна інфекція або «кишковий грип» - одна з **найпоширеніших** причин діарей у дітей

В Керівництві ESPGHAN (2014) вказано, що ротавірус - **основна причина розвитку гострої діареї у дітей** (рівень доказовості III, C).

Згідно даних ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЕПІДНАДЗОРУ за РОТАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ (ГМЕР) в Україні серед дітей до 5 років з гострою діареєю **ротавірус у фекаліях виявляється у кожної 3-ої дитини¹**

Ротавірусна інфекція **високо контагіозна** і надзвичайно небезпечне захворювання, є найчастішою причиною смертності дітей до 5 років (**20% смертності у дітей до 5 років обумовлено ротавірусом!!!**).

1. *Estimates of global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of diarrhoeal diseases: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. GBD Diarrhoeal Diseases Collaborators//Lancet Infect Dis. – 2017. – Vol. 17(9). – P. 909-948.*

2. *Bryce at al. Lancet 20054 365: 1147-62*

3. *Мікробіологія, вірусологія, імунологія. - под ред. В.П. Широбокова. Нова книга - Вінниця., 2015, 855 с.*

4. <https://emedicine.medscape.com/article/176515-overview#a>

CITO TEST® ROTA допоможе:

Pharmasco®
ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

- СВОЄЧАСНО підтвердити або виключити вірусну природу діареї у дитини
- Призначити АДЕКВАТНЕ лікування та запобігти розвитку ускладнень
- СВОЄЧАСНО вжити заходів для захисту від інфікування інших членів родини

Чутливість
більше 99%

Специфічність
99%

РЕЗУЛЬТАТ
за 10 хв.



← національний
кешбек



CITO TEST® ROTA: комплектація



1. Тест
2. Пробірка з розчинником
3. Піпетка*
4. Одноразові рукавички
5. Їмність для забору зразка фекалій
6. Інструкція



*піпетка, за допомогою якої можливо зробити забір рідких фекалій

Чому варто обрати CITO TEST® ROTA?

1. Клінічна точність >99%


- Дозволяє швидко диференціювати ротавірусну інфекцію від бактеріальної діареї. Це дає змогу **уникнути необґрунтованого призначення антибіотиків.**

2. Економія часу та ресурсів

- Тест дозволяє **приймати рішення на місці**, без очікування лабораторного аналізу. Зменшується навантаження на лабораторії та прискорюється початок лікування.

3. Підвищення довіри з боку батьків.

- Можливість **провести тест вдома** або в кабінеті лікаря створює відчуття контролю та спокою у батьків **(все необхідне є в упаковці).**
- Зменшується кількість емоційних звернень.



Рекомендовано тест CITO TEST STREP A

Висока температура

Лихоманка 38°C і вище



Сильний біль у горлі

Раптовий початок болю, що ускладнює ковтання



Набряклі мигдалини

Червоні, збільшені мигдалини, часто з білими або жовтими плямами



Важливо! Відсутність кашлю та нежитю (типових для вірусних інфекцій) часто вказує на стрептококову інфекцію.

Першочергове використання CITO TEST STREP A при підозрі на фарингіт та тонзиліт

> [J Clin Microbiol.](#) 2021 Nov 18;59(12):e0097821. doi: 10.1128/JCM.00978-21. Epub 2021 Sep 22.

The Utility of Rapid Group A Streptococcus Molecular Testing Compared with Throat Culture for the Diagnosis of Group A Streptococcal Pharyngitis in a High-Incidence Rheumatic Fever Population

[Amanda Taylor](#)¹, [Susan Morpeth](#)¹, [Rachel Webb](#)^{2 3 4}, [Susan Taylor](#)¹

Affiliations + expand

PMID: 34550808 PMCID: [PMC8601248](#) DOI: [10.1128/JCM.00978-21](#)

Висновок. У регіонах з високим навантаженням на Group A streptococcus (GAS), таких як округ Манукау, Нова Зеландія, тест Strep A значно швидший, ніж посів, має відмінну точність та дозволяє швидко та надійно ідентифікувати пацієнтів з фарингітом, спричиненим Group A streptococcus (GAS). Негативний результат тесту дозволяє клініцистам утримуватися від антибіотиків що призводить до раціонального використання антимікробних препаратів у регіонах з високим навантаженням на захворювання, пов'язані з Group A streptococcus (GAS).

Стрептококова інфекція

Початкове інфікування бета-гемолітичним стрептококом групи А

Хронічна ревматична хвороба серця

Розвиток фіброзу та склерозу клапанів серця



Імунна відповідь

Уповільнена аутоімунна реакція на стрептококову інфекцію

Гостра ревматична лихоманка

Ураження серця, суглобів, шкіри та мозку

Гостра ревматична лихоманка — це серйозне аутоімунне ускладнення, яке може виникнути після нелікованої або неправильно лікованої стрептококової інфекції. Це захворювання може уражати серце, суглоби, шкіру та мозок, призводячи до довічних ускладнень. Своєчасна та точна діагностика стрептококового тонзиліту за допомогою **Cito Test Strep A** та швидке призначення адекватного лікування знижують ризик розвитку ускладнень.



ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

Переваги СІТО TEST STREP A на стрептокок

**95,2
%**

Висока
чутливість та
специфічність при
виявленні
і
стрептококової
інфекції

5 хв

Швидкість
отримання
результату

Безпека
рекомендації
призначений для
самоконтролю
навідмінну від
іншого

Національний
кешбек



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

Використання СІТО TEST STREP A знижує ризик ускладнень та сприяє раціональному використанню антибіотиків.



Як відрізнити COVID-19 від грипу за першими симптомами



COVID-19

1. ТЕМПЕРАТУРА
2. КАШЕЛЬ
3. БІЛЬ У ГОРЛІ
4. ГОЛОВНИЙ БІЛЬ
5. БІЛЬ У М'ЯЗАХ
6. НУДОТА/БЛЮВАННЯ
7. ДІАРЕЯ

ГРИП

1. КАШЕЛЬ
2. БІЛЬ У М'ЯЗАХ
3. ГОЛОВНИЙ БІЛЬ
4. БІЛЬ У ГОРЛІ
5. ТЕМПЕРАТУРА
6. ДІАРЕЯ
7. НУДОТА/БЛЮВАННЯ

Симптоми грипу та коронавірусної хвороби настільки подібні, що самотійно, без тестування, їх складно розрізнити.

Залежність між основними респіраторними хворобами і їхніми першими симптомами.

COVID-19: спочатку підіймається температура

Грип: першим з'являється кашель

Застуда (ГРВІ): спершу болить горло



Національний
кешбек



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

99%

Висока
чутливість та
специфічність

8-15 хв

Швидкість
отримання
результату

Зручність тестування (упаковка= штатив)



CITO TEST ваш надійний та швидкий ключ до
своєчасної допомоги вашим клієнтам

Чому вибір м'якого स्वाба має значення?

Використання назофарингеальних мазків дають найвищу чутливість 97%

Точність результатів

Якість зразка напряду впливає на достовірність тестування та правильність діагнозу

Комфорт пацієнта

Зниження неприємних відчуттів під час процедури забору зразка

Безпека для всіх

Ідеально підходить для дітей, літніх людей та пацієнтів з підвищеною чутливістю



Наркотики проблема сучасного світу



Sniper виявляє сучасні наркотики та дає шанс на майбутнє

SNIPER Точний постріл в ціль





Тест для виявлення 10
наркотиків **SNIPER®**



Тест для виявлення 5
наркотиків **SNIPER®**

Pharmasco®
ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

SNIPER Точний постріл в ціль

SNIPER - це комбінація на наркотики **2025 року (спайс** (синтетична маріхуана), трамадол, бупренорфін), на відмінну від інших тестів

Американська якість

Дві методики тестування:
метод занурення
крапельний метод (для малої кількості сечі!)

Рекомендує SNIPER, ваші клієнти
отримають точний результат



SNIPER®