
- 1. (0,1) Entre os tempos de 1 hora e 2 horas de cultivo de leveduras ocorreu uma variação (dX) de 10g/L na quantidade total de biomassa, qual a velocidade instantânea rx para esse intervalo de tempo?
- 2. (0,1) Considerando que no mesmo intervalo de tempo da questão 1, ocorreu um consumo de 3 g/Lh de substrato limitante (-dS/dt) e que o valor da concentração celular X no ponto de análise da curva é 15 g/L, calcule o valor de velocidade específica de consumo se substrato μs.
- 3. (0,1) Se no intervalo de estudo das questões 1 e 2 o valor de µp é igual a 0,5 h-1 e o valor do P no tempo de 1h é igual a 2g/L qual o valor de P no tempo de 2 horas.
- 4. (0,1) Esboce uma curva de crescimento microbiano indicando as fases de crescimento e explique de forma detalhada quais são as fases de crescimento microbiano.
- 5. (0,05) Explique o significado da equação de Monod e da constante Ks.
- (0,05) Explique como a manutenção vital celular é contabilizada no crescimento microbiano. Discuta como ele impacta nas curvas LAG e LOG do crescimento microbiano.
- 7. (0,5) Escherichia coli vem sendo utilizada para a produção de proteínas recombinantes. Esta bactéria cresce aerobiamente em um sistema em batelada com glicose como substrato limitante. Os dados de concentração celular e concentração de substrato foram medidos em função do tempo e são apresentados na tabela abaixo. Determine a velocidade especifica máxima de crescimento microbiano e a constante de saturação.

Tempo (h)	Concentração celular	Concentração de
	(kg / Litro)	substrato (kg / litro)
0,0	0,20	25,0
0,33	0,21	24,8
0,5	0,22	24,8
0,75	0,32	24,6
1,0	0,47	24,3
1,5	1,00	23,3
2,0	2,10	20,7
2,5	4,42	15,7
2,5 2,8	6,90	10,2
3,0	9,40	5,2
3,1	10,9	1,65
3,2 3,5 3,7	11,6	0,2
3,5	11,7	0,0
3,7	11,6	0,0



6) À manutenção vital celular e' contobilizada por meio do consumo de substrato, granto mais raípido o substrato e consumido maior e a concentração de microorganismos no meio. Dutante a case lag a manutenção celular é ainda baixa por existir mma concentração baixa de microerganismos enguando na log ela se toena muito alta. A manutenção celular em cereto porto se toena tão alta que o meio começa a socree com calta de substrato, o que caz com que o meio entre em estagnação e posteriormente om declínio. 7) Mx max = 2,39 h-1 Contas e gráricos

Ks = 91,63 Kg/l (vide ANEXO Prova 1 Biogrímica .xlsx