

UNIVERSITÄT AUGSBURG

INSTITUT FÜR MATHEMATIK

Masterarbeit

Insert Title

*von:*  
Lukas GRAF

*Betreut von:*  
Prof. Dr. Tobias HARKS

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Grundlagen</b>	<b>3</b>
1.1	Spiele in strategischer Form . . . . .	3
1.2	Auslastungsspiele . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Potentiale</b>	<b>7</b>
2.1	Definitionen . . . . .	7
2.2	Anschauung . . . . .	7
2.3	Erste Sätze . . . . .	9
2.4	Charakterisierungen der Potentiale . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Morphismen</b>	<b>16</b>
3.1	Definitionen . . . . .	16
3.2	Erste Sätze . . . . .	19
<b>4</b>	<b>Morphismen - Alternativ:</b>	<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Zusammenhänge von Auslastungs- und Potentialspielen</b>	<b>24</b>
5.1	Von ungewichtet zu gewichtet . . . . .	24
5.2	Lastgewichtete Auslastungsspiele . . . . .	25
5.3	Kostengewichtete Auslastungsspiele . . . . .	25
5.4	Überblick . . . . .	26
	<b>Literatur</b>	<b>28</b>

# 1 Grundlagen

## 1.1 Spiele in strategischer Form

**Definition 1.1.** Ein *Spiel*  $\Gamma$  in *strategischer Form* ist ein Tupel  $(I, X = (X_i)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$ . Dabei ist

- $I$  die Menge der Spieler,
- $X_i$  die Menge der (reinen) Strategien von Spieler  $i$ ,
- $c_i : X_i \rightarrow K_i$  die Kostenfunktion von Spieler  $i$ .

Das eigentliche Spiel besteht nun daraus, dass jeder Spieler versucht durch die Wahl seiner Strategie die eigenen Kosten zu minimieren.

Wir nennen ein solches Spiel *endlich*, wenn der gesamte Strategieraum  $X$  endlich ist und  $N$ -Personenspiel, wenn  $|I| = N \in \mathbb{N}$  gilt.

*Beobachtung 1.2.* Klassische Kostenminimierungsspiele erhält man durch Wahl von  $(\mathbb{R}_{\geq 0}, \leq)$  als Kostenraum für alle Spieler, Nutzenmaximierungsspiele durch Wahl von  $(\mathbb{R}, \geq)$  als „Kosten“-raum.

an weniger allgemeinen Ansatz anpassen

*Beobachtung 1.3.* Ist ein Spiel endlich, so können wir in der Regel ohne Einschränkung annehmen, dass auch die Menge der Spieler endlich ist. Denn die Menge  $X = \prod_{i \in I} X_i$  kann nur endlich sein, wenn höchstens endlich viele  $X_i$  einelementig sind. Also haben in einem endlichen Spiel nur endlich viele Spieler mehr als eine Strategie. Für die Suche beispielsweise nach Nash-Gleichgewichten oder Verbesserungspfaden spielen aber nur solche Spieler eine Rolle.

*Notation 1.4.* Zu einem festen Spieler  $i$  bezeichne  $X_{-i} := \prod_{j \in I \setminus \{i\}} X_j$  das Produkt aller Strategieräume außer dem von Spieler  $i$ . Zu jedem Strategieprofil  $x \in X$  bezeichne dann  $x_{-i}$  die Projektion dieses Profils auf den Raum  $X_{-i}$  und  $x_i$  die Projektion auf  $X_i$  (also die von Spieler  $i$  gewählte Strategie). Wir schreiben dann auch  $(x_i, x_{-i})$  für das Strategieprofil  $x$ .

Kann man diese Erkenntnis irgendwie mit Morphismen formalisieren (evtl. über Retrakte?)

Sollte der Begriff Strategieprofil eigens definiert werden?

Später werden wir auch Abbildungen  $\phi_i : X_i \rightarrow Y_i$  zwischen den spieterspezifischen Strategieräumen betrachten und die durch diese induzierte Abbildung  $X \rightarrow Y : x = (x_i)_{i \in I} \mapsto \phi(x) := (\phi_i(x_i))_{i \in I}$  mit  $\phi$  bezeichnen. Analog zur Notation für Strategieräume werden wir außerdem die Notation  $\phi_{-i} : X_{-i} \rightarrow Y_{-i}$  verwenden.

**Definition 1.5.** Ein Strategieprofil  $x \in X$  ist ein *Nash-Gleichgewicht*, wenn für jeden Spieler  $i \in I$  und jede seiner Strategien  $\hat{x}_i$  gilt:

$$c_i(\hat{x}_i, x_{-i}) \succcurlyeq c_i(x)$$

Ein Nash-Gleichgewicht ist also ein Strategieprofil, aus dem heraus kein Spieler einen Anreiz für einen einseitigen Strategiewechsel hat.

Aus [MS96b]:

**Definition 1.6.** Eine Folge von Strategieprofilen  $\gamma = (x^0, x^1, x^2, \dots) \in X^{\mathbb{N}}$  ist

- ein *Pfad*, wenn jeder Schritt aus der Abweichung eines einzelnen Spielers besteht. Das heißt wenn es für jede Stelle  $k$  es einen Spieler  $i(k) \in I$  gibt, sodass das Profil  $x^{k+1}$  aus  $x^k$  durch alleinige Abweichung dieses Spielers entsteht, also  $x^{k+1} = (x_{i(k)}^{k+1}, x_{-i(k)}^k)$ .
- ein *nicht-Verschlechterungspfad*, wenn sie ein Pfad ist und sich der abweichende Spieler jeweils echt verbessert. Das heißt es gilt an jeder Stelle  $k$ :  $c_{i(k)}(x^{k+1}) \prec c_{i(k)}(x^k)$ .
- ein *schwacher Verbesserungspfad*, wenn sie ein nicht-Verschlechterungspfad ist und sich an mindestens einer Stelle der abweichende Spieler echt verbessert. Das heißt es gibt eine Stelle  $k$  mit  $c_{i(k)}(x^{k+1}) \prec c_{i(k)}(x^k)$ .
- ein *Verbesserungspfad*, wenn sie ein Pfad ist und sich der abweichende Spieler jeweils echt verbessert. Das heißt es gilt an jeder Stelle  $k$ :  $c_{i(k)}(x^{k+1}) \prec c_{i(k)}(x^k)$ .

Für einen endlichen Pfad  $\gamma = (x^0, \dots, x^n)$  ist

- die *Gesamtänderung* entlang des Pfades definiert  $\delta(\gamma)$  als die Summe aller Änderungen für die jeweils abweichenden Spieler:

$$\delta(\gamma) := \sum_{k=0}^n c_{i(k)}(x^{k+1}) - c_{i(k)}(x^k)$$

- $\gamma$  ein *abgeschlossener Verbesserungspfad*, wenn er ein Verbesserungspfad ist, der nicht mehr nach hinten verlängert werden kann, d.h. es keine Strategie  $\hat{x}_i$  gibt, mit  $c_i(x_{-i}^n, \hat{x}_i) \prec c_i(x^n)$ .
- $\gamma$  ein *n-Zykel*, wenn  $x^0 = x^n$  gilt.

Schöner formulieren

bester Antwort Pfad

$\leftarrow$   $\gamma$  definieren und als Charakterisierung von schwacher Verbesserungspfad verwenden

**Definition 1.7.** Ein Spiel  $\Gamma$  hat die *finite improvement property (FIP)*, wenn jeder Verbesserungspfad endlich ist.

**Definition 1.8.** Eine Teilmenge  $Y \subseteq X$  des Strategieraumes heißt *Pfadzusammenhangskomponente*, wenn es für je zwei  $x, y \in Y$  einen Pfad von  $x$  nach  $y$  in  $Y$  gibt. Zu einem gegebenen Strategieprofil  $x \in X$  ist die *Pfadzusammenhangskomponente von  $x$*  die (bezüglich Inklusion) maximale Pfadzusammenhangskomponente  $Y_x \subseteq X$ , welche  $x$  enthält.

Wohldefiniertheit? Evtl. direkt mit Relationen definieren?

*Beobachtung 1.9.* Die Pfadzusammenhangskomponente eines Strategieprofils  $x$  besteht aus allen Strategieprofilen, die an höchstens endlich vielen Stellen von  $x$  unterscheiden, d.h.

$$Y_x = \{y \in X \mid \exists J \subseteq I : |J| < \infty \text{ und } \forall i \in I \setminus J : x_i = y_i\}$$

Insbesondere ist also für  $N$ -Personenspiele der gesamte Strategieraum eine einzige Zusammenhangskomponente.

*Beobachtung 1.10.* Jedes Ende eines abgeschlossenen Verbesserungspfades ist ein Nash-Gleichgewicht. Denn wäre dem nicht so, dann gäbe es wenigstens einen Spieler, der sich durch Abweichen noch verbessern kann - was zu einer Verlängerung des Verbesserungspfades führen würde.

Umgekehrt ist offenkundig auch jedes Nash-Gleichgewicht Ende wenigstens eines abgeschlossenen Verbesserungspfades - nämlich des trivialen, nur aus diesem Strategieprofil bestehenden Verbesserungspfades

**Korollar 1.11.** *Ein Spiel  $\Gamma$  besitzt genau dann (mindestens) ein Nash-Gleichgewicht, wenn es (mindestens) einen endlichen, maximalen Verbesserungspfad besitzt. Ein Spiel mit FIP besitzt dementsprechend immer wenigstens ein Nash-Gleichgewicht.*

Sollte eine Beobachtung wirklich ein Korollar haben?

Aus [Voo00]

**Definition 1.12.** Ein Verbesserungspfad  $x^0, x^1, x^2, \dots$  heißt *Beste Antwort-Pfad*, wenn der abweichende Spieler jeweils eine beste Alternativstrategie wählt, d.h.

Voorneveld nennt es (ohne Verbesserungsbedingung) beste Antwort-kompatibel

$$c_{i(n)}(x^{n+1}) = \min_{\hat{x}_{i(n)} \in X_{i(n)}} c_{i(n)}(\hat{x}_i, x_{-i(n)}^n).$$

Insbesondere setzt das natürlich voraus, dass ein solches Maximum auf dem Pfad immer existiert.

## 1.2 Auslastungsspiele

**Definition 1.13.** Ein *Auslastungsmodell*  $M$  ist gegeben durch ein Tupel  $(I, R, (S_i)_{i \in I}, K, (g_r)_{r \in R})$ . Dabei ist

- $I$  die Menge der Spieler,
- $R$  die Menge der zur Verfügung stehenden Ressourcen,
- $S_i \subseteq \mathcal{P}(R)$  die Menge von endlichen Teilmengen der Ressourcenmenge, unter denen sich der Spieler  $i$  für eine Teilmenge entscheiden kann,
- $K$ , eine geordnete abelsche Gruppe, der Kostenraum der Ressourcen und
- $g_r : \mathbb{R} \rightarrow K$  eine Funktion, welche die Kosten der Ressource  $r \in R$  in Abhängigkeit von ihrer Auslastung beschreibt.

**Definition 1.14.** Jedes Auslastungsmodell  $M$  induziert ein *Auslastungsspiel*  $\Gamma(M) := (I, S = (S_i)_{i \in I}, (K)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  durch die Kostenfunktion:

$$c_i : S \rightarrow K : s \mapsto \sum_{r \in R} g_r(l_r(s))$$

wobei  $l_r : S \rightarrow \mathbb{N} : s \mapsto |\{i \in I \mid r \in s_i\}|$  die *Lastfunktion* der Ressource ist.

Hier bekommt man wohl Probleme, wenn Spieler- bzw. Ressourcenmenge unendlich ist.

**Beispiel 1.15.** .

Netzwerkauslastungsspiel

**Definition 1.16.** Zusammen mit einem Gewichtsvektor  $(w_i)_{i \in I}$  induziert ein Auslastungsmodell  $M$

- ein *kostengewichtetes Auslastungsspiel*  $\Gamma_c(M, w) := (I, S, (K)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  durch die Kostenfunktion:

$$c_i : S \rightarrow K : s \mapsto \sum_{r \in R} w_i \cdot g_r(l_r(s))$$

und die gleiche Lastfunktion wie im ungewichteten Fall.

- ein *lastgewichtetes Auslastungsspiel*  $\Gamma_l(M, w) := (I, S, (K)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  durch die Kostenfunktion wie im ungewichteten Fall und die Lastfunktion  $l_r : S \rightarrow \mathbb{N} : s \mapsto \sum \{w_i \mid r \in s_i\}$ .
- ein *gewichtetes Auslastungsspiel*  $\Gamma(M, w) := (I, S, (K)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  durch die Kostenfunktion:

$$c_i : S \rightarrow K : s \mapsto \sum_{r \in R} w_i \cdot g_r(l_r(s))$$

und die Lastfunktion  $l_r : S \rightarrow \mathbb{N} : s \mapsto \sum \{w_i \mid r \in s_i\}$ .

**Beispiel 1.17.** .

gewichtetes Netzwerkauslastungsspiel

**Definition 1.18.** Zusammen mit einer Skalierungsfunktionen  $(f_i : K \rightarrow K_i)_{i \in I}$  und verallgemeinerten Lastfunktionen  $(h_r : X \rightarrow \mathbb{R})_{r \in R}$  induziert ein Auslastungsmodell  $M$

Ist diese Definition wirklich sinnvoll?

- ein *kostenskaliertes Auslastungsspiel*  $\Gamma_c(M, f_i) := (I, S, (K)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  durch die Kostenfunktion:

$$c_i : S \rightarrow K : s \mapsto \sum_{r \in R} f_i(g_r(l_r(s)))$$

und die gleiche Lastfunktion wie im ungewichteten Fall.

- ein *lastskaliertes Auslastungsspiel*  $\Gamma_l(M, h_r) := (I, S, (K)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  durch die Kostenfunktion:

$$c_i : S \rightarrow K : s \mapsto \sum_{r \in R} g_r(h_r(s))$$

- ein *verallgemeinertes gewichtetes Auslastungsspiel*  $\Gamma(M, f_i, h_r) := (I, S, (K)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  durch die Kostenfunktion:

$$c_i : S \rightarrow K : s \mapsto \sum_{r \in R} f_i(g_r(h_r(s))).$$

## 2 Potentiale

### 2.1 Definitionen

**Definition 2.1.** Eine Funktion  $P : X \rightarrow \mathbb{R}$  heißt

Verallgemeinern? (total geordnete Menge  $K$  statt  $\mathbb{R}$ ?)

- *Beste Antwort-Potential*, wenn für jeden Spieler  $i$  und alle Strategieprofile  $x_{-i} \in X_{-i}$  gilt:

$$\arg \min_{x_i \in X_i} c_i(x) = \arg \min_{x_i \in X_i} P(x)$$

- *verallgemeinertes ordinales Potential*, wenn für jeden Spieler  $i$  und alle Strategieprofile  $x_{-i} \in X_{-i}$  sowie  $x_i, \hat{x}_i \in X_i$  gilt:

$$c_i(x_i, x_{-i}) > c_i(\hat{x}_i, x_{-i}) \implies P(x_i, x_{-i}) > P(\hat{x}_i, x_{-i})$$

- *ordinales Potential*, wenn für jeden Spieler  $i$  und alle Strategieprofile  $x_{-i} \in X_{-i}$  sowie  $x_i, \hat{x}_i \in X_i$  gilt:

$$c_i(x_i, x_{-i}) > c_i(\hat{x}_i, x_{-i}) \iff P(x_i, x_{-i}) > P(\hat{x}_i, x_{-i})$$

- *skaliertes Potential*, wenn es streng monotone Funktionen  $f_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  gibt, die 0 auf 0 abbilden, sodass für jeden Spieler  $i$  und alle Strategieprofile  $x_{-i} \in X_{-i}$  sowie  $x_i, \hat{x}_i \in X_i$  gilt:

$$c_i(x_i, x_{-i}) - c_i(\hat{x}_i, x_{-i}) = f_i(P(x_i, x_{-i}) - P(\hat{x}_i, x_{-i}))$$

- *gewichtetes Potential*, wenn es einen Gewichtsvektor  $(w_i)_{i \in I} \in \mathbb{R}_{>0}^I$  gibt, sodass für jeden Spieler  $i$  und alle Strategieprofile  $x_{-i} \in X_{-i}$  sowie  $x_i, \hat{x}_i \in X_i$  gilt:

$$c_i(x_i, x_{-i}) - c_i(\hat{x}_i, x_{-i}) = w_i \cdot (P(x_i, x_{-i}) - P(\hat{x}_i, x_{-i}))$$

- *exaktes Potential*, wenn für jeden Spieler  $i$  und alle Strategieprofile  $x_{-i} \in X_{-i}$  sowie  $x_i, \hat{x}_i \in X_i$  gilt:

$$c_i(x_i, x_{-i}) - c_i(\hat{x}_i, x_{-i}) = P(x_i, x_{-i}) - P(\hat{x}_i, x_{-i})$$

Exakte, gewichtete, ordinale und verallgemeinerte ordinale Potentiale wurden erstmals in [MS96b] definiert, beste Antwort-Potentiale erstmals in [Voo00].

Kann man diese Definition irgendwie kompakter/übersichtlicher machen?

### 2.2 Anschauung

In einem gewissem Sinne definiert jedes Potential ein alternatives Spiel mit gleichem Strategieraum, aber einer anderen, für alle Spieler einheitlichen Kostenfunktion (nämlich

der Potentialfunktion). In einem solchen Spiel ist es nun viel einfacher beispielsweise Gleichgewichts- oder Optimalitätspunkte zu finden (da hierzu nur eine einzige Funktion betrachtet werden muss). Eigenschaften, die beim Übergang zurück zum ursprünglichen Spiel erhalten bleiben, kann man dann in dem einfacheren Spiel überprüfen. Diesen Übergang werden wir später mit Hilfe von (Iso-)Morphismen formal fassen (siehe Abschnitt 3).

Hier wollen wir nun noch kurz darauf eingehen, wie sich die verschiedenen Potentialbegriffe anschaulich voneinander unterscheiden. Wir betrachten dazu (endliche) 2-Personenspiele. Deren Strategieraum kann man dann als Gitternetz in der Ebene auffassen, wobei jede Strategie von Spieler 1 einer senkrechten und jede Strategie von Spieler 2 einer waagerechten Gitterlinie entspricht. Kreuzungspunkte von zwei Geraden entsprechen dann gerade vollständige Strategieprofilen. Kostenfunktionen (ebenso wie Potentiale) sind dann „Reliefkarten“, deren Höhe den jeweiligen Kosten entspricht.




Abbildung 1: Ein 2-Personenspiel mit exaktem Potential (grau): Spieler 1: rot, Spieler 2: blau

Ein exaktes Potential entspricht in diesem Bild einer gemeinsamen Reliefkarte für beide Spieler, die - im Falle eines exakten Potentials - „scheibenweise“ bis auf eine additive Konstante mit der eigentlichen Kostenfunktion übereinstimmt. Anders formuliert: Wird die Strategie eines Spieler festgehalten, so kann der andere Spieler seine Kostenveränderungen bei der Wahl der verschiedenen ihm zur Verfügung stehenden Strategien auch anhand der Potentialfunktion ablesen.

Geht man nun über zu einem gewichteten Potential, so lesen die beiden Spieler das Potential sozusagen in verschiedenen Einheiten. Das heißt die Kostenveränderungen eines Spielers sind nur noch proportional zu den Potentialänderungen. Ein skaliertes Potential zeigt jedem Spieler noch an, welche der Kostenveränderungen eher groß und welche klein sind. Ordinale Potentiale zeigen nur noch die Richtung der Kostenveränderung an („wird teurer“ / „wird billiger“ / „Kosten bleiben konstant“) und verallgemeinerte ordinale Potentiale zeigen nur noch echte Steigungen korrekt an. Beste-Antwort-Potentiale schließlich zeigen immer die beste Antwort an.

eigentlich müssen verschiedene Einheiten nicht zwangsläufig proportional zueinander sein - für Längeneinheiten sollte es typischerweise aber stimmen

Zusammenhänge (evtl. schon nächstes Kapitel?)

Eine Beobachtung aus [HKM11]:



*Beobachtung 2.2.* Ein Spiel  $\Gamma = (I, (X_i)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  besitzt genau dann ein gewichtetes Potential (mit Gewichtsvektor  $(w_i)_{i \in I}$ ), wenn  $\Gamma' := (I, (X_i)_{i \in I}, (w_i \cdot c_i)_{i \in I})$  ein exaktes Potential besitzt.

Folgt auch aus einer allgemeineren Beobachtung in Abschnitt 3.

## 2.3 Erste Sätze

Zu einem gegebenen Strategieprofil  $x \in X$  sei dessen *Nachbarschaft* die Menge aller durch höchstens eine Abweichung erreichbarer Strategieprofile, d.h. die Menge  $\{(\hat{x}_i, x_{-i}) \mid i \in N, \hat{x}_i \in X_i\}$ . Wir nennen  $x$  dann ein *lokales Minimum* einer Funktion  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ , wenn es ein Minimum innerhalb seiner Nachbarschaft ist.

**Satz 2.3.** *Sei  $\Gamma$  ein Spiel mit einem verallgemeinerten ordinalen Potential  $P$ . Dann ist jedes lokale Minimum von  $P$  ein Nash-Gleichgewicht von  $\Gamma$ . Ist  $P$  sogar ein ordinales Potential, so gilt auch die umgekehrte Richtung.*

Diese Sätze hier evtl. nur erwähnen und erst später (nach der Definition von Morphismen) formalisieren (und beweisen)

Dieser Satz zeigt also, dass man Nash-Gleichgewichte allein durch Betrachten einer Potentialfunktion finden kann. Daraus folgt direkt die Existenz von Nash-Gleichgewichten in einer Vielzahl von Potentialspielen:

**Korollar 2.4.** *Sei  $\Gamma$  ein Spiel mit einem kompakten Strategieraum und einer stetigen verallgemeinerten ordinalen Potentialfunktion. Dann hat  $\Gamma$  wenigstens ein Nash-Gleichgewicht.*

Insbesondere also haben endliche Potentialspiele immer ein Nashgleichgewicht. Satz 2.3 folgt mit Hilfe von Korollar 1.11 direkt aus dem folgenden Satz:

**Satz 2.5.** *Sei  $\Gamma$  ein Spiel mit einem verallgemeinerten ordinalen Potential  $P$ . Dann ist jeder Verbesserungspfad in  $\Gamma$  auch ein Verbesserungspfad bezüglich  $P$ . Ist  $P$  sogar ein ordinales Potential, so gilt auch die umgekehrte Richtung.*

Streng genommen nicht wirklich, da das Korollar nur für Spiele gilt!?

*Beweis.* .

Beweis

□

Was kann man über Beste-Antwort-Potentiale sagen (vermtl. Zusammenhang zu Beste-Antwort-Pfade?)

Für Spiele mit unendlicher Spielermenge erweist es sich als hilfreiche Beobachtung, dass wir Potentiale pfadzusammenhangskomponentenweise definieren können:

*Beobachtung 2.6.* Sei  $\Gamma$  ein beliebiges Spiel und  $P : X \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion. Erfüllt  $P$  dann die Bedingung eines exakten/gewichteten/skalierten/ordinalen/verallgemeinerten ordinalen Potentials für jede (maximale) Pfadzusammenhangskomponente, so ist  $P$  ein entsprechendes Potential für ganz  $\Gamma$ .

*Beweis.* Dies folgt direkt aus dem Umstand, dass die definierende Eigenschaft für alle aufgezählten Potentiale immer nur entlang eines Pfades (der Länge 1) und damit innerhalb einer Zusammenhangskomponente geprüft werden muss.  $\square$

## 2.4 Charakterisierungen der Potentiale

**Satz 2.7.** *Ein Spiel besitzt genau dann ein exaktes Potential, wenn alle 4-Zykel im Strategieraum eine Gesamtänderung von 0 haben.*

*Beweis.* Wir folgen dem Beweis aus [MS96b, Anhang A]. Dort wird der Satz nur für  $N$ -Personenspiele gezeigt, mit Beobachtung 2.6 überträgt sich dieser Beweis aber direkt auch auf allgemeine Spiele.

Sei zunächst  $\gamma := (x^0, x^1, x^2, x^3, x^4)$  ein beliebiger 4-Zykel in einem Spiel mit Potential  $P$ . Dann gilt für die Gesamtänderung:

$$\delta(\gamma) = \sum_{i=0}^3 c_{i(k)}(x^{k+1}) - c_{i(k)}(x^k) = \sum_{k=0}^3 P(x^{k+1}) - P(x^k) = P(x^4) - P(x^0) = 0$$

Ist umgekehrt  $\Gamma$  ein Spiel, in dem für alle 4-Zykel  $\gamma$  gilt  $\delta(\gamma) = 0$ ,  $x$  ein beliebiges, aber festes Strategieprofil in  $\Gamma$  und  $Y_x$  dessen Pfadzusammenhangskomponente. Dann definiere wie folgt eine Funktion  $P_x$  auf  $Y_x$ :

$$P : Y_x \rightarrow \mathbb{R} : y \mapsto \delta(\gamma), \gamma \text{ beliebiger Pfad von } x \text{ nach } y$$

Damit diese Funktion tatsächlich wohldefiniert ist, muss für je zwei Pfade  $\gamma$  und  $\gamma'$  von  $\hat{x}$  nach  $x$  gelten, dass die jeweiligen Gesamtänderungen gleich sind, d.h.  $\delta(\gamma) = \delta(\gamma')$ .

weiter (Induktion?)

Wählen wir nun für jede maximale Pfadzusammenhangskomponente ein einziges  $x$  in dieser und definieren wie oben eine Funktion  $P_x$ , so lassen sich alle diese Funktionen zu einer Funktion  $P$  auf ganz  $X$  zusammensetzen. Nach Definition erfüllt diese auf jeder Pfadzusammenhangskomponente die Bedingung eines exakten Potentials. Also ist nach Beobachtung 2.6  $P$  ein exaktes Potential auf  $X$ .  $\square$

**Satz 2.8.** *Ein Spiel besitzt genau dann ein gewichtetes Potential, wenn ...*

analoge Bedingung zu  
exaktem Potential (vgl.  
[HKM11, Kapitel 3.2])

Beweis. .

mit Beobachtung 2.2?

□

Charakterisierung der Existenz eines skalierten Potentials?

**Definition 2.9.** Eine Menge  $X$  mit einer strikten Partialordnung  $\prec$  (irreflexiv und transitiv) heißt *reell geordnet*<sup>1</sup>, wenn es eine strikt monotone Abbildung von  $X$  in die reellen Zahlen gibt, also  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $x \prec x' \implies f(x) < f(x')$ .

Wir definieren nun eine Äquivalenzrelation auf dem Strategieraum:

$x \approx y : \iff$  es gibt einen nicht-Verschlechterungspfad von  $x$  nach  $y$  und umgekehrt

Auf dem dadurch erzeugten Raum von Äquivalenzklassen  $X/\approx := \{[x] \mid x \in X\}$  erhält man eine transitive Ordnung

$[x] \prec_{\uparrow} [y] : \iff$  Es gibt einen schwachen Verbesserungspfad von  $y$  nach  $x$

Sowohl Wohldefiniertheit als auch Transitivität dieser Relation ergeben sich aus der Beobachtung, dass die Verknüpfung eines nicht-Verschlechterungspfades mit einem schwachen Verbesserungspfad wieder einen schwachen Verbesserungspfad ergibt.

Damit zeigen Voorneveld und Norde in [VN97, Theorem 3.1] folgende Charakterisierung der Existenz von ordinalen Potentials:

**Satz 2.10.** Ein Spiel besitzt genau dann ein ordinales Potential, wenn es keine schwachen Verbesserungszykel enthält und  $(X/\approx, \prec_{\uparrow})$  reell geordnet ist.

*Beweis.* Sei zunächst  $P : X \rightarrow \mathbb{R}$  ein ordinales Potential eines Spiels  $\Gamma$ . Dann gilt:

1.  $\Gamma$  enthält keine schwachen Verbesserungszykel. Denn angenommen  $\gamma = (x^0, \dots, x^n)$  wäre ein schwacher Verbesserungszykel in  $\Gamma$ , so gilt für alle  $0 \leq k < n$ :  $c_{i(k)}(x^{k+1}) \preceq c_{i(k)}(x^k)$  und für ein solches  $k$  sogar  $c_{i(k)}(x^{k+1}) \prec c_{i(k)}(x^k)$ . Da ferner  $P$  ein ordinales Potential ist, folgt daraus:

$$P(x^0) \leq P(x^1) \leq \dots \leq P(x^{k+1}) < P(x^k) \leq \dots \leq P(x^n) = P(x^0)$$

Dies ist jedoch ein Widerspruch. Also kann es keinen solchen Verbesserungszykel geben.

2.  $\prec_{\uparrow}$  ist eine strikte Partialordnung auf  $X/\approx$ . Denn die Relation ist immer transitiv und in der Abwesenheit von schwachen Verbesserungszykeln zudem irreflexiv. Gäbe es nämlich ein Strategieprofil mit  $[x] \prec_{\uparrow} [x]$ , so gäbe es einen schwachen Verbesserungspfad von  $x$  nach  $x$ , also einen schwachen Verbesserungszykel.

<sup>1</sup>Voorneveld und Norde bezeichnen solche Mengen in [VN97] als „properly ordered“

evtl. schon im Grundlagenkapitel gemeinsam mit Pfadzusammenhangskomponenten?

3.  $(X/\approx, \prec_\uparrow)$  ist reell geordnet. Definiere dazu die Abbildung  $f : X/\approx \rightarrow \mathbb{R} : [x] \mapsto P(x)$ . Diese ist wohldefiniert, denn ist  $y \in [x]$ , so gibt es also nicht-Verschlechterungspfade von  $x$  nach  $y$  und umgekehrt. Zusammen bilden diese einen nicht-Verschlechterungszykel und da es keine schwachen Verbesserungszykel in  $\Gamma$  gibt, muss in diesem Zykel (und damit bereits in den beiden Pfaden) in jedem Schritt Gleichheit gelten. Insbesondere folgt damit  $P(x) = P(y)$ .

Ferner ist diese Abbildung streng monoton, denn gilt  $[x] \prec_\uparrow [y]$ , so gibt es einen nicht-Verschlechterungspfad  $\gamma$  von  $y$  nach  $x$ , aber keinen in die umgekehrte Richtung. Insbesondere ist also  $\overleftarrow{\gamma}$  kein nicht-Verschlechterungspfad, d.h.  $\gamma$  ein schwacher Verbesserungspfad von  $y$  nach  $x$ . Damit folgt analog zum ersten Punkt:  $P(x) < P(y)$

Ist umgekehrt  $\Gamma$  ein Spiel ohne schwache Verbesserungszykel und  $([X], \prec_\uparrow)$  reell-geordnet mit Abbildung  $f : [X] \rightarrow \mathbb{R}$ , so definiere  $P : X \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f([x])$ . Dies ist ein ordinales Potential, denn es gilt:

1. Gilt  $c_i(x) > c_i(\hat{x}_i, x_{-i})$ , so ist  $(x, (\hat{x}_i, x_{-i}))$  ein schwacher Verbesserungspfad. Da es in  $\Gamma$  keine schwachen Verbesserungszykel gibt, kann es also keinen nicht-Verschlechterungspfad in die andere Richtung geben und es gilt:  $[x] \succ [(\hat{x}_i, x_{-i})]$ . Daraus wiederum folgt  $P(x) = f([x]) > f([(\hat{x}_i, x_{-i})]) = P(\hat{x}_i, x_{-i})$ .
2. Gilt  $c_i(x) = c_i(\hat{x}_i, x_{-i})$ , so sind sowohl  $(x, (\hat{x}_i, x_{-i}))$  als auch  $((\hat{x}_i, x_{-i}), x)$  nicht-Verschlechterungspfade, also  $[x] = [(\hat{x}_i, x_{-i})]$  und damit  $P(x) = f([x]) = f([(\hat{x}_i, x_{-i})]) = P(\hat{x}_i, x_{-i})$ .  $\square$

*Bemerkung 2.11.* Im Gegensatz zur Charakterisierung von exakten Potentialspielen in Satz 2.7 genügt es für die Existenz eines ordinalen Potentials nicht, nur Zykel der Länge 4 zu betrachten. Voorneveld und Norde geben dafür in [VN97, Beispiel 3.1] ein Gegenbeispiel mit zwei Spielern und je drei Strategien an.

Anlehnend an Satz 2.10 erhält man unter Verwendung der Relation

$$x <_\uparrow y : \iff \text{es gibt einen Verbesserungspfad der Länge } \geq 1 \text{ von } y \text{ nach } x$$

eine Charakterisierung der Existenz eines verallgemeinerten ordinalen Potentials:

**Satz 2.12.** *Ein Spiel besitzt genau dann ein verallgemeinertes ordinales Potential, wenn  $(X, <_\uparrow)$  reell geordnet ist.*

*Beweis.*  $(X, <_\uparrow)$  reell geordnet mit streng monotoner Abbildung  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ , so sieht man direkt, dass  $f$  auch ein verallgemeinertes Potential ist. Denn für  $x \in X, \hat{x}_i \in X_i$  mit  $c_i(x) > c_i(\hat{x}_i, x_{-i})$  ist  $(x, (\hat{x}_i, x_{-i}))$  ein Verbesserungspfad, also  $(\hat{x}_i, x_{-i}) <_\uparrow x$  und damit  $f(\hat{x}_i, x_{-i}) > f(x)$ .

Haben wir hingegen ein Spiel  $\Gamma$  mit einem verallgemeinerten ordinalen Potential  $P$ , so ist  $(X, <_\uparrow)$  reell geordnet, denn

1.  $<_{\uparrow}$  ist eine strikte Partialordnung auf  $X$ : Sie ist transitiv, da die Verknüpfung zweier Verbesserungspfade wieder ein Verbesserungspfad ist, und irreflexiv, da es in  $\Gamma$  keine Verbesserungszykel gibt. Angenommen nämlich  $\Gamma$  enthielte einen solchen Verbesserungszykel  $\gamma = (x^0, \dots, x^n)$ , d.h. für alle  $0 \leq k < n$  gilt  $c_{i(k)}(x^{k+1}) \prec c_{i(k)}(x^k)$ . Da  $P$  ein verallgemeinertes ordinales Potential ist, folgt daraus  $P(x^0) > P(x^1) > \dots > P(x^n) = P(x^0)$ , ein Widerspruch. Also kann es keinen Verbesserungszykel geben und damit nie  $x <_{\uparrow} x$  gelten.
2.  $(X, <_{\uparrow})$  ist reell geordnet durch die Funktion  $P : X \rightarrow \mathbb{R}$ . Gilt nämlich  $x <_{\uparrow} y$ , so gibt es also einen Verbesserungspfad von  $y$  nach  $x$ . Da  $P$  ein verallgemeinertes ordinales Potential ist, nimmt es entlang dieses Pfades in jedem Schritt ab, und folglich gilt  $P(y) > P(x)$ . Damit ist  $P$  streng monoton auf  $(X, <_{\uparrow})$ .  $\square$

In dieser Form ist dies noch eine wenig hilfreiche Charakterisierung, denn um zu zeigen, dass der Strategieraum reell geordnet ist, muss man effektiv bereits die Potentialfunktion angeben. Allerdings erhält man daraus mit Hilfe der folgenden Propositionen einfachere Charakterisierungen für gewisse Teilklassen von Spielen:

**Proposition 2.13.** *Jede abzählbare Menge mit einer strikten Partialordnung ist bereits reell geordnet.*

Ein Beweis dazu findet sich in [VN97, Lemma 2.2]. Noch allgemeiner zeigen Voorneveld und Norde, dass es sogar genügt, wenn die partiell geordnete Menge eine bezüglich dieser Ordnung dichte, abzählbare Teilmenge hat.

wirklich gezeigt wird es dort eigentlich nicht (sondern auf andere Quelle verwiesen)

**Proposition 2.14.** *Die Relation  $<_{\uparrow}$  ist genau dann eine strikte Partialordnung, wenn  $\Gamma$  keine Verbesserungszykel enthält.*

*Beweis.* Da die Verknüpfung eines Verbesserungspfades von  $z$  nach  $y$  mit einem von  $y$  nach  $x$  einen Verbesserungspfad von  $z$  nach  $z$  ergibt, ist  $<_{\uparrow}$  automatisch immer transitiv.

Ferner ist  $<_{\uparrow}$  genau dann irreflexiv, wenn für alle  $x \in X$  gilt, dass  $x \not<_{\uparrow} x$ , es also keinen Verbesserungspfad von  $x$  nach  $x$  gibt. Und letzteres entspricht genau einem (bei  $x$  beginnenden) Verbesserungskreis.  $\square$

**Korollar 2.15.** *Ein Spiel mit abzählbarem Strategieraum besitzt genau dann ein verallgemeinertes ordinales Potential, wenn es keine Verbesserungskreise enthält.*

*Beweis.* Nach Proposition 2.13 ist jede abzählbare Menge mit einer strikten Partialordnung bereits reell geordnet. Also macht  $<_{\uparrow}$  einen abzählbaren Strategieraum genau dann zu einer reell geordneten Menge, wenn  $<_{\uparrow}$  eine strikte Partialordnung ist. Und dies ist nach Proposition 2.14 genau dann der Fall, wenn das Spiel keine Verbesserungszykel enthält.  $\square$

Laut Beobachtung 2.6 gilt diese Charakterisierung sogar für die größere Klasse der Spiele mit abzählbar großen Pfadzusammenhangskomponenten. Insbesondere gilt damit:

**Korollar 2.16.** *Ein Spiel mit abzählbar vielen Spielern und abzählbar großen Spielerspezifischen Strategieräumen besitzt genau dann ein verallgemeinertes ordinales Potential, wenn es keine Verbesserungskreise enthält.*

*Beweis.* Wir müssen zeigen, dass in einem solchen Spiel jede Pfadzusammenhangskomponente abzählbar groß ist. Seien dazu also  $x \in X$  und  $n \in \mathbb{N}^*$  beliebig. Dann ist

$$Y_x^n := \{y \in X \mid \exists \gamma \text{ Pfad der Länge } n \text{ von } x \text{ nach } y\},$$

die Menge aller von  $x$  aus durch Pfade der Länge  $n$  erreichbaren Strategieprofile, abzählbar. Denn es gilt induktiv:

**IA** ( $n = 1$ ) Es ist

$$Y_x^1 = \{y \in X \mid \exists i \in I : y = (y_i, x_{-i})\} = \{(y_i, x_{-i}) \mid i \in I, y_i \in Y_i\} = \bigcup_{i \in I} \{(y_i, x_{-i}) \mid y_i \in Y_i\}$$

eine abzählbare Vereinigung (da die Spielermenge abzählbar ist) von abzählbar großen Mengen (den Spielerspezifischen Strategieräumen), also selbst abzählbar groß.

**IS** ( $< n \rightarrow n$ ) Es ist

$$Y_x^n = \bigcup_{y \in Y_x^{n-1}} Y_y^1$$

eine (nach Induktionsvoraussetzung) abzählbare Vereinigung abzählbar großer Mengen und daher selbst wieder abzählbar.

Folglich ist auch  $Y_x = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} Y_x^n$  abzählbar und besitzt folglich nach Korollar 2.15 ein verallgemeinertes ordinales Potential.  $\square$

Beschränkt man sich hingegen auf die kleinere Klasse von endlichen Spielen, so erhält man die (auf anderem Wege) erstmals von Monderer und Shapley in [MS96b, Lemma 2.5] gezeigte Charakterisierung der Existenz von verallgemeinerten ordinalen Potentialen:

**Korollar 2.17.** *Ein endliches Spiel besitzt genau dann ein verallgemeinertes ordinales Potential, wenn es die FIP besitzt.*

*Beweis.* In einem Spiel mit endlichem Strategieraum sind unendliche Verbesserungspfade genau die Verbesserungskreise. Damit folgt die Aussage direkt aus Korollar 2.15.  $\square$

*Bemerkung 2.18.* Möchte man in den oben beschriebenen Fällen eine konkrete Potentialfunktion angeben, so kann man dies analog zu einer alternativen, konstruktiven Beweisidee für endliche Spiele aus [Mil96, Abschnitt 5] tun:

Sei dazu  $\Gamma$  ein Spiel mit abzählbarem Strategieraum  $X := \{x^1, x^2, \dots\}$  und ohne Verbesserungszykel. Definiere die Funktion  $h : X \rightarrow \mathbb{R} : x^k \mapsto 2^{-k}$  sowie für jedes Strategieprofil  $x \in X$  die Menge  $Y_{>x} := \{y \in X \mid \exists \text{ Verbesserungspfad von } y \text{ nach } x\}$  und mit deren Hilfe

$$P : X \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 1 - \sum_{y \in Y_{>x}} h(y)$$

*Beweis.* Diese Funktion ist wohldefiniert, da  $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1$  absolut konvergiert. Sie ist außerdem ein verallgemeinertes ordinales Potential, denn gilt  $c_i(x) > c_i(\hat{x}_i, x_{-i})$  so ist  $(x, (\hat{x}_i, x_{-i}))$  ein Verbesserungspfad. Außerdem gilt  $x \notin Y_{>x}$ , da es in  $\Gamma$  keine Verbesserungszykel gibt. Damit folgt:

$$P(x) = 1 - \sum_{y \in Y_{>x}} h(y) > 1 - \sum_{y \in Y_{>x}} h(y) - h(x) = 1 - \sum_{y \in Y_{>(\hat{x}_i, x_{-i})}} h(y) = P(\hat{x}_i, x_{-i}) \quad \square$$

Ebenfalls analog zur Charakterisierung für ordinale Potentiale zeigt Voorneveld in [Voo00, Theorem 3.1] eine solche für Beste Antwort-Potentiale. Dazu definiert man die Äquivalenzrelation:

$x \approx^* y : \Longleftrightarrow$  es gibt einen beste Antwortpfad von  $x$  nach  $y$  und umgekehrt

und auf dem dadurch erzeugten Raum von Äquivalenzklassen  $X/\approx^* := \{[x] \mid x \in X\}$  erhält man eine transitive Ordnung

$[x] \prec^* [y] : \Longleftrightarrow$  Es gibt einen schwachen bessere Antwort-Pfad von  $y$  nach  $x$

**Satz 2.19.** *Ein Spiel besitzt genau dann ein beste Antwort-Potential, wenn es keine schwachen bessere Antwortzykel enthält und  $(X/\approx^*, \prec^*)$  reell geordnet ist.*

beste Antwort Pfad und schwacher bessere Antwort Pfad sind noch nicht definiert!

*Beweis.* .

aus [Voo00], evtl. weglassen?

□

### 3 Morphismen und Isomorphismen von Spielen

Motivation: Warum betrachtet man überhaupt Morphismen von Spielen. Wie induzieren diese Isomorphismen?

Mögliche Motivationen:

- Jedes Potential definiert selbst wieder ein Spiel mit einer gemeinsamen Kostenfunktion für alle Spieler. Und in einem gewissen Sinne ist dieses Spiel „äquivalent“ zum ursprünglichen Spiel (z.B. gleiche Gleichgewichtspunkte). Das Hin- und Herwechseln zwischen diesen beiden Versionen eines Spiels kann man durch Morphismen beschreiben und die Äquivalenz der beiden wird dann dadurch sichtbar, dass diese Morphismen *Isomorphismen* sind.
- Die Äquivalenz zwischen exakten Potentialspielen und Auslastungsspielen wird durch Morphismen beschrieben.
- Kategorientheoretische Sicht: Um eine Kategorie (hier: die der Spiele) zu verstehen, muss man ihre Morphismen kennen. Kennt man diese, so ergeben sich aus diesen auf natürliche Weise weitere Begriffe wie Isomorphismen von Spielen, Summen oder Produkte von Spielen.

Diese Punkte (insbesondere den letzten) näher ausführen?

#### 3.1 Definitionen

Zu zwei gegebenen Spielen  $\Gamma = (I, X, (K_i)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  und  $\Gamma' = (I', X', (K'_i)_{i \in I'}, (c'_i)_{i \in I'})$  kann man wie folgt eine Abbildung zwischen diesen beiden definieren:

- Eine Abbildung  $\sigma : I' \rightarrow I$  zwischen den Spielermengen und
- für jeden Spieler  $i \in I$  eine Abbildung  $\phi_i : X_i \rightarrow X'_{\sigma(i)}$  seiner Strategien.

[Mil15] bezeichnet derartige Abbildungen *Strategieersetzungsvorschriften*.

*Beobachtung 3.1.* Mit dieser Definition ist es also nur möglich Abbildungen zwischen Spielen mit Spielermengen gleicher Kardinalität zu definieren. Im Folgenden werden wir ausschließlich solche Abbildungen betrachten (vergleiche aber Bemerkung 3.6 dazu wie auch in anderen Fällen Abbildungen zwischen Spielen definiert werden können). Zur Vereinfachung der Notation werden wir daher ab sofort immer davon ausgehen, dass die Spielermengen beider an einer Abbildung beteiligten Spiele bereits gleich und geeignet permutiert sind.

Abbildungen der obigen Form nehmen noch keinerlei Rücksicht auf die Kostenfunktionen der jeweiligen Spiele. Da diese aber in der Regel die interessierenden Eigenschaften eines Spiels (wie beispielsweise Gleichgewichte) festlegen, werden derartige Abbildungen im Allgemeinen noch wenig Aussagen über die beteiligten Spiele ermöglichen. So besagt der

Mehr dazu schreiben - erst später bei rationalen SEVs erwähnen?



durch diese Art Abbildungen induzierte Isomorphiebegriff bspw. nur, dass zwei Spiele Spieler- und Strategiemengen gleicher Kardinalität besitzen.

Echte Morphismen zwischen Spielen sollten folglich noch mehr der Struktur eines Spiels erhalten, insbesondere in irgendeiner Form „verträglich“ mit den Kostenfunktionen sein. Je nach dem, welche Eigenschaften die Morphismen (und insbesondere die dadurch induzierten Isomorphismen) erhalten sollen, erhält man so unterschiedlich starke Einschränkungen daran, welche Abbildungen zwischen Spielen als *Morphismen zwischen Spielen* bezeichnet werden dürfen. Einige Möglichkeiten dafür werden wir nun kennenlernen.

Eine relative starke Forderung ist die, dass Morphismen *kostenerhaltend* sein müssen, wie sie in [Mil13] gestellt wird:

**Definition 3.2.** Ein Morphismus  $\phi$  von  $\Gamma = (I, X, (K_i)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  nach  $\Gamma' = (I, X', (K'_i)_{i \in I}, (c'_i)_{i \in I})$  heißt *kostenerhaltend*, wenn für alle Strategieprofile  $x \in X$  und jeden Spieler  $i \in I$  gilt:

$$c_i(x) = c'_i(\phi(x))$$

Ist ein solcher Morphismus gleichzeitig ein Isomorphismus, so nennen wir  $\Gamma$  und  $\Gamma'$  *äquivalent*.

*Bemerkung 3.3.* Zwei Spiele sind also genau dann äquivalent, wenn sie sich ausschließlich durch Umbenennung der Strategien ineinander überführen lassen. In [MS96b] (S. 133) wird dies als Isomorphie von Spielen bezeichnet.

Eine auf das Untersuchen von Nash- und Polygleichgewichten zugeschnittene Form von Morphismen wird in [Mil15] wie folgt definiert:

**Definition 3.4.** Ein Morphismus  $\phi$  von  $\Gamma = (I, X, (K_i)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  nach  $\Gamma' = (I, X', (K'_i)_{i \in I}, (c'_i)_{i \in I})$  heißt *rational*, wenn für alle Strategieprofile  $x \in X$ , jeden Spieler  $i \in I$  und jede Strategie  $x'_i \in X'_i$  gilt:

$$c'_i(\phi(x)) \leq c'_i(\phi_{-i}(x_{-i}), x'_i)$$

dort allerdings nur für Endomorphismen definiert

Ist diese Definition sinnvoll/zielführend?

**Definition 3.5.** Zwei Spiele  $\Gamma = (I, X, (K_i)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  und  $\Gamma' = (I, X', (K'_i)_{i \in I}, (c'_i)_{i \in I})$  heißen *isomorph*, falls es bijektive Abbildungen  $\phi_i : X_i \rightarrow X'_i$  sowie bijektive und monotone Abbildungen  $\psi_i : K_i \rightarrow K'_i$  gibt, sodass alle Diagramme der folgenden Form kommutieren:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\phi} & X' \\ \downarrow c_i & & \downarrow c'_i \\ K_i & \xrightarrow{\psi_i} & K'_i \end{array}$$

*Bemerkung 3.6.* Diese Definition ergibt sich aus der abstrakteren Definition für in [Lap99].

Auch auf Verallgemeinerung mit Garben hinweisen (erlaubt Abbildungen zwischen Spielen mit Spielermengen unterschiedlicher Kardinalität!)

**Definition 3.7.** Zwei im Sinne von Definition 3.5 isomorphe Spiele heißen *sozial isomorph*, wenn zusätzlich die Funktion

$$\sum \psi_i : \prod_{i \in I} K_i \rightarrow \prod_{i \in I} K'_i$$

monoton ist.

Das macht natürlich nur Sinn, wenn auf den beiden Produkträumen auch totale (?) Ordnungen existieren

**Beispiel 3.8.** lineare Funktionen

Eine ganze Familie von Morphismen erhält man zudem aus den in Abschnitt 2 beschriebenen Potentialen: Milchtaich definiert in [Mil13] einen Isomorphismusbegriff der dazu führt, dass jedes exakte Potentialspiel isomorph zu dem Spiel ist, bei dem die Potentialfunktion als für alle Spieler einheitliche Kostenfunktion verwendet wird. Analog hierzu lassen sich auch für die anderen Potentialbegriffe passende Begriffe eines Morphismus (und damit eines Isomorphismus) definieren:

**Definition 3.9.** Ein Morphismus  $\phi$  von  $\Gamma = (I, X, (K_i)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  nach  $\Gamma' = (I, X', (K'_i)_{i \in I}, (c'_i)_{i \in I})$  heißt

- *exakt*, wenn für alle Strategieprofile  $x \in X$ , Spieler  $i \in I$  und Strategien  $\hat{x}_i$  gilt:

$$c_i(x) - c_i(x_{-i}, \hat{x}_i) = c'_i(\phi(x)) - c'_i(\phi(x_{-i}, \hat{x}_i))$$

- *gewichtend*, wenn es einen Vektor  $(w_i)_{i \in I}$  gibt, sodass für alle Strategieprofile  $x \in X$ , Spieler  $i \in I$  und Strategien  $\hat{x}_i$  gilt:

$$c_i(x) - c_i(x_{-i}, \hat{x}_i) = w_i \cdot (c'_i(\phi(x)) - c'_i(\phi(x_{-i}, \hat{x}_i)))$$

- *skalierend*, wenn es streng monotone Funktionen  $f_i$  gibt, die 0 auf 0 abbilden, sodass für alle Strategieprofile  $x \in X$ , Spieler  $i \in I$  und Strategien  $\hat{x}_i$  gilt:

$$c_i(x) - c_i(x_{-i}, \hat{x}_i) = f_i(c'_i(\phi(x)) - c'_i(\phi(x_{-i}, \hat{x}_i)))$$

- *ordinal*, wenn für alle Strategieprofile  $x \in X$ , Spieler  $i \in I$  und Strategien  $\hat{x}_i$  gilt:

$$c_i(x) < c_i(x_{-i}, \hat{x}_i) \implies c'_i(\phi(x)) < c'_i(\phi(x_{-i}, \hat{x}_i))$$

- *beste Antwort-erhaltend*, wenn für alle Spieler  $i \in I$  und Strategieprofile  $x_{-i} \in X_{-i}$  gilt:

$$\phi(\arg \min_{x_i \in X_i} c_i(x)) \subseteq \arg \min_{x'_i \in X'_i} c'_i(\phi_{-i}(x_{-i}), x'_i)$$

**Definition 3.10.** Ein Spiel heißt *Koordinationsspiel*, wenn alle Spieler eine gemeinsame Kostenfunktion verwenden.

[Voo+99]

*Bemerkung 3.11.* Umgekehrt könnte man nun auch ausgehend von diesen Morphismen-Begriffen definieren, wann ein Spiel ein Potentialspiel ist: Ein Spiel ist nämlich genau dann ein exaktes/gewichtetes/ordinales/beste-Antwort-Potentialspiel, wenn es exakt/gewichtet/ordinal isomorph zu einem Koordinationsspiel ist. Ein Spiel hat genau dann ein verallgemeinertes ordinales Potential, wenn es einen ordinalen Morphismus in ein solches Spiel gibt.

Zu beste Antwort: vgl. [MS96a], [MU04]

Induzieren diese Morphismen jetzt wirklich die behaupteten Isomorphismen?

*Beobachtung 3.12.* Es gelten folgende Beziehungen zwischen den verschiedenen Morphismenbegriffen:

$$\begin{aligned} \text{kostenerhaltend} &\implies \text{exakt} \implies \text{gewichtend} \implies \text{skalierend} \implies \text{ordinal} \\ &\text{rational} \implies \text{beste Antwort-erhaltend} \end{aligned}$$

weitere Zusammenhänge? Evtl. dann als Diagramm?

*Bemerkung 3.13.* Ein alternativer Ansatz zur Definition von Morphismen von Spielen verwendet Vorob'ev in [Vor94]. Darin werden einzelne Strategien nicht zwangsläufig wieder auf einzelne Strategien abgebildet, sondern können gleich auf ganze Teilmengen des Bildstrategieraums abgebildet werden. Von diesem Morphismen-typ werden dann verschiedene „approximativ kostenerhaltende“ Varianten betrachtet und die sich dadurch ergebende Kategorie studiert.

## 3.2 Erste Sätze

**Proposition 3.14.** *Sei  $\phi : \Gamma \rightarrow \Gamma'$  ein ordinaler Morphismus und  $x^0, x^1, \dots$  ein Verbesserungspfad in  $\Gamma$ . Dann ist  $\phi(x^0), \phi(x^1), \dots$  ein Verbesserungspfad in  $\Gamma'$ . Ist der Pfad endlich und in  $\Gamma'$  abgeschlossen, so auch in  $\Gamma$ .*

*Beweis.* Da Morphismen spielerweise definiert sind, erhalten sie die Eigenschaft der unilateralen Abweichung. Die Ordinalität des Morphismus stellt ferner sicher, dass jeder Verbesserungsschritt ein Verbesserungsschritt bleibt.

Nehmen wir nun an  $\phi(x^0), \dots, \phi(x^n)$  wäre ein abgeschlossener Verbesserungspfad in  $\Gamma'$ , aber  $x^0, \dots, x^n$  nicht abgeschlossen in  $\Gamma$ . Dann gäbe es folglich ein Strategieprofil  $x^{n+1} \in X$ , welches diesen Pfad in  $\Gamma$  verlängert. Aber wie wir gerade gezeigt haben wäre dann auch  $\phi(x^0), \dots, \phi(x^n), \phi(x^{n+1})$  ein Verbesserungspfad in  $\Gamma'$ , insbesondere also eine Verlängerung des ursprünglichen Pfades - im Widerspruch zu dessen vorausgesetzter Abgeschlossenheit.  $\square$

**Korollar 3.15.** *Ordinale Morphismen reflektieren Nash-Gleichgewichte. Das heißt, ist  $x \in X$  ein Strategieprofil in  $\Gamma$  und  $\phi$  ein ordinaler Morphismus in ein Spiel  $\Gamma'$ , sodass  $\phi(x)$  ein Nash-Gleichgewicht in diesem ist, dann war bereits  $x$  ein Nash-Gleichgewicht von  $\Gamma$ .*

*Beweis.* Es ist  $x$  ein trivialer Verbesserungspfad in  $\Gamma$ , dessen Bild  $\phi(x)$  in  $\Gamma'$  abgeschlossen ist. Daher ist mit Proposition 3.14  $x$  in  $\Gamma$  abgeschlossen und folglich (vgl. Beobachtung 1.10)  $x$  ein Nash-Gleichgewicht in  $\Gamma$ .  $\square$

**Korollar 3.16.** *Seien  $\Gamma$  und  $\Gamma'$  zwei ordinal-isomorphe Spiele. Dann ist  $x \in X$  genau dann ein Nash-Gleichgewicht von  $\Gamma$ , wenn  $\phi(x) \in X'$  ein Nash-Gleichgewicht von  $\Gamma'$  ist.*

Ordinal-isomorphe Spiele haben also die gleichen Nash-Gleichgewichte. Selbiges gilt auch für Verbesserungspfade, das heißt insbesondere, dass die FIP eines Spiels unter ordinaler Isomorphie erhalten bleibt.

**Korollar 3.17.** *Seien  $\Gamma$  und  $\Gamma'$  zwei ordinal-isomorphe Spiele. Dann hat  $\Gamma$  genau dann die FIP, wenn  $\Gamma'$  diese besitzt.*

**Lemma 3.18.** *Seien  $\Gamma$  und  $\Gamma'$  zwei sozial isomorphe Spiele. Dann ist  $x \in X$  genau dann ein soziales Optimum von  $\Gamma$ , wenn  $\phi(x) \in X'$  ein soziales Optimum von  $\Gamma'$  ist.*

*Beweis.* .

Folgt direkt mit Definitionen

$\square$

**Satz 3.19.** *Besitzt ein Spiel  $\Gamma$  ein ordinales Potential, so ist es ordinal-isomorph zu einem Auslastungsspiel.*

*Beweis.* Analog zum Beweis der Äquivalenz von Spielen mit exaktem Potential und Auslastungsspielen in [MS96b], Beweis orientiert sich an [Mon06].  $\square$

*Beobachtung 3.20.* Besitzt ein Spiel ein verallgemeinertes ordinales Potential, so gibt es einen ordinalen Morphismus in/von ein Auslastungsspiel.

Was von beidem?

*Beweis.* .

Proofmining in oberem Beweis

$\square$

*Beobachtung 3.21.* Nach [MS96b] Lemma 2.5 hat jedes Spiel mit FIP ein verallgemeinertes Potential, also

in/von...

Eine Verallgemeinerung von Beobachtung 2.2 lautet

**Proposition 3.22.** Seien  $\Gamma$  und  $\Delta$  zwei Spiele. Dann gibt es genau dann einen gewichteten Morphismus  $\Gamma \rightarrow \Delta$ , wenn es Gewichte  $(w_i)_{i \in I}$  und einen exakten Morphismus  $\Gamma \rightarrow w_i \cdot \Delta$  gibt.

**Korollar 3.23.** Zwei Spiele  $\Gamma$  und  $\Delta$  sind genau dann gewichtet isomorph, wenn ... usw.

## 4 Morphismen - Alternativ:

Zu zwei gegebenen Spielen  $\Gamma = (I, X, (K_i)_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  und  $\Delta = (J, Y, (L_j)_{j \in J}, (d_j)_{j \in J})$  kann man wie folgt eine Abbildung zwischen diesen beiden definieren:

- Eine Abbildung  $\sigma : J \rightarrow I$  zwischen den Spielermengen und
- für jeden Spieler  $j \in J$  eine Abbildung  $\phi_j : X_{\sigma(j)} \rightarrow Y_j$  seiner Strategien.

*Bemerkung 4.1.* Alle Abbildungen  $\phi_j$  zusammen induzieren eine Abbildung zwischen den Gesamtstrategieräumen:

$$\phi : X \rightarrow Y : x = (x_i)_{i \in I} \mapsto \phi(x) := (\phi_j(x_{\sigma(j)}))_{j \in J}$$

Dass das funktioniert liegt daran, dass die Spielerabbildung in die umgekehrte Richtung geht!

**Definition 4.2.** Ein Morphismus  $(\sigma, \phi)$  von  $\Gamma = (I, X, (\mathbb{R})_{i \in I}, (c_i)_{i \in I})$  nach  $\Delta = (J, Y, (\mathbb{R})_{j \in J}, (d_j)_{j \in J})$  heißt

- *exakt*, wenn für alle Strategieprofile  $x \in X$ , Spieler  $j \in J$  und Strategien  $\hat{x}_{\sigma(j)}$  gilt:

$$c_{\sigma(j)}(x) - c_{\sigma(j)}(x \mid \hat{x}_{\sigma(j)}) = d_j(\phi(x)) - d_j(\phi(x \mid \hat{x}_{\sigma(j)}))$$

- *gewichtend*, wenn es einen Vektor  $(w_j)_{j \in J}$  gibt, sodass für alle Strategieprofile  $x \in X$ , Spieler  $j \in J$  und Strategien  $\hat{x}_{\sigma(j)}$  gilt:

$$c_{\sigma(j)}(x) - c_{\sigma(j)}(x \mid \hat{x}_{\sigma(j)}) = w_j \cdot (d_j(\phi(x)) - d_j(\phi(x \mid \hat{x}_{\sigma(j)})))$$

- *skalierend*, wenn es streng monotone Funktionen  $f_j$  gibt, die 0 auf 0 abbilden, sodass für alle Strategieprofile  $x \in X$ , Spieler  $j \in J$  und Strategien  $\hat{x}_{\sigma(j)}$  gilt:

$$c_{\sigma(j)}(x) - c_{\sigma(j)}(x \mid \hat{x}_{\sigma(j)}) = f_j(d_j(\phi(x)) - d_j(\phi(x \mid \hat{x}_{\sigma(j)})))$$

- *biordinal*, wenn für alle Strategieprofile  $x \in X$ , Spieler  $j \in J$  und Strategien  $\hat{x}_{\sigma(j)}$  gilt:

$$c_{\sigma(j)}(x) < c_{\sigma(j)}(x \mid \hat{x}_{\sigma(j)}) \iff d_j(\phi(x)) < d_j(\phi(x \mid \hat{x}_{\sigma(j)}))$$

- *ordinal*, wenn für alle Strategieprofile  $x \in X$ , Spieler  $j \in J$  und Strategien  $\hat{x}_{\sigma(j)}$  gilt:

$$c_{\sigma(j)}(x) < c_{\sigma(j)}(x \mid \hat{x}_{\sigma(j)}) \implies d_j(\phi(x)) < d_j(\phi(x \mid \hat{x}_{\sigma(j)}))$$

- *beste Antwort-erhaltend*, wenn für alle Spieler  $j \in J$  und Strategieprofile  $x_{-\sigma(j)} \in X_{-\sigma(j)}$  gilt:

$$\phi(\arg \min_{x_{\sigma(j)} \in X_{\sigma(j)}} c_{\sigma(j)}(x)) \subseteq \arg \min_{y_j \in Y_j} d_j(\phi_{-\sigma(j)}(x \mid y_j))$$

*Beobachtung 4.3.* Ordinale Isomorphismen sind automatisch biordinal.

*Notation 4.4.* Ist  $\sigma$  bijektiv (d.h. eine Permutation), so werden wir im Folgenden immer davon ausgehen, dass es bereits die Identität ist. Dies erlaubt es uns in der Notation alle  $\sigma$  ganz wegzulassen.

**Proposition 4.5.** *Sei  $(\sigma, \phi) : \Gamma \rightarrow \Delta$  ein ordinaler Morphismus mit injektivem  $\sigma$ . Dann ist für jeden Verbesserungspfad  $x^0, x^1, \dots$  in  $\Gamma$  auch  $\phi(x^0), \phi(x^1), \dots$  ein Verbesserungspfad in  $\Delta$ . Ist der Pfad endlich und in  $\Delta$  abgeschlossen, so auch in  $\Gamma$ .*

*Beweis.* Da  $\sigma$  injektiv ist, bleibt die Eigenschaft unilateraler Abweichung erhalten. Die Ordinalität des Morphismus stellt ferner sicher, dass jeder Verbesserungsschritt ein Verbesserungsschritt bleibt.

Nehmen wir nun an  $\phi(x^0), \dots, \phi(x^n)$  wäre ein abgeschlossener Verbesserungspfad in  $\Delta$ , aber  $x^0, \dots, x^n$  nicht abgeschlossen in  $\Gamma$ . Dann gäbe es folglich ein Strategieprofil  $x^{n+1} \in X$ , welches diesen Pfad in  $\Gamma$  verlängert. Aber wie wir gerade gezeigt haben wäre dann auch  $\phi(x^0), \dots, \phi(x^n), \phi(x^{n+1})$  ein Verbesserungspfad in  $\Delta$ , insbesondere also eine Verlängerung des ursprünglichen Pfades - im Widerspruch zu dessen vorausgesetzter Abgeschlossenheit.  $\square$

**Korollar 4.6.** *Ordinale Morphismen mit injektiver Spielerabbildung reflektieren Nash-Gleichgewichte. Das heißt, ist  $x \in X$  ein Strategieprofil in  $\Gamma$  und  $(\sigma, \phi)$  ein ordinaler Morphismus in ein Spiel  $\Delta$ , sodass  $\phi(x)$  ein Nash-Gleichgewicht in diesem ist, dann war bereits  $x$  ein Nash-Gleichgewicht von  $\Gamma$ .*

*Beweis.* Es ist  $x$  ein trivialer Verbesserungspfad in  $\Gamma$ , dessen Bild  $\phi(x)$  in  $\Delta$  abgeschlossen ist. Daher ist mit Proposition 3.14  $x$  in  $\Gamma$  abgeschlossen und folglich (vgl. Beobachtung 1.10)  $x$  ein Nash-Gleichgewicht in  $\Gamma$ .  $\square$

**Proposition 4.7.** *Sei  $(\sigma, \phi) : \Gamma \rightarrow \Delta$  eine biordinale Retraktion (d.h. ein biordinaler Morphismus, welcher ein Rechtsinverses besitzt). Dann ist ein Strategieprofil  $x \in X$  genau dann ein Nash-Gleichgewicht in  $\Gamma$ , wenn  $\phi(x)$  ein Nash-Gleichgewicht in  $\Delta$  ist.*

*Beweis.* Sei  $(\tau, \psi) : \Delta \rightarrow \Gamma$  ein Rechtsinverses von  $(\sigma, \phi)$ , d.h. es gelte  $(\sigma, \phi) \circ (\tau, \psi) = (\tau \circ \sigma, \phi \circ \psi) = (\text{id}_\Gamma, \text{id}_Y)$ . Damit ist  $\sigma$  offenbar injektiv und daher mit Korollar 4.6 die „wenn“-Richtung gezeigt.

Zu „dann“: Sei also  $x \in X$  ein Nash-Gleichgewicht und  $y_j \in Y_j$ . Wegen der Surjektivität von  $\phi_j$  gibt es dann ein  $\hat{x}_{\sigma(j)} \in X_{\sigma(j)}$  mit  $\phi_j(\hat{x}_{\sigma(j)}) = y_j$ . Da  $x$  ein Nash-Gleichgewicht ist, gilt nun

$$c_{\sigma(j)}(x) \leq c_{\sigma(j)}(x \mid \hat{x}_{\sigma(j)})$$

und daher wegen Biordinalität von  $\phi$  auch

$$d_j(\phi(x)) \leq d_j(\phi(x \mid \hat{x}_{\sigma(j)})) \stackrel{*}{=} d_j(\phi(x) \mid \phi_j(\hat{x}_{\sigma(j)})) = d_j(\phi(x) \mid y_j)$$

wobei in  $*$  nochmal die Injektivität von  $\sigma$  eingeht. □

In der Proposition explizit Surjektivität/Injektivität fordern - folgt die Retrakteigenschaft dann? In dem Fall also Bemerkung hinzufügen

**Beispiel 4.8.** Ordinale Isomorphismen haben insbesondere injektive Spieler- und Strategieabbildungen. Damit erfüllen sie die Voraussetzungen von Proposition 4.7, d.h. ordinal isomorphe Spiele haben die gleichen Nash-Gleichgewichte.

Bi?

**Beispiel 4.9.** Spieler mit nur einer einzigen Strategie können immer entfernt werden ohne die Nash-Gleichgewichte zu verändern.

Formalisiert oBdA-Bemerkung aus Grundlagen

Beweis: Morphismus angeben und Eigenschaften zeigen

## 5 Zusammenhänge von Auslastungs- und Potentialspielen

Welche Endlichkeitsvoraussetzungen benötigt man hier jeweils?

In [Ros73] führte Rosenthal Auslastungsspiele als Klasse von Spielen ein, welche immer ein exaktes Potential besitzen. Später zeigten Monderer und Shapley in [MS96b, Theorem 3.2], dass diese Klasse bis auf (kostenerhaltende) Isomorphie bereits *alle* Spiele mit exaktem Potential umfasst. Zusammengefasst gilt also:

**Satz 5.1.** *Jedes Auslastungsspiel besitzt ein exaktes Potential und jedes exakte Potentialspiel ist äquivalent zu einem Auslastungsspiel.*

*Beweis.* .

Beweis?

□

### 5.1 Von ungewichtet zu gewichtet

Für gewichtete Auslastungsspiele zeigen Harks, Klimm und Möhring in [HKM11, Theorem 3.9], dass die einzigen beiden Klassen stetiger Funktionen, die (als Kostenfunktionen verwendet) ausschließlich Spiele mit gewichtetem Potential erzeugen, affin lineare Funktionen bzw. exponentielle Funktionen (mit gemeinsamem Exponenten) sind:

**Satz 5.2.** *Gegeben eine Menge von stetigen Funktionen  $C$ . Dann besitzt genau dann jedes gewichtete Auslastungsspiel, welches nur Funktionen aus  $C$  als Kostenfunktionen verwendet, ein gewichtetes Potential, wenn  $C$*

- *entweder ausschließlich affin lineare Funktionen enthält*
- *oder ausschließlich Funktionen der Form  $c(l) = a_c \cdot b^l + d_c$  enthält.*

Fälle: Exaktes Potential/gewichtetes Potential unterscheiden

In [HK12, Theorem 5.1] zeigen Harks und Klimm weiter, dass diese beiden Klassen von Kostenfunktionen unter allen Klassen *stetiger* Funktionen gleichzeitig auch die einzigen sind, die die Existenz eines Nash-Gleichgewichtes garantieren.<sup>2</sup>

Da nun für endliche Spiele alle der in Abschnitt 2 definierten Potentiale die Existenz eines Nash-Gleichgewichtes garantieren, folgt hiermit direkt, dass es auch für die allgemeineren Potentialbegriffe keine größeren oder anderen Klassen von stetigen Funktionen gibt, die immer die Existenz eines entsprechenden Potentials sicher stellen.

Zusammen zeigen diese beiden Sätze bereits deutlich, dass der Schritt vom ungewichteten Fall zum gewichteten auf Seite der Auslastungsspiele erheblich größer ist als auf Seite der Potentiale. Tatsächlich zeigt Milchtaich in [Mil13], dass dieser Verallgemeinerungsschritt für Auslastungsspiele bereits der größtmögliche ist, denn es gilt:

**Satz 5.3.** *Jedes Spiel ist äquivalent zu einem gewichteten Auslastungsspiel .*

(sogar Netzwerkauslastungsspiel mit ...)

<sup>2</sup>zudem sind es auch noch die einzigen Klassen, welche für jedes gewichtete Auslastungsspiel das Erfüllen der FIP sicherstellen.



Die Menge der gewichteten Auslastungsspiele umfasst also (bis auf kostenerhaltende Isomorphie) bereits *alle* (endlichen) Spiele in strategischer Form. Möchte man daher eine wirklich analoge Verallgemeinerung von Auslastungsspielen passend zu gewichteten Potentialspielen finden, muss man also andere Varianten betrachten Gewichte ins Spiel zu bringen. In Definition 1.16 hatten wir bereits zwei solche gesehen, welche wir nun näher untersuchen wollen:

## 5.2 Lastgewichtete Auslastungsspiele

Die erste alternative Klasse von Auslastungsspielen sind die lastgewichteten Auslastungsspiele. Harks, Klimm und Möhring beobachten in [HKM11], dass lastgewichtete Auslastungsspiele (die dort als normalisierte Auslastungsspiele bezeichnet werden) zwar nicht äquivalent, aber doch unter verschiedenen Aspekten sehr ähnlich zu allgemeinen gewichteten Auslastungsspielen sind. Dieser Zusammenhang lässt sich nun leicht durch einen passenden Isomorphiebegriff formalisieren - es gilt nämlich:

**Lemma 5.4.** *Jedes lastgewichtete Auslastungsspiel ist gewichtet isomorph zu einem gewichteten Auslastungsspiel und umgekehrt. Die beiden Spiele basieren dabei jeweils auf dem gleichen Auslastungsmodell.*

*Beweis.* Der Existenz eines solchen Isomorphismus folgt direkt aus der auch in [HKM11] gemachten Beobachtung ...  $\square$

Hieraus ergeben sich dann direkt die in [HKM11] beobachteten Zusammenhänge zwischen gewichteten und lastgewichteten Auslastungsspielen:

**Korollar 5.5.** .

*Beobachtungen*

Insbesondere sehen wir damit aber auch, dass lastgewichtete Auslastungsspiele ebenfalls eine zu starke Verallgemeinerung von ungewichteten Auslastungsspielen sind, um eine Entsprechung der gewichteten Potentialspiele sein zu können.

## 5.3 Kostengewichtete Auslastungsspiele

Wie sich herausstellt sind kostengewichtete Auslastungsspiele hingegen ein geeigneter Kandidat:

**Satz 5.6.** *Jedes kostengewichtete Auslastungsspiel besitzt ein gewichtetes Potential und jedes Spiel mit einem gewichteten Potential ist äquivalent zu einem kostengewichteten Auslastungsspiel.*

Nicht nur entspricht dieser Satz genau dem von Monderer und Shapley bewiesenen Satz für ungewichtete Auslastungsspiele und exakte Potentiale (Satz 5.1), auch der Beweis erfolgt völlig analog.

*Beweis.* Sei  $\Gamma$  ein kostengewichtetes Auslastungsspiel mit Gewichtsvektor  $w := (w_i)_{i \in I}$ . Dann ist die Rosenthal-Potentialfunktion (vgl. [Ros73])  $P(x) := \sum_{r \in R} \sum_{k=1}^{l_r(x)} c_r(k)$  ein  $w$ -Potential für  $\Gamma$ , denn es gilt:

Beweis!

Ist umgekehrt  $\Gamma$  ein Spiel mit einem gewichteten Potential  $P$  (mit Gewichtsvektor  $w$ ), so definieren wir wie folgt ein kostengewichtetes Auslastungsspiel (wir folgen hier dem Beweis in [Mon06, Theorem 1]):

Definition kostengewichtetes Auslastungsspiel

Zum Beweis der Äquivalenz der beiden Spiele betrachte man folgenden kostenerhaltenden Isomorphismus:

Definition Iso

□

Zusammen mit Satz 5.2 wissen wir nun ...

Direkte Konstruktion eines ungewichteten Auslastungsspiels zu gew. mit affin-linearen Kosten (wie ähnlich ist diese zu dem Beweis der Existenz eines exakten Potentials von Fotakis et al?)  
Kann man irgendwas zu Spielen mit exponentiellen Kosten sagen?

## 5.4 Überblick




Abbildung 2: Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Spieleklassen für endliche Spiele

## Literatur

- [FKS04] Dimitris Fotakis, Spyros Kontogiannis und Paul Spirakis. „Selfish Unsplittable Flows“. In: *Automata, Languages and Programming: 31st International Colloquium, ICALP 2004, Turku, Finland, July 12-16, 2004. Proceedings*. Hrsg. von Josep Díaz u. a. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004, S. 593–605. ISBN: 978-3-540-27836-8. DOI: [10.1007/978-3-540-27836-8\\_51](https://doi.org/10.1007/978-3-540-27836-8_51). URL: [http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-27836-8\\_51](http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-27836-8_51).
- [HK12] Tobias Harks und Max Klimm. „On the Existence of Pure Nash Equilibria in Weighted Congestion Games“. In: *Mathematics of Operations Research* 37.3 (2012), S. 419–436. DOI: [10.1287/moor.1120.0543](https://doi.org/10.1287/moor.1120.0543). eprint: <http://dx.doi.org/10.1287/moor.1120.0543>. URL: <http://dx.doi.org/10.1287/moor.1120.0543>.
- [HKM11] Tobias Harks, Max Klimm und Rolf H. Möhring. „Characterizing the Existence of Potential Functions in Weighted Congestion Games“. In: *Theory of Computing Systems* 49.1 (2011), S. 46–70. ISSN: 1433-0490. DOI: [10.1007/s00224-011-9315-x](https://doi.org/10.1007/s00224-011-9315-x). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s00224-011-9315-x>.
- [Jim14] Alfi Jiménez. *Game Theory from the Category Theory Point of View*. 2014. URL: <https://www.gtcenter.org/Archive/2014/Conf/Jimenez1880.pdf> (besucht am 15.01.2017).
- [Lap99] Victor Lapitsky. „On some Categories of Games and Corresponding Equilibria“. In: *International Game Theory Review* 1.2 (1999), S. 169–185.
- [Mil13] Igal Milchtaich. „Representation of finite games as network congestion games“. In: *International Journal of Game Theory* 42.4 (2013), S. 1085–1096. ISSN: 1432-1270. DOI: [10.1007/s00182-012-0363-5](https://doi.org/10.1007/s00182-012-0363-5). URL: <https://faculty.biu.ac.il/~milchti/papers/03.html>.
- [Mil15] Igal Milchtaich. „Polyequilibrium“. Bar-Ilan University, Department of Economics, 2015. URL: <https://faculty.biu.ac.il/~milchti/papers/30.html>. Working Paper.
- [Mil96] Igal Milchtaich. „Congestion Games with Player-Specific Payoff Functions“. In: *Games and Economic Behavior* 13.1 (1996), S. 111–124. ISSN: 0899-8256. DOI: <http://dx.doi.org/10.1006/game.1996.0027>. URL: <https://faculty.biu.ac.il/~milchti/papers/20.html>.
- [Mon06] Dov Monderer. „Multipotential Games“. In: *Proceedings of the 20th International Joint Conference on Artificial Intelligence*. 2006. URL: [https://web.iem.technion.ac.il/images/user-files/dov/image/bce0fb629a68f9b2e9bd487ebb73356d/multi\\_potential\\_games--monderer.pdf](https://web.iem.technion.ac.il/images/user-files/dov/image/bce0fb629a68f9b2e9bd487ebb73356d/multi_potential_games--monderer.pdf).

- [MS96a] Dov Monderer und Lloyd S. Shapley. „Fictitious Play Property for Games with Identical Interests“. In: *Journal of Economic Theory* 68.1 (1996), S. 258–265. ISSN: 0022-0531. DOI: <http://dx.doi.org/10.1006/jeth.1996.0014>. URL: [https://www.researchgate.net/profile/Dov\\_Monderer/publication/4977154\\_Fictitious\\_Play\\_Property\\_for\\_Games\\_with\\_Identical\\_Interests/links/55b77cb408aed621de04635f.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Dov_Monderer/publication/4977154_Fictitious_Play_Property_for_Games_with_Identical_Interests/links/55b77cb408aed621de04635f.pdf).
- [MS96b] Dov Monderer und Lloyd S. Shapley. „Potential Games“. In: *Games and Economic Behaviour* (1996), S. 124–143.
- [MU04] Stephen Morris und Takashi Ui. „Best response equivalence“. In: *Games and Economic Behavior* 49.2 (2004), S. 260–287. ISSN: 0899-8256. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.geb.2003.12.004>. URL: [https://www.princeton.edu/~smorris/pdfs/paper\\_40\\_Best\\_Response\\_Equivalence.pdf](https://www.princeton.edu/~smorris/pdfs/paper_40_Best_Response_Equivalence.pdf).
- [Ros73] Robert W. Rosenthal. „A class of games possessing pure-strategy Nash equilibria“. In: *International Journal of Game Theory* 2.1 (1973), S. 65–67. ISSN: 1432-1270. DOI: [10.1007/BF01737559](https://doi.org/10.1007/BF01737559). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/BF01737559>.
- [VN97] Mark Voorneveld und Henk Norde. „A Characterization of Ordinal Potential Games“. In: *Games and Economic Behavior* 19.2 (1997), S. 235–242. ISSN: 0899-8256. DOI: <http://dx.doi.org/10.1006/game.1997.0554>. URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899825697905546>.
- [Voo+99] Mark Voorneveld u. a. „Congestion games and potentials reconsidered“. In: *International Game Theory Review* 1.03n04 (1999), S. 283–299. URL: <http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219198999000219>.
- [Voo00] Mark Voorneveld. „Best-response potential games“. In: *Economics Letters* 66.3 (2000), S. 289–295. ISSN: 0165-1765. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/S0165-1765\(99\)00196-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0165-1765(99)00196-2). URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176599001962>.
- [Vor94] Nicolai N. Vorob’ev. *Foundations of Game Theory. Noncooperative Games*. Englisch. Übers. von Ralph P. Boas. Birkhäuser Basel, 1994. DOI: [10.1007/978-3-0348-8514-0](https://doi.org/10.1007/978-3-0348-8514-0).