



## Fraktale Dimensionen - Lösungshinweise

Dieses Skript enthält Lösungshinweise zum letzten Korrespondenzbrief. Manchmal sind dies schon die kompletten Lösungen der Aufgaben, meistens sind es aber nur einige Hinweise, die dir dabei helfen sollen, auch die Aufgaben lösen zu können, bei denen du bisher nicht weiter gekommen bist. Wenn du noch weitere Fragen zu den Aufgaben hast, kannst du uns diese weiterhin gerne per E-Mail stellen.

Wenn du uns bereits deine eigenen Lösungsversuche geschickt hast (oder noch schicken wirst - das ist selbstverständlich immer noch möglich), dann versuchen wir natürlich auch dir mit unseren Korrekturen beim Verständnis der Aufgaben helfen. Es lohnt sich also uns deine Lösungen zu senden :-)

### Aufgabe 1.


Mit der gleichen Überlegung wie für den zweiten Schritt erhält man:

- Nach 3 Schritten eine Länge von  $\left(\frac{4}{3}\right)^3 \cdot l = \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot l = \frac{64}{27}l \approx 2,37 \cdot l$
- Nach 5 Schritten eine Länge von  $\left(\frac{4}{3}\right)^5 \cdot l = \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot l \approx 4,21 \cdot l$
- Nach  $n$  Schritten eine Länge von  $\left(\frac{4}{3}\right)^n \cdot l$

### Aufgabe 2. *Wo ist der Schnee?*

Der Umfang der Kochschen Schneeflocke ist offenbar dreimal so lang wie die Länge einer der drei Kochschen Kurven, aus denen sie besteht. Da deren Länge aber schon unendlich ist, ist natürlich auch der Umfang der Kochschen Schneeflocke unendlich.

Interessanterweise ist aber der Flächeninhalt der Kochschen Schneeflocke trotzdem endlich. Zum Beispiel kann man sich leicht überlegen, dass der Flächeninhalt kleiner sein muss als der des Umkreises des ursprünglichen Dreiecks - und der ist sicher endlich.



**Aufgabe 3.** *Wie oft?*

Streckfaktor:	2-fach	3-fach	4-fach	9-fach
Strecke	2-mal	3-mal	4-fach	9-fach
Dreieck	4-mal	9-mal	16-fach	81-fach
Quadrat	4-mal	9-mal	16-fach	81-fach
Würfel	8-mal	27-mal	64-fach	729-fach
Kochsche Kurve	—	4-mal	—	16-mal

**Aufgabe 4.** *Potenzen und Dimensionen*

	2	3	4	9
$\square^1$	$2^1 = 2$	$3^1 = 3$	$4^1 = 4$	$9^1 = 9$
$\square^2$	$2^2 = 4$	$3^2 = 9$	$4^2 = 16$	$9^2 = 81$
$\square^3$	$2^3 = 8$	$3^3 = 27$	$4^3 = 64$	$9^3 = 729$
$\square^{1,262}$	2,398	4,001	5,752	16,005

Es fällt auf (in den ersten drei Zeilen): Streckt man ein  $d$ -dimensionales Objekt um den Faktor  $k$ , so passt das ursprüngliche genau  $k^d$  in das neue. Das passt also genau zu unserer Definition 2 aus dem Korrespondenzbrief.

Damit diese Regel auch für die Kochsche Kurve gilt, müssen wir diese anscheinend als (ungefähr) 1,262-dimensionales Objekt bezeichnen.

**Aufgabe 5.**


Streckfaktor:	2-fach	4-fach
Fraktal-Baum	3-mal	9-mal



Vergleichst du die obige Tabelle mit der aus Aufgabe 3, so siehst du dass die Dimension des Fraktalbaumes zwischen der einer Strecke und der eines Dreiecks liegt - also zwischen 1 und 2. Eine exakte Berechnung liefert:  $d \approx 1,585$ .

## 0.1 Das Sierpinski-Dreieck

### Aufgabe 6.



Streckst du das Sierpinski-Dreieck um den Faktor 2, so passt das ursprüngliche Dreieck 3-mal in das neue. Genau wie bei der letzten Aufgabe, liegt dessen Dimension also irgendwo zwischen 1 und 2. Genauer gesagt wiederum  $d \approx 1,585$ .


### Aufgabe 7.

In jedem Schritt verliert man  $\frac{1}{4}$  der grauen Fläche. Es bleiben also nach jedem Schritt  $\frac{3}{4}$  der Fläche vor dem jeweiligen Schritt.

Ist die Fläche des grauen Dreiecks zu Beginn 1, so hat man nach einem Schritt eine Fläche von  $\frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{3}{4}$ , nach zwei Schritten eine Fläche von  $\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \left(\frac{3}{4}\right)^2$  usw.

Nach  $n$  Schritten bleibt also noch eine Fläche von  $\left(\frac{3}{4}\right)^n$ . Man kann sich überlegen, dass der Flächeninhalt dadurch kleiner als jede positive Zahl wird. Folglich ist der Flächeninhalt des Fraktals („nach unendlich vielen Schritten“) 0.

### Aufgabe 8. *Pascalsches Dreieck*



### Aufgabe 9. Cantor-Menge

Streckt man die Cantor-Menge um den Faktor 3, so erhält man zwei Kopien des ursprünglichen Fraktals. Bei einer Strecke erhielte man drei Kopien. Die Cantor-Menge hat also eine *kleinere* fraktale Dimension als die Strecke - also eine Dimension zwischen 0 und 1 - genauer:  $d \approx 0,631$ .

Nach jedem Schritt die Strecke nur noch  $\frac{2}{3}$  der vorherigen Länge. Nach  $n$  Schritten also noch  $\left(\frac{2}{3}\right)^n$ . Und wie beim Sierpinski-Dreieck kann man sehen, dass diese Länge immer mehr gegen 0 geht.

### Aufgabe 10. Pyramiden-Fraktal


Streckt man das Pyramiden-Fraktal um den Faktor 2, so erhält man 5 Kopien. Ein Vergleich mit der Tabelle aus Aufgabe 3 zeigt also, dass die fraktale Dimension dieses Objekts zwischen 2 und 3 liegen muss. Genauer gesagt ist  $d \approx 2,322$ .

### Aufgabe 11.

Fraktale Dimension größer als 2. Daher Fläche (2-dimensional) unendlich. Kleiner als 3, daher Volumen (3-dimensional) gleich 0.

Fläche nach einem Schritt  $\frac{5}{4}$ -mal so groß und Volumen  $\frac{5}{8}$ -mal (5 Pyramiden, die jeweils halb so breit, halb so tief und halb so hoch sind.)

### Aufgabe 12.



2-mal so groß, dann passt es 4-mal hinein. Damit ist  $d = 2$ .

Dieses Objekt ist flächenfüllend (d.h. wie eine Fläche - 2-dimensional)

**Aufgabe 13.** *Ostseeküste*

2-mal so groß, dann passt es 4-mal hinein. Damit ist  $d = 2$ .

Dieses Objekt ist flächenfüllend (d.h. wie eine Fläche - 2-dimensional)