

Übungsblatt 4 zur Algebraischen Zahlentheorie

Aufgabe 1. Ein zweiter Ausblick auf Verzweigung von Primidealen

Sei $\mathfrak{q} := (11) \subseteq \mathcal{O}_K$ mit $K := \mathbb{Q}[\sqrt{-5}]$.

- a) Zeige, dass \mathfrak{q} ein Primideal ist. b) Berechne den Grad $[\mathcal{O}_K/\mathfrak{q} : \mathbb{Z}/(11)]$.

Aufgabe 2. Ein Kriterium für die Trägheit eines Primideals

Sei p eine Primzahl. Sei d quadratfrei und $K := \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$.

- a) Zeige: Wenn die Kongruenz $x^2 \equiv d \pmod{p}$ unlösbar ist, dann ist $(p) \subseteq \mathcal{O}_K$ ein Primideal.
b) Zeige, dass auch die Umkehrung der Aussage aus a) gilt, falls p ungerade ist.

Hinweis. Ist $f \in \mathbb{F}_p[X]$ ein quadratisches Polynom, so ist der Ring $\mathbb{F}_p[X]/(f)$ genau dann ein Integritätsbereich, wenn f keine Nullstelle modulo p besitzt.

Aufgabe 3. Eine Einschränkung an Diskriminanten von Zahlkörpern

Sei d die Diskriminante einer \mathbb{Q} -Basis eines beliebigen Zahlkörpers, welche nur aus ganzen Elementen besteht. Zeige, dass d modulo 4 gleich 0 oder 1 ist.

Hinweis. Solltest du in die Situation kommen, Körpereinschreibungen auf gewisse komplexe Zahlen anzuwenden, dann stress dich nicht, falls diese Zahlen gar nicht in der Definitionsmenge der Körpereinschreibungen liegen sollten. Das ist ein behebbares technisches Problem.

Aufgabe 4. Ein Konstruktionsverfahren für Ganzheitsbasen

Sei $K := \mathbb{Q}[\vartheta]$ ein Zahlkörper vom Grad n und d die Diskriminante der Basis $(1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1})$. Für $i = 0, \dots, n-1$ wählen wir aus der Menge

$$B_i := \{x \in \mathcal{O}_K \mid x = \frac{1}{d}(a_0 + a_1\vartheta + \dots + a_i\vartheta^i) \text{ für gewisse } a_0, \dots, a_i \in \mathbb{Z} \text{ mit } a_i \neq 0\}$$

ein Element x_i mit minimalem Betrag des Koeffizienten a_i . Zeige, dass (x_0, \dots, x_{n-1}) eine Ganzheitsbasis von \mathcal{O}_K ist.

Aufgabe 5. Wir suchen eine Ganzheitsbasis

Sei $\alpha \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle des Polynoms $X^3 - X - 4 \in \mathbb{Q}[X]$. Sei $K := \mathbb{Q}[\alpha]$. Finde eine Ganzheitsbasis von \mathcal{O}_K .

Hierzu folgt noch ein Hinweis.

♡ Aufgabe 6. Der mystische Körper mit einem Element

Das q -Analogon einer Zahl n ist $[n]_q := 1 + q + \dots + q^{n-1}$.

- a) Zeige: Ein n -dimensionaler Vektorraum über \mathbb{F}_q besitzt genau $(q^n - 1)/(q - 1)$ eindimensionale Untervektorräume.
b) Finde eine Formel für die Anzahl k -dimensionaler Untervektorräume eines n -dimensionalen Vektorraums über \mathbb{F}_q . Drücke dein Ergebnis über q -Analoge aus.
c) Setze ohne Erlaubnis in deiner Formel aus b) $q := 1$. Was passiert? Was sollten also Vektorräume und Untervektorräume über dem Körper \mathbb{F}_1 mit einem Element sein?