

浅谈排列组合

前置知识

- 排列组合

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$
$$\binom{n}{m} = C_n^m = \frac{A_n^m}{A_m^m} = \frac{n!}{(n-m)! \cdot m!}$$

特别的, 当 $m > n$ 时, $C_n^m = 0$ 。

- 排列组合的推导

在 n 个数里面 **按顺序** 的选择 m 个数, 也就是 A_n^m , 我们可以这样假设: 有 m 个空位, 你需要——把这 n 个物品放上去。有 n 种选择可以在第一个空位上面 (因为每一个物品都可以放上去)。而第二个空位只有 $n-1$ 种选择, (因为有一个物品已经放在了第一个空位, 剩下了 $n-1$ 个物品), 第三个空位只有 $n-2$ 种选择……, 第 m 个空位只有 $(n-m+1)$ 中选择。所以,

$$A_n^m = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}。$$

在 n 个数里面 **不按顺序** 的选择 m 个数, 也就是 C_n^m , 也可以写成 $\binom{n}{m}$ 。如果在乎顺序选择, 那么总结结果就是 A_n^m 。如果不在于顺序, 就要去掉重复。所有被选出来的 m 个数, 按顺序排列有 A_m^m 种, 如果不按顺序排列, 就只有一种。所以, $C_n^m = \frac{A_n^m}{A_m^m} = \frac{n!}{(n-m)! \cdot m!}。$

- 排列组合的扩充

由定义, 我们可以发现 n 个数里面选取 m 个数的方案跟 n 个数里面选取 $n-m$ 个数的方案是一样的 (因为 n 个数里面选 m 个数, 就相当于在 n 个数里面选择 $n-m$ 个数丢掉), 于是我们可以得到:

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$$

当在 $n+m$ 个数里面选择 m 个数 ($n \geq m$) 的时候, 相当于从 n 个数里面选择 $0, 1, 2, \dots, m$ 个数, 并且在剩下 m 个数里面选 $m, m-1, m-2, \dots, 0$ 个数的方案数之和。也就是说,

$$\sum_{i=0}^m \binom{n}{i} \binom{m}{m-i} = \binom{n+m}{m}$$

其中 \sum 是求和符号, 表示 $i = 0, 1, 2, 3, \dots, m$ 时, 求和符号右边式子的值的和。

当 $n = m$ 时, 我们还可以得出

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$$

1. 组合数的递推式

在这一节, 我们将会证明这个公式:

$$\binom{a}{b} = \binom{a-1}{b-1} + \binom{a-1}{b}$$

- 由 **定义** 出发

先来看看 $\binom{a}{b}$ 的含义。它指的就是从 a 个数里面不按顺序选出 b 个数的方案数。

我们可以这样分类讨论：

1. 不选最后一个数，那么就要从 $(a-1)$ 个数里面选出 b 个，即 $\binom{a-1}{b}$ 。
2. 选最后一个数，那么只要从 $(a-1)$ 个数里面选 $(b-1)$ 个数即可，那么就是 $\binom{a-1}{b-1}$ 。

由加法原理可以得到

$$\binom{a}{b} = \binom{a-1}{b-1} + \binom{a-1}{b}$$

- 由 **计算** 出发

$$\begin{aligned} & \binom{a-1}{b-1} + \binom{a-1}{b} \\ &= \frac{(a-1)!}{(a-b)! \cdot (b-1)!} + \frac{(a-1)!}{(a-b-1)! \cdot b!} \\ &= \frac{(a-1)(a-2) \cdots (a-b+1)}{(b-1)!} + \frac{(a-1)(a-2) \cdots (a-b)}{b!} \end{aligned}$$

提公因式 $(a-1)(a-2) \cdots (a-b+1)$ ，得原式

$$\begin{aligned} &= (a-1)(a-2) \cdots (a-b+1) \cdot \left(\frac{1}{(b-1)!} + \frac{a-b}{b!} \right) \\ &= (a-1)(a-2) \cdots (a-b+1) \cdot \left(\frac{b}{b!} + \frac{a-b}{b!} \right) \\ &= (a-1)(a-2) \cdots (a-b+1) \cdot \frac{a}{b!} \\ &= \frac{a(a-1)(a-2) \cdots (a-b+1)}{b!} \\ &= \frac{a!}{(a-b)! \cdot b!} = \binom{a}{b} \end{aligned}$$

□

关于证明最后的小方块：QED 是拉丁词组 **Q**uod **E**rat **D**emonstrandum（这就是所要证明的）的缩写，代表证明完毕。现在的 QED 符号通常是 ■ 或者是 □。—— **OI-Wiki**

Ex.1 二项式定理

我们先从完全平方公式说起：

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

那么， $(a+b)^n$ 该怎么求呢？在这一节，我们将会证明这个公式，也就是 **二项式定理**：

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= \binom{n}{0} a^0 b^n + \binom{n}{1} a^1 b^{n-1} + \cdots + \binom{n}{n} a^n b^0 \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i} \end{aligned}$$

其中 \sum 是求和符号，表示 $i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$ 时，求和符号右边式子的值的和。

证明： 考虑 **数学归纳法**，

当 $n = 0$ 时， $(a+b)^0 = 1 \times a^0 b^0 = 1$ 显然成立。

假设当 $n = k$ 时成立, 即 $(a + b)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^i b^{k-i}$ 。那么, 当 $n = k + 1$ 时,

$$\begin{aligned}
 (a + b)^{k+1} &= (a + b)^k \times (a + b) \\
 &= (a + b) \times \left(\binom{k}{0} b^k + \binom{k}{1} a^1 b^{k-1} + \cdots + \binom{k}{k} a^k \right) \\
 &= \binom{k}{k} a^{k+1} + \binom{k}{k-1} a^k b + \binom{k}{k-2} a^{k-1} b^2 + \cdots + \binom{k}{0} a b^k \\
 &\quad + \binom{k}{k} a^k b + \binom{k}{k-1} a^{k-1} b^2 + \binom{k}{k-2} a^{k-2} b^3 + \cdots + \binom{k}{0} b^{k+1} \\
 &= \binom{k}{k} a^{k+1} + \left(\binom{k}{k} + \binom{k}{k-1} \right) a^k b + \left(\binom{k}{k-1} + \binom{k}{k-2} \right) a^{k-1} b^2 + \cdots + \binom{k}{0} b^{k+1} \\
 &= \binom{k+1}{k+1} a^{k+1} + \binom{k+1}{k} a^k b + \binom{k+1}{k-1} a^{k-1} b^2 + \cdots + \binom{k+1}{0} b^{k+1} \\
 &= \sum_{i=0}^{k+1} \binom{k+1}{i} a^i b^{k+1-i}
 \end{aligned}$$

□

如果你不想看到这么复杂的计算过程, 你也可以从它的组合意义出发证明。

当二项式定理中的 a 和 b 取特殊值时, 你可以得到下面这些式子:

$$\begin{aligned}
 \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} &= 2^n \quad (a = b = 1) \\
 \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} &= 0 \quad (a = -1, b = 1)
 \end{aligned}$$

2. 杨辉三角与排列组合

先将杨辉三角集体左移, 放在一张表格上。(注意表格的行 / 列开头是 0)

行 / 列	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

我们设表格中第 x 行, 第 y 列的数是 $P(x, y)$ 。

首先, 由杨辉三角本身可以得到 $P(a, b) = P(a - 1, b) + P(a - 1, b - 1)$ 。

接着, 我们可以发现一个比较神奇的事实: $P(a, b) = \binom{a}{b}$ 。

证明: 考虑 **数学归纳法**,

显然可得 $P(0, 0) = \binom{0}{0}$ 。

发现杨辉三角的递推式 $P(a, b) = P(a - 1, b) + P(a - 1, b - 1)$
与组合数的递推式 $\binom{a}{b} = \binom{a-1}{b-1} + \binom{a-1}{b}$ 形式是相同的，由此可以判断下列等式成立：

$$P(a, b) = \binom{a}{b}$$

我们再来回顾一下二项式定理：

$$(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}$$

将它的系数从前往后列出来： $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n}$

由 $P(a, b) = \binom{a}{b}$ 可以得到：这些数字刚好就是杨辉三角第 n 行从前往后的数字！

而这，就是杨辉三角和组合数之间的关系。

Ex.2 Catalan 数

假如你在一个平面直角坐标系上，起点为 $(0, 0)$ 。你一共可以移动 $2n$ 次，每次可以向右或向上走一格。我们规定，你在任意时刻往右走的次数都不能少于往上走的次数。问：当你走到点 (n, n) 时，有多少种不同的路径？


如果不按照规定来，方案则相当于在 $2n$ 次移动中选择 n 次向上移动，总数为 $\binom{2n}{n}$ 。

所有方案总数求出来了，我们接下来想一想不符合规定的方案总数。

先来想一个问题，什么时候方案是不符合要求的？

设你在移动若干次后的坐标为 (a, b) ，根据“你在任意时刻往右走的次数都不能少于往上走的次数”这一规定，可以得到这个不等式： $a \geq b$ 。也就是说，**我们在坐标系上，把 $y = x + 1$ 这条线画出来，如果一条路径触碰到了这根线，它就不符合要求。**


这种方案就是不符合要求的：



我们再尝试对这个不符合要求的方案转换一下：

所有的不符合要求的路径，都或多或少的触碰到了 $y = x + 1$ 这一条直线。我们把第一次触碰到这条直线时的坐标记为 (a, b) 。

我们再把 (a, b) 之后的路径全都按照 $y = x + 1$ 这条直线对称过去，此时图片变成了这样：
(黑色：原路径 蓝色：对称后路径)



对称过后，终点坐标就变成了 $(n-1, n+1)$ 。而且，所有不符合规定的路径对称后就唯一对应着一条到 $(n-1, n+1)$ 的路径。不仅如此，**所有到 $(n-1, n+1)$ 的一条路径也都唯一对应着一条不符合规定的路径**。（只需要再次对称回去就行了）从点 $(0, 0)$ 到点 $(n-1, n+1)$ 的一条路径方案就相当于在 $2n$ 次移动操作中选取 $n+1$ 次的向上操作，总数为 $\binom{2n}{n+1}$ 。

那么，所有符合规定的路径方案总数为 $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$ 。

又因为 $\binom{a}{b} = \binom{a}{a-b}$ ，方案总数还可以表示为 $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$ 。

而这，就是 **Catalan 数** 的通项公式。这个问题只是 Catalan 数的一种形式。

Practice

1. 求证： $\sum_{i=0}^n \binom{n-i}{i} = F_{n+1}$ ，其中 F 指斐波那契数列。

证明：考虑 **数学归纳法**，

当 $n = 0$ 时， $\binom{0}{0} = F_1 = 1$ 显然成立。当 $n = k$ 时，

$$\begin{aligned} F_k + F_{k-1} &= \sum_{i=0}^k \binom{k-i}{i} + \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k-1-i}{i} \\ &= \binom{k}{0} + \binom{k-1}{1} + \binom{k-2}{2} + \binom{k-3}{3} + \cdots + \binom{1}{k-1} + \binom{0}{k} \\ &\quad + \binom{k-1}{0} + \binom{k-2}{1} + \binom{k-3}{2} + \cdots + \binom{1}{k-2} + \binom{0}{k-1} \\ &= \binom{k+1}{0} + \binom{k}{1} + \binom{k-1}{2} + \cdots + \binom{2}{k-1} + \binom{1}{k} + \binom{0}{k+1} \\ &= \sum_{i=1}^{k+1} \binom{k+1-i}{i} = F_{k+1} \end{aligned}$$

□

2. **Zapina** / 有 n 个不同的人 and n 道不同的题，当第 i 个人开心时，当且仅当他被分配到 i 道题。请求出让至少一个人开心的方案数。

答案 = 总方案数 - 所有人都不开心的方案数

对于每道题而言，它都有 n 个选择来去到一个人的手中。而又有 n 道互不相同的题，根据乘法原理，所有总方案数自然就是 n^n 。我们设 $f(i, j)$ 为到了第 i 个人，分配了 j 道题目后都不开心的方案数，易得

$$f(i, j) = \sum_{k=0}^j f(i-1, k) \times \binom{j}{k} \times [k \neq i]$$

其中 $[k \neq i]$ 表示判断语句。当语句内容为真时，值为 1。如果为假，值为 0。

初始值 $f(0, 0) = 0$ ，终值为 $f(n, n)$ ，答案即为 $n^n - f(n, n)$ 。

3. 「雅礼集训2018」足球大战 / 有一场足球比赛，还有 n 秒就结束了，比分还是 $0:0$ 。主队每秒进球概率为 p ，客队每秒进球概率为 q ，求主队的获胜概率。

我们设 $T(i, j)$ 为队伍 i ($i = 1$ 表示主队， $i = 0$ 表示客队) 进球 j 次的概率。可以得到

$$P(\text{win}) = \sum_{i=1}^n T(1, i) \sum_{j=0}^{i-1} T(0, j)$$

我们还可以得到，

$$T(i, j) = \begin{cases} p^j (1-p)^{n-j} \times \binom{n}{j} & (i = 1) \\ q^j (1-q)^{n-j} \times \binom{n}{j} & (i = 0) \end{cases}$$

我们又设 $S(k) = \sum_{i=0}^k T(0, i)$ ，可以得到如下递推式：

$$S(0) = T(0, 0), S(n) = S(n-1) + T(0, n) \quad (n \geq 1)$$

最后，再把这些式子整合在一起，可以得到

$$P(\text{win}) = \sum_{i=1}^n T(1, i) \times S(i-1)$$

All In All

我们学到了什么？

- 排列组合的定义，计算和拓展
- 二项式定理的公式和拓展
- 杨辉三角和排列组合的关系
- Catalan 数
- 数学归纳法

附件存储在 Github 中：<https://github.com/Graphcities/Graphcity-s-Things>