

- Konstantinos Filippou
- ics23044

Exercise 1

Η αριθμητική modulo αποτελεί τη βάση για πολλά κρυπτοσυστήματα. Υπολογίστε τα παρακάτω αποτελέσματα "στο χέρι" (χωρίς τη χρήση υπολογιστή):

- $7 * 14 \bmod 11$
- $7 * 14 \bmod 13$
- $4 * 3 \bmod 12$
- $-4 * 23 \bmod 21$
- $2^{10} \bmod 2$

Solution

- $7 * 14 = 98 \rightarrow 98 / 11 = 8$ (πηλίκο), $98 - 8 \times 11 = 98 - 88 = 10$, Επομένως $7 * 14 \bmod 11 = 10$
- $7 * 14 = 98 \rightarrow 98 / 13 = 7$ (πηλίκο), $98 - 7 \times 13 = 98 - 91 = 7$, Επομένως $7 * 14 \bmod 13 = 7$
- $4 * 3 = 12 \rightarrow 12 / 12 = 1$ (πηλίκο), $12 - 1 \times 12 = 12 - 12 = 0$, Επομένως $4 * 3 \bmod 12 = 0$
- $-4 * 23 = -92 \rightarrow -92 / 21 = -5$ (πηλίκο), $-92 - (-5) \times 21 = -92 + 105 = 13$, Επομένως $-4 * 23 \bmod 21 = 13$
- $2^{10} = 1024 \rightarrow 1024 / 2 = 512$ (πηλίκο), $1024 - 512 \times 2 = 1024 - 1024 = 0$, Επομένως $2^{10} \bmod 2 = 0$

Exercise 2

Ποιος είναι ο πολλαπλασιαστικός αντίστροφος του 5 στους δακτυλίους Z_5 , Z_{25} και Z_{38} ? Παραμένει ο ίδιος ή αλλάζει με την αλλαγή του δακτυλίου? Έχει νόημα να αναφερόμαστε σε έναν αντίστροφο εάν δεν προσδιορίσουμε το modulo? Με ποιον αλγόριθμο γίνεται αποδοτικά ο υπολογισμός του αντιστρόφου σε έναν δακτύλιο?

Solution

Ο πολλαπλασιαστικός αντίστροφος του 5 στους δακτυλίους Z_5 , Z_{25} δεν υπάρχει καθώς ο μέγιστος κοινός διαιρέτης δεν είναι το 1 και είναι το 5. Στο Z_{38} ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι το 1, επομένως υπάρχει πολλαπλασιαστικός αντίστροφος. Μέσω inverse συνάρτησης βγάζουμε τον αριθμό 23, (αφού s μέσω hgcd είναι το -15 και $\text{inverse of } 5 \bmod 38 = s + 38$ δηλαδή: $-15 + 38 = 23$) και για να το επαληθεύσουμε αρκεί να δείξουμε ότι: $5 \times 23 \equiv 1 \bmod 38$
 $5 \times 23 = 115 \rightarrow 115 / 38 = 3$ (πηλίκο), $115 - 3 \times 38 = 115 - 114 = 1$. Ο πολλαπλασιαστικός αντίστροφος αλλάζει με την αλλαγή του δακτυλίου αφού αλλάζει η πράξη \bmod που κάνουμε. Εάν δεν προσδιορίσουμε το Modulo δεν έχει νόημα να αναφερόμαστε σε έναν αντίστροφο καθώς είναι σχετικός ο ένας με τον άλλον. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε αποδοτικά τον αντίστροφο σε έναν δακτύλιο είναι ο Ευκλείδειος αλγόριθμος και συγκεκριμένα, η επέκτασή του (Extended Euclidean Algorithm). Καθώς δεν υπολογίζει μόνο τον μέγιστο κοινό διαιρέτη αλλά εκφράζει το ΜΚΔ ως γραμμικό συνδυασμό των a και b , δηλαδή βρίσκουμε αριθμούς x και y , τέτοιοι ώστε:

$$\text{MKD}(a,b) = a \cdot x + b \cdot y.$$

Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο όταν θέλουμε να βρούμε τον πολλαπλασιαστικό αντίστροφο του $a \bmod b$, επειδή αν $\text{MKD}(a, b) = 1$, τότε υπάρχει αντίστροφος και το x είναι ο αντίστροφος του $a \bmod b$.

Exercise 3

1. Βρείτε όλους τους ακεραίους στο διάστημα $0 \leq n < m$ οι οποίοι είναι σχετικά πρώτοι του m , όπου $m = 9, 17, 25, 33$. Ουσιαστικά θα πρέπει να αναζητήσετε το $\varphi(m)$ για $m = 9, 17, 25, 33$ (Euler's phi function).

Solution

Για $m = 9$:

$$9 = 3^2 \text{ επομένως } \varphi(9) = 9 \times (1 - 1/3) = 9 \times 2/3 = 6$$

Το 9 είχε πρώτο παράγοντα το 3

Τα πολλαπλάσια του 3 από $[0, 9)$ είναι το 3 και το 6

Άρα οι αριθμοί που είναι σχετικά πρώτοι με το 9 είναι οι: 1, 2, 4, 5, 7, 8

Για $m = 17$:

Ο αριθμός 17 είναι πρώτος αριθμός επομένως $\varphi(17) = 17 - 1 = 16$

Άρα οι αριθμοί που είναι σχετικά πρώτοι με το 17 είναι οι: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Για $m = 25$:

$$25 = 5^2 \text{ επομένως } \varphi(25) = 25 \times (1 - 1/5) = 25 \times 4/5 = 20$$

Το 25 είχε πρώτο παράγοντα το 5

Τα πολλαπλάσια του 5 από $[0, 25)$ είναι το 5, 10, 15, 20

Άρα οι αριθμοί που είναι σχετικά πρώτοι με το 25 είναι οι: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24

Για $m = 33$:

$$33 = 3 \times 11 \text{ επομένως } \varphi(33) = 33 \times (1 - 1/3) \times (1 - 1/11) = 33 \times 2/3 \times 10/11 = 33 \times 20/33 = 20$$

Το 33 είχε πρώτο παράγοντα τους 3 και 11

Τα πολλαπλάσια του 3 από $[0, 33)$ είναι το 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Τα πολλαπλάσια του 11 από $[0, 33)$ είναι το 11, 22

Άρα οι αριθμοί που είναι σχετικά πρώτοι με το 33 είναι οι: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32

Exercise 4

Θεωρούμε τα σύνολα $Q = \{q_1, q_2, \dots, q_5\}$ και $P = \{p_1, p_2, \dots, p_5\}$ και τις πράξεις \triangle και \diamond που ορίζονται από τους πίνακες:

\triangle	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	\diamond	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5
q_1	q_4	q_1	q_5	q_3	q_2	p_1	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5
q_2	q_3	q_5	q_2	q_1	q_4	p_2	p_2	p_1	p_4	p_2	p_3
q_3	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	p_3	p_3	p_5	p_1	p_2	p_4
q_4	q_2	q_4	q_1	q_5	q_3	p_4	p_4	p_3	p_5	p_1	p_2
q_5	q_5	q_3	q_4	q_2	q_1	p_5	p_5	p_4	p_2	p_3	p_4

Εξηγήστε γιατί οι αλγεβρικές δομές (Q, \triangle) και (P, \diamond) δεν είναι ομάδες.

Solution

Στην αλγεβρική δομή Q-Τρίγωνο, Είναι κλειστή η πράξη (όλα τα αποτελέσματα είναι στο εύρος τιμών Q, ωστόσο παρατηρούμε ότι στην γραμμή q_3 είναι q_1, q_2, q_3, q_4, q_5 δηλαδή $q_3 \triangle q_i = q_i$, αντιθέτως στην στήλη δεν ισχύει το αντίθετο, π.χ $q_1 \triangle q_3 = q_5$ αντί για q_1 . Εφόσον δεν υπάρχει ουδέτερο στοιχείο - συνεπώς δεν ορίζονται αντίστροφα, τότε δεν είναι ομάδα.

Στην αλγεβρική δομή P-Ρόμβος, Είναι κλειστή η πράξη όπως στην Q, υπάρχει ουδέτερο στοιχείο p_1 (δίνει πάντα p_i) και ορίζονται αντίστροφα καθώς για κάθε p_i υπάρχει p_j τέτοιο ώστε $p_i \diamond p_j = p_1 = p_j \diamond p_i$. Ωστόσο, δεν υπάρχει προσεταιριστικότητα καθώς αν πάρουμε $(p_2 \diamond p_2) \diamond p_3 = p_3$ ενώ $p_2 \diamond (p_2 \diamond p_3) = p_2$

Επομένως καμία από τις δύο δεν είναι ομάδες.

Exercise 5

Θεωρήστε τον ομοπαράλληλο κρυπταλγόριθμο με κλειδί $\mathbf{k}=(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ του οποίου οι συναρτήσεις κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης ορίζονται από τις εξισώσεις:

$$\mathbf{ek}(\mathbf{m}) = \mathbf{k}_1 * \mathbf{m} + \mathbf{k}_2 \pmod{p}$$

$$\mathbf{dk}(\mathbf{c}) = \mathbf{k}_1^{-1} * (\mathbf{c} - \mathbf{k}_2) \pmod{p}$$

όπου p θετικός ακέραιος και \mathbf{k}_1^{-1} ο αντίστροφος του \mathbf{k}_1 modulo p .

- Έστω $p = 541$ και ότι το κλειδί είναι $\mathbf{k} = (34, 71)$. Κρυπτογραφήστε το μήνυμα $\mathbf{m} = 204$. Αποκρυπτογραφήστε το κρυπτοκείμενο $\mathbf{c} = 431$.
- Υποθέτοντας ότι το p είναι δημόσια γνωστό, εξηγήστε γιατί ο ομοπαράλληλος κρυπταλγόριθμος είναι ευάλωτος σε μια επίθεση επιλεγμένου απλού κειμένου. Πόσα ζεύγη απλού κειμένου – κρυπτοκειμένου χρειάζονται ενδεχομένως προκειμένου να ανακτήσει ο αντίπαλος το κλειδί;
- Η Alice και ο Bob αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τον πρώτο $p = 601$ για τον ομοπαράλληλο τους κρυπταλγόριθμο. Η τιμή του p είναι δημόσια γνωστή και η Eve υποκλέπτει τα κρυπτοκείμενα $\mathbf{c}_1 = 324$ και $\mathbf{c}_2 = 381$, και καταφέρνει να ανακαλύψει ότι τα αντίστοιχα απλά κείμενα είναι $\mathbf{m}_1 = 387$ και $\mathbf{m}_2 = 491$. Προσδιορίστε το κλειδί και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα $\mathbf{m}_3 = 173$.

Solution

- $ek(204) = 34 * 204 + 71 \pmod{541} = 6936 + 71 \pmod{541} = 7007 \pmod{541} \rightarrow 7007 / 541 = 12$ (πηλίκο), $7007 - 12 * 541 = 7007 - 6492 = 515$

$$ek(204) = 515$$

$$dk(431) = k_1^{-1} * (431 - 71) \pmod{541} :$$

$k_1^{-1} = k_1 \text{ modulus } p = 34 \pmod{541} = 541 = 34 \times 15 + 31 // 34 = 31 \times 1 + 3 // 31 = 3 \times 10 + 1 // 3 = 1 \times 3 + 0$ (το υπόλοιπο έγινε 1 άρα αντιστρέφεται)

Αντιστρέφουμε όρους: $1 = 31 - 3 \times 10$, $3 = 34 - 31 \times 1$ Άρα: $1 = 31 - (34 - 31) \times 10 = 31 \times 11 - 34 \times 10$ και απο το πρώτο $31 = 541 - 34 \times 15$ αντικαθιστούμε:

$$1 = (541 - 34 \times 15) \times 11 - 34 \times 10 = 541 \times 11 - 34 \times (165 + 10) = 541 \times 11 - 34 \times 175. \text{ Άρα: } -34 \times 175 \equiv 1 \pmod{541} \text{ οπότε } k_1^{-1} \equiv 541 - 175 = 366$$

(Αυτό γίνεται και με ένα απλό xgcd μέσω sagemath)

Επομένως η πράξη είναι $366 \times (360) \pmod{541} = 131.760 \pmod{541} \rightarrow 131.760 / 541 = 243$ (πηλίκο), $131.760 - 243 * 541 = 131.760 - 131.463 = 297$

$$dk(431) = 297$$

- Ο ομοπαράλληλικός κρυπταλγόριθμος είναι ευάλωτος καθώς αρκεί ο αντίπαλος να επιλέξει αυθαίρετα γράμματα κειμένου και να παράγει τα αντίστοιχα κρυπτοκείμενα. Αρκεί ακριβώς δύο ζεύγη απλού κειμένου - κρυπτοκειμένου προκειμένου να ανακτήσει ο αντίπαλος το κλειδί, αρκεί η λύση της αφαίρεσης $m_1 - m_2$ να είναι μοναδική.
- Αν πάρουμε το $ek(m)$ έχουμε ότι $ek(387) = 387k_1 + k_2 \pmod{601} = 324$ και $ek(491) = 491k_1 + k_2 \pmod{601} = 381$

Επομένως έχουμε ένα σύστημα και αν αφαιρέσουμε κατά μέλη προκύπτει ότι $104k_1 = 57 \text{ modulus } 601$ βρίσκουμε τον αντίστροφο του 104 :

$$601 = 104 \times 5 + 81, 104 = 81 \times 1 + 23, 81 = 23 \times 3 + 12, 23 = 12 \times 1 + 11, 12 = 11 \times 1 + 1, 11 = 1 \times 11 + 0, \text{ (το υπόλοιπο έγινε 1 άρα αντιστρέφεται)}$$

Αντιστρέφουμε όρους:

$$1 = 12 - 11 \times 1, 11 = 23 - 12 \times 1 \text{ Άρα } 1 = 12 - (23 - 12) = 12 - 23 \times 1 + 12 \times 1 = 2 \times 12 - 23, \text{ όμως απο πάνω έχουμε ότι } 12 = 81 - 23 \times 3, \text{ άρα:}$$

$$1 = 2 \times (81 - 23 \times 3) - 23 \times 1 = 2 \times 81 - 6 \times 23 - 23 \times 1 = 2 \times 81 - 7 \times 23, \text{ όμως } 23 = 104 - 81 \times 1, \text{ άρα: } 1 = 2 \times 81 - 7 \times (104 - 81) = 2 \times 81 - 7 \times 104 + 7 \times 81 = 9 \times 81 - 7 \times 104 \text{ και}$$

$$81 = 601 - 104 \times 5 \text{ και άρα προκύπτει το: } 1 = 9 \times (601 - 104 \times 5) - 7 \times 104 = 9 \times 601 - 45 \times 104 - 7 \times 104 = 9 \times 601 - 52 \times 104. \text{ Άρα } 1 = 9 \times 601 - 52 \times 104 \text{ και επειδή είμαστε στο modulus } 601, 1 = -52 \times 104, \text{ άρα } x = -52 \text{ και επειδή είναι αρνητικός το inverse είναι: } 601 - 52 = 549.$$

(γίνεται και με inverse function του εργαστηρίου

`inverse(104,601)`

) στη συνέχεια έχουμε: $549 * 57 =$

549

$31293 \text{ modulo } 601 = 31293 / 601 = 52$ (πηλίκο), $31293 - 52 * 601 = 31293 - 31252 = 41$. Άρα $k_1 = 41$ και για k_2 από πρώτη σχέση: $387 * 41 + k_2 = 324 \pmod{601}$,

$$15867 + k_2 = 324 \pmod{601}, 15867 \pmod{601} \rightarrow 15867 / 601 = 26 \text{ (πηλίκο)}, 15867 - 26 * 601 = 15867 -$$

$15626 = 241$. Άρα $241 + k_2 = 324$, επομένως $k_2 = 83$. Άρα το κλειδί είναι $(41, 83)$. Για $m_3 = 173$ έχουμε:
 $ek(173) = 173 \times 41 + 83 \pmod{601} = 7093 + 83 \pmod{601} = 7176 \pmod{601} \rightarrow 7176/601 = 11$
 $7176 - 11 \times 601 = 7176 - 6611 = 565$, Επομένως $c_3 = 565$

Exercise 6

- Εξετάστε τη συμπεριφορά του ομοπαράλληλικού κρυπταλγορίθμου σε **επίθεση γνωστού απλού κειμένου** έχοντας κατανοήσει τη διαφορά των επιθέσεων CPA και KPA: - περιγράψτε τη συνθήκη που πρέπει να ισχύει για το μήνυμα απλού κειμένου προκειμένου η επίθεση να είναι επιτυχής.
- η επιλογή των γραμμάτων **E** και **L** των οποίων το αντίστοιχο κρυπτοκείμενο είναι τα γράμματα **M** και **V** αποκαλύπτει το κλειδί? Αν ναι, ποιο είναι αυτό?
- η γνώση ότι τα γράμματα **M** και **Y** παράγουν ως κρυπτοκείμενο τα γράμματα **R** και **V** αποκαλύπτει το κλειδί? Τεκμηριώστε κατάλληλα.
- έχοντας κατανοήσει τη διαφορά των επιθέσεων CPA και KPA, βελτιώστε τον κώδικα της συνάρτησης **affine_analysis** ώστε να δίνει την κατάλληλη έξοδο κάθε φορά.

Solution

- Η συνθήκη που πρέπει να ισχύει είναι επαναχρησιμοποίηση του κλειδιού K σε περισσότερα από ένα ciphertext και η γνώση τουλάχιστον ενός αντίστοιχου plaintext διότι αν: $C_1 = P_1 \oplus K$ και $C_2 = P_2 \oplus K$ τότε από το γνωστό ζεύγος προκύπτει $K = C_1 \oplus P_1$. Έχοντας το K και βλέποντας το C_2 ο επιδρομέας αποκτά αμέσως το $P_2 = C_2 \oplus K$.
- $m_1 = 4$ (γράμμα E), $m_2 = 11$ (γράμμα L), $c_1 = 12$ (γράμμα M) $c_2 = 21$ (γράμμα V) και έχουμε τις συναρτήσεις:
 $c_1 = k_1 m_1 + k_2 \pmod{26}$
 $c_2 = k_1 m_2 + k_2 \pmod{26}$ οι οποίες γίνονται:
 $12 = 4k_1 + k_2 \quad (1)$
 $21 = 11k_1 + k_2 \quad (2)$
 Αν αφαιρέσουμε κατά μέλη γίνεται: $7k_1 = 9 \pmod{26}$ βρίσκουμε το αντίστροφο του 7,
 $26 = 7 \times 3 + 5$, $7 = 5 \times 1 + 2$, $5 = 2 \times 2 + 1$, $2 = 1 \times 2 + 0$, άρα αντιστρέφεται άρα υπάρχει κλειδί:
 $1 = 5 - 2 \times 2$, $2 = 7 - 5 \times 1$, άρα $1 = 5 - 2 \times (7 - 5 \times 1) = -2 \times 7 + 5 \times 3$, και έχουμε ότι $5 = 26 - 7 \times 3$, άρα $1 = -2 \times 7 + 3 \times (26 - 7 \times 3) = -2 \times 7 + 3 \times 26 - 7 \times 9$
 $1 = -11 \times 7 + 3 \times 26$, $1 = -11 \times 7$, $26 - 11 = 15$, άρα ο αντίστροφος του 7 στο mod 26 είναι το 15. Λύνουμε για k_1 :
 $7k_1 = 9 \pmod{26}$, $k_1 \equiv 9 \cdot 7^{-1} \equiv 9 \cdot 15 = 135 \pmod{26}$, $135 \pmod{26} = 135/26 = 5$ (πηλίκιο), $135 - 5 \times 26 = 135 - 130 = 5$, $k_1 = 5$,
 και k_2 από σχέση (1) $\Rightarrow 12 = 4 \times 5 + k_2 \Rightarrow k_2 = 12 - 20 = -8$, $26 - 8 = 18$, άρα $k_2 = 18$
- $m_1 = 12$ (γράμμα M), $m_2 = 24$ (γράμμα Y), $c_1 = 17$ (γράμμα R) $c_2 = 21$ (γράμμα V) και έχουμε τις συναρτήσεις:
 $c_1 = k_1 m_1 + k_2 \pmod{26}$
 $c_2 = k_1 m_2 + k_2 \pmod{26}$ οι οποίες γίνονται:
 $17 = 12k_1 + k_2 \quad (1)$
 $21 = 24k_1 + k_2 \quad (2)$

Αν αφαιρέσουμε κατά μέλη γίνεται: $8k1 = 4 \pmod{26}$ βρίσκουμε το αντίστροφο του 8 ,

$26 = 8 \times 3 + 2$, $8 = 2 \times 4 + 0$, δεν έχει υπόλοιπο 1 άρα δεν αντιστρέφεται άρα δεν υπάρχει κλειδί.

- Η μόνη αλλαγή που χρειάζεται είναι ένας έλεγχος αν το `key[0]` αντιστρέφεται ή όχι μέσω της συνάρτησης `gcd`. Παρακάτω έχουμε ένα test case με σωστά δεδομένα και ένα με λάθος (τα παραπάνω δεδομένα τις άσκησης)
- (1)

```
[39]: # επίθεση επιλεγμένου απλού κειμένου - CPA
n=26
Z26=IntegerModRing(n)

plaintext='EL'
ciphertext='HW'

def affine_analysis(m,c):
    mList=str2lst(m)
    cList=str2lst(c)

    A = matrix(Z26, 2, 2, [mList[0], 1, mList[1], 1])
    b = vector(Z26, [cList[0], cList[1]])
    key=A.solve_right(b)
    return key

key=affine_analysis(plaintext,ciphertext)
if (gcd(key[0],26) == 1 ):
    print('The key is:', key)
    print("Verification: the ciphertext message: " + ciphertext + " is decrypted in --> " + affine_dec(ciphertext,int(key[0]),int(key[1])))
else:
    print("No keys available.")

The key is: (5, 18)
Verification: the ciphertext message: HW is decrypted in --> EL
```

(2)

```
[40]: # επίθεση επιλεγμένου απλού κειμένου - CPA
n=26
Z26=IntegerModRing(n)

plaintext='EL'
ciphertext='RV'

def affine_analysis(m,c):
    mList=str2lst(m)
    cList=str2lst(c)

    A = matrix(Z26, 2, 2, [mList[0], 1, mList[1], 1])
    b = vector(Z26, [cList[0], cList[1]])
    key=A.solve_right(b)
    return key

key=affine_analysis(plaintext,ciphertext)
if (gcd(key[0],26) == 1 ):
    print('The key is:', key)
    print("Verification: the ciphertext message: " + ciphertext + " is decrypted in --> " + affine_dec(ciphertext,int(key[0]),int(key[1])))
else:
    print("No keys available.")

No keys available.
```