



FICHA TÉCNICA



I. Descripción

gp-bio es un hidrolizado que está compuesto por músculos de pescado y otros componentes marinos que mediante hidrólisis bacteriana degradan y constituyen un potente fertilizante líquido hidrosoluble que posee un alto contenido de nitrógeno asimilable, fósforo, potasio, aminoácidos libres, micronutrientes esenciales y péptidos que son absorbidos directamente vía foliar y/o radicular. Además, posee una carga microbiana benéfica que por simbiosis maximizan el proceso natural de nutrición, resistencia a plagas, enfermedades y regeneración de suelo.

II. Características

Ingrediente activo: Aminoácidos libres.

Concentración: 25 %⁹

Formulación: Líquida (LI)

Clase de uso: Bioestimulante agrícola.

Aspecto: Líquido ámbar oscuro.

Toxicidad: Baja toxicidad.



III. Mecanismos de acción

El bioestimulante agrícola actúa en la planta mediante la estimulación del crecimiento *radicular* y *vegetativo*, mejora de la absorción de nutrientes, aumento de la eficiencia fotosintética, resistencia al estrés y activación de defensas naturales. Todo esto se logra gracias a la modulación hormonal, la mejora del entorno microbiológico del suelo, y el incremento de la actividad enzimática, ayudando a que la planta se desarrolle de manera más saludable y productiva.

IV. Beneficios

- ✓ Ayuda a reducir el estrés en las plantas, lo que mejora su capacidad para tolerar condiciones adversas.
- ✓ Aumenta la producción de los cultivos y se refleja en una mayor cantidad y calidad de frutos, flores u hojas.
- ✓ Mejora la resistencia a enfermedades y plagas, ideal para el crecimiento de microorganismos benéficos.
- ✓ Fortalece el sistema radicular de las plantas, mejorando la absorción de nutrientes y agua.
- ✓ Mejora la estructura del suelo, reduce la erosión, corrige las deficiencias nutricionales y mejora la fertilidad.

V. Compatibilidad

gp-bio es compatible con productos químicos y orgánicos, se recomienda mezclar con productos de pH menor a 7.0; Consultar con su especialista de campo.

VI. Toxicidad

gp-bio es un bioestimulante clasificado como una sustancia de baja toxicidad.

VII. Dosis y modo de aplicación

Dosis L/cil				
Cultivo	Foliar	Fertirriego	Drench	Frecuencia de aplicación
Frutales: mango, palto, cítricos, café, etc.	4-6	10-12	6-8	15-30 días (4 a 5 aplic.)
Cereales: arroz, maíz, avena, ect.	2-4	8-10	6-8	15-20 días (3 a 4 aplic.)
Tuberosas: papa, camote, yuca, etc.	2-4	8-10	6-8	15-20 días (4 a 5 aplic.)
Cucurbitáceas: sandía, melón, etc.	2-4	8-10	6-8	15-20 días (4 a 5 aplic.)
Leguminosas: frejol, arveja, maní, etc.	2-4	8-10	6-8	15-20 días (4 a 5 aplic.)
Capsicum: rocoto, escabeche, páprika.	2-4	8-10	6-8	15-20 días (4 a 5 aplic.)
Hortalizas: tomate, espárrago, brócoli, etc.	2-3	8-10	6-8	15-20 días (4 a 5 aplic.)
Algodón.	2-3	8-10	6-8	15-30 días (4 a 5 aplic.)

VIII. Recomendaciones de uso

- ✓ Evaluar la presencia de plagas objetivo
- ✓ Incorporar un compuesto adherente (aceite agrícola) para mayor fijación del producto.
- ✓ Utilizar agua con ph entre 5.5 - 7 y dureza < 150 ppm de carbonato de calcio.
- ✓ Hacer una pre-mezcla, agregar al tanque de solución y dejar reposar por 30 min antes de la aplicación.
- ✓ Usar equipo calibrado, sin residuos de productos no compatibles.
- ✓ Aplicar temprano (6 am-9 am) o tarde (> 4 pm).

IX. Precauciones

Usar equipo de protección (guantes, mascarilla, overoles, lentes). Evitar contacto directo con el producto.

X. Primeros auxilios

Lavar la zona de contacto con abundante agua, no automedicarse, acudir al médico y muestre la etiqueta:
CICOTOX: 0800-1-3040, ESALUD: 411 8000 (opción 4).

XI. Almacenamiento y transporte

Conservar en envase original, en lugares frescos y secos a menos de 20°C, en refrigeración de 4 a 10°C.
No exponer a más de 30°C, ni a la luz solar directamente.

XII. Manejo y disposición de desechos y envases vacíos

Los envases vacíos deben enjuagarse mediante triple lavado y posteriormente perforar los envases para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, deben disponerse en un punto de acopio autorizado o manejarse conforme a la normativa local para residuos no peligrosos, evitando arrojarlos al suelo, canales, ríos o quemarlos al aire libre. Mantener siempre los envases fuera del alcance de niños, animales y fuentes de alimento.

XIII. Presentación

Líquido (LI) envasado en recipientes plásticos con presentaciones de 1, 4, 20, 200 y 1000 L.