




Метод эмпирических силовых полей. Молекулярная динамика



Чугунов Антон


Группа анализа структуры
мембранных белков *in silico*

<https://www.ibch.ru/structure/groups/giamps>

Долгопрудный
13 ноября 2025 г.

План лекции

1. Кое-что из общих глав молекулярного моделирования
2. Эмпирические силовые поля
3. Их приложения
 1. Минимизация энергии
 2. Молекулярная динамика
 3. Метод Монте Карло
4. «Молекулярный микроскоп»:
энигма молекулярной динамики
5. Чуть-чуть про enhanced sampling



«Кремниевый» эксперимент


- *In silico* (от in silicon) – новый латинизм, расширяющий методологию биологического эксперимента за пределы *in vivo* («в живом») и *in vitro* («в стекле»)
- *In silico* – идеология полностью компьютерного, но достоверного эксперимента
- Подход *in silico* многоуровневый:
 - моделирование поведения отдельных молекул,
 - биохимических процессов,
 - отдельных физиологических систем и
 - популяций и экосистем

Молекулярное моделирование —


набор вычислительных методов, позволяющих с разной степенью физической корректности на атомарном уровне изучать молекулярные системы разной сложности

0. Квантовая механика


1. Методы
эмпирических
силовых полей




2. Биоинформатика




3. Моделирование
на основании
гомологии




4. Молекулярный
докинг



Эмпирические силовые поля (ЭСП)



Эмпирические силовые поля (ЭСП)



$$U_{bond}(r_{ij}) = \frac{1}{2} k_{ij} (r_{ij} - r_{0,ij})^2$$

$$U_{angle}(\alpha_{ij}) = \frac{1}{2} \alpha_{ij} (\alpha_{ij} - \alpha_{0,ij})^2$$

$$U_{torsion}(\varphi_{ijkl}) = k_{\varphi} (1 + \cos(n\varphi - \varphi_0))$$

$$U_{dvW}(r_{ij}) = \frac{A_{ij}}{r^{12}} - \frac{B_{ij}}{r^6}$$

$$U_{coulomb}(r_{ij}) = k \frac{q_i q_j}{\epsilon_r r_{ij}}$$

Квантово-механическая система рассматривается в приближении классической (Ньютоновской) физики:


$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \vec{F}_i = - \frac{dU}{d\vec{r}_i}$$

Взаимодействие между атомами описывается суммой термов потенциальной энергии:

$$U_{\text{общ}} = U_{\text{валентн}} + U_{\text{невалентн}},$$

$$U_{\text{валентн}} = U_{\text{bond}} + U_{\text{angle}} + U_{\text{torsion}},$$

$$U_{\text{невалентн}} = U_{\text{vdW}} + U_{\text{coulomb}} + U_{\text{hbond}}$$




ЭСП: оптимизация геометрии молекулы

Алгоритмы минимизации свободной энергии позволяют приводить структуру в энергетически (и геометрически) выгодное состояние

Разновидности:


- Метод скорейшего спуска
- Метод сопряжённых градиентов

...



Приложения:

- Релаксация структуры молекул
- Оптимизация комплексов рецептор-лиганд
- Сравнение термодинамических параметров разных состояний системы
- Устранение невыгодных взаимодействий
- Формирование конформации, удовлетворяющей заданным условиям



ЭСП: метод Монте Карло

Сканирование конформационного пространства
координаты атомов, двугранные углы, ...

Оценка конформаций
критерий Метрополиса

$$p(\Delta U) = e^{-\frac{U(R_{i+1}) - U(R_i)}{kT}}$$
$$p(\Delta U) > p_{\text{random}}$$

Накопление «хороших» (низких по энергии) конформаций

Достоинства метода
Позволяет широко исследовать конформационное пространство исследуемой молекулы

Недостатки:

Метод не дает динамическую картину поведения

Длительность моделирования для получения представительной выборки «хороших» конформаций нелинейно зависит от числа степеней свободы молекулы



Николас Метрополис

ЭСП: метод молекулярной динамики (МД)

Основа: численное решение уравнения Ньютона ➡
наблюдение за эволюцией системы во времени

$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \vec{F}_i = - \frac{dU}{d\vec{r}_i}$$

Результат МД — *траектория*: файл, содержащий координаты и скорости атомов через равные промежутки времени

МД моделирует различные *ансамбли* — состояния, в которых микроскопические параметры могут быть произвольными, а макроскопическое состояние удовлетворяет заданным условиям (NPT, NVT)




ЭСП: историческая справка по МД


МД «бильярдных шаров» (конец 50-х)



Бэрни Алдер (стоит), Том Вайнрайт и Мэри Мэнсэйн




Alder B.J., Wainwright T.E. (1957).
Phase transition for a hard sphere system
J. Chem. Phys. **27**, 1208–1209



UNIVAC 1
использовал
5200 электрова
куумных ламп,
весил 13 т.
1955 г.

Метод ЭСП (начало 70-х)
Моделирование биомолекул




Шнейр Лифсон, Майкл Левит

Levitt M. (1969). Detailed Molecular
Model for Transfer Ribonucleic Acid.
Nature **224**, 759–763

Динамика белковой глобулы (конец 70-х)




Мартин Карплюс,
Эндрю Мак-Кэммон



McCammon J.A., Gelin B.R., Karplus M. (1977).
Dynamics of folded proteins.
Nature **267**, 585–590

ЭСП: граничные условия в МД



Периодические граничные условия служат для сведения к минимуму «краевых эффектов»

- заключаются в «размножении» ячейки с системой вокруг ее реального положения
- частицы внутри «виртуальной» ячейки друг с другом не взаимодействуют

Поддержание постоянных температуры и давления осуществляется с помощью алгоритмов, называемых *термостатом* и *баростатом*

- Накладывается условие постоянства суммарной кинетической энергии частиц в системе
- Основано на добавлении к уравнению движения силы, пропорциональной скорости частицы (аналог жидкого трения)

Разновидности термостатов:

- Берендсена
- Нозе-Гувера
- коллизионный термостат
- ...

$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \vec{F}_i - \gamma \frac{d\vec{r}}{dt}$$




Энигма молекулярной динамики

Открытия, сделанные Левенгуком:

- Инфузории
- Бактерии
- Вакуоли в клетке
- Сперматозоиды
- Мышечные волокна
- Структура кофейных зерен :-)



В пример другим миллиардерам




Дэвид Шоу (D.E. Shaw)

- Образование: Университет Калифорнии, потом Стэнфорд (Ph.D.; 1980)
- Университет Колумбии: исследования в области высокопроизводительных вычислений
- 1988: основан хеджевый фонд “D. E. Shaw & Co.”; «математический» подход к финансовым торгам
- 1996: *FORTUNE*: «Фонд D.E. Shaw & Co. на сегодня — самая таинственная сила на Уолл-стрит»
- 2001: Шоу оставляет управление фондом и с головой уходит в компьютерную биохимию и биофизику
- 2008: *Forbes* оценивает состояние Шоу в 2.5 млрд. \$
- Независимый НИИ “D. E. Shaw Research” занимается разработкой алгоритмов и платформ для молекулярной динамики и приложениями в области структурной биологии и драг-дизайна

Anton: увидеть всё до атома

- Массивно-параллельный компьютер для молекулярной динамики
- 512 специализированных процессоров (application-specific integrated circuit)
- Шина 400 МГц
- Оптимизация для расчетов электростатики, сил Ван-дер-Ваальса, преобразований Фурье (по 32 конвейера @ 800 МГц)
- Коммуникации: сеть «3D-тор», 607 Гбит/с. Латентность: 50 нс
- Производительность в МД: 1000-кратно превосходит «обычные» суперкомпьютеры

Миллисекунда: много или мало?




Обычно шаг интегрирования в МД равен 1–2 фс; на ПК счет миллисекундной траектории займет *сотни лет*

- Для небольших белков виллина и FcR35 проведена МД 0.1–1 мс; наблюдались несколько актов сворачивания / разворачивания
- Более крупный белок БПТИ: фолдинга в МД достичь не удалось, но конформационные переходы вблизи нативной структуры соответствуют данным ЯМР
- Первая опубликованная МД БПТИ: несколько пикосекунд (10^{-12} с)



McCammon & Karplus (1977). *Nature* 267, 585

Калиевый канал *in silico*

А Ранняя деактивация: закрытие поры



Б Поздняя деактивация: движение S4 и воротных зарядов




МД потенциал-чувствительного K^+ -канала пока-
стадии открывания/закрывания канала и движе-

- Инактивация: закрытие поры и «гидрофобный кол
- Масштабные движения вольт-сенсора и 15 Å-перем

Ion translocation through hexamers

Results from 64 M atom,
1 μ s molecular dynamics
simulation!



Полная динамическая модель спайк-белка (S)

Гликановая «шуба» влияет на
динамику и функцию



Casalino *et al.*, [ACS Cent. Sci.](#), 2020

Beyond Shielding: The Roles of Glycans in the SARS-CoV-2 Spike Protein

Lorenzo Casalino,[#] Zied Gaieb,[#] Jory A. Goldsmith, Christy K. Hjorth, Abigail C. Dommer, Aoife M. Harbison, Carl A. Fogarty, Emilia P. Barros, Bryn C. Taylor, Jason S. McLellan, Elisa Fadda, and Rommie E. Amaro*



Cite This: *ACS Cent. Sci.* 2020, 6, 1722–1734



Read Online

ACCESS |




Metrics & More



Article Recommendations



Supporting Information



ABSTRACT: The ongoing COVID-19 pandemic caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has resulted in more than 28,000,000 infections and 900,000 deaths worldwide to date. Antibody development efforts mainly revolve around the extensively glycosylated SARS-CoV-2 spike (S) protein, which mediates host cell entry by binding to the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2). Similar to many other viral fusion proteins, the SARS-CoV-2 spike utilizes a glycan shield to thwart the host immune response. Here, we built a full-length model of the glycosylated SARS-CoV-2 S protein, both in the open and closed states, augmenting the available structural and biological data. Multiple microsecond-long, all-atom molecular dynamics simulations were used to provide an atomistic perspective on the roles of glycans and on the protein structure and dynamics. We reveal an essential structural role of N-glycans at sites N165 and N234 in modulating the conformational dynamics of the spike's

Роль S-белка в жизненном цикле коронавируса

Гликобиология: S-белок (как и многие другие) мощно гликозилирован

ГЛИКОПРОТЕИНЫ — СЛОЖНЫЕ :


• Биомолекула

1. РАЗНЫЙ СОСТАВ САХАРОВ

2. ВЕТВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ

3. МНОГО САЙТОВ ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ НА БЕЛКЕ








4. РАЗНЫЕ МЕЖМОНОСАХАРИДНЫЕ СВЯЗИ



КОПИЯ БЕЛКА №1



КОПИЯ БЕЛКА №2



МОНОСАХАРИДЫ N-ГЛИКАНОВ ЧЕЛОВЕКА

БМ: Жизнь без сахара — не сахар:
третий алафавит в молекулярной
биологии

Полная модель S-белка

- Достройка модели
- Толстая гликановая «шуба»
- Две конформации
- Пальмитилирование






Table S1. Glycan compositions for chain-A.



Table S2. Glycan compositions for chain-B.

Table S3. Glycan compositions for chain-C.

CHAIN B

Table S4. Membrane lipids, their percentages in the membrane patch, and corresponding IUPAC names.

Lipid		Percentage		IUPAC Name	
G42	POPC	47%		1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine	
G43	POPE	20%		1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine	
G44	CHL	15%		(3β)-cholest-5-en-3-ol	
G45	POPI	11%		1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol	
G46	POPS	7%		1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine	

A**Closed****B****Open**


Две конформации:
«открытая» и
«закрытая»

Отличаются
положением рецептор-
связывающего домена
(RBD): “down” и “up”


МД S-белка: открытая, закрытая и мутантная формы

Модель строили «по кускам». 1.7М атомов, ≈ 10 мкс.
60 нс/день на 256 узлах суперкомпьютера TACC Frontera
N-концевой и рецептор-связывающий домены, сайт расщепления фурином (на цепи S1 и S2), исходно скрытый фузионный пептид, центральная спираль, связующий домен, гептадный повтор, трансмембранный домен и цитоплазматический хвост

- S-белок связывается с «рецептором» на человеческой клетке — ангиотензин-превращающим ферментом 2 (ACE2)
- Вслед за этим человеческие же мембранные протеазы дважды разрезают S, высвобождая фузионный пептид, «вскрывающий» клетку человека как консервный нож
- S2 — скрытая пружина, стягивающая вирусную оболочку и клетку, содействуя слиянию
- S-белок — главная антигенная детерминанта. Но она в гликановой «шубе»
- Однако картины перехода закрытое → открытое состояние МД не дает...




Гликаны на N234, N165: не просто «шуба»




- В закрытом состоянии гликаны направлены «по касательной» к цилиндру тримера S-белка
- В открытом RBD поднимается, и гликан направляется на его место к центру тримера
- Эти гликаны стабилизируют положение RBD “up” и открытую конформацию S-белка, усиливая связывание с ACE2
- Удаление гликанов *in silico* (мутации N234A+N165A) увеличивают подвижность RBD, дестабилизируя конформацию “up” и снижая связывание с ACE2

Гликаны на
N234, N165: не
просто «шуба»




Пруф: в эксперименте мутанты **N234A** и **N165A** хуже связывают S-белок







Данные: интерферометрия на бислое.

Использовали два контроля: **положительный (S-2P)** и отрицательный (S383C+D975C) — белок с RBD, «пришитым» в положении “down”





Шуба-дуба блюз

- «Стебель» почти полностью укрыт гликанами, «голова» — на 40% лысая (значит, эпитопы для антител — только там)
- В открытом состоянии RBD «возвышается» над гликанами




Почему же не работает «ЭпиВакКорона»?




Выбранные «антигенные детерминанты» просто не могут работать, поскольку расположены в недоступных антителам участках белка

Неуловимая свободная энергия связывания





$$K_d = \frac{[P] \cdot [L]}{[PL]} = \frac{1}{K_b}$$



$$\Delta G^0 = -RT \cdot \ln \left(K_b \cdot C^0 \right) = RT \cdot \ln \left(\frac{K_d}{C^0} \right)$$

(где C^0 — стандартная концентрация 1 М)

Свободная энергия — функция вероятностей состояний [1]...




- ...которые можно вычислить из МД...
- ...но лучше заранее выбрать «правильные» пути $\Rightarrow$ коллективные переменные

Проблемы МД



- Неточность «физики» (силовые поля)
- Проблема семплирования и вычислительные мощности
- Сложный анализ

Существующие подходы


- «Ванильная» МД
- Обмен репликами
- Моделирование путей перехода
- Методы «коллективных» переменных:
 - Зонтичная выборка
 - Метадинамика
 - Адаптивные весовые гистограммы
- Алхимические трансформации




Зонтичная выборка (US-MD)



Advanced Weight Histogram



- Не требует ручного выбора «ОКОН»
- Поддерживает «мультиволкеры»
- Динамическое обновление смещающего потенциала
- Двухэтапный протокол
- В сравнении с US-МД, более адаптивный




Алхимические трансформации

«Алхимия» позволяет превращать одну (часть) молекулы в другую или даже «аннигилировать» их

- Главное: записываются работа и энергия
- Трансформация управляется λ : $0 \rightarrow 1$

$\Delta\Delta G^{\text{Мутация}}_{\text{фолдинга}}$ можно посчитать:

1. Моделированием фолдинга (сложно)
2. Проще: сравнивая $\Delta G^{\text{Мутации}}_{\text{Свернутый}}$ и $\Delta G^{\text{Мутации}}_{\text{Развернутый}}$



$$\Delta\Delta G^{\text{Mutation}}_{\text{Folding}} = \Delta G^{\text{Mut}}_{\text{Folding}} - \Delta G^{\text{WT}}_{\text{Folding}} = \Delta G^{\text{Mutation}}_{\text{Folded}} - \Delta G^{\text{Mutation}}_{\text{Unfolded}}$$

1

2

Термодинамика утверждает: это одно и то же!

Неравновесная алхимия



Работа не меньше разницы в энергиях

$$\langle W(\tau) \rangle \geq \Delta G$$

Работу можно посчитать в прямой ($\lambda_{0 \rightarrow 1}$) и обратной ($\lambda_{1 \rightarrow 0}$) трансформации, а из ансамбля таких значений найти энергию.

$$W(\tau) = \int_{\lambda=0}^{\lambda=1} \frac{\partial H(\vec{x}, \vec{v}, \lambda)}{\partial \lambda} d\lambda$$

H — гамильтониан, x — фазовые координаты, v — скорости, λ — параметр перехода




Метадинамика (WTMD)

“Metadynamics is a dynamics in the space of the CVs” [Parrinello 2006]


1. Initiation

Position of the system




Potential energy surface (PES)

2. Simulation



Metadynamics simulation time


3. Result



Bias potential from metadynamics

Original PES

Метадинамика смещает (bias) потенциал, добавляя «хилсы» к потенциальной энергии (PES)



WTMD уменьшает размер «хилсов» в хорошо просемплированных регионах

Выводы

- Современная техника молекулярного моделирования позволяет «заглядывать» в наиболее ранние этапы биологических процессов
- Такая имитация представляет не только фундаментальный интерес, но и служит основой для рациональной модификации и дизайна биологических молекул с практически важными свойствами
- Наиболее крупные белковые молекулы, в случае отсутствия экспериментально определенной пространственной структуры, пока приходится моделировать на основе «шаблонов»
- В компьютерном моделировании главное — не компьютеры и программы, а все равно мозги :-)

Спасибо за внимание!

