



Em cada dia de crise, anota a intensidade de 1 a 10 na parte de baixo da caixa e assinala «Med.» se tomaste um medicamento para a crise. Também podes escrever uma palavra na caixa: dia de período, noite mal dormida, stress...

Mais de 10 dias com um medicamento para a crise este mês? Fala com o teu médico: é o limiar do uso excessivo de medicação.



As minhas crises em detalhe

Uma linha por crise. Para cada medicamento ou alívio, assinala se ajudou. Imprime esta página as vezes que precisares.

Data	Início e fim	Intensidade	Sintomas	Possíveis fatores desencadeantes	Medicamento e hora	Alívio sem medicamentos
		/10			Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não	Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não
		/10			Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não	Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não
		/10			Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não	Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não
		/10			Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não	Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não
		/10			Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não	Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não
		/10			Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não	Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não
		/10			Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não	Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não
		/10			Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não	Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não
		/10			Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não	Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não
		/10			Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não	Ajudou: ☐ Sim ☐ Um pouco ☐ Não

Fatores desencadeantes frequentes Stress · Falta de sono · Refeição saltada · Período · Meteorologia · Ecrãs · Álcool · Desidratação · Cafeína · Luz intensa

Sintomas frequentes Náuseas · Incómodo com a luz · Incómodo com o ruído · Aura visual · Tonturas · Dor latejante

Alívios frequentes Repouso no escuro · Frio na testa · Respiração lenta · Dormir · Beber água · Comer alguma coisa



Mellow Retoma o controlo das tuas enxaquecas com a app

mellowmigraine.com