



Cada día de crisis, anota la intensidad del 1 al 10 en la parte de abajo de la casilla y marca «Med.» si has tomado un medicamento para la crisis. También puedes escribir una palabra en la casilla: día de regla, mala noche, estrés...

Días con medicamento _____

mellowmigraine.com



Mis crisis en detalle

Una fila por crisis. Para cada medicamento o alivio, marca si ha ayudado. Imprime esta página tantas veces como necesites.

Fecha	Inicio y fin	Intensidad	Síntomas	Posibles desencadenantes	Medicamento y hora	Alivio sin medicamentos
		/10			¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ha ayudado? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No

- Desencadenantes frecuentes**
- Síntomas frecuentes**
- Alivios frecuentes**
- Estrés · Falta de sueño · Saltarse una comida · Regla · Meteorología · Pantallas · Alcohol · Deshidratación · Cafeína · Luz intensa
- Náuseas · Molestia con la luz · Molestia con el ruido · Aura visual · Mareos · Dolor pulsátil
- Descanso a oscuras · Frío en la frente · Respiración lenta · Dormir · Beber agua · Comer algo

