



Cada día de crisis, anota la intensidad del 1 al 10 en la parte de abajo de la casilla y marca “Med.” si tomaste un medicamento para la crisis. También puedes escribir una palabra en la casilla: día de periodo, mala noche, estrés...

¿Más de 10 días con un medicamento para la crisis este mes? Coméntalo con tu médico: es el umbral del uso excesivo de medicamentos.



Mis crisis en detalle

Una fila por crisis. Para cada medicamento o alivio, marca si ayudó. Imprime esta página todas las veces que necesites.

Fecha	Inicio y fin	Intensidad	Síntomas	Posibles desencadenantes	Medicamento y hora	Alivio sin medicamentos
		/10			¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No
		/10			¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No	¿Ayudó? ☐ Sí ☐ Un poco ☐ No

Desencadenantes frecuentes Estrés · Falta de sueño · Saltarse una comida · Periodo · Clima · Pantallas · Alcohol · Deshidratación · Cafeína · Luz intensa
Síntomas frecuentes Náuseas · Molestia con la luz · Molestia con el ruido · Aura visual · Mareo · Dolor pulsátil
Alivios frecuentes Descansar a oscuras · Frío en la frente · Respiración lenta · Dormir · Tomar agua · Comer algo



Mellow Recupera el control de tus migrañas con la app

mellowmigraine.com