

Manual de primeros auxilios

Respuesta familiar inicial ante emergencias - Puerto Iguazú, Misiones

ATENCIÓN

Este manual ayuda a ordenar la respuesta inicial. No reemplaza una capacitación práctica ni la atención profesional. Ante peligro inmediato, llamar al servicio local y seguir sus instrucciones.

1. Secuencia universal: proteger, alertar y socorrer

- Proteger: verificar tránsito, electricidad, fuego, humo, agua, animales, derrumbes y cualquier riesgo antes de acercarse.
- Alertar: pedir ayuda, dar ubicación exacta, cantidad de personas, estado aparente y peligros presentes.
- Socorrer: comprobar respuesta y respiración; atender primero hemorragias graves, obstrucción de vía aérea y ausencia de respiración normal.
- No mover a una persona con posible lesión de columna salvo que exista un peligro inmediato mayor.

2. Evaluación rápida en 60 segundos

Signo	¿Qué hacer?	Acción recomendada
Seguridad	¿El lugar es seguro para la familia y quien ayuda?	Aislar el peligro o esperar asistencia especializada.
Respuesta	Hablar fuerte, tocar suavemente hombros.	Si no responde, pedir ayuda inmediata.
Respiración	Observar si respira normalmente. Jadeos aislados no son respiración normal.	Si no respira normalmente, iniciar RCP y usar DEA si está disponible.
Sangrado	Buscar sangre abundante o que empapa ropa.	Presión directa firme con gasa o tela limpia.
Estado general	Color, temperatura, dolor, confusión, convulsión.	Mantener abrigado, vigilar y registrar cambios.

3. RCP y uso de DEA

CLAVE

La mejor preparación es que al menos dos adultos de la familia realicen un curso práctico de RCP y primeros auxilios.

- Adulto o adolescente inconsciente que no respira normalmente: llamar a emergencias, pedir un DEA e iniciar compresiones fuertes y rápidas en el centro del pecho.
- Si se conoce la técnica completa, alternar 30 compresiones con 2 ventilaciones; si no, realizar compresiones continuas hasta que llegue ayuda o la persona muestre signos de vida.
- En niños y lactantes la técnica y la profundidad cambian: seguir instrucciones del operador de emergencias y capacitación recibida.

- Encender el DEA, colocar los parches como indica el equipo y obedecer la voz. Nadie debe tocar a la persona durante el análisis o descarga.

4. Atragantamiento

- Si la persona tose y puede hablar, animarla a seguir tosiendo; no dar golpes innecesarios.
- Si no puede hablar, respirar o toser eficazmente, pedir ayuda urgente y aplicar la secuencia aprendida en un curso de primeros auxilios.
- Si pierde el conocimiento, colocarla en el piso de forma segura e iniciar RCP; revisar la boca solo si se ve claramente el objeto, sin barrido a ciegas.
- En lactantes y embarazadas se usan maniobras específicas; no improvisar.

5. Hemorragias y heridas

- Usar guantes si están disponibles. Aplicar presión directa continua con gasa o tela limpia.
- Si el apósito se empapa, no retirarlo: agregar material encima y mantener presión.
- No retirar objetos clavados; estabilizarlos alrededor y esperar asistencia.
- Un torniquete comercial puede salvar una vida en una hemorragia masiva de una extremidad, pero requiere capacitación; registrar la hora de colocación y no aflojarlo por cuenta propia.
- Heridas pequeñas: lavar con agua segura, retirar suciedad superficial visible, cubrir y vigilar infección.

6. Quemaduras

- Detener la fuente de calor o electricidad sin exponerse.
- Enfriar la quemadura con agua corriente fresca durante varios minutos. No usar hielo directo, pasta dental, manteca ni remedios caseros.
- Retirar anillos o ropa no adherida antes de que aumente la hinchazón.
- Cubrir con material limpio no adherente. Consultar si es extensa, profunda, eléctrica, química o afecta cara, manos, genitales o articulaciones.

7. Golpes, fracturas y columna

- No enderezar deformidades ni intentar acomodar huesos.
- Inmovilizar en la posición encontrada, acolchando alrededor, y controlar circulación distal.
- Ante golpe fuerte en cabeza: vigilar vómitos repetidos, somnolencia creciente, confusión, convulsión, pupilas diferentes o pérdida de conocimiento.
- Ante posible lesión de cuello o espalda, pedir que no se mueva y sostener la cabeza en posición neutral sin forzar.

8. Convulsión, desmayo y dolor de pecho

- Convulsión: apartar objetos, proteger la cabeza, medir el tiempo, no sujetar y no colocar nada en la boca. Al finalizar, si respira, colocar de lado.
- Desmayo: acostar, elevar piernas si no hay lesión y aflojar ropa. Consultar si no recupera rápidamente o hay dolor, dificultad respiratoria o embarazo.
- Dolor de pecho, falta de aire, sudor frío o dolor que corre al brazo/mandíbula: emergencia médica. Mantener reposo y no conducir por cuenta propia.

9. Mordeduras, picaduras y animales ponzoñosos

- Alejarse del animal sin intentar capturarlo. Tomar una foto solo si puede hacerse sin riesgo.
- Serpiente: mantener a la persona quieta, retirar anillos/calzado ajustado, inmovilizar suavemente. No cortar, succionar, quemar, aplicar hielo ni torniquete.
- Abejas/avispas: retirar aguijón raspando si es visible, lavar y enfriar localmente. Dificultad respiratoria, hinchazón de lengua o desmayo requieren ayuda inmediata.
- Mordedura de perro o gato: lavar abundantemente con agua y jabón y consultar por tétanos y rabia.

10. Fiebre, diarrea, vómitos y deshidratación

- Priorizar líquidos seguros y sales de rehidratación oral preparadas exactamente como indica el sobre.
- En niños, vigilar boca seca, ausencia de lágrimas, menos orina, ojos hundidos, somnolencia o irritabilidad.
- No administrar antidiarreicos a niños ni ante sangre en materia fecal, fiebre alta o dolor abdominal intenso sin indicación profesional.
- Ante sospecha de dengue, evitar ibuprofeno, diclofenac, ketorolaco y aspirina; consultar y usar solo lo indicado por un profesional.

11. Signos de alarma: no esperar

Organismo	Señal de alarma
Respiración	Falta de aire, labios azulados, respiración muy rápida o ruidosa.
Neurológico	Inconsciencia, confusión marcada, convulsión prolongada o repetida.
Circulación	Sangrado que no cede, piel fría y pálida, pulso débil.
Dolor	Dolor de pecho, dolor abdominal intenso o dolor súbito “peor de la vida”.
Niños	Decaimiento extremo, no acepta líquidos, no orina, rigidez de nuca.
Trauma	Caída importante, atropello, golpe de cabeza con síntomas o posible fractura de columna.

12. Registro para entregar al médico

Datos a anotar

- ☐ Hora del evento y mecanismo.
- ☐ Síntomas observados y cambios.
- ☐ Medicamentos ya administrados, dosis y hora según indicación.
- ☐ Alergias conocidas y enfermedades relevantes.
- ☐ Fotos del envase/producto involucrado.
- ☐ Mediciones disponibles: temperatura, presión, glucemia, pulso.

Fuentes y actualización

NOTA

Estas fuentes se incluyen para verificar, ampliar y actualizar el manual. Las normas, vedas, horarios, rutas y recomendaciones sanitarias pueden cambiar.



IFRC - International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025

<https://www.ifrc.org/sites/default/files/2026-03/IFRC%20International%20First%20Aid%2C%20Resuscitation%20and%20Education%20Guidelines%202025.pdf>



Cruz Roja Argentina - Primeros auxilios

<https://www.cruzroja.org.ar/primeros-auxilios/>



Argentina.gob.ar - Números de emergencia

<https://www.argentina.gob.ar/tema/emergencias>