

Manual de medicamentos básicos

Uso seguro del botiquín familiar - sin dosis personalizadas

ATENCIÓN

La guía organiza el stock y evita errores; no receta tratamientos ni dosis. Cada uso debe respetar el prospecto y la indicación de médico, pediatra, odontólogo o farmacéutico.

1. Regla de los cinco correctos

- Persona correcta.
- Medicamento correcto y principio activo verificado.
- Dosis correcta indicada para edad/peso/condición.
- Hora e intervalo correctos.
- Vía correcta y registro de lo administrado.

2. Antes de dar cualquier medicamento

- Leer nombre, concentración y vencimiento con buena luz.
- Confirmar alergias, embarazo, enfermedad renal/hepática, úlcera, anticoagulantes y otros medicamentos usados.
- No usar un medicamento sin etiqueta legible, con envase dañado o aspecto alterado.
- Registrar nombre, cantidad administrada, hora y motivo.
- Ante duda, llamar a un profesional o centro de toxicología.

3. Inventario orientativo del botiquín EDY

Producto	Principio activo	Indicación general	Precaución clave
Actron Pediátrico 4%	Ibuprofeno	Fiebre y dolor infantil	No usar ante sospecha de dengue. Dosis por peso e indicación pediátrica.
Tafirol 500 mg / 1 g	Paracetamol	Dolor y fiebre	No duplicar con Buscapina DÚO ni otros productos con paracetamol.
Ibuprofeno 600 mg	Ibuprofeno	Dolor e inflamación en adultos	No combinar con diclofenac o ketorolaco. Evitar en dengue, úlcera, enfermedad renal o deshidratación.
Kemanat 20 mg	Ketorolaco	Dolor agudo intenso	Uso corto y médico. No combinar con otros antiinflamatorios.
Fabogesic Flexi 75	Diclofenac	Dolor e inflamación	No combinar con ibuprofeno/ketorolaco. Evitar en dengue.
Buscapina DÚO	Hioscina + paracetamol	Cólicos y dolor espasmódico	Ya contiene paracetamol; revisar contraindicaciones y causa del dolor.
Reliverán gotas	Metoclopramida	Náuseas/vómitos	Solo con indicación. Puede causar somnolencia o movimientos anormales.
Sales de rehidratación oral	Sales y glucosa	Reponer líquidos por diarrea/vómitos	Disolver exactamente en el volumen indicado; desechar según prospecto.
Loperamida 2 mg	Loperamida	Diarrea aguda en adultos seleccionados	No usar con sangre, fiebre alta, dolor intenso ni en niños sin indicación.
Loratadina 10 mg	Loratadina	Alergia leve	No reemplaza adrenalina ni emergencias ante anafilaxia.
Caladryl Incoloro	Difenhidramina + óxido de zinc	Picazón/irritación leve en piel	Solo piel intacta; evitar áreas extensas y ojos.
Muelita Forte	Benzocaína 20%	Dolor dental temporal en adultos	Uso breve; no aplicar en niños. Dolor dental requiere odontólogo.
Cetaxim 500	Azitromicina	Antibiótico	Solo receta para infección bacteriana indicada; completar esquema prescripto.
Butefina 500	Cefalexina	Antibiótico	Solo receta; verificar alergia a betalactámicos.

4. Situaciones frecuentes y decisión segura

Situación	Primero	Medicamentos: criterio general	Consultar urgente si...
Fiebre	Medir, hidratar, observar estado general.	Paracetamol o ibuprofeno solo si corresponde y con dosis indicada. En sospecha de dengue, no antiinflamatorios.	Dificultad respiratoria, rigidez, convulsión, decaimiento marcado, deshidratación.
Dolor	Identificar lugar, inicio, golpe, intensidad.	No sumar analgésicos con el mismo principio activo ni combinar antiinflamatorios.	Dolor de pecho, cabeza súbito, abdomen intenso, trauma importante.
Diarrea	Sales de rehidratación y alimentos seguros.	Loperamida solo en adultos seleccionados y sin signos de infección.	Sangre, fiebre alta, dolor intenso, poca orina, niño decaído.
Vómitos	Sorbitos frecuentes y reposo.	Metoclopramida solo con indicación.	Vómito verde o con sangre, dolor intenso, rigidez, deshidratación.
Alergia	Alejar el desencadenante, observar respiración.	Loratadina para cuadros leves; no sirve como rescate de anafilaxia.	Lengua/garganta hinchada, falta de aire, desmayo.
Dolor dental	Higiene suave y frío externo.	Benzocaína solo temporal en adultos; analgésico sin duplicar.	Hinchazón facial, fiebre, dificultad para tragar o respirar.

5. Combinaciones que deben evitarse

- Paracetamol duplicado: Tafirol + Buscapina DÚO u otro antigripal con paracetamol.
- Antiinflamatorios entre sí: ibuprofeno + diclofenac + ketorolaco. Elegir solo lo indicado, no “sumar potencia”.
- Antibióticos por cuenta propia, sobrantes o para cuadros virales.
- Medicamentos adultos en niños sin indicación y cálculo por peso.
- Alcohol con sedantes, analgésicos potentes u otros medicamentos que adviertan somnolencia.

6. Antibióticos

PRECAUCIÓN

Azitromicina y cefalexina quedan registradas como stock bajo receta. No deben iniciarse “por las dudas”, compartirse ni usarse para resfrío, gripe o diarrea sin diagnóstico.

7. Conservación y rotación

- Guardar en envase original, seco, protegido del calor, luz y alcance de niños.
- No guardar en baño o vehículo expuesto al sol.
- Revisar trimestralmente vencimientos y estado.
- Rotar primero lo que vence antes, sin abrir envases de reserva innecesariamente.
- Medicamentos vencidos: consultar punto de recepción o farmacia; no arrojarlos al inodoro.

8. Ficha de administración

Registro familiar

- ☐ Nombre del paciente.
- ☐ Medicamento y principio activo.
- ☐ Concentración/presentación.
- ☐ Dosis indicada y profesional que la indicó.
- ☐ Hora administrada.

Fuentes y actualización

NOTA

Estas fuentes se incluyen para verificar, ampliar y actualizar el manual. Las normas, vedas, horarios, rutas y recomendaciones sanitarias pueden cambiar.



Vademecum Nacional de Medicamentos - ANMAT

<https://servicios.pami.org.ar/vademecum/>



Argentina.gob.ar - Uso responsable de medicamentos

<https://www.argentina.gob.ar/anmat/comunidad/medicamentos>



OMS - Seguridad de la medicación

<https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm>