

# Integrare numerică. Metoda Romberg. Cuadraturi Gaussiene.

Colaboratori: Andrei STAN, Mădălina Hristache, Radu Constantinescu

February 17, 2025

## Cuprins

<b>1</b>	<b>Obiective laborator</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Noțiuni preliminare</b>	<b>1</b>
2.1	Cuadraturi Gaussiene . . . . .	1
2.2	Metoda Romberg . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Probleme rezolvate</b>	<b>2</b>
3.1	Problema 1 . . . . .	2
3.2	Problema 2 . . . . .	3
3.3	Problema 3 . . . . .	4
<b>4</b>	<b>Probleme propuse</b>	<b>5</b>
4.1	Problema 1 . . . . .	5
4.2	Problema 2 . . . . .	5
4.3	Problema 3 . . . . .	5
4.4	Problema 4 . . . . .	6

## 1 Obiective laborator

În urma parcurgerii acestui laborator, studentul va fi capabil să:

- utilizeze metode gaussiene și metoda Romberg pentru a calcula aproximativ valoarea integralei unei funcții continue;
- să implementeze în Octave metodele studiate.

## 2 Noțiuni preliminare

Ne propunem să calculăm în mod aproximativ valorile  $I[f] = \int_a^b f(x) dx$  și  $D[f] = f^{(p)}(x_0)$ , în condițiile:

- funcția  $f$  este continuă pe  $[a, b]$ ;
- primitiva  $F$  nu este cunoscută;
- funcția  $f$  este cunoscută numai prin valorile  $f(x_i)$  pe care le ia într-un număr restrâns de puncte  $x_i$ ,  $i = 0 : N$ .

Definim o metodă aproximativă de integrare astfel:

$$I_N[f] = \sum_{i=0}^N A_{iN} \cdot f(x_{iN})$$

Metoda aproximativă de aproximare este convergentă dacă  $\lim_{N \rightarrow \infty} |I[f] - I_N[f]| = 0$ .

### 2.1 Cuadraturi Gaussiene

Metodele de tip Newton-Cotes au gradul de valabilitate  $N$  (sunt exacte pentru polinoame până la gradul  $N$  inclusiv). Dacă în formula aproximativă de integrare:

$$\int_a^b f(x) w(x) dx \approx \sum_{i=0}^N A_{iN} f(x_{iN})$$

se aleg nodurile  $x_{iN}$  ca rădăcini ale unui polinom ortogonal, definit în mod unic în raport cu  $a$ ,  $b$  și funcția pondere  $w(x)$ , gradul de valabilitate al formulei devine  $2N + 1$ .

Coefficienții  $A_{iN}$  se vor determina impunând ca formula să aibă grad de valabilitate  $N$  (să fie exactă pentru funcțiile  $1, x, \dots, x^N$ ). Acest fapt conduce la rezolvarea unui sistem de ecuații liniare.

Pentru polinoamele ortogonale uzuale, se obțin următoarele formule de integrare:

- Cebășev ordin 1

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f\left(\cos \frac{(2i+1)\pi}{2N}\right)$$

- Legendre

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^N A_{iN} f(x_{iN}), \quad A_{iN} = \frac{2(1-x_{iN}^2)}{N^2 L_{N-1}^2(x_{iN})}$$

- Laguerre

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = \sum_{i=0}^N A_{iN} f(x_{iN}), \quad A_{iN} = \frac{x_{iN}}{(N+1)^2 G_{N+1}^2(x_{iN})}$$

- Hermite

$$\int_0^\infty e^{-x^2} f(x) dx = \sum_{i=0}^N A_{iN} f(x_{iN}), \quad A_{iN} = \frac{2^{N+1} N! \sqrt{\pi}}{H_{N+1}^2(x_{iN})}$$

## 2.2 Metoda Romberg

Se formează matricea:

$$I = \begin{bmatrix} I_{11} & & & \\ I_{21} & I_{22} & & \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ I_{N1} & I_{N2} & \cdots & I_{NN} \end{bmatrix}$$

în care prima coloană  $I_{11}, I_{21}, \dots, I_{N1}$  reprezintă estimările integralelor calculate cu formula compusă a trapezelor, considerând  $2^0, 2^1, \dots, 2^{N-1}$  intervale.  $I_{N1}$  poate fi obținut prin recurență din  $I_{N-1,1}$  cu formula:

$$I_{N,1} = \frac{1}{2} \left[ I_{N-1,1} + \frac{b-a}{2^{N-1}} \sum_{i=1, \Delta i=2}^{2^{N-1}} f\left(a + \frac{b-a}{2^N} i\right) \right]$$

Elementele din coloana  $j$  se calculează cu relația de recurență:

$$I_{k,j} = \frac{4^{j-1} I_{k+1,j-1} - I_{k,j-1}}{4^{j-1} - 1}$$

Fiecare coloană converge către  $I$ , cu atât mai rapid cu cât este situată mai la dreapta. Pentru o coloană  $j$ , calculul iterativ este oprit în momentul în care  $|I_{k,j} - I_{k-1,j}| < \varepsilon \cdot |I_{k,j}|$ .

## 3 Probleme rezolvate

### 3.1 Problema 1

Implementați în OCTAVE metoda Romberg și aproximați cu ajutorul ei integrala  $\int_3^5 x \log(x) dx$ .

*Soluție:*

```

function I = romberg(fx, a, b)
    lfx = length(fx);
    N = log2(lfx-1)+1;
    R = zeros(N,N);
    for i = 1 : N
        R(i,1) = compositeTrapezoidal(fx(1:2^(N-i):lfx), a, b);
    endfor

    pow4 = 1;
    for j = 2 : N
        pow4 = pow4*4;
        R(j:N,j) = (pow4*R(j:N) - R(j-1:N-1))/(pow4-1);
    endfor
    I = R(N,N);
endfunction

```

Listing 1: Metoda de integrare Romberg.

```

function rez = lab12Pr1(func, a, b, N)
    step = (b-a)/2^(N-1);
    xi = a:step:b;
    fxi = func(xi);
    rez = romberg(fxi, a, b);
endfunction

```

Listing 2: lab12Pr1.m.

Date de intrare:	Date de ieșire:
$f_{\log x}, a = 3, b = 5, N = 4$	$rez = 11.177$

unde  $f_{\log x} = @(x) x.*\log(x)$ .

### 3.2 Problema 2

Calculați aproximativ integrala  $\int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{x(1-x)}} dx$ .

*Soluție:*

Ca prim pas, facem schimbarea de variabilă  $t = 2x - 1 \Rightarrow x = \frac{t+1}{2}$ .

$$x = 0 \Rightarrow t = -1$$

$$x = 1 \Rightarrow t = 1$$

$$\text{Atunci integrala devine: } \int_{-1}^1 \frac{\left(\frac{t+1}{2}\right)^4}{2\sqrt{\left(\frac{t+1}{2}\right)\left(1-\frac{t+1}{2}\right)}} dt = \int_{-1}^1 \frac{\left(\frac{t+1}{2}\right)^4}{\sqrt{(1+t)(1-t)}} dt = \int_{-1}^1 \frac{\left(\frac{t+1}{2}\right)^4}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

$$\text{Identificăm } f(t) = \left(\frac{t+1}{2}\right)^4, \quad w(t) = \sqrt{1-t^2}, \quad a = -1, \quad b = 1.$$

$$\text{Din formula de integrare Cebâșev, avem: } \int_{-1}^1 \frac{f(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt = \frac{\pi}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f(\cos(x_i)), \quad x_i = \frac{(2i+1)\pi}{2N}.$$

Deoarece  $f$  este un polinom de grad 4, vrem ca formula utilizată pentru aproximare să aibă grad de valabilitate  $\geq 4$ , folosind cât mai puține puncte. Alegem  $N = 3$ , iar gradul de valabilitate va fi 5.

$$x_0 = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad x_1 = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad x_2 = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

În final, formula de integrare devine:

$$\int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{x(1-x)}} dx = \frac{\pi}{3} \left[ \left( \frac{\frac{\sqrt{3}+1}{2}}{2} \right)^4 + \left( \frac{1}{2} \right)^4 + \left( \frac{-\frac{\sqrt{3}+1}{2}}{2} \right)^4 \right].$$

### 3.3 Problema 3

Se consideră integrala  $I = \int_{-1}^1 f(x) dx$ . Determinați formula de integrare  $I \approx a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + a_3 f(x_3)$ . Precizați gradul de valabilitate al formulei.

*Soluție:*

În formula de integrare gaussiană:

$$\int_a^b f(x) w(x) dx \approx \sum_{i=0}^N A_i f(x_i),$$

nodurile  $x_i$  sunt determinate din condiția de ortogonalitate a polinomului  $\pi(x) = \prod_{i=0}^N (x - x_i)$  cu un polinom oarecare de grad mai mic decât cel al lui  $\pi$ , în particular  $x^k$ . Avem astfel:

$$\int_a^b \pi(x) \cdot w(x) \cdot x^k dx = 0, \quad k = 0 : n-1.$$

În cazul nostru,

$$\pi(x) = (x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot (x - x_3) = x^3 + ax^2 + bx + c, \quad w(x) = 1$$

$$\int_{-1}^1 (x^3 + ax^2 + bx + c) x^k dx = 0, \quad k = 0 : 2, \text{ care conduce la sistemul de ecuații liniare:}$$

$$\begin{cases} \frac{2}{3}a + 2c = 0 \\ \frac{2}{3}b = -\frac{2}{5} \\ \frac{2}{5}a + \frac{2}{3}c = 0 \end{cases}, \text{ cu soluția } a = c = 0, b = -\frac{3}{5}.$$

$$\pi(x) = x^3 - \frac{3}{5}x, \text{ cu rădăcinile } x_1 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = \sqrt{\frac{3}{5}}.$$

Pentru determinarea coeficienților  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$  impunem condiția ca formula de integrare să fie exactă pentru funcțiile 1,  $x$ ,  $x^2$ . Astfel:

$$f(x) = 1 : \quad \int_{-1}^1 dx = a_1 + a_2 + a_3 = 2$$

$$f(x) = x : \quad \int_{-1}^1 x dx = -\sqrt{\frac{3}{5}}a_1 + \sqrt{\frac{3}{5}}a_3 = 0$$

$$f(x) = x^2 : \quad \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{3}{5}a_1 + \frac{3}{5}a_3 = \frac{2}{3}$$

$$\text{De aici, găsim că } a_1 = a_3 = \frac{5}{9}, \quad a_2 = \frac{8}{9}.$$

În final, formula de integrare devine:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{5}{9}f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}f(0) + \frac{5}{9}f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right), \text{ iar gradul ei de valabilitate este 5.}$$

## 4 Probleme propuse

### 4.1 Problema 1

Se consideră formula de integrare:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + a_3 f(x_3) + b_1 f(-1) + b_2 f(1).$$

Determinați  $x_i, a_i, i = 1 : 3$  și  $b_j, j = 1 : 2$  astfel încât formula să aibă grad maxim de valabilitate.

*Indicație:* Nodurile  $x_1, x_2, x_3$  se determină din condițiile de ortogonalitate

$$\int_{-1}^1 \pi(x) \rho(x) x^k dx = 0, \quad k = 0 : 2,$$

în care  $\pi(x) = \prod_{i=1}^3 (x - x_i)$ ,  $\rho(x) = (x - 1)(x - 2)$ .

### 4.2 Problema 2

Se consideră formula de integrare:

$$\int_0^a f(x)dx \approx a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + b_1 f(0) + b_2 f(a).$$

Determinați  $x_i, a_i, b_i, i = 1 : 2$  astfel încât formula să aibă grad de valabilitate maxim.

*Indicație:* Nodurile  $x_1$  și  $x_2$  se determină din condițiile de ortogonalitate

$$\int_{-1}^1 (x - x_1)(x - x_2)x(x - a)x^k dx = 0, \quad k = 0 : 1.$$

Coefficienții se determină impunând formulei de integrare un grad de valabilitate corespunzător.

### 4.3 Problema 3

Pentru formula de integrare:

$$\int_a^b f(x)w(x)dx \approx \sum_{i=0}^N a_i f(x_i),$$

să se arate că dacă integrarea se face prin cuadratură Gaussiană, atunci  $a_i = \int_a^b w(x)l_i^2(x)dx$ , în care  $l_i$  reprezintă multiplicatorii din formula de interpolare Lagrange.

#### 4.4 Problema 4

Formula de integrare Gauss-Radau are forma:

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} \approx \sum_{i=0}^N a_i f(x_i),$$

este exactă pentru polinoame de grad  $\leq N$  și utilizează ca abscise  $x_i$  zerourile polinomului  $T_{N+1}(x) - T_N(x)$ .

- a) Dezvoltați o formulă de integrare cu  $N = 3$ .
- b) Scrieți o funcție OCTAVE care implementează metoda de integrare pentru  $N$  oarecare.