Stage 1

1. Use Parametric Differentiation to find $\frac{dy}{dx}$ in terms of the parameter t, then evaluate $\frac{dy}{dx}$ when t=-2.

(a)
$$x = 3t$$
, $y = 8t^2$

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

(b)
$$x = 5t - 4$$
, $y = 7 - 2t$

-

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

(c)
$$x = 10t^2$$
, $y = 5t^2 - 2t$

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

(d)
$$x = t^3 - t$$
, $y = 4 - t^2$

JE MATHS

JE MATHS



JE MATHS JE MATHS JE MATHS

JE MATHS JE MATHS

(f) $x = 3t^2 + 1$, $y = t^3 - 2t^2$

JE MATHS JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS (g) $x = 2\sqrt{t}$, $y = \frac{1}{t\sqrt{t}}$

JE MATHS

JE MATHS JE MATHS

JE MATHS JE MATHS JE MATHS

2. Given the parametric equation of the curve

$$x=t^3-8t, \quad y=t^2$$

where t is a parameter. Given that the point A has parameter t = -1, (a) find the coordinate of A

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

The line I is a tangent to the curve at point A.

JE MATHS

(b) Find the equation of line 1.

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

The line I also intersects the curve at point B.

(c) Find the coordinate of point B.

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

3. Use parametric differentiation to find the equation of tangent to the curve at the given the point.

(a)
$$x = 3t^2$$
, $y = t - 6t^2$ at the point where $t = 1$

JE MATHS JE MATHS JE MATHS

> JE MATHS JE MATHS

JE MATHS JE MATHS JE MATHS

JE MATHS (b) $x = (t+2)^2$, $y = (t-1)^3$ at the point where t = -1

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS JE MATHS

JE MATHS JE MATHS JE MATHS (c) $x = \frac{1}{1+t}$, $y = \frac{1}{1-t}$ at the point where $t = \frac{1}{2}$

JE MATHS

- 4. Use parametric differentiation to find the equation of the normal to the curve at the given point.
 - (a) $x = t^2 + 1$, y = 3(t+1) at the point where t = 2.

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

(b) $x = t^2$ and $y = t^2 + 6t - 7$ at t = 12

JE MATHS JE MATHS

Stage 2

- 1. Use $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx/dy}$ to differentiate:
 - (a) $y = \sqrt{x+2}$ JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

(b) $y = \sqrt[3]{x}$

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

(c) $y = \sqrt[4]{2x}$

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

(d)
$$y = \frac{1}{\sqrt{6-x}}$$

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

(e)
$$y = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$$

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

(f) $y = \frac{6}{\sqrt[4]{x}}$

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

JE MATHS

Stage 1

1. (a)
$$x = 3t \implies \frac{dx}{dt} = 3$$

 $y = 8t^2 \implies \frac{dy}{dt} = 16t$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} = \frac{16t}{3}$$

JE MATHS

JE MATHS

(b)
$$x = 5t - 4 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 5$$
 IB MATHS
 $y = 7 - 2t \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -2$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-2}{5}$$

$$\text{JE MATHS}$$

JE MATHS

IN MATHS

JE MATHS

(c)
$$x = 10t^2 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 20t$$

 $y = 5t^2 - 2t \Rightarrow \frac{dy}{dt} = 10t - 2$

JB MATHS

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx} \frac{dt}{dx} = \frac{10t - 2}{20t} = \frac{5t - 1}{10t}$$

JE MATHS

(d)
$$x = t^3 - t \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 1$$

 $y = 4 - t^2 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = 0 - 2t = -2t$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-2t}{3t^2 - 1}$$

JE MATHS

(e)
$$x = t^3 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 3t^2$$

 $y = t^2 - 1 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = 2t$

JE MATHS

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t}{3t^2} = \frac{2}{3t}$$

(f)
$$x = 3t^2 + 1 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 6t$$

 $y = t^3 - 2t^2 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = 3t^2 - 4t$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dt} = \frac{3t^2 - 4t}{6t} = \frac{3t - 4}{6}$$

$$18 \text{ MATHS}$$

(g)
$$x = 2\sqrt{t} = 2t^{\frac{1}{2}} \implies \frac{dx}{dt} = t_{|\mathbb{S}}^{\frac{1}{2}} \text{MATHS}$$

$$y = \frac{1}{t\sqrt{t}} = \frac{1}{t^{\frac{3}{2}}} = t^{-\frac{3}{2}} \implies \frac{dy}{dt} = -\frac{3}{2}t^{-\frac{5}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} = \frac{-\frac{3}{2}t^{-\frac{5}{2}}}{t^{\frac{3}{2}}} = -\frac{3}{2}t^{-2} = -\frac{3}{2t^{2}}$$

$$\text{JE MATHS}$$

2. (a) When t = -1, x = -1 - (-8) = 7, $y = 1 \stackrel{\text{JB}}{\Rightarrow} A(7,1)$

(b)
$$x = t^3 - 8t \implies \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 8$$

$$y = t^2 \implies \frac{dy}{dt} = 2t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dt}{dt}} = \frac{2t}{3t^2 - 8} \implies \frac{dy}{dx}\Big|_{t=-1} = \frac{2}{5}$$

$$l_T: y - 1 = \frac{2}{5}(x - 7) \implies 2x - 5y - 9 = 0$$

IB MATHS

IB MATHS

3. (a) When t=1, x=3, y=1-6=-5 \Rightarrow at point (3,-5) $x = 3t^2 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 6t$ $y = t - 6t^2 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = 1 - 12t$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dt}{dt}} = \frac{1 - 12t}{6t} \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{11}{6}$

$$l_T: y+5=-\frac{11}{6}(x-3) \implies 11x+6y-3=0$$

(b) When
$$t = -1$$
, $x = 1$, $y = (-2)^3 = -8$ \Rightarrow at point $(1, -8)$
 $x = (t + 2)^2$ $\Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dt} \times \frac{du}{dt}$ (by chain rule if let $u = t + 2$ and $x = u^2$)

 $= 2(t + 2) \times 1$
 $= 2(t + 2)^{+1}$
 $= 2(t + 2$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dt}{dx}} = \frac{\frac{1}{(1-t)^2}}{-\frac{1}{(1+t)^2}} = -\frac{(1+t)^2}{(1-t)^2} \implies \frac{dy}{dx}\Big|_{t=\frac{1}{2}} = -\frac{\frac{9}{4}}{\frac{1}{4}} = -9$$

$$I_T \stackrel{\text{MATHS}}{:} y - 2 = 9\left(x - \frac{2}{3}\right) \implies 9x - y - 4 = 0^{\text{MATHS}}$$

$$I_T \stackrel{\text{MATHS}}{:} y = 9x - y - 4 = 0^{\text{MATHS}}$$

4. (a) When
$$t=2$$
, $x=5$, $y=9$ \Rightarrow Hat point $(5,9)$

$$x=t^2+1 \Rightarrow \frac{dx}{dt}=2t$$

$$y=3(t+1) \Rightarrow \frac{dy}{dt}=3+0=3$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{3}{2t} \Rightarrow \frac{dy}{dx}\Big|_{t=2}=\frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow m_N=-\frac{4}{3} \text{ at point } (5,9) \quad \text{(as } m_T\times m_N=-1)$$

$$l_N: y-9=-\frac{4}{3}(x-5) \Rightarrow 4x+3y-47=0$$

(b) When
$$t = 12$$
, $x = 144$, $y = 144 + 72 - 7 = 209$ \Rightarrow at point $(144, 209)$

$$x = t^{2} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 2t$$

$$y = t^{2} + 6t - 7 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = 2t + 6$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dt} = \frac{2t + 6}{2t} \Rightarrow \frac{dy}{dx}\Big|_{t=12} = \frac{24 + 6}{24} = \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow m_{N} = -\frac{4}{5} \text{ at point } (144, 209) \quad \text{(as } m_{T} \times m_{N} = -1)$$

$$l_{N}: y - 209 = -\frac{4}{5}(x - 144) \Rightarrow 4x + 5y - 1621 = 0$$

$$\text{IB MATHS}$$

Stage 2

1. (a)
$$y = \sqrt{x+2} \implies y^2 = x+2$$
 $\Rightarrow x = y^2 - 2$
 $\Rightarrow \frac{dx}{dy} = 2y$
 $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy^2}} = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$
 $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$
 $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$
 $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$

(b) $y = \sqrt[3]{x} \implies x = y^3$
 $\Rightarrow \frac{dx}{dy} = 3y^2$
 $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1}$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dy} = 3y^{2}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3\sqrt[3]{x^{2}}}$$

(c)
$$y = \sqrt[4]{2x} \implies 2x = y^4$$

$$\Rightarrow x = \frac{y^4}{2}$$
 $j_E \text{ MATHS} \implies \frac{dx}{dy} = 2y^3$
 $j_E \text{ MATHS}$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$
 $j_E \text{ MATHS}$

$$= \frac{1}{2y^3}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt[4]{2xy^3}}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt[4]{8x^3}}$$

$$\vdots \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt[4]{8x^3}}$$
 $j_E \text{ MATHS}$

$$\Rightarrow 6 - x = y^2$$

$$\Rightarrow x = 6 - y^2$$

$$j_E \text{ MATHS}$$

$$j_E \text{ MATHS}$$

$$j_E \text{ MATHS}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = 0 - (-2)y^3$$

$$= 2y^3$$

$$= 2y^3$$

$$j_E \text{ MATHS}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

$$j_E \text{ MATHS}$$

$$= \frac{y^3}{2}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{(6-x)^3}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{(6-x)^3}}$$

$$|B MATHS|$$

$$\Rightarrow x = y^3$$

$$\Rightarrow x = y^3$$

$$|B MATHS|$$

$$\Rightarrow x = y^3$$

$$|B MATHS|$$

$$= -\frac{3}{y^4}$$

$$= -\frac{3}{y^4}$$

$$|B MATHS|$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx}$$

$$dy$$

$$= -\frac{y^4}{3} MATHS$$

$$= -\frac{1}{3\sqrt[3]{x^4}}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{3\sqrt[3]{x^4}}$$

$$|B MATHS|$$

$$= \frac{1}{3\sqrt[3]{x^4}}$$

$$= \frac{1}{3\sqrt[3]{x^4}}$$

$$= \frac{1}{3\sqrt[3]{x^4}}$$

JE MATHS

JE MATHS

(f)
$$y = \frac{6}{\sqrt[4]{x}} \Rightarrow y^4 = \frac{1296}{x}$$

$$\Rightarrow x = 1296y^4$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dy} = -5184y^{-5} \qquad \text{IB MATHS}$$

$$= -\frac{5184}{y^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

$$= -\frac{y^5}{5184}$$

$$= -\frac{1}{5184} \times \frac{6^5}{\sqrt[4]{x^5}}$$

$$= -\frac{3}{2x\sqrt[4]{x}}$$

$$\text{IB MATHS}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{3}{2x\sqrt[4]{x}}$$

$$\text{IB MATHS}$$

$$\Rightarrow \text{IB MATHS}$$

$$\text{IB MATHS}$$

$$\text{IB MATHS}$$

$$\text{IB MATHS}$$

$$\text{IB MATHS}$$

JE MATHS

JE MATHS