



★ KNEE CARE GUIDE

घुटनों के दर्द से राहत

दर्द, सूजन और अकड़न को संभालने के लिए **10 आसान और सुरक्षित घरेलू उपाय** - जिन्हें आप आज से समझदारी के साथ शुरू कर सकते हैं।

10 सरल उपाय एक उपयोगी दैनिक योजना

महत्वपूर्ण: यह सामान्य शैक्षणिक गाइड है, व्यक्तिगत जांच या उपचार का विकल्प नहीं। गंभीर दर्द, नई चोट या लाल-गरम सूजन में पहले डॉक्टर से सलाह लें।



डॉ. धीरज दुबे

Director, Robotic Joint Replacement Surgery
Shalby Hospital, Jaipur

23+

वर्षों का अनुभव

35,000+

जॉइंट रिप्लेसमेंट



★ शुरू करने से पहले

हर घुटने का दर्द एक जैसा नहीं होता

घुटने में दर्द उम्र, गठिया, मांसपेशियों की कमजोरी, अधिक भार, पुरानी चोट या अचानक मोच जैसे कई कारणों से हो सकता है। यह गाइड हल्के से मध्यम, गैर-आपातकालीन दर्द में सुरक्षित स्व-देखभाल समझाने के लिए है।

यह गाइड किसके लिए उपयोगी है?

- हल्का दर्द या अकड़न, जो धीरे-धीरे शुरू हुई हो
- सीढ़ी, चलने या लंबे समय बैठने के बाद तकलीफ
- डॉक्टर द्वारा पहले से बताई गई सामान्य घिसावट/ऑस्टियोआर्थराइटिस
- दैनिक गतिविधि को धीरे-धीरे बेहतर करना चाहने वाले लोग

पहले डॉक्टर से सलाह कब लें?

- हाल ही में गिरने, टक्कर या खेल की चोट के बाद
- पहले घुटने की सर्जरी या गंभीर बीमारी का इतिहास हो
- दर्द बहुत तेज हो, रात में जगाए या तेजी से बढ़ रहा हो
- व्यायाम की सुरक्षा को लेकर कोई संदेह हो

1

दर्द को सुनें

हल्का खिंचाव सामान्य हो सकता है। चुभता दर्द, नई सूजन या चलने में स्पष्ट गिरावट हो तो गतिविधि रोकें।

2

धीरे-धीरे बढ़ाएँ

एक ही दिन में ज्यादा व्यायाम न करें। कम दोहराव से शुरू करें और शरीर की प्रतिक्रिया देखें।

3

अगली सुबह जाँचें

यदि अगली सुबह दर्द या सूजन पहले से काफी अधिक है, तो पिछले दिन की गतिविधि कम करें।

दवा संबंधी सावधानी: दर्द-निवारक या सूजन-रोधी दवाएँ अपने आप शुरू न करें। पेट, किडनी, हृदय, ब्लड प्रेशर या ब्लड-थिनर दवाओं की स्थिति में डॉक्टर/फार्मासिस्ट की सलाह विशेष रूप से जरूरी है।



★ दर्द और सूजन को संभालें

पहले चार सरल उपाय

इन उपायों का उद्देश्य घुटने पर अनावश्यक दबाव कम करना, सूजन नियंत्रित करना और सुरक्षित हलचल बनाए रखना है।

1

आराम करें, लेकिन पूरा बेड रेस्ट नहीं

जिस गतिविधि से दर्द बढ़ता है उसे कुछ समय घटाएँ, पर पूरे दिन घुटना बिल्कुल स्थिर न रखें। हर घंटे कुछ मिनट हल्की चाल या आरामदायक मोड़-सीधा करना अकड़न कम कर सकता है।

आज करें: लंबे समय बैठने पर हर 45-60 मिनट में स्थिति बदलें।

2

नई सूजन में ठंडी सिकाई

नई चोट, गतिविधि के बाद सूजन या गर्माहट में कपड़े में लिपटा ठंडा पैक 10-15 मिनट लगाएँ। बर्फ सीधे त्वचा पर न रखें और त्वचा सुन्न/सफेद होने लगे तो तुरंत हटा दें।

आज करें: जरूरत के अनुसार दिन में 2-4 बार, बीच में पर्याप्त अंतर रखें।

3

अकड़न में हल्की गर्म सिकाई

सुबह की अकड़न या मांसपेशियों की जकड़न में 10-15 मिनट हल्की गर्मी आराम दे सकती है। बहुत गर्म पानी/हीटिंग पैड से बचें। ताज़ा चोट या लाल-गरम सूजन में गर्मी न लगाएँ।

आज करें: गर्म सिकाई के बाद 5 मिनट हल्की गति करें।

4

सूजन में पैर ऊँचा रखें

लेटते समय पिंडली और एड़ी के नीचे 1-2 तकिए रखकर पूरे निचले पैर को थोड़ा ऊँचा करें। केवल घुटने के पीछे लंबे समय तक मोटा तकिया दबाकर न रखें।

आज करें: 15-20 मिनट आराम के दौरान पैर को आरामदायक ऊँचाई दें।

★ हलचल और मजबूती

घुटने को सुरक्षित ढंग से चलाएँ

घुटने को सहारा देने वाली जांघ की मांसपेशियाँ मजबूत होने पर जोड़ पर तनाव कम हो सकता है। व्यायाम आरामदायक सीमा में करें।



5 एड़ी सरकाना (Heel Slide)

पीठ के बल लेटें। एड़ी को धीरे-धीरे नितंब की ओर सरकाकर घुटना मोड़ें, फिर वापस सीधा करें। गति केवल उतनी रखें जितनी आरामदायक हो।

5-10 दोहराव, दिन में 1-2 बार



6 जांघ की मांसपेशी कसना (Quad Set)

घुटने के नीचे पतला तौलिया रखें। जांघ को कसते हुए घुटने को तौलिये की ओर धीरे दबाएँ। एड़ी जमीन पर रहे और सांस न रोकें।

5 सेकंड होल्ड × 8-10 बार

7 कम-झटका गतिविधि धीरे-धीरे बढ़ाएँ

समतल जगह पर छोटी वॉक, स्टेशनरी साइकिल या पानी में व्यायाम घुटने के लिए सामान्यतः कम झटका देने वाले विकल्प हैं। 5-10 मिनट से शुरू करें और अगले दिन की प्रतिक्रिया देखकर समय बढ़ाएँ। तेज ढलान, दौड़ या दर्द के बीच मजबूरी में चलना न करें।

सरल नियम: गतिविधि के बाद दर्द जल्दी सामान्य हो जाए और अगली सुबह स्पष्ट रूप से न बढ़े।

व्यायाम रोकें: यदि घुटना लॉक हो, अचानक जवाब दे, तेज चुभता दर्द हो, नई सूजन आए या पैर में सुन्नपन/कमजोरी महसूस हो।



★ दैनिक आदतें

छोटे बदलाव, लंबी राहत

जूते, वजन, नींद और दैनिक गतिविधियों की तकनीक घुटने पर पड़ने वाले कुल भार को प्रभावित करती है।

8

सही जूते और सुरक्षित सहारा

आरामदायक, कुशन वाले और स्थिर जूते पहनें। घिसे हुए सोल या बहुत ऊँची एड़ी से बचें। सीढ़ी पर रेलिंग पकड़ें; जरूरत हो तो डॉक्टर/फिजियो की सलाह से छड़ी का उपयोग करें।

ध्यान दें: छड़ी सामान्यतः दर्द वाले घुटने के विपरीत हाथ में पकड़ी जाती है।

9

वजन और संतुलित भोजन

यदि वजन अधिक है तो धीरे-धीरे वजन कम करने से घुटने पर भार घट सकता है। भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, सब्जियाँ, फल और पानी रखें। कोई सप्लीमेंट गठिया को “ठीक” करने का प्रमाणित विकल्प नहीं है।

आज करें: मीठे पेय और बार-बार तली चीज़ें कम करें।

10

नींद और लक्षण डायरी बनाएँ

नियमित नींद रखें और 7 दिनों तक नोट करें: सुबह-शाम दर्द (0-10), सूजन, वॉक/गतिविधि और किस उपाय से राहत मिली। यह जानकारी डॉक्टर को सही कारण और अगला कदम समझने में मदद करती है।

डायरी: दर्द, सूजन, चलने का समय, नींद और इस्तेमाल किया उपाय।

एक सरल दैनिक रूटीन

अपनी क्षमता के अनुसार

सुबह

अकड़न हो तो 10 मिनट हल्की गर्म सिकाई, फिर Heel Slide और Quad Set।

दिन में

लंबे समय न बैठें। समतल जगह पर 5-15 मिनट आरामदायक चाल और सही जूते।

शाम

सूजन हो तो ठंडी सिकाई और पैर ऊँचा। डायरी में दर्द व गतिविधि नोट करें।

क्या न करें

- दर्द के बीच जबरदस्ती गहरी बैठक या जमीन पर बार-बार उठना-बैठना
- अचानक लंबी वॉक, दौड़ या भारी वजन उठाना
- बर्फ/हीट पैड सीधे त्वचा पर लगाना
- इंटरनेट देखकर दवा, इंजेक्शन या सप्लीमेंट स्वयं शुरू करना



★ इन संकेतों को नज़रअंदाज़ न करें

कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें?

तुरंत चिकित्सा सहायता लें यदि:

- चोट के बाद पैर पर वजन नहीं डाल पा रहे हों या घुटना बहुत विकृत दिखे
- घुटना बहुत लाल, गर्म और सूजा हो - खासकर बुखार के साथ
- अचानक बहुत तेज सूजन, असहनीय दर्द या घुटना पूरी तरह लॉक हो जाए
- पिंडली में नई सूजन/दर्द के साथ सांस फूलना या सीने में दर्द हो
- पैर में बढ़ती कमजोरी, सुन्नपन या रंग बदलना महसूस हो
- दर्द कुछ दिनों में कम होने के बजाय बढ़े या 1-2 सप्ताह तक बना रहे



सही कारण जानें, सही इलाज चुनें

डॉ. धीरज दुबे - MBBS, MS (Orthopedic), FJRS (Germany)

Director, Robotic Joint Replacement Surgery, Shalby Hospital Jaipur. घुटना और कूल्हा दर्द, गठिया तथा जॉइंट रिप्लेसमेंट की विशेषज्ञ जांच और उपचार।

23+ वर्ष अनुभव

35,000+ सर्जरी

Robotic & Navigation Surgery

Hospital OPD

Shalby Hospital Jaipur

Ajmer Expressway, 200 Feet Bypass Road, near Gandhi Path,
Chitrakoot Sector 3, Vaishali Nagar, Jaipur - 302021

Mon-Sat: 9:00 AM-5:00 PM

Evening Clinic

Dr. Dubay Hip & Knee Clinic

297, Gali Number 6, Kusum Vihar, Vidhyadhar Nagar, Jaipur -
302017

Mon-Sat: 6:00 PM-8:00 PM



WhatsApp / Appointment

+91 89553 73205

QR स्कैन करके संपर्क करें



और जानकारी

www.drdubay.in

प्रक्रियाएँ, लेख और लोकेशन

स्रोत: NHS - Knee pain; American Academy of Orthopaedic Surgeons - Knee Conditioning Program; World Health Organization - Osteoarthritis; Dr. Dheeraj Dubay official website (प्रोफाइल, संपर्क और लोकेशन जानकारी)। यह सामग्री सार्वजनिक रोगी-शिक्षा के लिए संक्षेपित की गई है।

चिकित्सकीय अस्वीकरण: यह PDF किसी बीमारी का निदान नहीं करती और न ही व्यक्तिगत उपचार योजना देती है। आपकी उम्र, स्वास्थ्य, चोट, दवाओं और जांच के अनुसार सलाह बदल सकती है। कोई भी नया व्यायाम या उपचार शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श करना उचित है।