TREMDORA

LIBRO 1 DE 3 · EL MÉTODO

Hogar en Calma

La guía científica y práctica para liberar a tu mascota de la ansiedad — cuando está contigo y cuando se queda sola.

FUNDAMENTADO EN LA OBRA Y LOS HALLAZGOS DE

Ivan Pavlov · B. F. Skinner · Konrad Lorenz · Jaak Panksepp
Alexandra Horowitz · Brian Hare · Margaret Gruen · Temple Grandin

EDICIÓN COMPLETA

🤍

Para Paris

Todo lo que me habría gustado saber cuando te tenía conmigo,
escrito para que otros lo sepan a tiempo.

Tremdora nació de ti.

EDICIÓN COMPLETA

Hogar en Calma

Ocho ciencias del comportamiento animal, traducidas en un método que sí funciona.

Este libro reúne, en un solo método, más de un siglo de investigación sobre cómo sienten, aprenden y se comunican los animales. No es una colección de trucos: es un mapa completo. Cada capítulo toma la contribución central de un científico o investigadora de referencia y la convierte en algo que puedes hacer hoy mismo, en tu salón, con tu propio perro o tu propio gato.

La ansiedad de una mascota no es «mal comportamiento». Es un sistema emocional haciendo exactamente lo que evolucionó para hacer, en un contexto para el que no fue diseñado. Este libro te enseña a leer ese sistema y a reeducarlo, con paciencia y con evidencia — capítulo a capítulo, ficha a ficha, ejercicio a ejercicio.

Y cubre a los dos: hay un programa completo para perros y otro para gatos, porque la ansiedad felina no se parece a la canina y llevamos años confundiéndola con carácter.

Hogar en Calma es el primero de tres materiales pensados para usarse juntos: este libro te da la ciencia y el método; el **Diario de Bienestar** te da el espacio para registrar el progreso día a día; y el **Plan Práctico de 8 Semanas** te da la hoja de ruta exacta, semana a semana, para aplicar todo sin perderte.

Hogar en Calma · Guía de bienestar emocional animal · Edición completa
Primera edición digital · 2026 · Libro 1 de 3 · Publicado por **Tremdora** · tremdora.com · @tremdora_pets

Este material tiene fines educativos y de acompañamiento. No sustituye el diagnóstico ni el tratamiento de un veterinario o de un veterinario especialista en comportamiento (veterinario etólogo). Ante señales de ansiedad severa, autolesión, agresividad o deterioro súbito, consulta siempre a un profesional.

Índice

Un recorrido en tres partes: de la ciencia, a la lectura de tu mascota, a la práctica diaria — con una ficha rápida al final de cada capítulo.

ANTES DE EMPEZAR

— Introducción: por qué tu mascota siente ansiedad

— Los ocho pilares científicos de este libro

— Cómo usar esta serie de tres libros

PARTE I · LA CIENCIA DETRÁS DE LA CALMA

01 Etología: el lenguaje instintivo del comportamiento — *Lorenz*

02 Neurociencia afectiva: el mapa emocional del cerebro — *Panksepp*

03 Cognición animal: cómo piensan y sienten — *Hare*

04 Teoría del aprendizaje: construir y deshacer el miedo — *Pavlov · Skinner*

05 Lenguaje corporal: leer antes de que grite — *Horowitz*

06 Bienestar animal: diseñar un entorno que calma — *Grandin*

07 Comportamiento clínico: cuándo es un diagnóstico — *Gruen*

08 Dolor y comportamiento: el dolor que se disfraza — *Gruen*

09 Envejecimiento y deterioro cognitivo — *Gruen · Panksepp*

10 Refuerzo positivo: construir calma paso a paso — *Skinner*

PARTE II · EL PROGRAMA PRÁCTICO

A Calma en tu presencia — cinco frentes de trabajo

B Ansiedad por separación — protocolo completo

C Ansiedad felina — el programa para gatos

D Vista previa del Plan Práctico de 8 Semanas

PARA CERRAR

— Cuándo pedir ayuda profesional

— Sobre la autora

— Bibliografía y referentes citados

— Los otros dos libros de la serie

INTRODUCCIÓN

Por qué tu mascota siente ansiedad

Lo que hay detrás del temblor, del destrozo y del escondite

Tu perro tiembla cuando truena. Tu gato se esconde cuando llegan visitas. Tu perro destroza la puerta veinte minutos después de que sales a trabajar. Nada de esto es un defecto de carácter, ni «manías», ni el animal «vengándose» por quedarse solo. Es fisiología: un sistema nervioso diseñado por millones de años de evolución para detectar peligro y buscar seguridad, reaccionando ante un mundo —el tuyo— que a menudo no tiene el peligro real que el cuerpo del animal cree percibir.

La buena noticia es que ese mismo sistema que produce ansiedad es un sistema que aprende. Puede reaprender. Los ocho científicos que sostienen este libro pasaron sus carreras demostrando, cada uno desde un ángulo distinto, cómo funciona la mente animal — y cómo se puede intervenir en ella de forma respetuosa y eficaz, sin dominación, sin castigo, sin miedo.

> *«No se trata de corregir a tu mascota. Se trata de cambiar lo que su cuerpo cree que va a pasar.»*
>
> PRINCIPIO GUÍA DE ESTE LIBRO

Este libro está organizado como un recorrido: primero entenderás por qué ocurre la ansiedad (etología, neurociencia afectiva, cognición y aprendizaje), luego aprenderás a leerla en el cuerpo de tu mascota antes de que se vuelva crisis, y finalmente tendrás tres programas completos con ejercicios diarios — uno para la ansiedad en tu presencia, uno para la soledad y uno específico para gatos. Al final de cada capítulo encontrarás una ficha rápida: una página de consulta veloz para releer sin tener que buscar entre párrafos, ideal para tener a mano en la cocina o guardada en el teléfono.

Cómo usar este libro: no necesitas leerlo de una sentada ni aplicar todo a la vez. Cada capítulo científico incluye un ejercicio breve y su ficha; los programas A, B y C te dan la secuencia completa. Avanza a tu ritmo — la calma no se apura, se construye.

ANTES DE EMPEZAR

Si tu mascota se autolesiona, deja de comer, tiene diarrea o vómitos por estrés, muestra agresividad, o el malestar es intenso y constante, este libro es un excelente complemento — **pero el primer paso es una consulta veterinaria** (los capítulos 7 y 8 te explican por qué).

FUNDAMENTOS

Los ocho pilares científicos de este libro

Cada uno aporta una pieza distinta del mismo rompecabezas: cómo siente, piensa y aprende un animal

FISIOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Ivan Pavlov

El condicionamiento clásico: por qué tu perro se altera solo con ver la correa.

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA

B. F. Skinner

Lo que se refuerza, se repite — base de todo entrenamiento positivo.

ETOLOGÍA

Konrad Lorenz

La conducta tiene función evolutiva; no es capricho ni «mala educación».

NEUROCIENCIA AFECTIVA

Jaak Panksepp

Los circuitos de MIEDO y de PÁNICO/ANGUSTIA por separación en el cerebro.

COGNICIÓN CANINA

Alexandra Horowitz

El *umwelt* canino: cómo un perro percibe el mundo por el olfato.

COGNICIÓN Y EVOLUCIÓN

Brian Hare

Tu mascota lee tus emociones — la base del contagio emocional.

COMPORTAMIENTO CLÍNICO

Margaret Gruen

Cuándo la ansiedad necesita también tratamiento veterinario.

BIENESTAR ANIMAL

Temple Grandin

Diseño de entornos de bajo estrés y sensibilidad sensorial animal.

CÓMO USAR ESTA SERIE

Los tres libros de Hogar en Calma

Este libro (**1. El método**) te da la ciencia y el porqué. El **2. Diario de Bienestar** te da páginas de seguimiento diario para registrar estados de ánimo, disparadores y avances. El **3. Plan Práctico de 8 Semanas** convierte todo en una secuencia de acciones diarias, semana a semana. Puedes usar los tres juntos, o empezar solo con este libro y sumar los otros cuando quieras más estructura.

PARTE I

La ciencia detrás de la calma

Diez capítulos, diez ángulos distintos sobre la misma pregunta: qué está pasando de verdad dentro de tu mascota cuando se angustia.

01

ETOLOGÍA

El lenguaje instintivo del comportamiento

Según los hallazgos de Konrad Lorenz

Konrad Lorenz, padre de la etología moderna, dedicó su vida a una idea simple pero revolucionaria: el comportamiento animal no es aleatorio ni caprichoso — tiene una función biológica, forjada por la evolución para resolver problemas de supervivencia. Sus estudios sobre la impronta (el vínculo que un animal joven forma con su primera figura de apego) mostraron que hay periodos críticos del desarrollo en los que el cerebro está especialmente preparado para aprender de quién depender y de qué protegerse.

Esto cambia por completo cómo deberíamos ver la ansiedad. Cuando tu perro ladra sin parar ante un desconocido, o tu gato se queda congelado ante un ruido nuevo, no está «portándose mal»: está ejecutando un patrón instintivo de alerta que en la naturaleza salvó vidas. El problema no es el instinto — es que ese instinto no distingue entre un peligro real y el cartero. La ansiedad moderna en mascotas domésticas es, muchas veces, un sistema de detección de amenazas perfectamente sano, funcionando en el entorno equivocado.

> LO QUE DESCUBRIÓ LORENZ
>
> Las primeras semanas de vida (el «periodo crítico de socialización», aproximadamente entre las 3 y las 14 semanas en perros) determinan en gran parte qué percibirá el animal adulto como seguro o como amenazante. Una mascota poco expuesta a estímulos variados en esa ventana tiende a generalizar el miedo con más facilidad de adulta.

Esto no significa que un animal adulto con ansiedad esté «condenado». El cerebro conserva plasticidad toda la vida — simplemente el proceso de reenseñarle qué es seguro requiere más repetición y más paciencia que en un cachorro. Y aquí está la clave etológica más útil para el día a día: **respeta la función del comportamiento antes de intentar eliminarlo.** Un perro que necesita oler cada farola no es «terco»; está usando su principal sentido para mapear seguridad. Interrumpir sistemáticamente esas conductas instintivas de exploración y control del entorno, sin sustituirlas por nada, tiende a aumentar la ansiedad general, no a reducirla.

En la práctica diaria, esto se traduce en dar salida a cuatro instintos básicos todos los días: **explorar** (olfatear, caminar rutas nuevas), **masticar o manipular** (juguetes, mordedores), **cazar y buscar** (juegos de rastreo, comida escondida) y **socializar** con su grupo de forma segura. Un animal cuyos instintos tienen salida legítima tiene, literalmente, menos energía nerviosa disponible para canalizarse como ansiedad.

EJERCICIO · CAPÍTULO 01

Etología

EJERCICIO PRÁCTICO

Paseo de decisiones: recupera la sensación de control

Objetivo: reducir la ansiedad general dando a tu mascota oportunidades reales de explorar y decidir, algo que su instinto necesita.

1. Durante el paseo diario, elige un tramo de 10 minutos sin prisa ni destino.
2. Deja que tu perro decida la ruta y el ritmo dentro de un radio seguro (usa una correa larga si hace falta).
3. Permite que huela todo el tiempo que quiera en cada punto de interés — no tires de la correa para «avanzar».
4. Observa: los animales que pueden ejercer control sobre pequeñas decisiones cotidianas muestran, de forma consistente, niveles más bajos de estrés basal.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 01

Etología

> *«El instinto no distingue entre un peligro real y el cartero — pero se le puede reeducar.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- La ansiedad suele ser un instinto de alerta sano, activado en el contexto equivocado.
- El periodo crítico (3 a 14 semanas) marca la base, pero el cerebro adulto conserva plasticidad.
- Respeta la función del comportamiento —oler, explorar, decidir— antes de intentar eliminarlo.
- Cuatro instintos necesitan salida diaria: explorar, masticar, buscar y socializar.

TU EJERCICIO DE HOY

Paseo de decisiones: 10 minutos en los que tu mascota elige la ruta y huele sin prisa.

02


NEUROCIENCIA AFECTIVA

El mapa emocional del cerebro

Según los hallazgos de Jaak Panksepp

Jaak Panksepp, pionero de la neurociencia afectiva, identificó siete circuitos emocionales primarios compartidos por todos los mamíferos: BÚSQUEDA, MIEDO, IRA, LUJURIA, CUIDADO, PÁNICO/ANGUSTIA y JUEGO (los nombra en mayúsculas para distinguirlos de las palabras cotidianas). No son metáforas: son sistemas neuroquímicos localizables en el cerebro, y se activan igual en un perro, en un gato o en una persona.

Para entender la ansiedad de tu mascota, dos sistemas son protagonistas. El sistema de **MIEDO** se activa ante amenazas —reales o percibidas— y produce la respuesta clásica de huida, congelación o evitación. El sistema de **PÁNICO/ANGUSTIA** es distinto: es el circuito de apego social, el mismo que genera el llanto de un cachorro separado de su camada. Cuando tu perro entra en crisis al quedarse solo, casi siempre es este segundo sistema el que se dispara — no es «miedo a estar solo» en abstracto, es la alarma biológica de separación de la figura de apego, evolutivamente diseñada para mantener unidas a las crías con su grupo.



Cuatro de los siete sistemas de Panksepp: los dos que disparan la ansiedad y los dos que la contrarrestan.

LO QUE DESCUBRIÓ PANKSEPP

Los circuitos de MIEDO y de PÁNICO se pueden regular activando otros sistemas que compiten con ellos — sobre todo BÚSQUEDA (curiosidad, olfateo, exploración) y JUEGO. Activarlos **tiende a bajar la intensidad** del miedo y del pánico: un cerebro ocupado buscando sostiene peor una alarma al máximo volumen.

«Las emociones no son un lujo cognitivo: son los sistemas operativos que guían la supervivencia.»

PRINCIPIO CENTRAL DE LA NEUROCIENCIA AFECTIVA DE PANKSEPP

Este hallazgo tiene una implicación práctica que muchos dueños pasan por alto: **no puedes razonar con un cerebro en PÁNICO.** Consolar con palabras a una mascota en plena crisis rara vez ayuda, porque el lenguaje se procesa en circuitos distintos de los que están secuestrando el sistema nervioso en ese momento. Lo que sí funciona es activar, físicamente, un sistema que compita con él —moverse, buscar, masticar— antes de que la alarma alcance su punto máximo.

EJERCICIO · CAPÍTULO 02

Neurociencia afectiva

EJERCICIO PRÁCTICO

Activar BÚSQUEDA para bajar el MIEDO

Objetivo: usar el sistema de exploración para desplazar, en el momento, un pico de ansiedad.

1. Ten siempre a mano un «kit de búsqueda»: una alfombra olfativa (*snuffle mat*) o un puñado de pienso para esparcir por la hierba o por el suelo.
2. En el instante en que notes los primeros signos de nerviosismo, invita a tu mascota a buscar comida esparcida, en vez de intentar «calmarla» con brazos y palabras.
3. Deja que dedique de 3 a 5 minutos completos a la búsqueda activa antes de continuar con lo que estabas haciendo.
4. Repite esto de forma preventiva, no solo reactiva: 10 minutos de juego de búsqueda al día bajan el nivel general de reactividad.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 02

Neurociencia afectiva

> *«No puedes razonar con un cerebro en pánico — pero puedes activar otro sistema que lo baje.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- MIEDO se activa ante amenazas; PÁNICO/ANGUSTIA es el circuito de apego y separación.
- La ansiedad por separación es una alarma de apego genuina, no un capricho.
- BÚSQUEDA y JUEGO compiten con MIEDO y PÁNICO — actívalos para regular.
- Consolar con palabras ayuda poco en plena crisis: mejor mover el cuerpo, buscar, masticar.

TU EJERCICIO DE HOY

Kit de búsqueda: de 3 a 5 minutos de comida esparcida ante el primer signo de nerviosismo.

03

COGNICIÓN ANIMAL

Cómo piensan y sienten

Según los hallazgos de Brian Hare

Brian Hare, cofundador del Centro de Cognición Canina de Duke, demostró algo que sorprendió a la comunidad científica: los perros son extraordinariamente hábiles leyendo gestos humanos —como señalar con el dedo— mucho mejor que los chimpancés, nuestros parientes más cercanos. Su hipótesis de la «autodomesticación» propone que, durante miles de años, los perros que mejor leían y toleraban las señales sociales humanas tuvieron ventaja evolutiva. El resultado es un animal exquisitamente afinado a nuestro estado emocional.

Esto tiene una consecuencia práctica enorme para la ansiedad: tu mascota te lee constantemente, y no solo tus gestos — también tu tono de voz, tu tensión muscular y tu ritmo respiratorio. A este fenómeno se le llama **contagio emocional**. Si sales de casa angustiada por dejar a tu perro solo, o te pones nerviosa cuando truena, es muy probable que estés amplificando, sin querer, la misma ansiedad que intentas calmar.

> LO QUE DESCUBRIÓ HARE
>
> Los perros no solo reaccionan a lo que haces — reaccionan a cómo te sientes mientras lo haces. La investigación en cognición canina muestra sincronización fisiológica entre perros y sus personas de referencia: los niveles de cortisol de ambos tienden a correlacionar.

Hare también documentó que los perros poseen una forma de «inteligencia social» comparable, en ciertas tareas, a la de niños humanos pequeños: entienden intenciones, distinguen entre un gesto accidental y uno deliberado, y ajustan su comportamiento según a quién están observando. Esto significa que tu mascota no solo «capta tu ansiedad» de forma pasiva — está interpretando activamente la situación a través de ti, usándote como referencia social para decidir si algo es peligroso.

EJERCICIO · CAPÍTULO 03

Cognición animal

EJERCICIO PRÁCTICO

La salida aburrida: entrena tu propia calma primero

Objetivo: eliminar las señales emocionales que tu mascota lee como «algo importante está pasando».

1. Antes de salir de casa, respira de forma lenta y consciente durante un minuto — tu sistema nervioso también se regula así, y tu mascota lo percibe.
2. Practica salir «aburrida»: sin despedidas efusivas, sin contacto visual prolongado, sin voz aguda de «ya vuelvo, mi amor». Cuanto más neutro sea el ritual de salida, menos lo marca el cerebro de tu mascota como un acontecimiento que temer.
3. Al volver, saluda también con calma — la euforia extrema al regresar enseña, sin querer, que el reencuentro es un acontecimiento de alta intensidad emocional, lo que aumenta el contraste con la soledad.
4. Aplica el mismo principio en momentos de miedo real (tormentas, petardos): tu tono tranquilo, corporal y verbal, es información que tu mascota usa para evaluar el peligro.

No se trata de dejar de mostrar cariño — se trata de **separar el cariño de la carga emocional** en los momentos exactos que tu mascota interpreta como señales de alarma.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 03

Cognición animal

> *«Tu mascota no capta tu ansiedad por accidente — te está leyendo activamente como referencia social.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- Los perros leen gestos, tono de voz y tensión corporal humana con una precisión inusual.
- El contagio emocional es real: tu calma —o tu ansiedad— se transmite.
- Usan a las personas como referencia social para decidir si algo es peligroso.
- Salidas y regresos «aburridos», sin euforia ni dramatismo, reducen la carga emocional del momento.

TU EJERCICIO DE HOY

Practica una salida «aburrida»: respira, sal sin despedida efusiva, vuelve con calma.

04

TEORÍA DEL APRENDIZAJE

Cómo se construye —y se deshace— el miedo

Según los hallazgos de Ivan Pavlov y B. F. Skinner

Ivan Pavlov demostró, con sus célebres experimentos, que un estímulo neutro (una campana) puede llegar a disparar una respuesta fisiológica automática (salivación) si se asocia repetidamente con algo relevante (comida). A esto lo llamamos **condicionamiento clásico**. La ansiedad funciona exactamente así, pero con estímulos que se asocian al miedo en lugar de a la comida: el sonido de las llaves, el ruido de la maleta, el trueno seguido de un portazo. El cerebro de tu mascota no razona «esto significa que se van» — simplemente asocia el estímulo con la emoción, de forma automática e involuntaria.

B. F. Skinner añadió la otra mitad del mapa: el **condicionamiento operante**. Las conductas seguidas de una consecuencia agradable se repiten; las seguidas de una desagradable se evitan, o generan más ansiedad todavía si la consecuencia es impredecible o injusta. Este principio es la base de todo entrenamiento positivo moderno: reforzar la calma para que se repita, en vez de castigar el nerviosismo, que casi siempre lo empeora al añadir una amenaza real encima de una percibida.

> LO QUE COMBINAN PAVLOV Y SKINNER
>
> La técnica más potente contra la ansiedad aprendida se llama **contracondicionamiento**: reasociar el estímulo que dispara el miedo (clásico, tipo Pavlov) con algo altamente positivo, mientras reforzamos activamente la conducta calmada que aparece (operante, tipo Skinner). Es cambiar el significado emocional del disparador, no solo la reacción visible.

Una confusión muy común es pensar que «distraer» a la mascota con un premio durante el miedo la «premia por tener miedo». Esto no es así: las emociones no se refuerzan como las conductas voluntarias — **no hay forma de premiar el miedo para que se repita, porque el miedo no es una elección.** Lo que sí ocurre, y es justamente el objetivo, es que el cerebro asocia el estímulo temido con algo bueno, cambiando poco a poco la respuesta emocional automática de raíz.

EJERCICIO · CAPÍTULO 04

Teoría del aprendizaje

EJERCICIO PRÁCTICO

Contracondicionamiento de un disparador cotidiano

Objetivo: enseñar a tu mascota que un sonido o un gesto que hoy predice «te voy a dejar» en realidad predice algo bueno.

1. Identifica un disparador claro (por ejemplo: coger las llaves).
2. Actívalo de forma aislada, sin salir de casa: coge las llaves y, de inmediato, dale un premio de alto valor (algo que solo reciba en este ejercicio).
3. Repite de 10 a 15 veces por sesión, varias veces al día, sin que el gesto lleve a una salida real la mayoría de las veces.
4. Cuando notes que tu mascota gira la cabeza esperando el premio en vez de tensarse, avanza: coge las llaves, da dos pasos hacia la puerta, premia y vuelve. Sube la dificultad solo cuando el paso anterior le resulte aburrido, no emocionante ni temido.
5. Nunca combines este ejercicio con una salida real larga hasta que el disparador esté completamente neutralizado.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 04

Teoría del aprendizaje

> *«No se premia el miedo — se reasocia el disparador con algo bueno, y se refuerza la calma que aparece.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- Condicionamiento clásico (Pavlov): un estímulo neutro puede aprender a disparar miedo.
- Condicionamiento operante (Skinner): lo que se refuerza, se repite.
- El contracondicionamiento combina ambos: cambia el significado emocional del disparador.
- El miedo no es una conducta voluntaria — no se puede «premiar para que se repita».

TU EJERCICIO DE HOY

Coge las llaves sin salir y premia de inmediato. Repite diez veces, varias veces al día.

05

LENGUAJE CORPORAL Y COMUNICACIÓN

Leer antes de que grite

Según los hallazgos de Alexandra Horowitz

Alexandra Horowitz popularizó el concepto de *umwelt* (el «mundo percibido propio» de cada especie) aplicado al perro: mientras nosotros vivimos en un mundo dominado por la vista, el perro vive en uno dominado por el olfato — un sentido miles de veces más sensible que el nuestro. Entender esto es clave para la ansiedad, porque significa que tu mascota detecta cambios en el ambiente (tu olor distinto después de hacer deporte, el rastro de una visita) mucho antes de que tú notes nada raro, y reacciona a un mundo de información que a ti te resulta invisible.

La aportación más práctica de Horowitz para este libro es su insistencia en **leer las señales tempranas de estrés**, mucho antes de que aparezca el ladrido, el temblor o la huida. La mayoría de los dueños solo intervienen cuando la ansiedad ya es visible y ruidosa — pero para entonces el animal lleva ya un buen rato en alerta.

Lamerse el hocico
sin comida ni agua cerca; señal temprana de incomodidad.

«Ojo de ballena»
se ve el blanco del ojo al mirar de reojo, sin girar la cabeza.

Cuerpo bajo o rígido
reducción del tamaño corporal, o inmovilidad tensa.

Sacudida corporal «en seco»
como al salir del agua, sin estar mojado; libera tensión.

Bostezar fuera de contexto
no por sueño, sino para autorregular la tensión.

Orejas hacia atrás o de lado
postura defensiva o escucha en alerta.

Jadeo sin calor ni ejercicio
respiración rápida y superficial en reposo.

Cola baja o entre las patas
en gatos, cola pegada al cuerpo o moviéndose rápido de lado a lado.

> LO QUE DESCUBRIÓ HOROWITZ
>
> Intervenir en la fase de señales tempranas —alejando a la mascota del disparador, dándole espacio o iniciando un ejercicio de calma— es mucho más efectivo que esperar a la crisis. Una vez que el sistema de MIEDO está a máxima intensidad, la capacidad de aprendizaje del animal se reduce drásticamente.

Horowitz también advierte contra un error muy frecuente: **castigar las señales tempranas** —regañar un gruñido, por ejemplo— no elimina el malestar, solo elimina el aviso. Un animal al que se le «enseña» a no avisar sigue sintiendo lo mismo, pero ahora sin previo aviso visible, lo que en el peor de los casos aumenta el riesgo de una reacción repentina más intensa. Siempre es mejor escuchar la señal temprana que suprimirla.

EJERCICIO · CAPÍTULO 05

Lenguaje corporal y comunicación

EJERCICIO PRÁCTICO

El diario de una semana de observación

Objetivo: entrenar tu propio ojo para detectar el estrés antes de que escale.

1. Durante siete días, anota cada vez que veas una de las señales de la lista anterior (usa el *Diario de Bienestar* si lo tienes, o cualquier cuaderno).
2. Anota también qué pasaba justo antes: ¿qué sonido, persona, lugar u objeto precedió la señal?
3. Al final de la semana, busca patrones — casi siempre aparecen dos o tres disparadores recurrentes.
4. Esos disparadores son tu prioridad de trabajo en los programas prácticos de la Parte II.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 05

Lenguaje corporal

> *«Un animal al que se le enseña a no avisar sigue sintiendo lo mismo — solo que ya no lo ves venir.»*

OCHO SEÑALES TEMPRANAS DE ESTRÉS

- Lamerse el hocico sin comida cerca · bostezar fuera de contexto
- «Ojo de ballena» (blanco del ojo visible) · orejas hacia atrás
- Cuerpo bajo o rígido · jadeo sin calor ni ejercicio
- Sacudida corporal «en seco» · cola baja o pegada al cuerpo

TU EJERCICIO DE HOY

Anota cada señal que veas hoy y qué pasó justo antes — es el inicio de tu mapa de disparadores.

06

BIENESTAR ANIMAL

Diseñar un entorno que calma

Según los hallazgos de Temple Grandin

Temple Grandin, científica en comportamiento animal y diseñadora de sistemas de manejo de bajo estrés, construyó su trabajo sobre una premisa que ella vive en carne propia gracias a su autismo: los animales —como algunas personas— pueden ser extraordinariamente sensibles a detalles sensoriales que el resto ni percibimos. Una sombra en movimiento, un reflejo, una superficie que cambia de textura, un sonido metálico agudo: cosas triviales para nosotros pueden ser aterradoras para un animal cuyo cerebro procesa el entorno en imágenes y detalles concretos, no en categorías abstractas.

Grandin también desarrolló, y llevó al diseño de instalaciones, el concepto de **zona de fuga** (*flight zone*): la distancia mínima a la que un animal se siente seguro respecto a algo que percibe como amenaza. Invadir esa zona sin darse cuenta —acercarse demasiado rápido, acorralar, forzar el contacto— dispara ansiedad incluso en un entorno por lo demás seguro. Su gran aportación práctica es que el bienestar no se logra solo «calmando» al animal en el momento de la crisis, sino **rediseñando el entorno para que genere menos picos de estrés desde el principio**.

> LO QUE DESCUBRIÓ GRANDIN
>
> La previsibilidad reduce el miedo tanto como la ausencia de peligro real. Un entorno con rutinas estables, espacios de retirada disponibles y cambios introducidos poco a poco produce animales medibles como menos reactivos al estrés, incluso ante los mismos estímulos puntuales.

Otro principio central de Grandin es el **pensamiento en detalles**: mientras las personas solemos generalizar categorías («esto es un aspirador»), muchos animales reaccionan a un detalle sensorial muy específico —ese tono de zumbido, ese reflejo de luz en la carcasa— que puede no repetirse igual en otro contexto. Por eso un perro puede tolerar un aspirador y temer otro. Practicar la habituación con **la variante exacta** que le genera miedo, no con una genérica, acelera mucho el progreso.

EJERCICIO · CAPÍTULO 06

Bienestar animal

EJERCICIO PRÁCTICO

Construye una «zona segura» en tu casa

Objetivo: darle a tu mascota un espacio propio y predecible donde el estrés baja por diseño.

1. Elige un rincón tranquilo, **alejado de la puerta principal** y de ventanas con mucho tránsito visual o sonoro.
2. Coloca allí su cama o su transportín (con la puerta siempre abierta), agua, y un objeto con tu olor (una prenda usada).
3. Establece una regla familiar: **nadie molesta a la mascota cuando está en su zona segura** — ni niños, ni visitas, ni juegos.
4. Practica enviarla allí con una señal (palabra más premio) en momentos de calma, para que asocie el espacio con seguridad antes de necesitarlo en una crisis.
5. Revisa el entorno general: ¿hay espejos que reflejan movimiento brusco, suelos resbaladizos, o zonas de paso estrechas donde no pueda alejarse de algo que le inquieta? Ajusta lo que puedas.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 06

Bienestar animal

> *«La previsibilidad reduce el miedo tanto como la ausencia de peligro real.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- Los animales reaccionan a detalles sensoriales concretos, no a categorías generales.
- La zona de fuga: invadirla sin avisar dispara ansiedad aunque no haya peligro real.
- Rutinas estables y cambios graduales bajan la reactividad general al estrés.
- Una zona segura propia, respetada por toda la familia, es una inversión de bienestar de por vida.

TU EJERCICIO DE HOY

Monta la zona segura: cama, agua y una prenda con tu olor, en un rincón tranquilo lejos de la puerta.

07

COMPORTAMIENTO CLÍNICO

Cuándo la ansiedad es un diagnóstico

Según los hallazgos de Margaret Gruen

Margaret Gruen, veterinaria especializada en comportamiento, recuerda algo que este libro quiere dejar muy claro: **no toda ansiedad se resuelve solo con entrenamiento.** Su investigación clínica distingue entre el nerviosismo situacional normal —que responde bien a los ejercicios de los capítulos anteriores— y los trastornos de ansiedad clínicamente significativos, donde el sistema de estrés del animal está desregulado de forma persistente, con impacto real en su calidad de vida.

El trabajo de Gruen defiende un enfoque combinado: modificación de conducta —lo que trabajamos en este libro — junto con, cuando es necesario, tratamiento veterinario, que puede incluir desde suplementos y feromonas hasta medicación ansiolítica prescrita. Lejos de ser un «último recurso» o un fracaso del dueño, la medicación bien indicada suele ser lo que permite que el aprendizaje conductual funcione: **un cerebro en pánico extremo tiene muy poca capacidad de aprender nada nuevo.**

> LO QUE DESCUBRIÓ GRUEN
>
> Los animales con ansiedad clínica moderada o severa muestran mejores resultados a largo plazo cuando el tratamiento combina intervención conductual y manejo médico, comparado con cualquiera de los dos por separado. Esperar a que el entrenamiento resuelva solo un cuadro severo suele alargar el sufrimiento innecesariamente.

Un matiz importante de su trabajo: la medicación ansiolítica bien indicada **no «droga» ni «apaga» a la mascota** — su objetivo es bajar el volumen basal del sistema de MIEDO lo suficiente para que el aprendizaje (contracondicionamiento, refuerzo positivo) pueda ocurrir. Se usa como puente hacia la independencia, no como sustituto permanente del trabajo conductual, y en la mayoría de los casos bien manejados puede reducirse poco a poco conforme el animal progresa.

EJERCICIO · CAPÍTULO 07

Comportamiento clínico

MARCA LO QUE RECONOZCAS

Cinco señales de alerta clínica

- [ ] La ansiedad ocurre **casi a diario**, no solo ante acontecimientos puntuales (tormentas, visitas).
- [ ] Hay **pérdida de apetito**, problemas digestivos recurrentes o cambios de peso asociados al estrés.
- [ ] Existe **autolesión**: lamido excesivo, mordisqueo de la cola, arañazos en puertas hasta sangrar.
- [ ] Los episodios **se intensifican** pese a aplicar de forma consistente los ejercicios de manejo.
- [ ] Hay **agresividad nueva o creciente** asociada al miedo.

Si has marcado **dos o más**, es momento de una consulta veterinaria conductual — no como sustituto de este libro, sino como complemento indispensable.

EJERCICIO PRÁCTICO

Prepara un informe clínico útil

Objetivo: llegar a la consulta veterinaria con información que acelere el diagnóstico.

1. Anota frecuencia, duración e intensidad (escala de 1 a 5) de los episodios de las últimas dos semanas — el *Diario de Bienestar* está diseñado exactamente para esto.
2. Graba de 20 a 30 segundos de un episodio típico, si es seguro hacerlo — el lenguaje corporal en vídeo vale más que cualquier descripción.
3. Lista los disparadores que identificaste en tu diario del capítulo 5.
4. Anota qué has probado ya y qué resultado tuvo, incluidos los ejercicios de este libro.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 07

Comportamiento clínico

> *«La medicación bien indicada no apaga a tu mascota — abre la puerta para que el aprendizaje sea posible.»*

LAS CINCO SEÑALES DE ALERTA CLÍNICA

- Ansiedad casi diaria, no solo ante acontecimientos puntuales.
- Apetito, digestión o peso alterados por el estrés.
- Autolesión: lamido excesivo, mordisqueo de cola, arañazos hasta sangrar.
- Sin mejora pese a un manejo conductual consistente.
- Agresividad nueva o creciente asociada al miedo.

TU EJERCICIO DE HOY

Si has marcado dos o más señales, pide cita para una consulta veterinaria conductual esta semana.

08

DOLOR Y COMPORTAMIENTO

El dolor que se disfraza de ansiedad

Según los hallazgos de Margaret Gruen

Una parte menos conocida, pero crucial, del trabajo de Gruen es su investigación sobre cómo el dolor crónico —sobre todo la artrosis, muy común y muy subdiagnosticada en perros y gatos— se manifiesta a menudo como cambios de comportamiento antes que como cojera evidente. Un animal con dolor articular puede volverse irritable, evitar que lo toquen en ciertas zonas, mostrarse más «ansioso» ante los cambios de postura (subir a un sofá, bajar escaleras), o reaccionar con miedo a situaciones que antes toleraba bien — porque asocia el movimiento o el contacto con una molestia física real.

Este es uno de los descubrimientos con más impacto práctico de todo el libro: **antes de asumir que un comportamiento es «puramente emocional», vale la pena descartar dolor físico**, especialmente en mascotas mayores de siete años, razas propensas a problemas articulares, o animales con cambios de comportamiento de aparición relativamente reciente y sin un disparador emocional claro.

> LO QUE DESCUBRIÓ GRUEN
>
> Gruen ayudó a desarrollar escalas validadas para detectar dolor crónico a partir de cambios sutiles de comportamiento —no solo de cojera—, reconociendo que el dolor y la ansiedad comparten mecanismos neurológicos de alerta y evitación, por lo que fácilmente se confunden entre sí.

Esta superposición tiene una explicación neurológica directa: tanto el dolor como la ansiedad activan circuitos de alerta y evitación muy similares en el sistema nervioso central. Un cuerpo que anticipa dolor se comporta, en muchos sentidos, igual que un cuerpo que anticipa peligro — se pone rígido, evita ciertos movimientos, se vuelve hipervigilante. Por eso tratar solo el componente «ansiedad» en un animal con dolor no resuelto rara vez da resultados duraderos.

Reticencia a saltar o subir
al sofá, a la cama o al coche, cuando antes lo hacía sin problema.

Irritabilidad al tocarlo
gruñido o retirada al acariciar espalda, caderas o patas.

Cambios de postura al dormir
dificultad para acomodarse, más despertares.

Menor tolerancia social
reactividad nueva hacia otros animales o niños que se acercan de golpe.

EJERCICIO · CAPÍTULO 08

Dolor y comportamiento

EJERCICIO PRÁCTICO

Prueba de descarte sencilla en casa

Objetivo: reunir evidencia inicial antes de tu visita al veterinario.

1. Observa durante una semana si el «comportamiento ansioso» ocurre más después de actividad física (paseos largos, juego intenso) que en reposo.
2. Fíjate en si evita apoyar peso en una pata, o si su marcha es más rígida al levantarse después de dormir.
3. Palpa con suavidad, sin forzar, columna, caderas y patas, observando si hay tensión, retirada o vocalización.
4. Con esta información, pide una valoración veterinaria orientada **al dolor**, no solo a la conducta.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 08

Dolor y comportamiento

> *«Un cuerpo que anticipa dolor se comporta igual que un cuerpo que anticipa peligro.»*

CUATRO SEÑALES DE DOLOR DISFRAZADO DE ANSIEDAD

- Reticencia a saltar o a subir donde antes no había problema.
- Irritabilidad o retirada al tocar espalda, caderas o patas.
- Cambios en cómo se acomoda o duerme, con más despertares.
- Menor tolerancia social nueva, sin causa emocional evidente.

TU EJERCICIO DE HOY

Palpa con suavidad columna, caderas y patas — anota cualquier tensión o retirada.

09

ENVEJECIMIENTO Y DETERIORO COGNITIVO

La ansiedad en la vejez

Según los hallazgos de Margaret Gruen y Jaak Panksepp

A medida que perros y gatos envejecen, muchos desarrollan disfunción cognitiva canina o felina — un equivalente animal a los cambios neurodegenerativos asociados al envejecimiento humano. Gruen ha contribuido a herramientas clínicas para detectarla a partir de un patrón de cambios que suele recordarse con el acrónimo **DISHA**: **D**esorientación, cambios en la **I**nteracción social, alteraciones del ciclo **S**ueño-vigilia, pérdida de **H**ábitos de higiene (accidentes en casa) y cambios de **A**ctividad.

Lo relevante para este libro es que la ansiedad de aparición nueva en una mascota mayor —inquietud nocturna, vocalización sin causa aparente, apego excesivo repentino, desorientación en espacios conocidos— **puede ser la primera señal visible de deterioro cognitivo**, no un simple «carácter que cambió con la edad». Panksepp también documentó que, con la edad, los sistemas de regulación emocional pierden eficiencia, por lo que el mismo estímulo puede generar una respuesta de MIEDO o de PÁNICO más intensa que antes.

> LO QUE APORTA ESTA CIENCIA
>
> El deterioro cognitivo no se detiene con entrenamiento, pero sí puede ralentizarse y compensarse. Rutinas altamente predecibles, enriquecimiento ambiental suave, iluminación nocturna y, en algunos casos, suplementación o medicación específica prescrita por un veterinario mejoran de forma medible la calidad de vida.

Un dato que suele aliviar a las familias: la ansiedad senior de origen cognitivo no significa que «ya no haya nada que hacer». Al contrario — es precisamente el tipo de ansiedad donde intervenir temprano, con ajustes ambientales sencillos y apoyo veterinario a tiempo, tiene el mayor impacto proporcional en calidad de vida, tanto para la mascota como para quien la cuida.

EJERCICIO · CAPÍTULO 09

Envejecimiento y deterioro cognitivo

EJERCICIO PRÁCTICO

Adapta el entorno para una mascota mayor con ansiedad

Objetivo: reducir la carga cognitiva del entorno para que sea más fácil de leer para un cerebro que envejece.

1. Mantén los muebles y el recorrido habitual sin cambios bruscos — la desorientación espacial aumenta la ansiedad.
2. Instala una luz tenue nocturna cerca de su cama, del agua y de su zona de aseo — muchos episodios de ansiedad senior ocurren al despertar en la oscuridad y no reconocer el espacio.
3. Aumenta un poco el contacto físico calmado antes de dormir (caricias lentas, no juego) para activar el sistema de CUIDADO de Panksepp, que compite con el de PÁNICO.
4. Consulta a tu veterinario sobre una valoración cognitiva si notas dos o más señales del acrónimo DISHA — hay intervenciones tempranas efectivas.

Si tu mascota ya está en esa etapa, el libro *Edad Dorada* de Tremdora desarrolla entero el cuidado de la mascota mayor: dolor, nutrición, pérdida de audición y de vista, enfermedades comunes y una escala de calidad de vida.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 09

Envejecimiento y deterioro cognitivo

> *«La ansiedad senior no es "ya no hay nada que hacer" — es donde intervenir temprano rinde más.»*

EL ACRÓNIMO DISHA

- **D**esorientación · **I**nteracción social alterada
- **S**ueño-vigilia trastornado · **H**ábitos de higiene perdidos
- **A**ctividad cambiada — dos o más señales requieren valoración cognitiva

TU EJERCICIO DE HOY

Instala una luz nocturna tenue cerca de su cama, del agua y de su zona de aseo.

10

ENTRENAMIENTO MEDIANTE REFUERZO POSITIVO

Construir calma, paso a paso

Según los hallazgos de B. F. Skinner

Ya conociste el condicionamiento operante de Skinner en el capítulo 4 — ahora lo convertimos en método. La idea central es sencilla de enunciar y poderosa en la práctica: **lo que refuerzas, crece.** Si quieres más calma, tienes que volverte muy buena notando y recompensando los micromomentos de calma que ya ocurren de forma espontánea, en lugar de esperar a «corregir» el nerviosismo cuando ya ha explotado.

Skinner también describió el **moldeamiento** (*shaping*): enseñar una conducta compleja reforzando pequeñas aproximaciones sucesivas hacia el objetivo final, en vez de esperar la conducta perfecta de una sola vez. Para la ansiedad, esto significa que no vas a pedirle a tu mascota «quédate tranquila una hora sola» de entrada — vas a reforzar primero cinco segundos de calma, luego diez, luego treinta, construyendo el músculo emocional en pasos que casi nunca fallan.

> LO QUE DESCUBRIÓ SKINNER
>
> El castigo puede suprimir una conducta visible, pero no cambia la emoción que está debajo — y a menudo la empeora, sumando el miedo al castigo sobre el miedo original. El refuerzo positivo, en cambio, cambia tanto la conducta como el estado emocional que la produce.

Un detalle que marca la diferencia entre resultados mediocres y excelentes: **el momento del refuerzo importa tanto como el refuerzo mismo.** Premiar medio segundo tarde, cuando la mascota ya ha empezado a levantarse o a mirar hacia la puerta, refuerza sin querer la inquietud en vez de la calma. Marcar el instante exacto —con una palabra corta o un *clicker*— antes de entregar el premio ayuda a comunicar con precisión qué comportamiento se está reforzando.

EJERCICIO · CAPÍTULO 10

Entrenamiento mediante refuerzo positivo

EJERCICIO PRÁCTICO

Captura de la calma

Objetivo: entrenar a tu mascota para que elija la calma porque ha aprendido que la calma funciona.

1. Durante el día, lleva contigo unos premios pequeños sin que tu mascota lo note.
2. Cada vez que la sorprendas tumbada, relajada, respirando despacio, marca el momento con una palabra suave («bien») y dale un premio, sin generar excitación.
3. No la llames para que «venga a que la premies» — el objetivo es reforzar la calma que ya está ocurriendo, no crear una rutina nueva de atención.
4. Repite varias veces al día durante dos semanas. Notarás que busca tumbarse cerca de ti con más frecuencia: está aprendiendo que la calma es una conducta valiosa, no un estado pasivo sin recompensa.

FICHA RÁPIDA · CAPÍTULO 10

Refuerzo positivo

> *«Lo que refuerzas, crece. Y el momento del refuerzo importa tanto como el refuerzo mismo.»*

LO QUE DEBES RECORDAR

- El castigo suprime la conducta visible, pero no cambia la emoción — y suele empeorarla.
- El moldeamiento construye conductas complejas en pasos pequeños y consistentes.
- Marca el instante exacto de calma con una palabra o un *clicker* antes de premiar.
- La calma se convierte en una conducta elegida cuando aprende que funciona.

TU EJERCICIO DE HOY

Captura la calma: premia tres momentos espontáneos de relajación, sin llamarla.

PARTE II

El programa práctico

Tres protocolos completos, con ejercicios diarios: uno para la ansiedad en tu presencia, uno para la ansiedad en soledad, y uno específico para gatos.

A

PROGRAMA PRÁCTICO

Calma en tu presencia

Para ansiedad ante ruidos, visitas, otros animales o situaciones cotidianas

---

Este programa se trabaja en cinco frentes, todos compatibles entre sí. No necesitas hacerlos en un orden rígido — pero si tu mascota tiene un disparador muy claro (identificado en tu diario del capítulo 5), **empieza por el frente 3**. El *Plan Práctico de 8 Semanas* distribuye estos cinco frentes en una secuencia diaria concreta si prefieres una estructura ya armada.

FRENTE 1 · BASE DIARIA

Rutina de descarga de energía y BÚSQUEDA

De 15 a 20 minutos, una o dos veces al día. Un cerebro con la necesidad de exploración satisfecha tiene menos combustible disponible para la ansiedad.

1. Un paseo con permiso de olfateo libre (ver el ejercicio del capítulo 1).
2. Un juego de búsqueda de comida escondida en casa: alfombra olfativa, cajas de cartón, toallas enrolladas con premios dentro.
3. Anota en tu registro si los días con esta rutina completa muestran menos episodios de ansiedad — la mayoría de las familias lo confirman en la primera semana.

FRENTE 2 · ENTRENAMIENTO BASE

Enseñar «sitio» (la colchoneta de calma)

10 minutos al día, en un momento tranquilo. Es la habilidad ancla de todo el programa: un punto físico que tu mascota asocia con calma a demanda.

1. Coloca una colchoneta o una toalla pequeña en el suelo. Premia cualquier interacción con ella: mirarla, tocarla, poner una pata.
2. Sube el criterio poco a poco hasta que se tumbe encima. Premia la postura tumbada, no el movimiento de llegar.
3. Añade la palabra «sitio» justo antes de que se tumbe, cuando ya lo haga con fiabilidad.
4. Alarga el tiempo tumbada antes de premiar: empieza en 3 segundos y sube poco a poco hasta 2 o 3 minutos a lo largo de varios días.
5. Practica en distintas habitaciones, para que la señal funcione en cualquier contexto y no solo donde entrenasteis la primera vez.

FRENTE 3 · DISPARADOR ESPECÍFICO

Escalera de exposición gradual

De 3 a 4 sesiones cortas por semana. Se trabaja el disparador identificado en tu diario: timbre, aspirador, visitas, otro animal, tormenta grabada.

1. Define cinco niveles de intensidad del disparador, de menor a mayor. Ejemplo con el timbre: 1) el sonido a volumen muy bajo desde una grabación, 2) volumen medio, 3) volumen real desde lejos, 4) volumen real desde la puerta, 5) timbre real con alguien entrando.
2. Empieza siempre en el nivel más bajo en el que tu mascota permanece relajada y acepta premios con apetito normal.
3. Empareja cada repetición del disparador con algo muy positivo: premio de alto valor, juego breve.
4. Sube de nivel **solo cuando el nivel actual deja de generar ninguna señal de estrés** (capítulo 5) durante tres sesiones seguidas.
5. Si en algún punto aparece una señal de estrés clara, **baja un nivel** y quédate ahí más tiempo — no es un retroceso, es parte normal del proceso.

EL FRENO MÁS IMPORTANTE DE ESTE PROGRAMA

Hecho deprisa, esto **empeora** el miedo en vez de quitarlo. Si tu mascota reacciona, has subido demasiado: baja el volumen o la intensidad. Nadie progresa más rápido por saltarse niveles — se progresa más rápido por no tener que volver atrás.

PROGRAMA A · CONTINUACIÓN

El cuerpo y el entorno

FRENTE 4 · REGULACIÓN FÍSICA

Contacto calmante estructurado

5 minutos, ideal antes de momentos previsiblemente estresantes: una tormenta anunciada, visitas.

1. Con tu mascota tumbada y relajada, aplica presión suave y constante —no palmaditas— con la palma abierta a lo largo del lomo, de cuello a cola.
2. Mantén tú una respiración lenta y audible mientras lo haces — recuerda el capítulo 3: te está leyendo a ti también.
3. Detente ante cualquier señal de incomodidad; este ejercicio solo funciona si es completamente voluntario y agradable para ella.

FRENTE 5 · ENTORNO

Auditoría rápida de la zona segura

Una sola vez, y revisarla cada dos meses.

1. Confirma que la zona segura del capítulo 6 sigue disponible, limpia y sin haber sido invadida por otros usos.
2. Revisa si hay fuentes nuevas de estrés sensorial en casa: electrodomésticos nuevos, muebles reorganizados, luces que parpadean.
3. Introduce cualquier cambio grande de la casa poco a poco, dejando que tu mascota lo explore antes de convivir con él a diario.

FICHA RÁPIDA · PROGRAMA A

Calma en tu presencia

> *«Cinco frentes, un mismo objetivo: que la calma sea la opción más fácil de elegir.»*

LOS CINCO FRENTES DE TRABAJO

- **1. Base diaria** — paseo con olfateo libre y juego de búsqueda.
- **2. Entrenamiento base** — enseñar «sitio» en la colchoneta.
- **3. Disparador específico** — escalera de exposición de cinco niveles.
- **4. Regulación física** — contacto calmante estructurado.
- **5. Entorno** — auditoría de la zona segura cada dos meses.

EMPIEZA POR

El frente 3 si ya has identificado un disparador claro. Si no, arranca por los frentes 1 y 2.

B

PROGRAMA PRÁCTICO

Ansiedad por separación

Protocolo completo para cuando tu mascota se queda sola

La ansiedad por separación activa el circuito de PÁNICO/ANGUSTIA de Panksepp (capítulo 2): no es que tu mascota «no tolere estar sola» por capricho, es una alarma de apego genuina. Este protocolo se basa en un único principio no negociable: **trabajar siempre por debajo del umbral de estrés**, es decir, nunca exponerla a una ausencia más larga de la que puede tolerar sin angustiarse — porque cada episodio de pánico completo refuerza el circuito de miedo y retrasa el progreso.

> REGLA DE ORO
>
> Si en cualquier paso tu mascota muestra angustia (ladrido o maullido sostenido, salivación excesiva, intentos de escape, destrozos cerca de puertas o ventanas), **no fue «un mal día»** — significa que el paso fue demasiado grande. Vuelve al último nivel que salió bien y avanza más despacio.

ANTES DEL PASO 1

¿Es ansiedad, o es aburrimiento?

No son el mismo problema y no se arreglan igual, así que conviene no confundirlos. Hay una pista muy rápida, aunque no es infalible: **fíjate en dónde rompe.**

Más probable aburrimiento

Destrozos repartidos por toda la casa, cosas de morder y de manipular, y te recibe como siempre. Pide estimulación y actividad (frente 1 del Programa A).

Más probable separación

Concentrado **en las salidas**: puerta, marco, ventana, persiana. Y suele venir con llanto continuo, babeo, o necesidades dentro de casa habiendo salido antes. Pide este protocolo.

Y si son las dos cosas a la vez, también es normal: muchos animales tienen ambas, y entonces se trabajan las dos. La pista de la localización te orienta en un minuto, pero **la que decide es la grabación del paso 1**: un perro que se tumba y se duerme no tiene un problema de separación, aunque después rompa algo.

PROGRAMA B · EL PROTOCOLO

Los dos primeros pasos

PASO 1 · LÍNEA BASE

Graba antes de entrenar

Necesitas saber exactamente cuánto tiempo tolera tu mascota sola antes de angustiarse — sin ese dato, cualquier plan es una suposición.

1. Coloca una cámara o el móvil grabando (hay muchas aplicaciones de cámara de vigilancia gratuitas) enfocando la puerta o el espacio principal.
2. Sal de casa con tu rutina normal y quédate fuera entre 15 y 20 minutos.
3. Revisa el vídeo y anota el minuto exacto en que aparece la primera señal de angustia: no solo el destrozo final, sino el jadeo, la vocalización, el ir y venir sin parar hacia la puerta.
4. Ese tiempo —a menudo mucho más corto de lo que imagina el dueño— es tu punto de partida real.

PASO 2 · DESENSIBILIZAR LAS SEÑALES DE SALIDA

Neutraliza los avisos de que te vas

De 10 a 15 repeticiones, varias veces al día, sin salir realmente de casa. Aplica directamente el contracondicionamiento del capítulo 4.

1. Identifica tus señales de salida habituales: llaves, zapatos, abrigo, bolso.
2. Haz cada gesto de forma aislada, en momentos aleatorios del día, sin que le siga una salida: ponte los zapatos y siéntate a ver la tele; coge las llaves y vete a la cocina.
3. Continúa hasta que tu mascota deje de reaccionar —se mantiene tumbada, sin seguirte con ansiedad— ante cada señal por separado.

Paso 3

PASO 3 · AUSENCIAS GRADUALES POR DEBAJO DEL UMBRAL

El corazón del protocolo

Una sesión al día, en un momento tranquilo. No sustituye tus salidas reales, que mientras tanto puedes cubrir con paseador, guardería o un familiar si el umbral todavía es corto.

1. Con las señales de salida ya neutralizadas, haz una salida real pero brevísima: empieza en **la mitad** del tiempo detectado en el paso 1 (si aguantaba 4 minutos, empieza en 2).
2. Sal por la puerta, aléjate lo suficiente para que no te detecte, y vuelve **antes** de que aparezca cualquier señal de angustia.
3. Entra en silencio, sin saludo efusivo (capítulo 3), y espera unos segundos de calma antes de interactuar.
4. Repite la misma duración entre 3 y 5 veces, en sesiones distintas, hasta que le resulte completamente aburrida.
5. Sube la duración en incrementos pequeños: entre un 25 % y un 30 % del tiempo anterior, nunca duplicando de golpe.
6. Si aparece angustia, no es un fallo — vuelve al último nivel que salió bien durante tres o cuatro sesiones más antes de volver a intentar subir.
7. Progresión orientativa: 2 min → 3 min → 5 min → 8 min → 12 min → 20 min → 30 min → 45 min → 1 h 30 → 3 h. El ritmo lo marca tu mascota, no el calendario.

PASO 4 · INDEPENDENCIA CON PRESENCIA

Practica la distancia estando tú en casa

De 5 a 10 minutos, varias veces al día. Muchos animales con ansiedad por separación en realidad tienen dificultad con cualquier distancia, no solo con la puerta cerrada.

1. Usa la señal «sitio» del Programa A para que tu mascota se quede en su colchoneta mientras tú te mueves por otra habitación.
2. Aumenta poco a poco el tiempo y la distancia entre los dos dentro de casa, antes de trabajar la puerta.
3. Cierra puertas interiores brevemente (baño, habitación) como paso intermedio antes de la puerta de la calle.

PASO 5 · ENRIQUECIMIENTO DE LA SOLEDAD

Que la ausencia también tenga algo bueno

Se activa justo antes de cada ausencia, real o de entrenamiento.

1. Un juguete relleno y congelado (un *kong* con pasta de premios) reservado exclusivamente para estos momentos — activa BÚSQUEDA y CUIDADO (capítulo 2) a la vez.
2. Una prenda con tu olor en la zona segura.
3. Sonido ambiente constante y neutro (la radio a bajo volumen) para amortiguar ruidos externos impredecibles que puedan disparar la alerta.
4. Reserva, cuando sea posible, parte de la comida del día para estos momentos de soledad, en vez de servirla toda cuando estás en casa.

Este protocolo puede llevar **de 4 a 12 semanas** según la severidad de partida. Es normal: el objetivo no es la velocidad, es que cada paso se consolide antes del siguiente. Los retrocesos ocasionales son parte esperada del proceso, no una señal de que no funciona.

Y LO QUE YA NO ES COSA DE UN LIBRO

Si tu mascota se autolesiona, se rompe las uñas o los dientes contra la puerta, o hay pánico de verdad —no responde a nada, no come, no reacciona ni a ti—, **eso necesita un profesional**: tu veterinario, o un veterinario especialista en comportamiento. Pedir ayuda no es haber fracasado.

FICHA RÁPIDA · PROGRAMA B

Ansiedad por separación

> *«Trabaja siempre por debajo del umbral de estrés — cada crisis completa retrasa el progreso.»*

LOS CINCO PASOS DEL PROTOCOLO

- **1.** Graba tu línea base real, sin adivinarla.
- **2.** Desensibiliza las señales de salida sin salir de casa.
- **3.** Ausencias graduales por debajo del umbral, subiendo poco a poco.
- **4.** Practica la independencia con distancia estando tú presente.
- **5.** Enriquece cada ausencia con el *kong*, tu olor y sonido ambiente.

REGLA DE ORO

Si aparece angustia, vuelve al último nivel que salió bien. No es un fallo: es parte del proceso.

C

PROGRAMA PRÁCTICO

Ansiedad felina

Por qué un gato ansioso no se parece en nada a un perro ansioso

Con los perros se nota: lloran, rompen, arañan la puerta. Los gatos no hacen nada de eso. Y por eso se nos pasa durante meses, o durante años. Un gato ansioso **no monta ruido: se apaga.** Pide ayuda dejando de hacer cosas — y nosotros interpretamos ese silencio como que está bien, o como que «es muy suyo».

Todo lo de la Parte I vale igual para él: los sistemas de Panksepp son los mismos, el contracondicionamiento funciona igual, y la sensibilidad sensorial de Grandin es, si acaso, mayor. Lo que cambia es **cómo se expresa el malestar** y **qué palancas lo arreglan**. Este programa es ese ajuste.

LO PRIMERO

Las cuatro señales que casi siempre se confunden con carácter

Se lame hasta hacerse calvas

sobre todo en la barriga, en la cara interna de los muslos y en las patas. Es la señal más clara y la que más se atribuye a «alergia» sin mirar el estrés.

Se esconde mucho más

no el escondite normal de un gato, sino horas enteras y en sitios nuevos: dentro de un armario, debajo de la cama, detrás de la lavadora.

Hace sus necesidades fuera del arenero

y casi nunca es «por fastidiar»: es el síntoma felino de estrés más frecuente, y a menudo el primero.

Deja de comer, o come a destiempo

come de noche, cuando no hay nadie, o pica sin terminar. También puede aparecer lo contrario: comer por ansiedad.

ANTES DE CUALQUIER TRABAJO DE CONDUCTA

El estrés en gatos se asocia a **problemas urinarios** (lo que se conoce como enfermedad del tracto urinario inferior felino). Si hace esfuerzos para orinar, va una y otra vez al arenero sin resultado, orina gotas o ves sangre, **es una urgencia veterinaria** — sobre todo en machos, donde una obstrucción puede ser mortal en horas. No esperes a mañana.

Y antes de asumir que es ansiedad: hacer sus necesidades fuera del arenero también puede ser cistitis, cálculos, enfermedad renal o dolor articular que le impide entrar. **Primero el veterinario, después la conducta.**

FRENTE 1 · EL DETONANTE

Qué cambió en casa

Objetivo: encontrar la causa, que en el gato casi siempre es un cambio en el entorno y no algo «suyo».

1. Repasa **los dos últimos meses** y anota todo lo que haya cambiado: una mudanza, un mueble nuevo, obras en el edificio, alguien que llegó o se fue de casa, un horario de trabajo distinto, un gato nuevo en la calle que se ve desde la ventana.
2. Para él no son detalles: son su mapa. Un gato no tiene un territorio «por gusto» — lo necesita para sentirse a salvo.
3. Si identificas el cambio y se puede revertir, revístelo. Si no se puede (una mudanza, un bebé), el trabajo es el de los frentes siguientes: devolverle previsibilidad y recursos.
4. Si no encuentras nada, no lo fuerces: a veces el detonante es invisible para nosotros. Pasa al frente 2 igualmente.

FRENTE 2 · LOS RECURSOS

Que pueda vivir sin cruzarse con nadie

Objetivo: el ajuste que más rápido cambia las cosas en un gato. Un gato necesita poder comer, beber, esconderse, subir y hacer sus necesidades sin tener que negociar con nadie.

1. **Comida y agua separadas entre sí.** En la naturaleza un felino no bebe donde come: el agua junto al plato se asocia a contaminación. Pon el bebedero en otro punto de la casa.
2. **Sitios altos.** Una estantería despejada, lo alto de un armario, un rascador alto junto a una ventana. Mirar el mundo desde arriba es, para un gato, lo que para un perro es olfatear: su forma de controlar que todo está en orden.
3. **Escondites a ras de suelo**, y al menos uno por cada zona de la casa. Una caja de cartón con la abertura hacia la pared funciona mejor que una cama caraísima en medio del salón.
4. **Si hay más de un gato, multiplica.** La regla es una de cada recurso por gato **más uno**, y repartidos por la casa, no todos juntos en la misma habitación: dos comederos pegados son, para ellos, un solo comedero.
5. **Rascadores verticales y altos** (de al menos un metro) donde ya arañe, no donde a ti te guste. Arañar es marcaje y descarga, no vandalismo.

PROGRAMA C · CONTINUACIÓN

El arenero, la rutina y la caza

FRENTE 3 · EL ARENERO

La palanca más infravalorada de todas

Objetivo: eliminar la causa más frecuente de que un gato deje de usarlo — y de que creamos que es ansiedad cuando es incomodidad.

1. **Uno por gato más uno**, en sitios distintos de la casa.
2. **Abiertos, sin tapa.** La tapa concentra el olor y le quita las salidas de escape: a nosotros nos gusta, a él no.
3. **Grandes:** vez y media el largo del gato, de la nariz a la base de la cola. La mayoría de los areneros que se venden son pequeños.
4. **Lejos de la comida** y en un sitio tranquilo, nunca en un paso estrecho ni al lado de la lavadora.
5. **Arena fina, sin perfume** y a unos cinco centímetros de profundidad. El cambio brusco de marca de arena es, por sí solo, causa de que dejen de entrar.
6. **Limpio a diario.** Un arenero sucio es el motivo número uno, antes que cualquier emoción.
7. **Y si el gato es mayor o le duele algo: de entrada baja**, o con una rampa. Muchos gatos dejan de usarlo solo porque les duele entrar, y llevamos años llamándolo «manía».

LO QUE MÁS RÁPIDO SE NOTA

Si solo pudieras cambiar dos cosas esta semana, serían **el arenero** (número, tamaño, sin tapa, limpio) y **los sitios altos**. En muchos gatos, eso solo ya baja visiblemente el nivel de tensión en diez o quince días — antes de haber tocado nada de conducta.

PROGRAMA C · EL TRABAJO FINO

Lo que sostiene el cambio

FRENTE 4 · LA RUTINA Y LA CAZA

Previsibilidad, y poder cazar todos los días

Objetivo: bajar el nivel general de alerta dándole lo que su instinto pide, en el orden que su cerebro espera.

1. **El orden importa más que el reloj.** Siempre la misma secuencia: juego → comida → aseo → descanso. Es la secuencia natural del ciclo de caza de un felino, y cerrarla lo deja tranquilo.
2. **Dos sesiones de caza al día**, de cinco minutos, con una caña o un juguete que se mueva como una presa: a ráfagas, escondiéndose, no en círculos constantes. Y que **termine cazando**: deja que atrape el juguete al final.
3. **Comida repartida y escondida.** Varias raciones pequeñas en comederos de juego o escondidas por la casa, en vez de un plato lleno dos veces al día. Buscar comida es el mejor ansiolítico natural que tiene un gato.
4. **No le despiertes ni le cojas en brazos para consolarle.** En un gato, el consuelo que funciona es dejar de invadirle: acércate, siéntate cerca y espera a que venga él.

FRENTE 5 · EL TRABAJO FINO

Contracondicionar lo que no se puede quitar

Objetivo: para disparadores concretos que no se pueden eliminar — el transportín, las visitas, el aspirador, otro gato de la casa.

1. Aplica la escalera de cinco niveles del Programa A, frente 3, con una diferencia: en gatos los niveles tienen que ser **más pequeños todavía**, y las sesiones más cortas (de uno a dos minutos).
2. **El transportín, siempre fuera y abierto**, con una manta dentro, como un mueble más de la casa. Si solo aparece el día del veterinario, es un predictor de miedo perfecto.
3. Para las presentaciones entre gatos: primero el olor, después la vista a través de una puerta entreabierta, y solo al final el espacio compartido. Semanas, no días.
4. Las feromonas sintéticas de ambiente pueden ayudar como apoyo, nunca como tratamiento único. Pregúntale a tu veterinario.
5. Y el freno de siempre: si reacciona, has subido demasiado. Baja un nivel.

FICHA RÁPIDA · PROGRAMA C

Ansiedad felina

> *«Un gato ansioso no monta ruido. Se apaga. Pide ayuda dejando de hacer cosas.»*

LAS CUATRO SEÑALES · Y LOS CINCO FRENTES

- Calvas por lamido · esconderse mucho más · fuera del arenero · deja de comer
- **1. El detonante:** qué cambió en casa estos dos meses.
- **2. Los recursos:** agua separada de la comida, sitios altos, escondites; uno por gato más uno.
- **3. El arenero:** uno por gato más uno, abiertos, grandes, limpios, lejos de la comida.
- **4. La rutina:** juego → comida → aseo → descanso, y dos cacerías al día.
- **5. El trabajo fino:** escalera de exposición en pasos aún más pequeños.

URGENCIA VETERINARIA

Esfuerzos para orinar, idas y venidas al arenero sin resultado o sangre en la orina: al veterinario hoy, sobre todo si es macho.

D

VISTA PREVIA

El Plan Práctico de 8 Semanas

Cómo se estructura el tercer libro de esta serie

Todo lo que has leído en la Parte I y en los programas A, B y C se puede aplicar libremente, a tu ritmo. Pero si prefieres una hoja de ruta día a día, sin tener que decidir qué trabajar cada mañana, el *Plan Práctico de 8 Semanas* —el tercer libro de esta serie— organiza exactamente eso: una progresión semanal completa, con lista de comprobación diaria.

SEMANA	FOCO
1-2	Observación y cimientos: diario de señales, rutina de BÚSQUEDA, «sitio», línea base grabada, desensibilización de las señales de salida.
3-4	Contracondicionamiento del disparador principal y primeras ausencias graduales por debajo del umbral.
5-6	Escalera de exposición avanzada, independencia con presencia y ausencias más largas.
7	Consolidación: repetir los niveles que salieron bien, revisar el entorno y la zona segura.
8	Evaluación de resultados y decisión sobre continuar sola o sumar apoyo profesional.

El plan incluye además una versión imprimible de la lista diaria y espacio para anotar el nivel de estrés observado — perfecto para combinarlo con el *Diario de Bienestar*, el segundo libro de la serie, que te da el espacio de registro completo día a día.

Si tienes gato, el plan trae su propia versión de ocho semanas: los frentes del Programa C repartidos en el mismo formato, porque los tiempos felinos son más lentos y los pasos más pequeños.

PARA CERRAR

Cuándo pedir ayuda profesional

Las líneas que, cuando se cruzan, dejan de ser cosa de un libro

Ningún libro sustituye el juicio clínico de un veterinario que examina a tu mascota en persona. Este libro te da el mapa científico y el entrenamiento que puedes hacer en casa — pero hay líneas que, cuando se cruzan, señalan el momento de sumar a un profesional: tu veterinario de cabecera, un veterinario especialista en comportamiento (etólogo veterinario), o un educador certificado en métodos de refuerzo positivo.

- [ ] Los ejercicios de este libro, aplicados con consistencia durante tres o cuatro semanas, **no muestran ninguna mejora**.
- [ ] Hay **riesgo de autolesión, de fuga o de daño a terceros**.
- [ ] Sospechas **dolor físico** por debajo (capítulo 8) y todavía no lo has descartado.
- [ ] Tu mascota es mayor y muestra señales del acrónimo **DISHA** (capítulo 9).
- [ ] En gatos: **esfuerzos para orinar, sangre en la orina o idas y venidas al arenero sin resultado** — esto no espera, es urgencia.
- [ ] Tu propio bienestar como cuidadora se está viendo afectado de forma significativa — pedir ayuda también es cuidar el vínculo.

> *«El objetivo nunca fue un animal perfectamente obediente. Fue un animal que se siente seguro en el mundo que construimos para él.»*
>
> CIERRE DE HOGAR EN CALMA

Gracias por tomarte el tiempo de entender a tu mascota desde la ciencia, y no solo desde la frustración del momento. Cada pequeño ejercicio de este libro, repetido con paciencia, está reescribiendo —literalmente, a nivel de circuitos cerebrales— lo que su sistema nervioso espera del mundo. Eso es, ni más ni menos, lo que significa ayudar a alguien a sentirse en calma.

SOBRE LA AUTORA

Quién hay detrás de este libro

Me llamo Victoria, tengo 44 años, y Tremdora existe por una perra que se llamaba Paris.

No soy veterinaria. Soy una persona que llegó a todo esto por el camino largo: primero por amor a una perra, y después por una curiosidad que no se me fue nunca — la neurociencia y la psicología, que llevo años leyendo por gusto, antes de que tuvieran nada que ver con un proyecto.

Cuando Paris se hizo mayor, aprendí muchas cosas de ella. Pero aprendí también que había cosas que me habría gustado saber **antes**, y no después: que no estaba cansada, que le dolía. Que lo que yo leía como carácter era, muchas veces, un cuerpo o una cabeza pidiendo ayuda de la única forma que sabía. Nadie nos enseña a leer eso. Y no está bien que la única manera de aprenderlo sea tarde.

De ahí viene este libro, y de ahí viene Tremdora: de juntar lo que la ciencia ya sabe —que es muchísimo, y lleva más de un siglo publicado— con lo que una persona normal necesita el martes por la tarde, en su salón, con su animal delante. Sin dominación, sin castigo, sin trucos. Entender, cuidar, acompañar y celebrar: eso es todo lo que hacemos.

Nada de lo que vas a leer aquí es mío. Es de Lorenz, de Panksepp, de Gruen, de Grandin y de los demás. Lo único que he hecho yo es traducirlo, ordenarlo y ponerlo donde se pueda usar.

Victoria

Fundadora de Tremdora · por Paris

REFERENCIAS

Bibliografía y referentes citados

Para quien quiera ir a las fuentes

Pavlov, I. — Investigaciones sobre reflejos condicionados y la fisiología del aprendizaje asociativo (*Conditioned Reflexes*, 1927).

Skinner, B. F. — Fundador del análisis experimental de la conducta y del condicionamiento operante (*The Behavior of Organisms*, 1938; *Science and Human Behavior*, 1953).

Lorenz, K. — Fundador de la etología moderna; estudios sobre la impronta y el comportamiento instintivo (*King Solomon's Ring*, 1949; premio Nobel de Fisiología o Medicina, 1973).

Panksepp, J. — Fundador de la neurociencia afectiva; mapeo de los sistemas emocionales primarios de los mamíferos (*Affective Neuroscience*, 1998).

Horowitz, A. — Investigadora de cognición canina, Barnard College; divulgación del *umwelt* canino (*Inside of a Dog*, 2009).

Hare, B. — Cofundador del Centro de Cognición Canina de Duke University; hipótesis de la autodomesticación (*The Genius of Dogs*, 2013, con Vanessa Woods).

Gruen, M. — Veterinaria conductual, North Carolina State University; investigación sobre ansiedad clínica, dolor crónico y disfunción cognitiva en mascotas.

Grandin, T. — Científica en ciencia animal, Colorado State University; diseño de sistemas de manejo de bajo estrés y bienestar sensorial animal (*Animals in Translation*, 2005; *Animals Make Us Human*, 2009).

Este libro sintetiza y traduce en lenguaje práctico los hallazgos generales y ampliamente publicados de estos autores. No cita textos protegidos por derechos de autor ni sustituye la lectura de sus obras originales, que se recomienda a quien quiera profundizar.

LA SERIE COMPLETA

Los otros dos libros de Hogar en Calma

Funcionan solos, pero juntos acompañan mucho mejor

LIBRO 2

Diario de Bienestar

Un cuaderno de seguimiento diario: registro de estado de ánimo, disparadores observados, ejercicios realizados y notas de progreso. Diseñado para usarse junto a los capítulos y los programas de este libro — cada página tiene espacio para la escala de estrés y para las «victorias» de la semana.

LIBRO 3

Plan Práctico de 8 Semanas

La hoja de ruta día a día: ocho semanas progresivas que reparten los ejercicios de los programas A, B y C en una lista diaria clara, con el objetivo de cada semana y consejos para mantener el rumbo cuando aparecen los retrocesos.

Y TAMBIÉN EN TREMDORA

Edad Dorada

La guía completa del cuidado de la mascota mayor: el dolor que se disfraza de vejez, la nutrición cuando comer se vuelve difícil, la pérdida de audición y de vista, las enfermedades comunes, la adaptación de la casa y una escala de calidad de vida para usar en casa, mes a mes.

TREMDORA

Hogar en Calma

Ciencia, paciencia y un plan claro — todo lo que tu mascota necesita para sentirse segura, contigo o sin ti.

Entender · Cuidar · Acompañar · Celebrar

tremdora.com
@tremdora_pets