

09/12/2025

## Równanie przewodnictwa cieplnego

Podsumowując ubiegłe ćwiczenia, chciałem szczególną uwagę zwrócić na równanie przewodnictwa cieplnego. Podobne rozumowania pojawiają się dość często w fizyce, stąd wydaje mi się na miejscu uporządkowanie i ponowne przedstawienie rozwiązania z ćwiczeń.

Równanie różniczkowe w postaci;

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \operatorname{Lap}(u) \quad (1)$$

gdzie  $\operatorname{Lap}$  to operator Laplace'a, zaś  $k$  to dodatnia stała, nazywane jest równaniem przewodnictwa cieplnego, lub równaniem dyfuzji. Nazwy te sugerują fizyczne zastosowania: wówczas funkcję  $u$  interpretuje się jako odpowiednio temperaturę lub gęstość materii. Istotnie skupiając się na tej drugiej interpretacji można zauważyć, że dla ustalonej objętości  $V \subset \mathbb{R}^3$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_V u \, dV &= \int_V \frac{\partial u}{\partial t} dV \\ &= \int_V k \operatorname{Lap}(u) \, dV \\ &= k \int_V \operatorname{div}(\operatorname{grad}(u)) \, dV \\ &= k \int_{\partial V} \operatorname{grad}(u) \cdot d(\partial V) \end{aligned}$$

gdzie w ostatnim przejściu wykorzystaliśmy twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego. Co to równanie w praktyce oznacza? Po lewej stronie równania mamy zmianę materii zawartej w określonej objętości. Jak się domyślamy, materia taka nie może zostać spontanicznie stworzona/zniszczona - i dokładnie o tym mówi nam prawa strona równania. Całka powierzchniowa z gradientu gęstości jest bowiem niczym innym jak strumieniem materii przez tę powierzchnię. Zatem zmiana ilości materii w objętości jest powodowana przepływem.

Przechodząc do bardziej matematycznych zagadnień i skupiając się na treści zadania, oprócz samego równania, ograniczonego do jednego wymiaru, dostaliśmy również pewne warunki, które muszą zostać spełnione:

$$L > 0 \quad u(t, 0) = u(t, L) = 0 \quad u(0, x) = f(x)$$

Możemy myśleć o tych warunkach jako:

- ☛  $L$  jest długością metalowego pręta
- ☛  $u$  jest temperaturą w każdym jego punkcie w danej chwili
- ☛  $u(t, 0) = u(t, L) = 0$  oznacza, że interesuje nas wyłącznie temperatura pręta, a np. jego boki są umocowane w chłodnicy
- ☛  $u(0, x) = f(x)$  jest początkowym rozkładem temperatur, np.: nagrzaliśmy jeden fragment i chcemy zobaczyć, jak temperatura rozłoży się po pewnym czasie.

Przechodząc teraz do rozwiązywania, załóżmy że można je zapisać z rozdzieleniem zmiennych, tzn.:

$$u(t, x) = T(t) \cdot X(x)$$

Wówczas, stosując skróconą notację  $T = T(t)$ ,  $\dot{T} = \frac{d}{dt}T$ ,  $X = X(x)$ ,  $X' = \frac{d}{dx}X$ , otrzymamy:

$$\dot{T}X = kTX'' \implies \frac{\dot{T}}{T} = k\frac{X''}{X}$$

Prawa strona jest funkcją zależną wyłącznie od czasu, lewa - wyłącznie od położenia. Zatem aby takie funkcje były sobie tożsamościowo równe, muszą być one po prostu stałe, a wartość tę nazwijmy  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Otrzymujemy stąd zatem dwa równania różniczkowe (w których funkcje są uwarunkowane parametrem, stąd indeks):

$$\begin{aligned}\dot{T}_\lambda &= \lambda T_\lambda \implies T_\lambda(t) \propto e^{\lambda t} \\ X''_\lambda &= \frac{\lambda}{k} X_\lambda\end{aligned}$$

Zauważmy teraz, że warunki brzegowe wprowadzają pewne ograniczenia na  $\lambda$ . Skoro bowiem  $T_\lambda(t) \propto e^{\lambda t} \neq 0$  (ponieważ  $\lambda \in \mathbb{R}$ ), zatem musi zachodzić:

$$X_\lambda(0) = X_\lambda(L) = 0$$

Rozważmy teraz rozwiązania równania  $X''_\lambda = \frac{\lambda}{k}X_\lambda$  w zależności od parametru  $\lambda$ . Zauważmy, że stałe w rozwiązaniach należy traktować jako zależne od parametru.

☛  $\lambda > 0 \implies X_\lambda(x) = C_1(\lambda) \exp\left(\sqrt{\frac{\lambda}{k}}x\right) + C_2(\lambda) \exp\left(-\sqrt{\frac{\lambda}{k}}x\right)$ , a zatem:

$$\begin{aligned}\begin{cases} 0 = C_1(\lambda) + C_2(\lambda) \\ 0 = C_1(\lambda) \exp\left(\sqrt{\frac{\lambda}{k}}L\right) + C_2(\lambda) \exp\left(-\sqrt{\frac{\lambda}{k}}L\right) \end{cases} \\ \implies C_2(\lambda) = -C_1(\lambda) \\ \implies \exp\left(\sqrt{\frac{\lambda}{k}}L\right) = \exp\left(-\sqrt{\frac{\lambda}{k}}L\right) \quad \vee \quad C_1(\lambda > 0) = 0\end{aligned}$$

przy czym pierwsza możliwość jest spełniona wyłącznie, gdy  $L = 0$  (ponieważ eksponenta rzeczywista jest funkcją różnowartościową na całej swojej dziedzinie, w szczególności nie jest parzysta), zaś jest to sprzeczne z założeniem  $L > 0$ . Druga opcja daje z kolei rozwiązanie trywialne, którego nie można dopasować do warunku  $u(0, x) = f(x)$ . Stąd wnioskujemy, że  $\lambda$  nie może być parametrem dodatnim.

☛  $\lambda = 0 \implies X''_\lambda = 0 \implies X_\lambda(x) = c_1(\lambda)x + c_2(\lambda)$ . Podobnie,  $X_\lambda(0) = 0 \implies c_2(\lambda = 0) = 0$ ,  $X_\lambda(L) = c_1(\lambda)L = 0 \implies c_1(\lambda = 0) = 0$ .

☛ Pozostaje nam zatem ujemny parametr  $\lambda$ . Dla prostoty dalszego zapisu przyjmijmy  $\frac{\lambda}{k} = -\omega^2$ ,  $\omega > 0$ , poszukujemy warunku na  $\omega$ . Wówczas

$$X_\lambda(x) = C_1(\lambda) \cos(\omega x) + C_2(\lambda) \sin(\omega x)$$

Z' pierwszego warunku:

$$0 = X_\lambda(0) = C_1(\lambda)$$

Drugi warunek:

$$0 = X_\lambda(L) = C_2(\lambda) \sin(\omega L)$$

nie daje nam warunku na  $C_2(\lambda)$ , zaś na  $\omega$ , wiemy bowiem że

$$\sin(n\pi) = 0, \quad n \in \mathbb{Z}$$

stąd:

$$n\pi = \omega L \implies \sqrt{-\frac{\lambda}{k}} = \omega = \frac{n\pi}{L} \implies \lambda = -\frac{n^2\pi^2}{L^2}k$$

Teraz znowu, możemy ograniczyć trochę parametr  $n$ : po pierwsze, interesuje nas wyjściowo  $\lambda$ , która jest parzysta w  $n$ , zatem możemy ograniczyć się wyłącznie do nieujemnych  $n \in \mathbb{N}_0$ . Drugi aspekt, dla  $n = 0 \implies X_\lambda(x) = 0$ , również daje trywialne rozwiązanie, które możemy pominąć. Stąd  $n \in \mathbb{N}$ . Pracowanie na liczbach naturalnych jest łatwiejsze, więc zmienimy notację:

$$T_{\lambda(n)} \mapsto T_n$$

$$X_{\lambda(n)} \mapsto X_n$$

$$C_2(\lambda(n)) \mapsto C_n$$

**Fizyczne spostrzeżenie:** Choć rozważaliśmy czysto matematyczne powody, dla których  $\lambda$  musi przybierać ujemne wartości, w pewnych warunkach można nadać temu sens fizyczny. Skupmy się znowu na rozważeniu temperatury. Nawet jeśli układ został nagrzany nierówno, wiemy że będzie on dążył do stanu równowagi termodynamicznej, i uznajmy że przyjmujemy takie jednostki, aby stan równowagi odpowiadał  $u = 0$ . W tym kontekście, równanie czasowe, które otrzymaliśmy:

$$\frac{\dot{T}}{T} = \lambda$$

od razu sugeruje, że  $\lambda < 0$ . Pochodna musi mieć bowiem przeciwny znak do samej funkcji - jeśli temperatura jest za duża, otoczenie będzie przejmowało energię i temperatura maleje, czyli pochodna jest ujemna. Analogicznie w drugą stronę.

Ponieważ nasze oryginalne równanie różniczkowe jest liniowe, możemy wziąć dowolną liniową kombinację rozwiązań i otrzymać:

$$u(t, x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} C_n T_n(t) X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \exp\left(-\frac{n^2\pi^2}{L^2}kt\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

z odpowiednimi stałymi  $C_n$ , które pozwolą nam dopasować "temperaturę" do warunków początkowych:

$$f(x) = u(0, x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

które ewidentnie sugeruje powiązanie z szeregi Fouriera. Jeśli zatem funkcja  $f$  jest wystarczająco "dobra", tak aby powyższy szereg zbiegał do niej (prawie wszędzie<sup>1</sup>), wówczas korzystając z dotychczas wyznaczonych na wykładzie i ćwiczeniach wzorów otrzymamy:

$$C_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

co kończy wyprowadzanie wzoru z zadania.

---

<sup>1</sup>To jest matematyczne określenie mówiące, że pewne zbiory nas nie interesują. W "codziennym" użyciu, gdy nie jest zaznaczone inaczej lub gdy nie rozmawiacie z profesjonalnymi matematykami, prawie wszędzie oznacza prawie wszędzie według miary Lebesgue'a. Po prostu - nie interesują nas teraz pojedyncze punkty, zbiory przeliczalne itd.