

Procesy stochastyczne

Zestaw zadań nr 4

Definicja 1. Niech $\{\mathcal{F}_t\}_{t \in T}$ będzie filtracją. Momentem stopu (momentem Markowa, momentem zatrzymania) nazywamy zmienną losową $\tau: T \rightarrow [0, +\infty]$ taką, że $\forall t \in T \quad \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$. Domknięcie przeciwdziedziny w nieskończoności wyjątkowo nie jest literówką.

Definicja 2. Filtrację $\{\mathcal{F}_t\}_{t \in T}$ nazywamy prawostronnie ciągłą, jeżeli $\forall t \in T \quad \mathcal{F}_{t+} = \bigcap_{s>t} \mathcal{F}_s = \mathcal{F}_t$.

Definicja 3. Mówimy, że filtracja $\{\mathcal{F}_t\}_{t \in T}$ spełnia zwykłe (standardowe) warunki, jeżeli :

- jest prawostronnie ciągła,
- \mathcal{F}_0 zawiera wszystkie zbiory miary zero.

W dalszym ciągu rozważać będziemy tylko filtracje spełniające zwykłe warunki.

Definicja 4. Niech τ będzie momentem stopu względem filtracji $\{\mathcal{F}_t\}_{t \in T}$. σ -ciałem zdarzeń obserwowanych do chwili τ nazywamy zbiór

$$\mathcal{F}_\tau = \left\{ A \in \mathcal{F}_\infty = \bigcup_t \mathcal{F}_t : \forall t \quad A \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t \right\}$$

Zadanie 1. Udowodnij

- σ -ciało zdarzeń obserwowanych do chwili τ jest σ -ciałem,
- jeżeli $\sigma \leq \tau$, to $\mathcal{F}_\sigma \subset \mathcal{F}_\tau$,
- zmienna losowa τ jest \mathcal{F}_τ -mierzalna.

Zadanie 2. Niech T będzie przedziałem. Wykaż, że jeżeli τ jest momentem stopu, to $\{\tau < t\} \in \mathcal{F}_t$ dla dowolnego t .

Zadanie 3. Niech $T = [0, \infty)$ oraz niech τ będzie momentem stopu. Czy momentem stopu jest

- τ^2 ,
- $\tau - 1$,
- $\tau + 1$,
- $\tau + c$, $c > 0$,
- $\tau - c$, $c > 0$.

Zadanie 4. Niech $\{\tau_n\}$ będzie ciągiem momentów stopu. Udowodnij, że momentami stopu są również następujące zmienne losowe:

- $\sup_n \tau_n$,
- $\inf_n \tau_n$,
- $\liminf_n \tau_n$,
- $\limsup_n \tau_n$.

Zadanie 5. Niech $T = [0, \infty)$, a X_t procesem \mathcal{F}_t -adaptowanym o ciągłych trajektoriach. Wykaż, że dla A otwartego $\tau_A := \inf\{t: X_t \in A\}$ jest momentem zatrzymania względem \mathcal{F}_t .

Zadanie 6. Wykaż, że jeśli τ i σ są momentami zatrzymania, to zdarzenia $\{\tau < \sigma\}$, $\{\tau = \sigma\}$ i $\{\tau \leq \sigma\}$ należą do \mathcal{F}_τ , \mathcal{F}_σ i $\mathcal{F}_{\tau \wedge \sigma}$.

To be continued...