

射影空间

Guanyu Li

1 定义与基本概念

定义. 给定一个分次环 $S = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} S_n$, 令 $S_+ = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}^*} S_n$, 我们可以做构造 $\text{Proj } S$ 使得它成为一个概型: 其中它的底拓扑空间

$$|\text{Proj } S| := \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \text{ 是 } S \text{ 的齐次素理想且不包含 } S_+\},$$

称 $|\text{Proj } S|$ 中的理想为相关素理想 (relevant prime ideal), 对任意齐次理想 I ,

$$V(I) := \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \text{ 是相关素理想且 } I \subseteq \mathfrak{p}\}$$

是 $|\text{Proj } S|$ 中的闭集且 $|\text{Proj } S|$ 的拓扑完全由此给出; 最后要给出 $\text{Proj } S$ 的结构层 $\mathcal{O}_{\text{Proj } S}$, 取 S 中次数为正的一个齐次元素 f , 令开集

$$|D_+(f)| := |\text{Proj } S| - V(f),$$

作为集合 $|D_+(f)| \cong |\text{Proj } S[f^{-1}]|$, 同时后者和 $S[f^{-1}]$ 中所有的 0 次元素组成的环 $S[f^{-1}]_0$ 中的素理想一一对应, 即有双射

$$\varphi_f : |\text{Proj } S[f^{-1}]| \rightarrow |\text{Spec } S[f^{-1}]_0|$$

且它是连续的, 这样我们可以给 $|D_+(f)|$ 同于 $\text{Spec } S[f^{-1}]_0$ 的概型结构, 这样只要选取足够多的 f 使得 $|D_+(f)|$ 构成一个开覆盖即可 (后面的习题会给出这样一个开覆盖).

例 1. 考虑 $S := k[x_0, \dots, x_n]$, 其中对任意的 $1 \leq i \leq n$, $\deg x_i = 1$. 于是, x_0, \dots, x_n 生成的理想是 S_+ , 那么 $\{D(x_i)\}_{i=0, \dots, n}$ 构成了 $\text{Proj } S$ 的一个开覆盖.

例 2. 考虑 $S := k[x_0, \dots, x_3]/(x_1^3 - x_0^2 x_3, x_2^3 - x_0 x_3^2, x_1 x_2 - x_0 x_3)$,

引理 1.1. 设 S 是 \mathbb{Z} 分次的环, $f \in S$ 是阶数为正的元素, 且它的逆存在. 那么 $\text{Spec } S$ 中的相关素理想与 $\text{Spec } S_0$ 中的素理想一一对应.

证明. 记 $\text{Spec } S$ 中的齐次素理想的集合为 H , $\deg f = d$, 构造集合的映射

$$\begin{aligned}\varphi : H &\hookrightarrow |\text{Spec } S_0| : \psi \\ \mathfrak{p} &\mapsto \mathfrak{p} \cap S_0 \\ \sqrt{\mathfrak{q}S} &\mapsto \mathfrak{q}.\end{aligned}$$

由于 $\mathfrak{p} \cap S_0$ 是 \mathfrak{p} 在嵌入映射 $S_0 \hookrightarrow S$ 下的拉回, 故 φ 是良定义的.

另一方面, 由于 \mathfrak{q} 只包含阶数为 0 的元素, 因此 $\mathfrak{q}S$ 是齐次理想. 任取 $g \in \sqrt{\mathfrak{q}S}$, 它可以写成齐次元素的和

$$g = \sum_{i=1}^n g_i,$$

满足 $\deg g_1 < \deg g_2 < \cdots < \deg g_n$, 由于 $\deg f > 0$, 存在正整数 m 使得 $\deg(f^m g_1) \geq 0$. 同时, $f^m g \in \sqrt{\mathfrak{q}S}$ 意味着存在整数 N 使得

$$(f^m g)^N = \left(f^m \sum_{i=1}^n g_i \right)^N = f^{mN} g_n^N + \text{其他低阶项} \in \mathfrak{q}S.$$

但 $\mathfrak{q}S$ 是齐次理想, 因此 $f^{mN} g_n^N \in \mathfrak{q}S$, 进而

$$\left(\frac{f^{mNd} g_n^{Nd}}{f^{mNd+N \deg g_n}} \right) \in \mathfrak{q}S \cap S_0 = \mathfrak{q}.$$

由于 \mathfrak{q} 是素理想, $\left(\frac{g_n^d}{f^{\deg g_n}} \right)^N \in \mathfrak{q}$ 意味着 $\frac{g_n^d}{f^{\deg g_n}} \in \mathfrak{q}$, 故 $g_n^d \in \mathfrak{q}S$, 即

$$g_n \in \sqrt{\mathfrak{q}S}.$$

这样 $g - g_n \in \sqrt{\mathfrak{q}S}$, 于是归纳地可证明 $g_i \in \sqrt{\mathfrak{q}S}$, 因此 $\sqrt{\mathfrak{q}S}$ 是齐次的.

再证明 $\sqrt{\mathfrak{q}S} \cap S_0 = \mathfrak{q}$. 显然 $\mathfrak{q} \subseteq \sqrt{\mathfrak{q}S} \cap S_0$. 对任意 $g \in \sqrt{\mathfrak{q}S} \cap S_0$, 存在正整数 M 使得 $g^M \in \mathfrak{q}S$, 阶数计算说明 $g^M \in \mathfrak{q}S \cap S_0 = \mathfrak{q}$, 再根据 \mathfrak{q} 的素性 $g \in \mathfrak{q}$, 因此 $\sqrt{\mathfrak{q}S} \cap S_0 \subseteq \mathfrak{q}$.

若 $a = \sum_{i=1}^m a_i, b = \sum_{j=1}^n b_j$ 满足 $ab \in \sqrt{\mathfrak{q}S}$, 那么由刚刚的证明 $a_n b_m \in \sqrt{\mathfrak{q}S}$, 由于 a_n, b_m 都是齐次元素, 故

$$\frac{a_n^d}{f^{\deg a_n}} \frac{b_m^d}{f^{\deg b_m}} = \frac{a_n^d b_m^d}{f^{\deg a_n + \deg b_m}} \in \sqrt{\mathfrak{q}S} \cap S_0 = \mathfrak{q},$$

再次由于 \mathfrak{q} 是素理想, $\frac{a_n^d}{f^{\deg a_n}} \in \mathfrak{q}$ 或 $\frac{b_m^d}{f^{\deg b_m}} \in \mathfrak{q}$, 于是 $a_n \in \sqrt{\mathfrak{q}S}$ 或 $b_m \in \sqrt{\mathfrak{q}S}$, 归纳可以得到 $\sqrt{\mathfrak{q}S}$ 是素理想, 而它不包含 f , 因此是相关素理想, 故 ψ 也是良定义的.

之前证明了 $\psi \circ \varphi(\mathfrak{q}) = \sqrt{\mathfrak{q}S} \cap S_0 = \mathfrak{q}$, 于是, 只需要再证明 $\varphi \circ \psi = \text{id}$. 显然 $(\mathfrak{p} \cap S_0)S \subseteq \mathfrak{p}$, 因此 $\sqrt{(\mathfrak{p} \cap S_0)S} \subseteq \mathfrak{p}$. 反过来任取 \mathfrak{p} 中的齐次元素 a , $\frac{a^d}{f^{\deg a}} \in \mathfrak{p} \cap S_0$, 因此 $a^d \in (\mathfrak{p} \cap S_0)S$, 即 $a \in \sqrt{(\mathfrak{p} \cap S_0)S}$, 这意味着 $\mathfrak{p} \subseteq \sqrt{(\mathfrak{p} \cap S_0)S}$. \square

习题 1.1. 1. 验证所有的 $V(I)$ 构成闭集.

2. 验证集合的双射 $\varphi_f : |\text{Proj } S[f^{-1}]| \rightarrow |\text{Spec } S[f^{-1}]_0|$ 及它是同胚.

3. 验证若 S_+ 中由齐次元素组成的子集 T 满足它生成理想的根理想 $\sqrt{\langle T \rangle} = S_+$, 那么

$$\{D(f) \mid f \in T\}$$

构成 $\text{Proj } S$ 的一组开覆盖.

4. 验证

$$D_+(f) \cap D_+(g) = D_+(fg) = D_+(f^m g^n),$$

其中 $m, n \in \mathbb{N}^*$.

5. 证明

$$(S[f^{-1}][(g/f)^{-1}])_0 \cong S[f^{-1}]_0[(g^{\deg f}/f^{\deg g})^{-1}] \cong S[f^{-1}, g^{-1}]_0.$$

说明以上的验证了之前的定义给出了一个概型.

证明. 1. 一方面, 若 $\mathfrak{p} \in V(I) \cup V(J)$, 那么相关素理想 \mathfrak{p} 满足 $I \subseteq \mathfrak{p}$ 或 $J \subseteq \mathfrak{p}$, 不妨设前者成立, 于是 $I \cap J \subseteq I \subseteq \mathfrak{p}$, $\mathfrak{p} \in V(I \cap J)$. 另一方面若 $\mathfrak{p} \in V(I \cap J)$, 则由交换代数 $I \subseteq \mathfrak{p}$ 或 $J \subseteq \mathfrak{p}$, 因此 $\mathfrak{p} \in V(I) \cup V(J)$.

再考虑 $\mathfrak{p} \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} V(I_\lambda)$, 那么 $I_\lambda \subseteq \mathfrak{p}$ 对所有 $\lambda \in \Lambda$ 成立, 因此 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} V(I_\lambda) \subseteq V(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda)$. 反过来若 $\mathfrak{p} \in V(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda)$, 那么 $I_\lambda \subseteq \bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \subseteq \mathfrak{p}$, 因此 $\mathfrak{p} \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} V(I_\lambda)$.

2. 构造

$$\begin{aligned} \varphi_f : |\mathrm{Proj} S[f^{-1}]| &\hookrightarrow |\mathrm{Spec} S[f^{-1}]_0| : \psi_f \\ \mathfrak{p} &\mapsto \mathfrak{p} \cap S[f^{-1}]_0 \\ \sqrt{\mathfrak{q}S[f^{-1}]} &\hookleftarrow \mathfrak{q}, \end{aligned}$$

引理 1.1 说明二者是双射, 于是只要验证二者连续即可. 若 J 是 $S[f^{-1}]_0$ 的理想, 那么

$$\begin{aligned} \psi_f(V(J)) &= \psi_f(\{\mathfrak{q} \mid \mathfrak{q} \supseteq J\}) \\ &= \{\sqrt{\mathfrak{q}S[f^{-1}]} \mid \mathfrak{q} \supseteq J\}, \end{aligned}$$

显然 $JS[f^{-1}] \subseteq \sqrt{\mathfrak{q}S[f^{-1}]}$, 于是 $\psi_f(V(J)) \subseteq V(JS[f^{-1}]) = V(\sqrt{JS[f^{-1}]})$; 反过来, 若 $\mathfrak{p} \in V(\sqrt{JS[f^{-1}]})$, 那么

$$\mathfrak{p} = \psi_f(\varphi_f(\mathfrak{p})),$$

因此 $\psi_f(V(J)) = V(JS[f^{-1}])$, 这样 φ_f 是连续的.

另一方面, 对 $|\mathrm{Proj} S[f^{-1}]|$ 中的闭集 $V(I) \cap |\mathrm{Proj} S[f^{-1}]|$,

$$\begin{aligned} \varphi_f(V(I) \cap |\mathrm{Proj} S[f^{-1}]|) &= \{\mathfrak{p} \cap S_0 \mid \mathfrak{p} \in V(I) \cap |\mathrm{Proj} S[f^{-1}]|\} \\ &\subseteq V(I \cap S_0), \end{aligned}$$

而且对任意 $\mathfrak{q} \in V(I \cap S_0)$,

$$\mathfrak{q} = \varphi_f(\psi_f(\mathfrak{q})),$$

因此 $\varphi_f(V(J)) = V(I \cap S_0)$, 这样 ψ_f 是连续的.

3. 任取 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Proj} S$, 由定义存在 $f \in S_+$ 使得 $f \notin \mathfrak{p}$, 由于 S 是分次环,

$$f = (f_1 + \cdots + f_n)^N,$$

使得每个 $f_i \in T$ 都是齐次的. 这样一定存在 i_0 使得 $f_{i_0} \notin \mathfrak{p}$, 因此 $\mathfrak{p} \in D_+(f_{i_0})$.

4. 若 $\mathfrak{p} \in D_+(fg)$, 那么 $fg \notin \mathfrak{p}$, 显然 $f \notin \mathfrak{p}$ 且 $g \notin \mathfrak{p}$, 所以 $D_+(fg) \subseteq D_+(f) \cap D_+(g)$. 反过来, 若 $\mathfrak{p} \in D_+(f) \cap D_+(g)$, 按定义 $f \notin \mathfrak{p}$ 且 $g \notin \mathfrak{p}$, 因为 \mathfrak{p} 是素理想, 故 $D_+(f) \cap D_+(g) \subseteq D_+(fg)$, 这意味着 $D_+(f) \cap D_+(g) = D_+(fg)$. 同样根据 \mathfrak{p} 是素理想, $D_+(fg) = D_+(f^m g^n)$.

5. 构造

$$\begin{aligned} \varphi : S[f^{-1}][(g/f)^{-1}] &\hookrightarrow S[f^{-1}, g^{-1}] : \psi \\ \frac{\frac{r}{f^n}}{(g/f)^m} &\mapsto \frac{r}{f^{n-m} g^m} \\ \frac{\frac{r}{f^{n+m}}}{(g/f)^m} &\mapsto \frac{r}{f^n g^m}, \end{aligned}$$

显然二者是良定义的, 它们是齐次环同态, 且互为逆映射. 于是, $S[f^{-1}, g^{-1}]_0 \cong (S[f^{-1}][(g/f)^{-1}])_0$. 若齐次元素

$$\frac{r}{f^n g^m} \in S[f^{-1}, g^{-1}]$$

满足 $\deg \frac{r}{f^n g^m} = 0$, 那么由定义

$$\deg r = m \deg g + n \deg f.$$

同时,

$$\frac{r}{f^n g^m} = \frac{g^{m \deg f - m} f^{m \deg g}}{g^{m \deg f - m} f^{m \deg g}} \frac{r}{f^n g^m} = \left(\frac{f^{\deg g}}{g^{\deg f}} \right)^m \frac{g^{m \deg f - m} r}{f^{n+m \deg g}},$$

且 $\deg \left(\frac{f^{\deg g}}{g^{\deg f}} \right)^m \frac{g^{m \deg f - m} r}{f^{n+m \deg g}} = \deg \frac{g^{m \deg f - m} r}{f^{n+m \deg g}} = \deg r + \deg g(m \deg f - m) - \deg f(n + m \deg g) = 0$. 这意味着 $S[f^{-1}, g^{-1}]_0 = S[f^{-1}]_0[(g^{\deg f} / f^{\deg g})^{-1}]$, 得证.

以上的验证中, 前三条说明了存在一个仿射的开覆盖, 第四条说明开覆盖当中两个的交集是什么样的——它也是开覆盖中的一个, 因此可以用前面的方式得到上面的层结构——第五条证明了层结构的相容性. 这样, $\text{Proj } S$ 是一个概型. \square

引理 1.2.

命题 1.1. 设 k 是域, $S = k[x_0, \dots, x_n]$, 那么 $\text{Proj } S = \mathbb{P}_k^n$.

证明. \square

习题 1.2. 证明 \mathbb{P}_R^r 是开集 \mathbb{A}_R^r 和闭集 \mathbb{P}_R^{r-1} 的不交并.

命题 1.2. 设 R 是交换环, $S = R[x_0, \dots, x_n]$, 那么态射 $\text{Proj } S \rightarrow \text{Spec } R$ 是正规的.

习题 1.3. 分类所有的态射

$$\text{Spec } \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^1.$$

习题 1.4. 设 S 是分次交换环, 对任意正整数 d , 定义 S 的第 d 个 Veronese 子环为

$$S^{(d)} := \bigoplus_{n \geq 0} S_{dn}.$$

1. 证明 $\text{Proj } S \cong \text{Proj } S^{(d)}$.
2. 证明若 $S = R[x, y]$, 作为分次环 (甚至只作为环) S 与 $S^{(d)}$ 不同构.

2 射影空间上的层

定义. 给定分次环 S 和分次 S 模 M , 如下构造给出 \tilde{M}

3 射影空间的闭子概型

命题 3.1. 设 I 是分次交换环 S 的齐次理想, 那么存在集合的包含

$$|\text{Proj } S/I| \subseteq |\text{Proj } S|,$$

并且子集 $|\text{Proj } S/I|$ 与任意仿射开集 $(\text{Proj } S)_f$ 的交都是 $(\text{Proj } S)_f$ 中的闭集, 并且交集对应的子概型同构于 $(\text{Proj } S/I)_f$. 因此 $\text{Proj } S/I$ 可看作 $\text{Proj } S$ 的闭子概型.

证明. □

4 全局 Proj 构造

定理 4.1. 设 k 是域, S 是 k 概型, 那么存在如下的 1-1 对应

$$\{(\mathcal{L}, s_0, \dots, s_n) \mid \mathcal{L} \in \text{Pic}(S), s_i \in H^0(S, \mathcal{L}) \text{ 生成 } \mathcal{L}\} / \sim \leftrightarrow \text{hom}_k(S, \mathbb{P}^n),$$

其中左边的等价关系 $(\mathcal{L}, s_0, \dots, s_n) \sim (\mathcal{M}, t_0, \dots, t_n)$ 定义为存在同构 $\varphi: \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{M}$ 使得 $t_i = \varphi(s_i)$. 给定 $(\mathcal{L}, s_0, \dots, s_n)$, 那么它对应的态射是 $f: S \rightarrow \mathbb{P}^n, P \mapsto [s_0(P), \dots, s_n(P)]$, 反过来给定一个态射 $f: S \rightarrow \mathbb{P}^n$, 取 $\mathcal{L} := f^* \mathcal{O}(1)$, $s_i := f^*(x_i)$.

5 切空间和切锥

例 3. 我们尝试分类 \mathbb{P}_k^1 上的所有线丛.