

# 同调代数



# 第一章 导出函子

定义. 给定加性范畴 $\mathcal{A}$ 中的一族对象及态射

$$X^\bullet : \cdots \xrightarrow{d^{n-1}} X^n \xrightarrow{d^n} X^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} \cdots$$

满足 $d^n \circ d^{n-1} = 0$ 对任意 $n$ 都成立, 则称 $(X^\bullet, d^\bullet)$ 是 $\mathcal{A}$ 中的一个上链(cochain).

对偶地, 我们也有加性范畴 $\mathcal{A}$ 中的链(chain)的概念.



## 第二章 导出范畴

### 2.1

**定理2.1.1.** 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴， $U$ 是其中的一族态射，则存在同构下唯一的范畴 $\mathcal{C}[U^{-1}]$ 和函子 $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[U^{-1}]$ ，使得 $U$ 中所有的态射都被 $Q$ 映到 $\mathcal{C}[U^{-1}]$ 中的同构，且满足如下泛性质：对任意范畴 $\mathcal{D}$ 和任意函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ ，若 $F$ 将 $U$ 中所有的态射映到 $\mathcal{D}$ 中的同构，则有唯一的分解

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{Q} & \mathcal{C}[U^{-1}] \\ & \searrow F & \downarrow \tilde{F} \\ & & \mathcal{D}. \end{array}$$

我们称范畴 $\mathcal{C}[U^{-1}]$ 为 $\mathcal{C}$ 局部化(localization).

这里需要注意，因为范畴中的一族态射 $U$ 可以取得非常不理想，因此局部化之后的范畴可能并非再是局部小的.但这里我们忽略这样的问题，我们假定（虽然并不真实，但相较于主要问题，范畴本身的问题需要在其他的地方讨论）我们还是得到想要的范畴。

**定义.** 设 $U$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的一族态射，满足如下条件：

1. 对任意 $\mathcal{C}$ 中的对象 $A$ ， $\text{id}_A \in U$ ，且 $U$ 关于态射的复合封闭，
2. (扩张条件)对任意 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f : A \rightarrow B$ 和 $U$ 中的态射 $u : C \rightarrow B$ ，存在 $\mathcal{C}$ 中的态射 $g : D \rightarrow C$ 和 $U$ 中的态射 $v : D \rightarrow A$ 使得

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{g} & C \\ v \downarrow & & \downarrow u \\ A & \xrightarrow{f} & B. \end{array}$$

对偶地，对任意 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f : B \rightarrow A$ 和 $U$ 中的态射 $u : B \rightarrow C$ ，存在 $\mathcal{C}$ 中的态射 $g : C \rightarrow D$ 和 $U$ 中的态射 $v : A \rightarrow D$ 使得

$$\begin{array}{ccc} D & \xleftarrow{g} & C \\ \uparrow v & & \uparrow u \\ A & \xleftarrow{f} & B, \end{array}$$

3. 对任意 $C$ 中的态射 $f, g : A \rightrightarrows B$ , 存在 $u \in U$ 使得 $uf = ug$ 当且仅当存在 $v \in U$ 使得 $fv = gv$ , 则称这一族态射 $U$ 是局部的(localizing).

我们大费周章地考虑对求逆态射的限制条件, 重要的是当态射族 $U$ 满足这些条件时, 局部化范畴中的态射时非常容易描述的:

**引理2.1.1.** 设 $U$ 是范畴 $C$ 中的一族局部态射, 那么 $C[U^{-1}]$ 可以被如下地描述:  $C[U^{-1}]$ 的对象同于 $C$ 中的对象,  $A \rightarrow B$ 的态射可以被描述为如下的图的等价类:

$$\begin{array}{ccc} & D & \\ u \swarrow & & \searrow f \\ A & & B, \end{array}$$

其中,  $u \in U$ ,  $f : D \rightarrow B$ 是任意 $C$ 中的态射, 记为 $\frac{f}{u}$ . 且 $\frac{f}{u}$ 等价于 $\frac{g}{v}$ 当且仅当存在 $\frac{h}{w}$ 使得如下图交换最后, 根据定义中的扩张条件,  $\frac{f}{u} : A \rightarrow B$ 与 $\frac{g}{v} : B \rightarrow C$ 的复合是

但是, 我们希望研究的情形非常不幸地不满足这些局部的条件: 对于Abel范畴 $\mathcal{A}$ 的上链复形范畴 $\text{Com}^\bullet(\mathcal{A})$ , 拟同构不是局部的.

**命题2.1.2.** 设 $U$ 是范畴 $C$ 中的一族局部态射,  $\mathcal{D}$ 是 $C$ 的满子范畴, 如果 $U_{\mathcal{D}} := U \cap \text{mor } \mathcal{D}$ 是 $\mathcal{D}$ 的局部态射, 且如下的条件满足一条

1. 对任意 $U$ 中的态射 $u : C \rightarrow D$ , 若 $D \in \text{ob } \mathcal{D}$ , 则一定存在 $B \in \text{ob } \mathcal{D}$ 和态射 $f : B \rightarrow C$ 使得 $u \circ f \in U$ ,
- 2.

那么 $\mathcal{D}[U_{\mathcal{D}}^{-1}] \hookrightarrow C[U^{-1}]$ 是一个满忠实的嵌入.

## 2.2

给定Abel范畴 $\mathcal{A}$ , 且设 $X^\bullet = (X^n, d_X^n) \in \text{Com}^\bullet(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 中对象组成的复形, 那么我们可以定义一个新的复形 $X[n]^\bullet$ , 满足 $(X[n])^i = X^{n+i}$ ,  $d_{X[n]}^i = (-1)^n d_X^{n+i} : (X[n])^i \rightarrow (X[n])^{i+1}$ . 若 $f : X^\bullet \rightarrow Y^\bullet$ 是一个链同态, 则我们有诱导的链同态 $f[n] : X[n]^\bullet \rightarrow Y[n]^\bullet$ , 满足 $f[n]^i = f^{n+i} : (X[n])^i \rightarrow (Y[n])^i$ .

我们称 $[1]$ 为平移函子(translation by 1 functor), 它是拓扑中 $- \times [0, 1]$ 的类比. 之后这个函子将给出了????上的一个三角结构(triangulated structure).

**定义.** 给定Abel范畴 $\mathcal{A}$ 的一个链同态 $f : X^\bullet \rightarrow Y^\bullet$ , 那么 $f$ 的映射锥(mapping cone)是 $\mathcal{A}$ 中对象组成的一个链 $\text{Cone}(f)^\bullet$ 满足

$$\text{Cone}(f)^i := X[1]^i \oplus Y^i$$

和

$$d_{\text{Cone}(f)}^i := \begin{pmatrix} d_{X[1]}^i & 0 \\ f[1]^i & d_Y^i \end{pmatrix}.$$

类似地我们可以定义 $f$ 的映射柱(mapping cylinder), 它是 $\mathcal{A}$ 中对象组成的一个链 $\text{Cyl}(f)^\bullet := X^\bullet \oplus X[1]^\bullet \oplus Y^\bullet$ , 其中

$$d_{\text{Cyl}(f)}^i := \begin{pmatrix} d_X^i & -\text{id}_{X[1]} & 0 \\ 0 & -d_{X[1]}^i & 0 \\ 0 & f[1]^i & d_Y^i \end{pmatrix}.$$

我们这样的定义很明显是合理的, 它们都是

**引理2.2.1.** 任给定

## 2.3

**引理2.3.1.** 设 $\mathcal{A}$ 是Abel范畴,  $D(\mathcal{A}) := \text{Com}^\bullet(\mathcal{A})[Qiso^{-1}]$ , 且设 $Q : \text{Com}^\bullet(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 是局部化函子. 求证若 $f : X^\bullet \rightarrow X^\bullet$ 链同伦与 $\text{id}_X$ , 那么在 $D(\mathcal{A})$ 中 $Q(f) = \text{id}_X$ .

*Proof.* 我们先假定如下事实:

□

**定理2.3.1.**





## 第三章 谱序列

### 3.1 双复形和全复形

定义. 分次模/分次对象

定义. 设  $M, N$  是分次  $R$  模, 若  $R$  模态射  $f : M \rightarrow N$  满足存在整数  $d$ , 使得对任意  $n \in \mathbb{Z}$  都有  $f : M_n \rightarrow N_{n+k}$ , 则称  $f$  是阶数为  $k$  的分次映射(graded map of degree  $k$ ).

命题3.1.1. 若  $M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P$  分别是阶数为  $k, l$  的分次映射, 则  $g \circ f$  是阶数为  $k + l$  的分次映射.

定义. 一个双分次模(bigraded module)是一族有两个指标的  $R$  模

$$M := \{M_{p,q}\}_{(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}},$$

一般我们记为  $M_{\bullet,\bullet}$ . 若  $M, N$  是双分次模, 一族映射

$$f = \{f_{p,q} : M_{p,q} \rightarrow N_{p+k,q+l}\}_{(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$$


若都是  $R$  模映射, 则称  $f$  是阶数为  $(k, l)$  的双分次映射.

接下来我们都用上同调的序号记号.

定义. 设  $M$  是双分次  $R$  模,  $d_I, d_{II}$  是两个阶数分别为  $(1, 0)$  和  $(0, 1)$  的双分次微分映射 (即  $d_I^{p+1,q} \circ d_I^{p,q} = 0$ ,  $d_{II}^{p,q+1} \circ d_{II}^{p,q} = 0$ ). 若映射满足

$$d_I^{p,q+1} \circ d_{II}^{p,q} + d_{II}^{p+1,q} \circ d_I^{p,q} = 0,$$

则称 $(M, d_I, d_{II})$ 是一个**双复形**(bicomplex).



**例1.** 设 $M$ 是双分次 $R$ 模,  $d_I, \delta$ 是两个阶数分别为 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 的双分次微分映射, 使得 $M$ 是一个交换图 (注意这和双复形差了一个符号!), 那么我们可以通过符号变换构造一个双复形. 令 $d_{II}^{p,q} = (-1)^p \delta^{p,q}$ , 那么

$$d_I^{p,q+1} \circ d_{II}^{p,q} + d_{II}^{p+1,q} \circ d_I^{p,q} =$$


**定义.** 设 $M$ 是双分次 $R$ 模, 那么

$$\text{Tot}(M)^n := \bigoplus_{p+q=n} M^{p,q}$$

和 $D^n : \text{Tot}(M)^n \rightarrow \text{Tot}(M)^{n+1}$ ,

$$D^n := \sum_{p+q=n} (d_I^{p,q} + d_{II}^{p,q})$$

称为 $M$ 的全复形(total complex).



**引理3.1.1.** 若 $M$ 是双复形, 则 $(\text{Tot}(M), D)$ 是复形.

很多时候, 我们关心的上同调问题是某个双复形的全复形的上同调群, 而谱序列就是一种计算全复形上同调群的某种技巧.

**例2.** 设 $M$ 是双分次 $R$ 模,  $(M, d_I, d_{II})$ 是一个双复形, 那么我们可以定义双复形的转置 $M^T$ : 这意味着

$$\text{Tot}(M) = \text{Tot}(M^T).$$

## 3.2 滤子和正合对

**定义.** 设 $\mathcal{A}$ 是Abel范畴,  $X$ 是 $\mathcal{A}$ 中的对象, 则 $X$ 的一个递降滤子(descending filtration)是一族 $X$ 的子对象 $\{F^n X\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 满足


$$0 \subseteq \cdots \subseteq F^{n+1} X \subseteq F^n X \subseteq \cdots X.$$

**定义.** 设 $M$ 是双分次 $R$ 模,  $(M, d_I, d_{II})$ 是一个双复形, 那么称


$$({}^I F^p \text{Tot}(M))^n := \bigoplus_{i \geq p} M^{i, n-i} = \cdots \oplus M^{p+2, q-2} \oplus M^{p+1, q-1} \oplus M^{p, q}$$

为 $\text{Tot}(M)$ 的第一滤子(the first filtration), 称

$$({}^{II} F^p \text{Tot}(M))^n := \bigoplus_{j \geq p} M^{n-j, j} = \cdots \oplus M^{p-2, q+2} \oplus M^{p-1, q+1} \oplus M^{p, q}$$



(a) 第一滤子



(b) 第二滤子

为 $\text{Tot}(M)$ 的第二滤子(the second filtration).

定义. 设 $\mathcal{A}$ 是Abel范畴,  $D, E$ 是 $\mathcal{A}$ 中的双分次对象,  $f, g, h$ 是双分次映射, 若

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{f} & D \\ & \nwarrow h & \nearrow g \\ & E & \end{array}$$

是正合的, 那么称 $(D, E, f, g, h)$ 是正合对(exact couple).

定理3.2.1. 每一个Abel范畴 $\mathcal{A}$ 中的上链 $X^\bullet$ 的滤子 $F^p X^\bullet$ 都给出一个正合对

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{f(-1, 1)} & D \\ & \nwarrow h(1, 0) & \nearrow g(0, 0) \\ & E, & \end{array}$$

其中映射的度在图中已经标出.

*Proof.* 我们有复形的短正合列

$$0 \rightarrow F^{p+1}X^\bullet \xrightarrow{i^{p+1}} F^pX^\bullet \xrightarrow{\pi^p} F^pX^\bullet/F^{p+1}X^\bullet \rightarrow 0,$$

这诱导了上同调群的长正合序列

$$\begin{aligned} \dots \rightarrow H^n(F^{p+1}X^\bullet) &\xrightarrow{H^n(i^{p+1})} H^n(F^pX^\bullet) \xrightarrow{H^n(\pi^p)} H^n(F^pX^\bullet/F^{p+1}X^\bullet) \rightarrow \\ &\xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(F^{p+1}X^\bullet) \xrightarrow{H^{n+1}(i^{p+1})} H^{n+1}(F^pX^\bullet) \xrightarrow{H^{n+1}(\pi^p)} H^{n+1}(F^pX^\bullet/F^{p+1}X^\bullet) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

我们取  $n = p + q$ ,  $f = H^\bullet(i^{p+1})$ ,  $g = H^\bullet(\pi^p)$ ,  $h = \delta^\bullet$ , 并且

$$\begin{aligned} D &= \{D^{p,q} := H^{p+q}(F^pX^\bullet)\} \\ E &= \{E^{p,q} := H^{p+q}(F^pX^\bullet/F^{p+1}X^\bullet)\} \end{aligned}$$

代入到长正合序列中即为

$$\dots \rightarrow D^{p+1,q-1} \xrightarrow{f^{p+1,q-1}} D^{p,q} \xrightarrow{g^{p,q}} E^{p,q} \xrightarrow{h^{p,q}} D^{p+1,q} \rightarrow \dots$$

□

**定义.** 设  $\mathcal{A}$  是 Abel 范畴,  $X$  是  $\mathcal{A}$  中的双分次对象,  $d$  是双分次映射满足  $d \circ d = 0$ , 则称  $(X, d)$  是微分双分次对象(differential bigraded object).

若  $(X, d)$  是微分双分次对象,  $d$  的阶数为  $(k, l)$ , 那么定义  $(X, d)$  的上同调为

$$H(X, d)^{p,q} := \frac{\ker d^{p,q}}{\operatorname{im} d^{p-k,q-l}}.$$

**定理3.2.2.** 若  $(D, E, f, g, h)$  是 Abel 范畴  $\mathcal{A}$  上的一个正合对, 那么  $d := h \circ g : E \rightarrow E$  给出  $\mathcal{A}$  上的一个微分双分次对象  $(E, d)$ , 且存在一个新的正合对  $(D_2, E_2, f_2, g_2, h_2)$

$$\begin{array}{ccc} D_2 & \xrightarrow{f_2} & D_2 \\ & \swarrow h_2 & \searrow g_2 \\ & E_2 & \end{array}$$

满足  $E_2 = H(E, d)$ , 称为导出对(derived couple).

*Proof.* 首先我们验证微分. 按照定义,  $d \circ d = (h \circ g) \circ (h \circ g) = h \circ (g \circ h) \circ g = h \circ 0 \circ g = 0$ .

按照条件定义  $E_2 = H(E, d)$ , 定义

$$D_2 := \operatorname{Im} f,$$

且  $f_2 := f|_{D_2} = f \circ \iota$ , 其中  $\iota : D_2 \rightarrow D$  是嵌入.

□

**推论3.2.2.1.** 每一个Abel范畴 $\mathcal{A}$ 中的上链 $X^\bullet$ 的滤子 $F^p X^\bullet$ 都给出一族正合对

$$\begin{array}{ccc} D_r & \xrightarrow{f_r(1, -1)} & D_r \\ & \nwarrow h_r(-1, 2) \quad \nearrow g_r(1-r, r-1) & \\ & E_r & \end{array}$$

且满足

1. 双分次映射 $f_r, g_r, h_r$ 的度分别为 $(1, -1), (1-r, r-1)$ 和 $(-1, 2)$ .
2. 微分 $d_r$ 的度为 $(0, 0)$ , 它由 $hf_{-r+1}g$ 诱导.

**定义.** 设 $\mathcal{A}$ 是Abel范畴,  $\mathcal{A}$ 上的谱序列 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ 是一族 $\mathcal{A}$ 中的对象和态射的全体 $E = (E_r^{p,q}, d_r^{p,q})$ , 满足

1. 态射 $d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$ 定义在第 $r$ 页, 且是微分映射, 即 $d_r^{p+r, q-r+1} \circ d_r^{p,q} = 0$ .
2. 有同构

$$H^{p,q}(E_r) := \frac{\text{Ker } d_r^{p,q}}{\text{Im } d_r^{p+r, q-r+1}} \cong E_{r+1}^{p,q}.$$

### 3.3 收敛性

**定义.** 设 $\mathcal{A}$ 是Abel范畴,  $X$ 是 $\mathcal{A}$ 的对象,  $Y$ 是 $X$ 的子对象,  $Z$ 是 $Y$ 的子对象, 则 $Y/Z$ 称为 $X$ 的一个子商(subquotient).

若 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ 是谱序列, 那么 $E_2 = H(E_2, d_2)$ 是 $E_1$ 的子商:  $E_2 := Z_2/B_2$ . 同理我们知道 $E_3$ 是 $E_2$ 的子商, 且

$$B_1 \subseteq B_2 \subseteq \cdots \subseteq B_r \subseteq \cdots \subseteq Z_r \subseteq Z_2 \subseteq Z_1 \subseteq E_1.$$

**定义.** 给定谱序列 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ , 定义 $Z_\infty := \bigcap_{r \geq 1} Z_r$ ,  $B_\infty := \bigcup_{r \geq 1} B_r$ , 则谱序列的极限项(limit term)为

$$E_\infty^{p,q} := \frac{Z_\infty^{p,q}}{B_\infty^{p,q}}.$$

借用MacLane的描述,  $Z^r$ 是出现到第 $r$ 页的对象,  $B^r$ 是被第 $r$ 页限制的对象, 而 $Z^\infty$ 和 $B^\infty$ 是一直出现和最终被限制的对象.

**引理3.3.1.** 设  $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$  是谱序列, 那么

1.  $E_{r+1} = E_r$  当且仅当  $Z_{r+1} = Z_r, B_{r+1} = B_r$ .
2. 若存在  $s$  使得对任意  $r \geq s$  都有  $E_{r+1} = E_r$ , 则  $E_\infty = E_s$ .

考虑  $\mathcal{A}$  中上链  $X^\bullet$  的一个滤子  $F^p X^\bullet$ , 于是我们有单同态  $i^p : F^p X^\bullet \rightarrow X^\bullet$ , 这诱导了  $H^n(i^p) : H^n(F^p X^\bullet) \rightarrow H^n(X^\bullet)$ . 由于  $F^p X^\bullet \subseteq F^{p-1} X^\bullet$ , 我们有  $\text{Im } H^n(i^p) \subseteq \text{Im } H^n(i^{p-1}) \subseteq H^n(X^\bullet)$ , 这意味着

$$\Phi^p H^n(X^\bullet) := \text{Im } H^n(i^p)$$

是  $H^n(X^\bullet)$  的一个滤子, 称为  $F^p X^\bullet$  的诱导滤子(derived filtration).

**定义.** 设  $X^\bullet$  是 Abel 范畴  $\mathcal{A}$  上的上链,  $F^p X^\bullet$  是上链的滤子. 若  $\forall n \in \mathbb{Z}$  都能找到整数  $l(n)$  和  $u(n)$  使得  $F^{u(n)} X^n = 0$  且  $F^{l(n)} X^n = X^n$ , 则称滤子  $F^p X^\bullet$  是有界的(bounded).

**定义.** 给定 Abel 范畴中的谱序列  $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ , 若存在分次对象  $H^n$  和  $H^n$  的有界滤子  $\Phi^p H^n$  满足

$$E_\infty^{p,q} \cong \frac{\Phi^p H^n}{\Phi^{p+1} H^n},$$

则称谱序列  $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$  收敛到(converges to)  $H^n$ , 记为

$$E_2^{p,q} \Rightarrow_p H^n.$$

**定理3.3.1.** Abel 范畴  $\mathcal{A}$  中的上链  $X^\bullet$  的滤子  $F^p X^\bullet$  给出的谱序列  $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$  都满足

1. 对任意给定的  $p, q$  都存在  $r$  使得  $E_r^{p,q} = E_\infty^{p,q}$ .
2.  $E_2^{p,q} \Rightarrow_p H^n(X^\bullet)$ .

*Proof.*

□

**命题3.3.2.** 设  $X^{\bullet\bullet}$  是三象限双复形, 且设  $^I E_r^{p,q}, {}^{II} E_r^{p,q}$  是  $\text{Tot}(X^{\bullet\bullet})$  的第一滤子和第二滤子所诱导的谱序列, 那么

1. 第一滤子和第二滤子都是有界的.

2. 对任意  $p, q$  都存在页数  $r = r(p, q)$  使得  ${}^I E_\infty^{p,q} = {}^I E_r^{p,q}, {}^{II} E_r^{p,q} = {}^{II} E_\infty^{p,q}$ .
3.  ${}^I E_2^{p,q} \Rightarrow_p H^n(\text{Tot}(X^{\bullet\bullet}))$  且  ${}^{II} E_2^{p,q} \Rightarrow_p H^n(\text{Tot}(X^{\bullet\bullet}))$ .

虽然这个结果看上去很不错，但不论是符号上还是实际计算上这些都并不能够帮助我们。

**定义.** 给定Abel范畴  $\mathcal{A}$  中的三象限双复形  $X^{\bullet\bullet}$ ，称  $H_I^p(H_{II}^q(X^{\bullet\bullet}))$  为  $X^{\bullet\bullet}$  的第一上同调(the first iterated cohomology)，称  $H_{II}^p(H_I^q(X^{\bullet\bullet}))$  为  $X^{\bullet\bullet}$  的第二上同调(the second iterated cohomology)。

**定理3.3.3.** 给定Abel范畴  $\mathcal{A}$  中的三象限双复形  $X^{\bullet\bullet}$ ，则

1.  ${}^I E_1^{p,q} = H_{II}^q(X^{p,\bullet})$ .
2.  ${}^I E_2^{p,q} = H_I^p(H_{II}^q(X^{\bullet\bullet})) \Rightarrow_p H^n(\text{Tot}(X^{\bullet\bullet}))$ .

对偶地，我们同样有

**定理3.3.4.** 给定Abel范畴  $\mathcal{A}$  中的三象限双复形  $X^{\bullet\bullet}$ ，则

1.  ${}^{II} E_1^{p,q} = H_I^q(X^{\bullet,p})$ .
2.  ${}^{II} E_2^{p,q} = H_{II}^p(H_I^q(X^{\bullet\bullet})) \Rightarrow_p H^n(\text{Tot}(X^{\bullet\bullet}))$ .

**例3.** 给定  $R$  模范畴中的交换图

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{g} & Q \\ \uparrow h & & \uparrow k \\ M & \xrightarrow{f} & N, \end{array}$$

做适当的变换我们得到一个三象限双复形  $X^{\bullet\bullet}$ ，我们考虑  $N, P$  都是  $Q$  的子模的特殊情形，来计算该双复形的全复形

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{\cap} P \oplus N \xrightarrow{g+k} Q$$

的上同调。

**定义.** 设  $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$  是Abel范畴中的谱序列，若  $E_2^{p,q} = 0$  对所有非零的  $q$  都成立，则称  $E_r$  落在  $p$  轴上(collapses on the  $p$ -axis)。



**命题3.3.5.** 设 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ 三象限谱序列, 且 $E_2^{p,q} \Rightarrow_p H^n(X^\bullet)$ , 若称 $E_r$ 落在任意轴上, 则

1.  $E_2^{p,q} = E_\infty^{p,q}$ 对任意 $p, q$ 成立.

2. 若 $E_r$ 落在 $p$ 轴上, 则 $H^n(X^\bullet) = E_2^{n,0}$ ; 若 $E_r$ 落在 $q$ 轴上, 则 $H^n(X^\bullet) = E_2^{0,n}$ .

**定理3.3.6.** 给定Abel范畴 $\mathcal{A}$ 中的三象限谱序列 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ , 且 $E_2^{p,q} \Rightarrow_p H^n(\text{Tot}(X^{\bullet\bullet}))$ , 则

1. 对任意 $n$ 都存在满同态 $E_2^{n,0} \rightarrow E_\infty^{0,n}$ 和单同态 $E_2^{0,n} \rightarrow E_\infty^{n,0}$ .

2. 对任意 $n$ 都存在满同态 $E_\infty^{n,0} \rightarrow H^n(\text{Tot}(X^{\bullet\bullet}))$ 和单同态 $E_\infty^{0,n} \rightarrow H^n(\text{Tot}(X^{\bullet\bullet}))$ .

3. 存在正合序列

$$0 \rightarrow E_2^{1,0} \rightarrow H^1(\text{Tot}(X^{\bullet\bullet})) \rightarrow E_2^{0,1} \xrightarrow{d_2} E_2^{2,0} \rightarrow H^2(\text{Tot}(X^{\bullet\bullet}))$$

### 3.4 Cartan-Eilenberg预解

**定义.** 设 $X^\bullet$ 是Abel范畴 $\mathcal{A}$ 上的上链, 那么称

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow Z^n \rightarrow X^n \xrightarrow{d^n} B^{n+1} \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow B^n \hookrightarrow Z^n \rightarrow H^n \rightarrow 0 \end{aligned}$$

为 $X^\bullet$ 的基本短正合列(fundamental exact sequence). 若上链复形 $X^\bullet$ 的基本短正合列都分裂, 则称 $X^\bullet$ 分裂(split).

**定义.** 设 $X^\bullet$ 是Abel范畴 $\mathcal{A}$ 上的上链, 如果

$$0 \rightarrow X^\bullet \rightarrow I^{0,\bullet} \rightarrow I^{1,\bullet} \rightarrow \dots$$

是整合列且对每个 $p$ 以下每个整合列都是 $\mathcal{A}$ 中的内射预解

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow X^p \rightarrow I^{0,p} \rightarrow I^{1,p} \rightarrow \dots \\ 0 \rightarrow Z^p(X^\bullet) \rightarrow Z^{0,p} \rightarrow Z^{1,p} \rightarrow \dots \\ 0 \rightarrow B^p(X^\bullet) \rightarrow B^{0,p} \rightarrow B^{1,p} \rightarrow \dots \\ 0 \rightarrow H^p(X^\bullet) \rightarrow H^{0,p} \rightarrow H^{1,p} \rightarrow \dots \end{aligned}$$

则称这是 $X^\bullet$ 的一个Cartan-Eilenberg内射预解(Cartan-Eilenberg injective resolution).

**定理3.4.1.** 若Abel范畴 $\mathcal{A}$ 中包含有足够多的内射对象, 则 $\mathbf{Com}^\bullet(\mathcal{A})$ 中的每个上链复形都有Cartan-Eilenberg内射预解.

### 3.5 Grothendieck谱序列

**定义.** 设 $\mathcal{A}$ 是Abel范畴, 且含有足够多的内射对象,  $X$ 是 $\mathcal{A}$ 的对象,  $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 是加性函子. 若 $R^p F(X) = 0$ 对于任意 $p \geq 1$ 都成立, 则称 $X$ 是右 $F$ 零调的(right  $F$ -acyclic).

**定理3.5.1** (Grothendieck谱序列). 设 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}, G: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ 是Abel范畴间的协变加性函子, 且 $\mathcal{B}$ 中包含足够多的内射对象,  $F$ 将 $\mathcal{A}$ 中的内射对象映为 $\mathcal{B}$ 中的右 $G$ 零调对象. 那么对任意 $\mathcal{A}$ 中的对象 $X$ , 存在第一象限的收敛谱序列

$$E_2^{p,q} := (R^p G \circ R^q F)(X) \Rightarrow R^{p+q}(G \circ F)(X).$$

*Proof.* 选取 $X$ 在 $\mathcal{A}$ 中的一个内射预解

$$0 \rightarrow X \rightarrow J^1 \rightarrow J^2 \rightarrow \cdots,$$

于是我们得到 $\mathcal{B}$ 中的一个

□

# 附录 A Abel范畴

一定程度上说，我们构造范畴的目的是抽象出原本一些对象之间的行为，用更一般的方式去理解之前的对象和之间的行为.在代数中，模是一类非常友好的对象，我们希望找到足够抽象的一类对象，他们之间的行为类似于模（或者Abel群），这样的范畴就是Abel范畴.

同调代数中绝大多数的研究对象是Abel范畴中的对象，它们具有许多良好的性质，在这一章中我们将列举绝大部分.但是，同调代数的学习并不需要知道每一个这样性质的来源和证明，甚至在很多情形下一个Abel范畴完全可以看成一个 $R$ 模范畴，虽然这并不准确，但足够对同调代数有正确的理解.这里的建议是大致浏览这一章，知道Abel范畴的定义和一些基本性质，然后进入正式的同调代数的学习，在适当并且需要的时候再去了解和分析Abel范畴中一些性质的证明.

## A.1 Abel范畴中态射的分解

子对象/商对象

定义. 给定范畴 $\mathcal{C}$ 中的两个态射 $f, g: X \rightarrow Y$ ，若存在对象 $K$ 和态射 $i: K \rightarrow X$ 满足

1.  $f \circ i = g \circ i$ ;
2. 若对任意满足 $f \circ h = g \circ h$ 态射 $h: Z \rightarrow X$ 都存在唯一的分解

$$\begin{array}{ccccc} K & \xrightarrow{i} & X & \xrightarrow[f]{g} & Y \\ \uparrow & \nearrow h & & & \\ Z & & & & \end{array}$$

则称 $K$ 是 $f, g$ 的等值子(equalizer).

等值子是无法分辨给定态射 $f, g: X \rightarrow Y$ 的，并且它是所有不能分辨两个给定态射的

定义. 若范畴 $\mathcal{A}$ 满足

1.  $\mathcal{A}$ 中零对象存在;

2. 对 $\mathcal{A}$ 中任意两个对象 $X, Y$ , 它们的和与积都存在;
  3. 若 $f: X \rightarrow Y$ 是 $\mathcal{A}$ 中的态射, 则 $\ker f$ 与 $\operatorname{coker} f$ 存在;
  4. 任意单态射都是某个态射的核, 任意满态射都是某个态射的余核;
- 则称 $\mathcal{A}$ 是Abel范畴(Abelian category).

么半范畴(monoidal category), 或者张量范畴

考虑 $\ker$ 和 $\operatorname{coker}$ , 这两个函子可以看作是 $S$ 和 $Q$ 之间的两个映射, 于是我们有

**定理A.1.1.**  $\ker$ 和 $\operatorname{coker}$ 是Abel范畴下的互逆映射.

**定理A.1.2.** 设 $f: X \rightarrow Y$ 是Abel范畴中的态射, 且 $f$ 同时是单态射和满态射, 于是 $f$ 是同构.

**引理A.1.1.** 设 $f: Y \rightarrow X$ 和 $g: Z \rightarrow X$ 是Abel范畴 $\mathcal{A}$ 中的单态射, 则存在纤维积 $Y \times_X Z$ .

**引理A.1.2.** 对任意Abel范畴 $\mathcal{A}$ 中的态射 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: X \rightarrow Y$ , 它们的等值子存在.

**定理A.1.3.** 设 $f: Y \rightarrow X$ 和 $g: Z \rightarrow X$ 是Abel范畴 $\mathcal{A}$ 中的态射, 则存在纤维积 $Y \times_X Z$ .

**定理A.1.4.** 设 $f: X \rightarrow Y$ 是Abel范畴 $\mathcal{A}$ 中的态射, 则

1.  $f$ 是满态射当且仅当 $\operatorname{im} f = Y$ , 当且仅当 $\operatorname{coker} f = 0$ ;
2.  $f$ 是单态射当且仅当 $\ker f = 0$ , 当且仅当 $\operatorname{coim} f = X$ .

**定理A.1.5.** 设 $f: X \rightarrow Y$ 是Abel范畴 $\mathcal{A}$ 中的态射, 则存在唯一的分解

$$X \xrightarrow{p} I \xrightarrow{i} Y,$$

使得  $p: X \rightarrow I$  是满态射,  $i: I \rightarrow Y$  是单态射.

此外, 如果  $k: K \rightarrow X$  是  $f: X \rightarrow Y$  的核,  $c: Y \rightarrow C$  是  $f: X \rightarrow Y$  的余核, 则  $k: K \rightarrow X$  也是  $p: X \rightarrow I$  的核,  $c: Y \rightarrow C$  也是  $i: I \rightarrow Y$  的余核, 且  $i: I \rightarrow Y$  是  $c: Y \rightarrow C$  的核,  $p: X \rightarrow I$  是  $k: K \rightarrow X$  的余核.

*Proof.* 假设我们有两个不同的对象  $I, \bar{I}$  满足上述分解, 于是我们有如下交换图

$$\begin{array}{ccccc}
 & & I & & \\
 & \nearrow p & \uparrow \varphi & \nwarrow i & \\
 X & & & & Y \xrightarrow{g} Z, \\
 & \searrow \bar{p} & \downarrow \bar{i} & \nearrow & \\
 & & \bar{I} & & 
 \end{array}$$

其中  $i: I \rightarrow Y$  是  $g: Y \rightarrow Z$  的核. 由核的定义, 我们有  $g \circ i = 0$ , 进而  $g \circ \bar{i} \circ \bar{p} = g \circ f = g \circ i \circ p = 0$ . 但  $\bar{p}$  是满态射说明  $\bar{p}$  存在右逆, 故  $g \circ \bar{i} = 0$ . 再根据核的分解, 存在唯一的  $\varphi: \bar{I} \rightarrow I$  使得右边三角形交换, 即  $i \circ \varphi = \bar{i}$ . 故  $i \circ \varphi \circ \bar{p} = \bar{i} \circ \bar{p} = f = i \circ p$ . 但  $i$  是单态射因此存在左逆, 于是  $\varphi \circ \bar{p} = p$ . 这样就证明了  $\varphi$  使整个图交换.

同样地, 我们可以构造  $\psi: I \rightarrow \bar{I}$  使整幅图交换, 根据抽象无意义  $\varphi \circ \psi = \text{id}_I$  且  $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\bar{I}}$ , 故  $I \cong \bar{I}$ , 唯一性得证.  $\square$

**定义.** 设  $P$  是 Abel 范畴  $\mathcal{A}$  中的对象, 满足对任意的满态射  $f: X \rightarrow Y$  和任意态射  $g: P \rightarrow Y$ , 都可以找到  $h: P \rightarrow X$  使得  $g = f \circ h$ ,

$$\begin{array}{ccccc}
 & & P & & \\
 & \nwarrow h & \downarrow g & & \\
 X & \xrightarrow{f} & Y & \longrightarrow & 0.
 \end{array}$$

**习题 A.1.1.** 设  $s: P \rightarrow P$  是 Abel 范畴  $\mathcal{A}$  中的态射,  $(P, s)$  是  $\mathcal{A}/P$  的投射对象, 证明  $P$  是  $\mathcal{A}$  中的投射对象.

*Proof.* 任取  $\mathcal{A}$  中的满态射  $g: X \rightarrow Y$ ,  $\square$

## A.2 Abel 范畴的函子

**定义.** 若  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  加性范畴, 协变函子  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  满足对任意  $\mathcal{C}$  中的对象  $X, Y$ , 由  $F$  诱导的映射  $\text{hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y))$  是群同态, 则称  $F$  是加性函子 (additive functor).

**定理A.2.1.** 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是Abel范畴,  $F : \mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}$ 是加性函子当且仅当 $F$ 保直和.

**命题A.2.2.** Abelian范畴间的左正合函子是加性的.

**定义.** 若范畴间协变函子 $F : \mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{D}$ 满足对任意 $\mathcal{C}$ 中的对象 $A, B$ , 由 $F$ 诱导的映射 $\text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{hom}_{\mathcal{D}}(F(A), F(B))$ 是单射, 则称 $F$ 是嵌入(embedding).

**定理A.2.3.** 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是Abel范畴,  $F : \mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}$ 是加性函子, 则下列陈述等价

1.  $F$ 是嵌入.
2.  $F$ 将非交换图映为非交换图.
3.  $F$ 将非正合序列映为非正合序列.

### A.3 嵌入定理