

EMPATHIE SANS EPUISEMENT

La checklist des 4 leviers valides par les neurosciences

Garder la presence. Reduire la fatigue. Passer de la resonance passive a la compassion active.

Sources : Singer Science 2004 * Klimecki SCAN 2014 * Geng Front.Neurosci. 2018

3 DISTINCTIONS CLES

- ☐ Neurones miroirs decouverts chez le macaque -- pas observes directement chez l'humain.
- ☐ Empathie affective (insula, ressentir) est differente de l'empathie cognitive (CPF, comprendre).
- ☐ Trop d'empathie non regulee peut mener a l'epuisement et a la souffrance amplifiee.

SIGNAUX D'ALERTE : EPUISEMENT EMPATHIQUE

Si 3 signes ou plus regulierement -> appliquer le levier 4 en priorite.

- Evitement des situations emotionnelles
- Cynisme ou detachment progressif
- Irritabilite accrue apres interactions
- Troubles du sommeil / ruminations
- Sentiment de vide ou d'insensibilite
- Baisse de concentration / fatigue

Figley 2002 (Compassion Fatigue) * Klimecki et al. SCAN 2014 * Maslach Burnout Inventory

LES 4 LEVIERS -- PRATIQUE QUOTIDIENNE

Meditation Loving-Kindness (10 min/matin)

- ☐ Commencer par soi : "Puisse-je etre heureux, en bonne sante, en paix"

- 1 ☐ Etendre progressivement : proche > neutre > difficile

-> Active circuits affiliation/recompense (striatum ventral), pas l'insula souffrance.

Klimecki et al., SCAN, 2014 -- DOI : 10.1093/scan/nst060

Synchronie corporelle

- ☐ Contact visuel doux 2-3 sec, posture ouverte, corps oriente vers l'autre

- 2 ☐ Ajuster mon rythme de parole a celui de mon interlocuteur

-> Favorise l'alliance sociale et soutient la production endogene d'ocytocine.

Geng et al., Frontiers in Neuroscience, 2018 -- DOI : 10.3389/fnins.2018.00512

Ecouter les recits a la premiere personne

- ☐ "Comment tu as vecu ca ?" -- laisser narrer sans interrompre

- 3 ☐ Reformuler ce que j'ai entendu avant de repondre

-> Renforce la comprehension empathique et limite la reaction automatique.

Lamm, Decety & Singer, NeuroImage, 2011 -- DOI : 10.1016/j.neuroimage.2010.10.014

Distance compassionnelle

- ☐ "Je ressens ta douleur" --> "Je veux que tu ailles mieux"

- 4 ☐ Rituel decompression le soir : noter les emotions residuelles (2 min)

-> Recrute le CPF pour reguler l'insula -- evite la surcharge emotionnelle.

Singer et al., Science 2004 * Klimecki et al., SCAN 2014

LE PARADOXE A RETENIR

Empathie brute = souffrance amplifiee (insula + aMCC). Compassion = meme presence, circuits distincts (striatum ventral) -- soutenable durablement.

Klimecki SCAN 2014 * Singer Science 2004 * Geng Front.Neurosci. 2018