

MAE5763 - Modelos Lineares Generalizados - Resolução da Lista 1

Guilherme Marthe - 8661962

9/21/2020

$$f_Z(z_i; \mu, \nu, \pi) = \begin{cases} \pi & \text{se } z_i = 0 \\ (1 - \pi) \frac{f_Y(z_i; \mu, \nu)}{1 - f_Y(0; \mu, \nu)} & \text{se } z_i > 0 \end{cases}$$

onde $z_i = 0, 1, 2, \dots$, $i = 1, 2, \dots, n$ e f_y é:

$$f_Y(y; \mu, \nu) = \frac{\Gamma(\nu + y)}{\Gamma(y + 1)\Gamma(\nu)} \cdot \left(\frac{\mu}{\mu + \nu}\right)^y \left(\frac{\nu}{\mu + \nu}\right)^\nu$$

A estatística do teste de razão de verossimilhança para testar $H_0 : \mu = 1$ contra $H_1 : \mu \neq 1$ é:

$$\xi_{RV} = 2[L(z_i; \hat{\mu}, \nu, \hat{\pi}) - L(z_i; 1, \nu, \hat{\pi})]$$

No caso de $Z \sim ZANBI(\mu, \nu, \pi)$ o logarítmo da sua função de massa de probabilidade é:

$$\log(f_Z(z_i; \mu, \nu, \pi)) = \begin{cases} \log(\pi) & \text{se } z_i = 0 \\ \log(1 - \pi) + \log(f_Y(z_i; \mu, \nu)) - \log(1 - f_Y(0; \mu, \nu)) & \text{se } z_i > 0 \end{cases}$$

Definindo k como o número de observações dentre as n que são zero, isto é os i que $z_i = 0$, ao somarmos as log verossimilhanças temos:

$$\begin{aligned} L(z_i; \mu, \nu, \pi) &= \sum_{i=1}^n f_Z(z_i; \mu, \nu, \pi) = \\ &= k \cdot \log(\pi) + (n - k) \cdot \log(1 - \pi) - (n - k) \cdot \log\left(1 - \left(\frac{\nu}{\nu + \mu}\right)^\nu\right) + \\ &+ (n - k) \log(\delta(\nu, y)) + \log(\mu) \sum_{i=1}^{n-k} z_i + (n - k) \nu \log(\nu) - (n - k) \nu \log(\nu + \mu) \end{aligned}$$

Onde definimos $\delta(\nu, y) = \frac{\Gamma(\nu + y)}{\Gamma(y + 1)\Gamma(\nu)}$, e $f_Y(0; \mu, \nu) = \left(\frac{\nu}{\nu + \mu}\right)^\nu$.

Com o objetivo de calcular ξ_{RV} realizamos a diferença $2\{L(z_i; \hat{\mu}, \nu, \hat{\pi}) - L(z_i; 1, \nu, \hat{\pi})\}$. Nesta conta, todos os termos que não dependem de μ são cancelados. Além disso, os termos restantes tem como um de seus fatores o tamanho da amostra não nula $(n - k)$ que é deixado em evidência. Outro aspecto importante é a definição da média amostra não nula $\bar{z}_{z>0} = \frac{1}{(n - k)} \sum_{i=1}^{n-k} z_i$ com $z_i \neq 0$. Então:

$$\begin{aligned} \xi_{RV} &= 2\{L(z_i; \hat{\mu}, \nu, \hat{\pi}) - L(z_i; 1, \nu, \hat{\pi})\} \\ &= 2(n - k) \left[\log\left(\frac{1 - \left(\frac{\nu}{1 + \nu}\right)^\nu}{1 - \left(\frac{\nu}{\hat{\mu} + \nu}\right)^\nu}\right) + \bar{z}_{z>0} \cdot \log(\hat{\mu}) + \nu \cdot \log\left(\frac{1 + \nu}{\hat{\mu} + \nu}\right) \right] \end{aligned}$$

Que é a estatística do teste de razão de verossimilhança proposto para testar $H_0 : \mu = 1$ contra $H_1 : \mu \neq 1$.